NUEVO MANUAL DE MEDICINA HOMEOPÁTICA, 1-2

Gottlieb Heinrich Georg Jahr

Digitized by Google


BARCELONA

image
not
available

Digitized by Google

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPATICA.

I.

Digitized by Google

Tetuan de Chamartin : 1876. — Imp. de Bailly-Bailliere.

Digitized by Google

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA

PRIMERA PARTE

MANUAL DE MATERIA MÉDICA

Ó

RESÚMEN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS CON INDICACION DE LAS OBSERVACIONES CLÍNICAS

Por

EL DOCTOR G. H. G. JAHR

Tercera edicion castellana,

ARREGLADA Á LA OCTAVA FRANCESA POR EL DECANO DE LOS HOMEÓPATAS ESPAÑOLES

D. PEDRO RINO Y HURTADO

Doctor en medicina y cirugía.

Tomo Primero.

MADRID

CARLOS BAILLY-BAILLIERE

LIBRERÍA EXTRANJERA Y NACIONAL, CIENTÍFICA Y LITERARIA

Plaza de Sta. Ana, núm. 10.

Paris, J. B. Bailliere. || Londres, Bailliere.

1876.

Digitized by Google

C.B. B.
P 131

Digitized by Google

AL LABORIOSO MÉDICO

Y DISTINGUIDO HOMEÓPATA

SR. D. ANASTASIO GARCIA LOPEZ

Doctor en medicina y cirugía,
Médico director de baños en propiedad y por oposicion,
Caballero de la real y distinguida órden española de Cárlos III, condecorado con la cruz de primera clase de la órden civil de la Beneficencia, individuo de varias corporaciones médicas, etc.

A vos, querido amigo mio, á quien me unen tantos motivos de adhesion y conformidad de miras, á vos dedico este humilde tributo de mi celo por la propagacion de nuestras hermosas verdades; aceptadlo benévolo, no teniendo en cuenta lo poco que vale, sino lo mucho que significa, como sincero y espontáneo testimonio de la viva estimacion y acendrado cariño que os profesa vuestro siempre atento y consecuente compañero

Q. B. V. M.,

PEDRO RINO.

Digitized by Google

Digitized by Google

PROLOGO DEL TRADUCTOR.

El nuevo MANUAL del doctor JAHR, cuya tercera edicion castellana publicamos ahora, es el libro mas popular y el prontuario mas completo que tenemos en nuestra actual literatura homeopática: este infatigable escritor, que tantos servicios tiene prestados á la causa de la humanidad con el cultivo de la ciencia, que tan de lleno y tan directamente escudriña sus beneficios, tiene ya publicadas, como todo el mundo sabe, una multitud de obras de indisputable mérito científico y de extenso aprovechamiento clínico: constante y asiduo en su prolijo empeño, persevera todavía, siempre incansable y consecuente, en el difícil deber que ha impuesto á su laboriosa cuanto fecunda existencia.

De todas las que ha dado á luz, ninguna ha sido tan universalmente recibida, tan buscada y con tanto afan constantemente consultada como el MANUAL DE MEDICINA HOMEOPÁTICA, cuya octava edicion acaba de publicarse en Francia, y cuya traduccion castellana nos apresuramos á ofrecer á nuestros comprofesores españoles. Comparada esta version con la segunda, publicada en 1858 y que correspondia á la quinta francesa de 1849, la vemos enriquecida con treinta y dos medicamentos, en su mayor parte americanos, que aunque no todos tienen en ella una patogenesia extensa y suficientemente detallada, ofrecen sin embargo un positivo aumento de recursos curativos y un mas ámplio y dilatado horizonte á los importantes y delicados estudios de la terapéutica especifica.

Casi todos ellos tienen ya adquirida en la medicina tradicional una importancia incontestable y á todas luces comprobada por numerosas experiencias, importancia que ya sirve de favorable precedente y de estímulo eficaz á la ávida iniciativa de los homeópatas en el tratamiento de las infinitas enfermedades que afligen á la humanidad; todos son agentes activísimos, de poderosa influencia en nuestro organismo, y de prontos y seguros beneficios en su indicacion acertada y perentoria.

Entre ellos encontramos el ACTÆA O CIMICIFUGA

Digitized by Google

RACEMOSA, cuya influencia, mas ámplia que intensa, sobre el sistema nervioso, la hace aceptable en el tratamiento de muchos padecimientos determinados; ella imprime en él una irritabilidad y una agitacion especial que simbolizan el *Delirium tremens*, y conducen á usarla con buen éxito en la *Corea*, especialmente en la que es de orígen reumático ó uterino; tambien produce constantemente, y por lo mismo cura con frecuencia, las *cefalalgias*, que se acompañan de intensos dolores en los glóbulos oculares; origina desfallecimiento epigástrico, y este es un signo que la indica en las molestias de la *menoposis*. La íntima relacion de todas estas situaciones morbosas, *corea*, *cefalalgia*, *desfallecimiento de estómago é irritacion espinal*, con las funciones uterinas, nos hace presentir: que el útero es acaso el principal centro de su esfera de accion, y efectivamente se le ve influido por esta sustancia de diferentes maneras; así es que ella produce el *aborto* sin irritacion (como la sabina), y excita en el parto sus contracciones, aunque con menos continuidad que el centeno de cornezuelo.

Homeopáticamente administrada es de un poderoso auxilio en las dismenorreas y las histeralgias consecutivas en las personas valetudinarias ó reumáticas; en estas combate las tendencias al aborto y facilita el parto, usada algunas semanas antes de su presentacion; es muy útil en general en las irritaciones esenciales ó idiopáticas del útero y en sus irradiaciones simpáticas, como en la *epilepsia* é *histeria* de complicacion uterina; tambien disipa los *dolores* mamarios profundos de las mujeres continentes, dolores que Simpson dice son al útero lo que al hígado los de la escápula.

Los músculos son á la vez para ella un centro de accion tambien privilegiado; así se la ve muy eficaz en los *reumatismos locales* agudos, como la *pleurodinia*, el *lumbago*, la *torticolis* y aun la *endocarditis*; siendo muy de notar la curacion operada por el doctor Hale de una *angina de pecho*, cuyos accesos se repetian varias veces cada dia. El doctor Ringer la mira como específico en la *artritis reumatismal*, y particularmente en la de orígen uterino y cuando los dolores se agravan por la tarde y por un tiempo húmedo y ventoso. El conocimiento de esta accion especial del *Actæa racemosa* sobre los músculos, indujo al doctor Madden á curarse á sí mismo una *mialgia diafragmática*, que le atormentaba nueve años hacia.

Esta preciosa planta, de tan popular uso en algunas comarcas de la América septentrional, puede compararse con *Arsenicum*, *Hyoscyamus* é *Ignatia*, en sus efectos sobre

el sistema nervioso; con *Caulophyllum* y *Secale cornutum*, en sus relaciones con el útero, y con *Aconitum*, *Bryonia* y *Colchicum*, en sus preferencias musculares.

Encontramos tambien entre ellos el GELSEMINUM SEMPERVIRENS, Jazmin amarillo, que, segun el doctor Guerin-Meneville, constituye una de las mas preciosas conquistas americanas de nuestra materia médica. La accion depresiva que ejerce esta planta sobre la actividad muscular, hasta el punto de aniquilar completamente su ejercicio, solo comparable con la del mismo *Curare*, que produce sus efectos por medio del sistema nervioso, y con el *Upas antiar* (Antiaris toxicaria) por su direccion sobre el muscular, puede constituir, con su poder antipático, un eficaz auxilio en los *espasmos calambrosos*, siendo á veces muy útil en el *trismus histérico*, el *laringismo estridulo* y la *rigidez uterina* durante el parto.

Algunos prácticos tienen una idea elevada de su eficacia antipática en la *dismenorrea* y varios sufrimientos espasmódicos; otros, con este mismo criterio, le consideran como específico de la *fiebre amarilla*; pero nosotros, que damos á la accion homeopática de los remedios una preferencia práctica mas omnímoda y justificada, le aconsejamos en las *parálisis* locales, como la *incontinencia de orina* de los viejos y la *inercia* de los músculos de la deglucion, que tan frecuentemente se presenta despues de las anginas diftéricas, como resultado de la profunda debilidad consecutiva; y como parece que su accion paralizante, enteramente especial, se ejerce sobre los centros sensoriales, produciendo la *ceguera*, en lo que remeda al *conium*, y dando lugar á multitud de desórdenes en la vision, de ahí su indicacion inapreciable en ciertas formas de la *amaurosis*, de la *ptosis*, de la *diplopia* y del *estrabismo*.

Algunos le han considerado como sucedáneo del *Aconitum*, en su accion sobre el sistema circulatorio; pero en realidad no puede rivalizar el *Gelseminum* con esta sustancia sino en muy escasas y determinadas ocasiones. La experiencia clínica enseña cuán eficaz es en el tipo remitente de la fiebre comun y en muchas intermitentes; el doctor Ludlam le recomienda en las remitentes de los niños, y efectivamente se le ve tan eficaz como lo es el *Acónito* en la inflamatoria simple, y la *Baptisia* en las calenturas gástricas. En los mismos adultos se ha manifestado muy poderoso cuando se presenta el recargo por la tarde y por la noche y se pronuncia la remision con sudor hácia la mañana.

La congestion cerebral causada por el *Gelseminum* tiene un carácter venoso pasivo, manifestándose únicamente

Digitized by Google

por cefalalgia gravativa y vértigos; y hé aquí por qué el doctor Hale le recomienda para el estupor soñoliento de los paises y estaciones cálidos. A la congestion en la médula espinal, que tambien produce, debe referirse la depresion graduada de la accion muscular, de que ya he hablado, y su indicacion y reconocida eficacia en la *aphasia* y quizá en la *paraplejia*. Tambien lo han usado con buen éxito en la *meningitis* cerebral epidémica, en la *mialgia* aguda, como la que es consecuencia de un prolongado ejercicio, en las atroces *cefalalgias* causadas por ciertas afecciones cardíacas, en la *escarlatina*, en la *sordera* por afeccion de la trompa de Eustaquio, en el *catarro nasal* y en el *insomnio* por sobreexcitacion cerebral.

El *Agaricus*, la *Baptisia*, el *Cannabis indica*, el *Conium* y el *Opium* tienen con el *Gelseminum* una analogía digna de estudio.

Importantísimo es igualmente el HAMAMELIS VIRGINICA, que tambien figura entre los remedios que enriquecen esta octava edicion, porque su accion directa sobre el sistema venoso la hace sumamente apreciable en nuestra terapéutica. La *flebitis*, la *varicosis* y las *hemorragias* de carácter venoso encuentran en este determinado agente un correctivo eficaz y pronto. En la *flebitis* comparte su poder con la *pulsatilla*; pero en las variadas formas de las afecciones *varicosas* no tiene rival, ni verdadero sucedáneo en nuestra materia médica. Admiracion causa, dice el doctor Guerin-Meneville, á quien me refiero en estas indicaciones, su porteutoso poder para calmar el dolor de las venas varicosas de las piernas, administrada interiormente á la primera ó segunda dilucion, y para producir efectos constrictivos, usada al exterior en tintura dilatada en agua. Conviene igualmente en la *varicosis* de la garganta, cuando esta se presenta azulada por efecto de la dilatacion de las venas, y en la que al malestar que se sigue, se une el dolor al tragar y la espuicion de mucosidades sanguinolentas.

El *Hamamelis* nos proporciona los mayores triunfos cuando estos estados venosos ocupan la extremidad inferior del tubo digestivo; así es que está reconocida su eficacia en las *várices hemorroidales* fluyentes administrada interiormente, y tanto el doctor citado como el mismo Hale, cuyo nombre va al frente de estas patogenesias, nos refieren de ello numerosos ejemplos. Estos hechos auténticos y repetidos han inducido su uso en todas las hemorragias de la misma índole, contándose ya multiplicados testimonios de tan benéfica como incontestable virtud; y tanto es así, que el doctor Preston no vacila en decir del

Digitized by Google

modo mas terminante: que el *Hamamelis* curará muy probablemente todas estas hemorragias venosas, en las cuales la sangre se presenta de una manera regular y sin notables esfuerzos expulsivos. Bajo este propio criterio y consecuentes con estas mismas enseñanzas, le prescriben con feliz éxito en la *epistaxis*, la *hemorragia* consecutiva á la extraccion de un diente, la *melena*, la *hematémesis*, la *hemoptisis*, y hasta en la *púrpura*. Tambien ha curado la menstruacion suplementaria y ayudado mucho en el tratamiento de la disentería. Esta propiedad hemostática del *Hamamelis* es enteramente homeopática, pues ya se sabe cuántos flujos de sangre produce con su uso abusivo é indiscreto.

Recientemente ha realizado sobre sí mismo el doctor Burt experiencias patogenéticas repetidas, que le han hecho conocer otra accion suya directa sobre los testículos, y que viene caracterizada especialmente por dolores neurálgicos, que irradiándose sobre el estómago, dan lugar á náuseas y desfallecimientos; tambien refiere tres casos notables de *neuralgia* ovárica, en los cuales, guiado por la analogía, ha obtenido completas curaciones. En este mismo sentido la elogia el doctor Ludlam en un excelente trabajo sobre la *ovaritis*, recientemente publicado, así como en la *orquitis* y en sus complicaciones blenorrágicas. El mismo Ludlam y el doctor Franklin la miran como específica en la *orquitis* blenorrágica. Tambien está llamada á obtener una grande reputacion como remedio de la *dismenorrea*, especialmente en aquellas que se relacionan con padecimientos de los ovarios. Por tanto, además de su íntima analogía con la *pulsatilla*, tiene muchos puntos de contacto bajo la relacion de sus virtudes hemostáticas, con la *ipecacuanha* y el *millefolium*.

No menos importante es el PODOPHYLLUM PELTATUM de Linneo, familia de las papaveráceas, tan usado como *cholagogo*, y que en la América del Norte atrae sobre su actividad pasmosa la mas popular atencion. La especial actividad de esta planta se ejerce principal y casi exclusivamente sobre la membrana mucosa del tubo digestivo, causando la inflamacion del estómago, de los intestinos delgados y del recto, en términos de ocasionar prontamente la muerte de los perros, segun las experiencias del doctor Grnow. Esta propiedad de obrar tan directamente sobre el tubo digestivo, causando vómitos, diarrea, cólicos, disentería, tenesmo y procidencia del recto, aumentando tambien por lo comun la salivacion y la secrecion biliaria, la hacen muy recomendable, segun el criterio homeopático, en el tratamiento de las enfermedades análogas á sus sín-

Digitized by Google

tomas patogénicos; así es que le vemos muy útil en la *duodenitis* crónica, en la *diarrea* de la fiebre *tifoidea*, en la *rectitis*, y muy particularmente cuando esta se complica con el *prolapsus ani*. Es muy de notar su especial preferencia de accion sobre los tres intestinos delgados y sobre el recto, excluyendo muy perceptiblemente el cólon y el ciego.

Su accion consecutiva sobre las glándulas de la boca, aumentando la secrecion salival, y sobre el hígado promoviendo la de la bílis, le ha valido el título de *mercurio vegetal*, aunque en realidad parece diferir mucho de este policresto. Sus indicaciones se precisan cuando las náuseas, los vértigos, el mal gusto de la boca, las vomituriciones, las diarreas biliosas y las orinas oscuras caracterizan el padecimiento, siendo enteramente ineficaz y dejando todo su lugar al *mercurius solubilis*, cuando el estado bilioso se acompaña de dolor intenso en el hipocondrio derecho, evacuaciones raras y descoloridas con abatimiento de espíritu. Tiene una patente analogía con *Aloe*, *Colchicum*, *Iris versicolor* y *Leptandria*.

El HYDRASTIS CANADENSIS, de Linneo, planta de los Estados-Unidos de América, de la familia de las Ranunculáceas, de la poliandria poliginia, y cuya raiz oficinal, compuesta de tubérculos carnosos, muy amarga y picante, entra tambien en el interesante catálogo con que el doctor Jahr enriquece su octava edicion, es usada en Pensilvania empíricamente contra las oftalmías y contra el cáncer por los indios, y hoy viene á ocupar, en la materia médica homeopática, un lugar preferente debido á las experiencias del doctor Burt y varios otros médicos.

En sus ensayos advirtieron como síntomas predominantes puros: unos, *catarro ocular y nasal*, acompañados de espesa y abundante secrecion blanca; otros, un *espeso moco*, que barnizaba las amígdalas; aquel, síntomas de *catarro con ronquera*, *cefalalgia* y *postracion suma*; este, *desfallecimientos epigástricos* con violentas *palpitaciones*, y una erupcion de *pústulas varioloídeas* con hinchazon del mismo sitio en que se hacia la aplicacion local de su infusion.

Estos fenómenos fisiológicos debieron excitar, y realmente excitaron, la curiosidad de los observadores en la aplicacion terapéutica del *Hydrastis*. Así es que ha sido usado con marcada utilidad en la *oftalmia catarral* y en las *viruelas*; pero el doctor Hale llama muy particularmente la atencion de los prácticos con sus tres principales indicaciones sobre la *constipacion*, las *úlceras* y el *cáncer*.

En el *estreñimiento* de vientre, tanto accidental como habitual, está reconocida su utilidad, haciéndole preceder

en los casos mas crónicos, de una dósis preliminar del *sulfur*; y como quiera que se le concede una accion electiva muy segura sobre el hígado, á causa de verle curar por sí solo varios casos de ictericia, no es nada extraño que su eficacia contra la constipacion reconozca esta misma electividad.

En sus aplicaciones externas sobre las *úlceras*, no varicosas ni bastante simples de la jurisdiccion de la *caléndula*, ningun medicamento reemplaza al *Hydrastis* en el sentir de algunos escritores. El mismo doctor Hale, citando numerosos testimonios de su eficacia, lo recomienda tópicamente en las úlceras de los orificios mucosos, la boca, la garganta, la nariz, los ojos, el recto, la vejiga y el cuello uterino, y el doctor Yeldham lo aconseja en inyecciones contra la *blenorrea* y la *gota militar*.

Pero en ninguna enfermedad es su estudio tan importante, ni tan bienhechora su influencia como en el *cáncer*. Ya se venian sirviendo de él, como principal ingrediente, en la composicion de la pasta cáustica, que empíricamente usan algunos prácticos para la extirpacion de los tumores escirrosos; los doctores Marston y Mac-Limont, secundando esta rutina, lo han administrado al interior y se han visto sorprendidos por la felicidad de los resultados conseguidos. Su administracion interna, seguida casi siempre de alivio en el dolor y de mejoría general, y aun en ciertos casos tambien su uso externo en lociones, aliviando y á veces destruyendo tan completamente los síntomas mas ominosos, han dado lugar á prescindir de toda otra medicacion. Con todo, el doctor Bayes, á quien debemos la mayor parte de estas enseñanzas sobre la eficacia del *Hydrastis* en el cáncer, asegura: que este medicamento no influye seguramente sobre la diátesis, y ni tampoco presta grande utilidad en el *cáncer uterino*; pero que tiene sin disputa un grande valor en los casos de *tumores escirrosos* desarrollados en el interior de los *tejidos glandulares*, á virtud de su especial influencia sobre las glándulas mismas. Unicamente queda ineficaz cuando la glándula se encuentra como identificada ó profundamente envuelta por la masa cancerosa, de tal suerte que, no quedando sino muy poco ó ningun tejido sano, dispuesto á recibir la benéfica accion del remedio, viene á ser materialmente imposible su restablecimiento.

Por tanto, no se conoce ningun verdadero sucedáneo del *Hydrastis*, á no ser que el *arsénico*, el *condurango* ó el *murex purpúrea* reclamen con el tiempo alguna participacion en su eficacia portentosa y reconocida. Los autores recomiendan las mas bajas atenuaciones en la constipa-

Digitized by Google

cion; pero para el cáncer recorren toda la escala desde la 30 hasta media gota de la tintura madre. En las aplicaciones externas se usa la tintura muy extendida, ó infusiones débiles; en la actualidad se recomienda el Muriato de hydrastina en la proporcion de 10 granos por 8 onzas de agua.

La BAPTISIA TINCTORIA, planta que tambien lleva el nombre de *indigo silvestre*, y de la que es oficinal la corteza de la raiz, con la que se prepara la tintura fuerte, es otro de los preciosos remedios de nuestra novísima edicion. Su perentoria indicacion en las diferentes formas de la fiebre, que suele preceder ó constituir el primer período de la *tifoidea*, y su manifiesta eficacia para destruirla, de la que recientemente tenemos nosotros mismos un palpitante ejemplo práctico, la hacen de un valor inapreciable en tan peligrosa enfermedad; hé aquí su patognomónico: «Sentimiento de debilidad, temblores, pulso frecuente, lleno y blando, calor externo é interno con sed, cefalalgia con tendencia al delirio, lengua de un oscuro amarillento en el centro y roja sobre los bordes, constipacion alternando con diarrea»..... En el primer período de la fiebre tifoídea ó entérica, cuando la piel se presenta caliente y seca, el pulso lleno y frecuente, la lengua cubierta de una espesa capa de color pardo blanquecino ó amarillento, con cefalalgia ó delirio, cuando menos por la noche, anorexia con sed ardiente, orinas encendidas y el enfermo por lo comun restreñido de vientre, cuando ya se insinuan los síntomas tifoídeos, entonces es cuando la *Baptisia* ejerce su poderoso y bienhechor influjo.

Tampoco tiene grande analogía la *Baptisia* con ningun otro medicamento como no sea con el *Gelseminum*; el acónito es impotente en el cuadro de síntomas que la pertenecen; el arsénico, á pesar de tener tanto lugar en los períodos subsiguientes de la fiebre tifoídea, tampoco puede considerarse como su sucedáneo en ningun caso; la brionia es quizá el que mas se le aproxima. La *Baptisia* se recomienda á dósis masivas, una ó dos gotas de la primera dilucion decimal cada dos horas. Nostros la administramos actualmente con incontestable buen éxito en glóbulos de la tercera y en gotas de la segunda decimal.

Ultimamente el IRIS VERSICOLOR, la HELONIAS DIOICA, que es el VERATRUM LUTEUM de Linneo, son otras tantas adquisiciones recientemente comprendidas en esta novísima edicion. El primero, cuya raiz sirve para la preparacion de la tintura madre, pasa en América por un poderoso emético, enérgico purgante y excitante reconocido de las secreciones salival y biliosa. Efectivamente, las experiencias recientes, tanto puras como pato-

ógicas, ponen de manifiesto su accion incontestable sobre el páncreas, el hígado, las glándulas salivales y todo el tubo intestinal; así es que su grande similitud le aconseja en el cólera morbo esporádico, en los vómitos y diarreas violentas y hasta en el cólera morbo infantil, pudiendo ser á la vez muy frecuentemente útil en las salivaciones mercuriales, afecciones agudas del páncreas, neuralgias del lado derecho de la cara y en las pérdidas seminales esténicas.

Los análogos del Iris versicolor parecen ser el *Antimonium tartaricum*, el *Colchicum*, la *Ipecacuanha*, el *Mercurius*, el *Podophyllum peltatum* y el *Stannum*. Tambien en este recomiendan los autores las bajas diluciones.

El HELONIAS DIOICA de Pursh, planta indígena de los Estados-Unidos, y de cuya raiz se valen tambien para obtener la tintura fuerte; es un irritante especial de la membrana mucosa génito-urinaria. Produce dolor y pesadez en los riñones, miccion frecuente y copiosa, con sentimiento de ardor en la uretra, dolores tractivos desde el dorso al útero, metrorragia, hinchazon y sensibilidad de los pechos: por tanto, se usa con frecuencia en los padecimientos renales y uterinos, en el prolapsus de la matriz, la menorragia, la leucorrea y otros estados atónicos de este órgano, lo que le ha valido el renombre de tónico uterino. Realmente parece estar dotado de grandes virtudes curativas al verle tan eficaz para remediar de un modo tan notable la debilidad concomitante y la anemia, y así se le compara en sus efectos al Acido fosfórico, al hierro y al estaño como medicamento uterino. Tambien se le recomienda en dósis masivas, la tintura fuerte ó la primera trituracion de la *Helonina*, que viene á ser una preparacion concentrada.

Por la importancia que tienen las especiales indicaciones de estos ocho remedios, cuya reseña acabamos de hacer, y que es en un todo comparable á las que omito, vendrán en conocimiento nuestros lectores de la necesidad científica y conveniencia práctica de incorporar en nuestra materia médica todos estos agentes con que el doctor Jahr enriquece su octava edicion, necesidad y conveniencia, que ya mas de una vez hemos tenido ocasion de justificar y comprobar en el estrecho círculo de nuestras actuales aplicaciones clínicas. Todos estos agentes son dignos de un atento y prolijo estudio, y todos prometen ensanchar más y más el dilatado horizonte de nuestras felices aplicaciones.

Así que, hemos empleado un especial cuidado para no omitir en la traduccion del Repertorio terapéutico y sinto-

matológico, ninguna de las signaturas que se refieren á ellos y que vienen intercaladas entre las de las ediciones precedentes. Indudablemente la edicion que ofrecemos hoy al público médico, responde á una exigencia positiva de la ciencia y satisface una apremiante y perentoria necesidad de nuestra terapéutica. Tambien hemos procurado al hacer esta revision de la edicion castellana de 1858, corregir las inadvertencias y equivocaciones, que tan naturalmente se deslizan en esta clase de trabajos, todos delicados y prolijos; siendo de notar con verdadera fruicion que son demasiado reducidas las que hemos encontrado, pero no así las pruebas del concienzudo interés y esmerada solicitud científica con que desde luego se hiciera la primitiva traduccion castellana.

Barcelona y mayo, 1872.

PEDRO RINO.

Digitized by Google

image
not
available

nidad, sin ocuparnos de su importancia, ¿á dónde nos conduciria á todos semejante conducta? Que entren desde luego todas estas sustancias en nuestros periódicos solamente, así pueden llamar la atencior de los prácticos con su existencia efímera, si se quiere, y cuando ellos hayan comprobado su valor, entonces, y solo entonces, las aceptaremos nosotros.

Además, hemos agregado á la MATERIA MÉDICA una *tabla alfabética de las mas importantes indicaciones*, en la que no hemos colocado mas que seis ú ocho medicamentos para cada una, estampándolos, no por órden alfabético, sino por el de su importancia práctica. Al componer esta tabla, hemos atendido sobre todo á la necesidad de los principiantes; pero pensamos que ella podrá tambien ser muy útil al práctico: separándola del tomo, la podrá agregar á su agenda y consultarla fácilmente cuando se escriban las notas. Esto evitará el inconveniente de llevar un libro voluminoso sin privarse de un ayuda-memoria necesario.

En fin, hemos empleado nuevamente toda nuestra atencion sobre el REPERTORIO que desde la sexta edicion ha sido literalmente refundido y aumentado con un gran número de preciosas indicaciones, notablemente para las *circunstancias agravantes* y los *epifenómenos de los padecimientos de cabeza*, de las *fiebres*, de las *odontalgias*, de las *afecciones gástricas*, etc. Lo hemos redactado de nuevo bajo una manera *absolutamente independiente del texto*, del que forma, no la *tabla*, sino el *suplemento*, por decirlo así, sin contener mas que las indicaciones necesarias al práctico, y remitiéndose, no solamente al texto, sino tambien á los datos contenidos en los avisos clínicos. Esperamos que los prácticos no dejarán de servirse de él con mas fruto que hasta aquí.

Para marcar el grado de importancia de los medicamentos citados en el Repertorio, usaremos de signos característicos que los dividan en cinco clases, á saber:

1.° Con *mayúsculas* (*ARN. p. ejem.) los medicamentos mas importantes de todos;

2.° Con *caractéres cursivos* y *asterisco* (**arn.* p. ejem.) aquellos que la práctica ha confirmado de una manera bastante frecuente;

3.° Con *caractéres cursivos y un pequeño cero* (°*arn.* p. ejem.), los medicamentos prácticos del tercer órden;

4.° Con *caractéres cursivos sin signo* (*arn.* p. ejem.), los medicamentos cuya patogenesia recomienda á la atencion de los prácticos,

5.° Con *caractéres de texto*, aquellos que parecen tener menos importancia que los otros.

En cuanto á esta *octava edicion*, podemos decir que la hemos revisado y corregido con todo el cuidado posible: los resultados que ha obtenido este Manual nos alentaban y aun nos obligaban á ello. Se comprenderá que hemos hecho cuanto dependia de nuestra voluntad para hacerlo más y más útil á los prácticos, y para responder á la atencion siempre en aumento, que el público y los médicos conceden á nuestro arte.

En estos últimos años se han hecho grandes esfuerzos para la propagacion de la homeopatía. En Italia, en Inglaterra, en Alemania, en Rusia, en España, en el Brasil, por todas partes, en fin, cuenta ella numerosos representantes; testas coronadas la han concedido su estimacion y su confianza. Muchos médicos de un reconocido talento no han esquivado ocuparse sériamente de ella; nuevos periódicos y nuevos libros se han publicado para su defensa. En Francia no está seguramente en decadencia; en el mismo Paris, asiento de las facultades y de las academias, foco ardiente de las luchas y de las rivalidades, ella prosigue su marcha victoriosa: el gobierno francés se ha visto obligado á ceder á la evidencia de los hechos y á reconocer, á pesar de la oposicion de la Academia, las ventajas que todos podian reportar de la propaganda homeopática. Al mismo tiempo, el público se muestra tambien más y más decidido por la reforma de Hahnemann. Algunos años más todavía, y la homeopatía alcanzará por todas partes el rango que merece.

10 de octubre, 1871.

Digitized by Google

TABLA DE LAS MATERIAS

DE LA PRIMERA PARTE.

Dedicatoria. v
Prólogo del Traductor. vii
Advertencia de la oc'ava edicion. xvii
Tabla de las materias. xx

AVISOS Y EXPLICACIONES DIFERENTES. xxv
I. Orden bajo el que se podrán estudiar los medicamentos. xxv
II. Distribucion de las materias en la exposicion de la patogenesia de los medicamentos. xxvi
III. Explicacion de algunas expresiones, en cuya acepcion podrán ocurrir dudas. xxvii
IV. Explicacion de los signos usados para designar las diferentes especies de sintoma. xxxi

INTRODUCCION. 1
I. Objeto y composicion de esta obra. 1
II. Sobre los sintomas consignados en esta obra. 2
III. Sobre las advertencias clínicas, que se hallan á la cabeza de cada medicamento. 5
IV. Sobre las dósis homeopáticas usadas. 6
V. De la repeticion de las dósis. 8
VI. De la duracion de accion de los medicamentos. 11
VII. De los medicamentos análogos. 13
VIII. Sobre el modo de servirse de este Manual. 15

MEDICAMENTOS CONTENIDOS EN ESTA OBRA

CON INDICACION DE SUS ABREVIATURAS.

1. ACON. *Aconitum napellus*, Acónito napelo. 17
2 AES-HIPP. *Aesculus hippocastanum*, Castaña de Indias. 25
3. AGAR. *Agaricus muscarius*, Agarico, Naranja falsa, Hongo rojo. . . 25
4. AGAV. *Agave americana*, Aloe Pitter. 29
5. AGN. *Agnus castus*, Sauzgatillo comun. 30
6. ALS. *Aloes soccotrina*, Aloes. 32
7. ALUM. *Alumina*, Alúmina, Arcilla. 39
8. AMBR. *Ambra grisea*, Ambar gris. 46
9. AMM. *Ammonium carbonicum*, Carbonato de amoniaco, Sal volátil de Inglaterra. 51
10. AMM-MUR. *Ammonium muriaticum*, Muriato de amoniaco, Sal amoniaco. 57
11. ANAC. *Anacardium orientale*, Haba de Malac. 62
12. ANG. *Angustura*, Angustura verdadera (corteza de la Bonplandia trifoliata). 66
13. ANT-CRUD. *Antimonium crudum*, Antimonio crudo, Sulfuro de antimonio. 70
14. APIS. *Apis mellifera*, Abeja melífera. 75

15. APOC-ANDR. *Apocynum androsemifolium*. 82
16. APOC-CAN. *Apocynum cannabinum*, Cáñamo americano. 82
17. ARG. *Argentum foliatum*, Plata. 83
18. ARG-N. *Argentum nitricum*, Nitrato de plata. 86
19. ARMOR. *Armoracia rusticana*. Rábano oficinal. 92
20. ARN. *Arnica montana*, Arnica de los montes. 93
21. ARS. *Arsenicum album*, Arsénico. 99
22. ARUM-TR. *Arum triphyllum*. 111
23. ASA. *Asa fœtida*, Gomo-resina de férula. 111
24. ASAR. *Asarum europæum*, Asaro de Europa. 115
25. AST. *Asterias rubens*, Asteria roja, Estrella de mar. 118
26. AUR. *Aurum foliatum*, Oro metálico. 119
27. AUR-M. *Aurum muriaticum*, Muriato de oro. 125
28. AUR-S. *Aurum sulfuricun*, Sulfato de oro. 129
29. BAPT. *Baptisia tinctoria*, Baptisia. 132
30. BARYT. *Baryta carbonica*, Carbonato de baryta.. 132
31. BAR-M. *Baryta muriatica*, Muriato de barita. 138
32. BELL. *Belladona*, *Atropa belladona*, Belladona. 140
33. BENZ. *Benzois acidum*, Acido benzóico, Flores de benjuí, Benjuí. . 153
34. BERB. *Berberis vulgaris*, Agracejo.. 155
35. BISM. *Bismuthum*, Bismuto.. 162
36. BORAX. *Borax veneta*, Sub-borato de sosa. 164
37. BOUN. *Bounafa*, Raiz de bunafa.. 169
38. BOVIS. *Bovista*, Bovista, Pedo de lobo de los vaqueros. 170
39. BROM. *Bromum*, Bromo. 174
40. BRUC. *Brucea antidysenterica*, Angustura falsa. 182
41. BRY. *Bryonia alba*, Brionia. 184
42. CACT. *Cactus grandiflorus*, Cactus. 194
43. CALAD. *Caladium seguinum*, Pié de buey venenoso.. 195
44. CALC. *Calcarea carbonica*, Carbonato de cal, sub-carbonato de cal de ostras. 198
45. CALC-PH. *Calcarea phosphorica*, Fosfato de cal.. 211
46. CAMPH. *Camphora*, Alcanfor. 214
47. CANN. *Cannabis sativa*, Cáñamo cultivado. 218
48. CANTH. *Cantharis*, Cantárida oficinal.. 222
49. CAPS. *Capsicum annuum*, Pimienta de Cayena. 226
50. CARB-AN. *Carbo animalis*, Carbon animal. 230
51. CARB-VEG. *Carbo vegetabilis*, Carbon vegetal. 234
52. CAST-EQ. *Castor equi*, Castaña de los caballos. 242
53. CAST. *Castoreum*, Castórco. 243
54. CAUST. *Causticum*, Cáustico. 245
55. CEP. *Cepa*, Cebolla. 255
56. CHAM. *Chamomilla vulgaris*, *Matricaria chamomilla*, Chamomilla, Manzanilla vulgar.. 258
57. CHEL. *Chelidonium majus*, Celidonia mayor. 266
58. CHIN. *China*, *cinchona officinalis*. Quina. 268
59. CHININ. *Chininum sulfuricum*, Sub-sulfato de quinina. 277
60. CHLOR. *Chlorum*, Cloro. 287
61. CIC. *Cicuta virosa*, *Cicutaria aquatica*, Cicuta de agua. 291
62. CIMIC. *Cimicifuga racemosa*, Yerba de San Cristóbal en racimos.. . 294
63. CIN. *Cina*, Artemisa de Alepo.. 295
64. CINN. *Cinnabaris*, Cinabrio, Sulfuro rojo de mercurio. 298
65. CIST. *Cistus canadensis*, Cisto heliantemo. 300
66. CLEM. *Clematis erecta*, Clematide derecha. 302

Digitized by Google

67. COCC. *Cocculus*, Coca de Levante. 505
68. COCC-CAC. *Coccus cacti*, Cochinilla de Méjico. 511
69. COFF. *Ceffea arabica*, *Coffea cruda*, Café crudo. 514
70. COLCH. *Colchicum autumnale*, Cólchico de otono.. 516
71. COLOC. *Colocynthis*, Coloquintida. 520
72. CON. *Conium maculatum*, Cicuta mayor.. 524
73. COP. *Copaivæ Balsamum*, Bálsamo de copaiba. 532
74. CORALL. *Corallium rubrum*, Coral rojo. 532
75. CROC. *Crocus sativus*, Azafran cultivado. 534
76. CROTAL. *Crotalus horridus*, Veneno de la serpiente de cascabel. . 538
77. CROTON. *Croton Tiglium*, Aceite de croton. 541
78. CUPR. *Cuprum metallicum*, Cobre metálico. 551
79. CUPR-AC. *Cuprum aceticum*, Acetato de cobre, cardenillo. . . . 556
80. CUPR-C. *Cuprum carbonicum*, Sub-carbonato de cobre. 557
81. CYCL. *Cyclamen europæum*, Pan porcino. 558
82. DAPH. *Daphne indica*, Dafné de las Indias. 561
83. DIG. *Digitalis purpurea*, Digital purpúrea. 564
84. DROS. *Drosera rotundifolia*, Drosera de hojas redondas, Rocio del sol.. 569
85. DULC. *Dulcamara*, Dulcamara 572
86. EUPHORB. *Euphorbium officinale*, Euforbio oficinal. 577
87. EUPH. *Euphrasia officinalis*, Eufrasia oficinal.. 580
88. FERR. *Ferrum metallicum*, Hierro metálico. 582
89. FERR-M. *Ferrum muriaticum*, Hidroclorato de hierro. 587
90. FLUOR-AC. *Fluoris acidum*, Acido fluórico. 588
91. GELS. *Gelseminum sempervirens*, Jazmin amarillo. 597
92. GINS. *Ginseng*, Ginseng. 598
93. GRAN. *Granatum*, Corteza de la raiz del granado. 602
94. GRAPH. *Graphites*, Grafito, Plombagina, Lapiz-plomo. 606
95. GRAT. *Gratiola officinalis*, Graciola. 614
96. GUAI. *Guaiacum officinale*, Resina de Guayaco.. 616
97. HAMAM. *Hamamelis virginica*, Hamamelis de Virginia. 618
98. HELL. *Helleborus niger*, Eléboro negro. 619
99. HEP. *Hepar sulfuris*, Hígado de azufre. 622
100. HIPP. *Hippomanes*, Hippomane. 629
101. HYDRAS. *Hydrastis canadensis*. 633
102. HYDR. *Hydrociani acidum*, Acido prúsico. 635
103. HYOSC. *Hyoscyamus niger*, Beleño negro. 637
104. IATR. *Iatropha curcas*, Piñon grueso de la India, Higuera infernal de América. 642
105. IGN. *Ignatia amara*, Haba de San Ignacio. 644
106. IND. *Indigo*, Indigo, Añil. 651
107. IOD. *Iodium*, Iodo.. 655
108. IPEC. *Ipecacuanha*, Ipecacuana. 657
109. IRIS. *Iris versicolor*, Iris de América. 662
110. KAL-BI. *Kali bichromaticum*, Bicromato de potasa. 662
111. KAL. *Kali carbonicum*, Subcarbonato de potasa, Sal de tártaro.. . . 669
112. KAL-CH. *Kali chloricum*, Cloruro de potasa, Muriato oxigenado de potasa. 677
113. KAL-H. *Kali hydriodicum*, Hidriodato de potasa. 679
114. KALM. *Kalmia latifolia*, Kalmia de hojas anchas. 681
115. KREOS. *Kreosotum*, Kreosota. 684
116. LACH. *Lachesis*, Veneno dentario del Trigonocéfalo con losanges. . . 691
117. LACHN. *Lachnantes tinctoria*, Lachnantes. 705

Digitized by Google

118. LACT. *Lactuca virosa*, Lechuga virosa.. 508
119. LAUR. *Laurocerasus*, Laurel cerezo. 520
120. LED. *Ledum palustre*, Romero silvestre. 523
121. LEPT. *Leptandra Virginica*, Leptandra. 527
122. LYC. *Lycopodium clavatum*, Licopodio, Pié de lobo. 528
123. MAGN. *Magnesia carbonica*, Magnesia carbonatada. 540
124. MAGN-M. *Magnesia muriatica*, Muriato de magnesia. 545
125. MAJOR. *Majorana*, Mejorana, Almoraduz. 549
126. MANC. *Mancinella*, Manzanillo venenoso.. 550
127. MANG. *Manganum*, Manganeso. 554
128. MEN. *Menyanthes trifoliata*, Trébol acuático. 558
129. MEPH. *Mephitis putorius*, Jugo fétido del putorius. 560
130. MERC. *Mercurius*, Mercurio. 563
131. MERC-C. *Mercurius sublimatus s. corrosivus*, Sublimado corrosivo, ó Deuto-cloruro de mercurio.. 577
132. MEZ. *Mezereum*, Mezereon, Laureola hembra. 582
133. MILL. *Millefolium*, Mil en rama, Yerba de San Juan. 586
134. MOSCH. *Moschus*, Almizcle. 590
135. MUR. *Murex purpurea*, Murice. 593
136. MUR-AC. *Muriatis acidum*, Acido muriático ó hidroclórico. . . . 595
137. NATR. *Natrum carbonicum*, Subcarbonato de sosa. 599
138. NATR-M. *Natrum muriaticum*, Muriato de sosa, Sal comun. . . 606
139. NITGL. *Nitroglycerinum*, Nitroglicerina, Glonoina. 615
140. NITR. *Nitrum, Kali nitricum*, Nitro, Nitrato de potasa. 619
141. NITR-AC. *Nitri acidum*, Acido nítrico. 623
142. NUPH. *Nuphar luteum*. 631
143. N-JUGL. *Nux Juglans*, Nuez de nogal.. 634
144. N-MOSCH. *Nux Moschata*, Nuez moscada.. 636
145. N-VOM. *Nux vomica*, Nuez vómica. 640
146. OLEAN. *Oleander*, Laurel rosa. 658
147. OP. *Opium*, Opio. 662
148. OX-AC. *Oxalis acidum*, Acido oxálico.. 666
149. PAR. *Paris quadrifolia*, Uvas de zorro.. 671
150. PETR. *Petroleum*, Aceite de petróleo. 675
151. PHOSPH. *Phosphorus*, Fosforo.. 681
152. PHOSPH-AC. *Phosphori acidum*, Acido fosfórico. 692
153. PHYT. *Phyto acca*, Espinaca de Indias. 699
154. PLAT. *Platina*, Platina.. 704
155. PLUMB. *Plumbum*, Plomo. 710
156. PODOPH. *Podophyllum peltatum*.. 715
157. PRUN. *Prunus spinosa*, Ciruelo espinoso, Espino negro. 720
158. PULS. *Pulsatilla nigricans*, Anémona de los prados, Pulsatilla negra. 722
159. RAN. *Ranunculus bulbosus*, Ranúnculo bulboso. 738
160. RAN-SC. *Ranunculus sceleratus*, Ranúnculo. 741
161. RAPH. *Raphanus sativus*, Rábano. 744
162. RHAB. *Rhabarbarum (Rheum)*. Ruibarbo. 748
163. RHOD. *Rhododendron chrysanthum*, Rosal de flores blancas. . . 751
164. RHUS. *Rhus toxicodendron*, Arbol venenoso, Zumaque venenoso. . 755
165. RUM-CR. *Rumex crispus*, Romaza rizada. 766
166. RUM. *Rumex patientia*, Romaza oficinal. 767
167. RUT. *Ruta graveolens*, Ruda de los jardines.. 772
168. SABAD. *Sabadilla*, Cebadilla. 777
169. SABIN. *Sabina*, Sabina.. 784
170. SAMB. *Sambucus nigra*. Saúco. 785

171. SANG. *Sanguinaria canadensis*, Sanguinaria del Canadá. 788
172. SARRAC. *Sarracenia purpurea*. 794
173. SASS. *Sassaparilla*, Zarzaparrilla. 795
174. SEC. *Secale cornutum*, Centeno de cornezuelo. 799
175. SELEN. *Selenium*, Selenio. 803
176. SENEC. *Senecio aureus*. 806
177. SENEG. *Senega*, *Polygala senega*, Poligala de Virginia.. 807
178. SEP. *Sepia*, Sepia.. 811
179. SIL. *Silicea*, Silice. 823
180. SPIG. *Spigelia*, Espigelia antihelmíntica, Polvo para las lombrices. . . 833
181. SPON. *Spongia tosta*, Esponja tostada 838
182. SQUILL. *Squilla maritima*, Escila marítima, Cebolla albarrana. . . 842
183. STANN. *Stannum*, Estaño. 845
184. STAPH. *Staphysagria*, Estafisagria. 850
185. STICT. *Sticta pulmonaria* 857
186. STRAM. *Stramonium*, *Datura stramonium*, Manzana espinosa, Rabiacan. 858
187. STRONT. *Strontiana*, Estronciana. 862
188. SULF. *Sulfur*, Azufre. 863
189. SULF-AC. *Sulfuris acidum*, Acido sulfúrico. 885
190. TABAC. *Tabacum*, *Nicotiana tabacum*, Tabaco. 888
191. TARAX. *Taraxacum*, *Leontodon taraxacum*, Diente de leon. . . 891
192. TARENT. *Tarentula hispanica*, Tarántula española.. 894
193. TART. *Tartarus emeticus*, *Antimonium tartaricum*, *Tartarus stibiatus*, Tártaro emético. 898
194. TEUCR. *Teucrium marum verum*, Germandina marítima.. . . . 903
195. THER. *Theridium curassavicum*, Araña negra de Curasao. . . . 906
196. THUJ. *Thuja occidentalis*, Tuya del Canadá. 907
197. VALER. *Valeriana officinalis*, Valeriana oficinal.. 914
198. VERATR. *Veratrum album*, Eléboro blanco. 918
199. VERATR-LUT. *Veratrum Luteum*, Helonia dióica, Eléboro amarillo. 926
200. VERART-VIR. *Veratrum viride*, Elébero verde. 927
201. VERB. *Verbascum thapsus*, Gordolobo. 928
202. VIOL. *Viola odorata*, Viola de marzo. 930
203. VIOL-TR. *Viola tricolor*, Pensamiento... 932
204. ZINC. *Zincum*, Zinc. 934
205. MAGS. *Magnes artificialis*, Iman artificial. 940
206. MGS. *Magnetis poli ambo*, los dos polos del iman. 940
207. M-ARC. *Magnetis Polus arcticus*, Polo Norte del iman.. 943
208. M-AUS. *Magnetis Polus australis*, Polo sud del iman.. 946

Tabla alfabética de las indicaciones clínicas mas importantes. 950

Nota 1. — Para la *historia natural* y la *preparacion farmacéutica* de los medicamentos precedentes, véase nuestra obra titulada: **Nueva Farmacopea homeopática**, etc., por el doctor G. H. G. Jahr y A. Catellan, farmacéutico homeopático, etc. Madrid, 1860, segunda edicion española, por D. S. R. Lopez. Editor, Bailly-Bailliere, plaza de Santa Ana, 10.

Nota 2. — Los farmacéuticos en cuyas casas se podrán adquirir los medicamentos homeopáticos, son: en Madrid, D. Cesáreo Martin Somolinos, Infantas, 26; D. Manuel Carrion y Muñoz, Abada, 4 y 6: en Barcelona, D. Victor María Grau, Union, 6 y 8, etc., etc.

Digitized by Google

ADVERTENCIAS

Y EXPLICACIONES DIFERENTES.

I. — ORDEN

en el que se podrán estudiar los medicamentos.

A.) PARA LOS MEDICAMENTOS SEGUN SU PREFERENCIA.

A.) Policrestos.—1) Acon. bell. bry. merc. n-vom. puls. —2) Arn. ars. cham. lach. rhus. sulf.—3) Calc. chin. lyc. phos. sep. sil.—4) Carb-veg. dulc. hep. hyosc. ipec. veratr. (24). 24

B.) Semipolicrestos.—1) Caus. cocc. ferr. graph. ign. nitr-ac. op. petr. staph.—2) Aur. baryt. cann. canth. coloc. con. phos-ac. spig. stram.—3) Ant. cic. coff. kal. magn. magn-m. plat. stann. tart.—4) Dig. dros. iod. led. natr. natr-m. n-mos. thuj. zinc. (36). 60

C.) *Medicamentos usados con frecuencia.*—1) Alum. amm. apis. borax. cupr. hell. kreos. mez. mur-ac. spong. sulf-ac.—2) Amm-m. asa. carb-a. cin. euphr. millef. mosch. sabad. sabin. sass. squill.—3) Agar. ambr. anac. bism. caps. cep. clem. colch. magn. rhab. valer.—4) Agn. als. ang. asar. bovis. guai. oleand. plumb. prun. rhod. rut. (44). 104

D.) *Medicamentos de que hasta ahora se ha hecho menos uso.* —1) Bar-m. calc-ph. camph. chel. croc. cylc. euphorb. fluor-ac. grat. laur. nitr. samb. sec. seneg. tarax. mgs. —2) Arg. arg-n. aur-m. crot. men. meph. nitrgl. par. ran. ran-sc. stront. tabac. teucr. verb. viol-od. viol-tr. —3) Berb. brom. bruc. calc-ph. chlor. cinn. cist. corall. daph. fluor-ac. kal-bi. merc-c. n-jugl. rum. sang. selen. —4) Ast. aur-s. benz. calad. cast. cast-eq. crot. kal-ch. kal-h. lact. maj. manc. murex. ox-ac. ther. mgs. (64).. 168

B.) PARA LOS ESTUDIOS QUE SE HAN DE HACER.

1er. Curso.—Lo que hay mas importante.

1. Distincion de los casos clínicos *mas importantes* para todos los medicamentos de las letras A-D.

Digitized by Google

2. Distincion de lo que hay *mas importante* en los SÍNTOMAS GENERALES, comprendiendo en ella los de la *piel*, *sueño*, las *fiebres* y la parte *moral* para A y B.
3. Estudio de lo que hay *mas importante* en los síntomas de los ÓRGANOS PARTICULARES, solamente para A.
4. El mismo estudio para B.
5. El mismo estudio del núm. 2, para C y D.
6 y 7. Los mismos estudios que 3 y 4, primero para C, despues para los de D.

2.° CURSO.—Estudios detallados de los policrestos A y B.

8. Estudio de TODOS LOS CASOS CLÍNICOS para A y B.
9. Estudio de *todos los signos* de los SÍNTOMAS GENERALES, hasta de los de la PARTE MORAL para A solamente.
10-13. Estudios de *todos los signos* de los ÓRGANOS PARTICULARES, sucesivamente para cada una de las cuatro colecciones contenidas en A.
14. El mismo estudio que el del núm. 9, para B.
15-17. Los mismos estudios que los de los números 10-13 para las cuatro colecciones de la C.

3.er CURSO.—Estudios detallados de los otros medicamentos, C y D.

18-29. Los mismos estudios que los del segundo curso y en el mismo órden, para C y D, y las colecciones comprendidas en estas letras.

Para la comparacion de los medicamentos análogos, véase la lista de estos medicamentos, al principio de la patogenesia de cada sustancia.

II.—DISTRIBUCION DE LAS MATERIAS

en la exposicion de la patogenesia de los medicamentos.

A. Abreviatura del nombre del medicamento.—Nombres españoles.—Nombres de los autores que han publicado los medicamentos.—Dósis usadas.—Duracion de accion.
B. *Antídotos* del medicamento, con las sustancias de que el mismo es antídoto.
C. *Medicamentos análogos*, con indicacion de los que pueden seguir ó preceder.
CLINICA: contiene una enumeracion de las afecciones contra las que el medicamento ha sido usado ó recomendado.
SINTOMAS GENERALES: contiene las *sensaciones predominantes*, el *estado de las fuerzas*, los fenómenos de los sistemas *nervioso*, *sanguíneo*, *linfático*, *huesoso*, etc., los accesos de malestar, de *convulsion*, etc., las circunstan-

Digitized by Google

cias predominantes bajo las que los síntomas se agravan, se mejoran, etc.

Piel, con las lesiones *de los órganos exteriores*, *ulceraciones*, *abscesos*, etc.

Sueño, con los *ensueños* y los *sufrimientos nocturnos*.

Fiebre, con el estado del *pulso*, la *traspiracion*, etc.

Moral, con los síntomas de la *inteligencia* y de la *memoria*.

Cabeza, con la *obnubilacion*, los *vértigos* y el estado del *cuero cabelludo*.

Ojos, con los síntomas de los *párpados* y de la *vista*.

Orejas, con los síntomas del *oido* y las *parótidas*.

Nariz, con los síntomas del *olfato* y la coriza.

Cara, con los fenómenos de la piel de la *frente*, de los *labios*, *mandibulas* y *glándulas submaxilares*.

Dientes, con las *encias*.

Boca, con la *lengua*, la palabra, la saliva, etc.

Garganta, con el *velo del paladar*, la *campanilla*, las *amigdalas*, etc.

Apetito, con los defectos del *gusto*, el *hambre*, la *sed*, las *repugnancias* ó los *apetitos* extravagantes, los sufrimientos *despues de comer* ó á consecuencia de ciertos alimentos, etc.

Estómago, con los *erutos*, las *náuseas*, los *vómitos* y los síntomas de la *region precordial*.

Vientre, con los síntomas del *hígado*, del *bazo*, *ingles* y *glándulas inguinales*; así como las *flatuosidades*.

Cámaras ó defecacion, con los sufrimientos del *ano*, del *recto* y del *perineo*.

Orinas, con las afecciones de las *vias urinarias*.

Partes viriles, con las *funciones sexuales del hombre*.

Reglas, con los síntomas de las partes genitales de la mujer, las mamas, etc., así como con los síntomas que se presentan en los niños que lactan.

Laringe, con los síntomas de la *tos*.

Pecho, con los síntomas de la *respiracion* y los padecimientos del corazon.

Tronco, contiene los síntomas del *dorso*, de los *riñones*, del *cuello*, de la *nuca*, *axilas* y *piel del tronco*.

Brazos, contiene todos los síntomas de las *extremidades superiores*.

Piernas, contiene todos los síntomas de las *extremidades inferiores*.

III.—EXPLICACION DE ALGUNAS EXPRESIONES

cuya acepcion puede ofrecer dudas.

Nota. — Nos ha parecido innecesario dar aquí la explicacion de todos los términos de que nos hemos servido: los médicos los conocen, y las otras personas que

Digitized by Google

quieran servirse de este Manual, pueden encontrarlas en todos los diccionarios; pero particularmente en el *Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, des sciences accesoires et de l'art vétérinaire*, décimatercia edicion, revisada y corregida por E. Littre y Robin. Paris, 1872.— Este libro es de primera necesidad.

Agalacia.—Carencia ó supresion de la leche en las nodrizas.

Acedías.—Estado morboso, caracterizado por erutos, vómitos agrios, gusto ácido de la boca, etc., etc.

Amaurosis y ambliopia.—Pérdida mas ó menos completa de la vista, sin lesion orgánica *apreciable*. Algunos autores alemanes distinguen la *Amaurosis* de la *Ambliopia amaurótica*, no empleando el nombre de la primera mas que para designar la pérdida de la vista, que depende de una parálisis *completa* de la retina ó del nervio óptico. El primer grado de esta afeccion recibe entonces el nombre de *Ambliopia*. Mas en Francia el nombre *Ambliopia* no designa, en general, mas que *vista débil* ó *vista oscura*; por lo cual nosotros hemos preferido la espresion de *Ambliopia amaurótica*, para designar la amaurosis incipiente.

Antropofobia.—Estado del que teme y huye de los hombres. El *Misántropo*, por el contrario, los odia.

Apoplejía.—Se ha querido emplear en estos últimos tiempos esta palabra para designar la *hemorragia cerebral*; pero esto es forzar su etimología hasta el último punto. El nombre *Apoplejia* se deriva del griego, y significa aquel estado morboso caracterizado por la conmocion que produce un fuerte golpe. Esto es por lo que nuestros antepasados y muchos médicos alemanes entienden por apoplejía, ya el resultado de una fuerte *congestion cerebral*, ó de un *flujo de sangre*, ya la consecuencia de un *derrame* de sangre, ó solamente de un derrame seroso, uniendo, para distinguir las diferentes causas, los nombres *sanguínea*, *serosa*, etc. Igualmente los médicos franceses no están todos de acuerdo sobre la definicion de la palabra *Apoplejia*; hé aquí lo que leemos: «*Entendemos por apoplejia*, dice M. Cruveilhier (1), *un estado morboso del encéfalo, caracterizado por el adormecimiento, la disminucion de la sensibilidad, de los movimientos voluntarios, y mas frecuentemente por la rareza y lentitud de las inspiraciones y celeridad de las espiraciones, así como por la dilatacion y rareza del pulso*..... Haciendo mas caso del debido á los derrames sanguíneos que se hallan frecuentemente en el cráneo de los apopléticos, quiere

(1) *Diccionario de Medicina y de Cirugía práctica*. Paris, 1830, t. III, pág. 201, artículo *Apoplejia*.—Compárese Hartmann, *Terapéutica homeopática de las enfermedades agudas y crónicas*. Paris, 1849, t. II, pág. 340 y siguientes. Traduccion española por D. P. H. y Espeso. Madrid, Bailly-Bailliere, Santa Ana, 10.

»Rochoux que se reserve el nombre de *Apoplejia* para »designar la hemorragia cerebral, y que no se emplee »ya más para designar los casos en que no se halla mas »que un derrame seroso ó nada de particular: si estas »opiniones estuviesen fundadas, valdria mas desterrar »esta palabra del vocabulario médico, y reemplazarla »por la de *Hemencéfalo*. Mas es verdaderamente abusar »de la anatomía patológica el establecer las diferentes »especies de enfermedades, solamente por las alteracio»nes que dejan en los cadáveres, y el erigir en otras »tantas afecciones cuantas *particularidades* anatómicas se »notan, efecto de un trastorno vital único.» Se responde con esto á los que nos arguyan que no atendemos á la patología *francesa*, cuando decimos que la acepcion que hemos dado á la palabra *Apoplejia* está enteramente de acuerdo con la definicion dada por el autor que acabamos de citar.

Asfixia.—Hemos empleado esta palabra como sinónima de *muerte aparente*.

Blenorrea.—Designamos con esta palabra todo derrame de materia mucosa, sin distincion del órgano donde exista.

Catarro.—Esta palabra es empleada en un sentido absoluto, y significa *fluxion de pecho* y *romadizo*.

Cólicos.—Empleamos constantemente esta palabra como sinónima de *dolor intestinal*, en general, con diarrea ó sin ella.

Dislaceracion, Dolores dislacerantes.—A ejemplo de los traductores de materia médica, empleamos esta palabra para traducir la alemana Reissen, expresion sumamente vaga, que unas veces quiere decir simplemente *dolor*, *sin otra distincion*, y otras un *dolor vivo*, aun mas agudo que el dolor *tractivo*, con el que tiene la mayor analogía. En general, es un dolor mas particular de las afecciones de los músculos, de las membranas serosas y del periostio. El dolor llamado *reumático*, tal como le producen, el mercurio, y sobre todo el sublimado corrosivo causando el *reumatismo mercurial*, siendo esto lo que la palabra *Reissen* designa con frecuencia; y si la palabra *reumatismo* no tuviese al mismo tiempo un sentido vicioso, no habria mejor palabra que sustituyese constantemente al vocablo aleman.

Dismenia y Dismenorrea.—Usamos la primera de estas dos palabras para designar el establecimiento laborioso de los ménstruos en la *época de la pubertad*; mientras que la segunda la empleamos para designar el flujo menstrual ordinario, cuando se presenta con dificultad, dolor, y por lo comun escaso.

Digitized by Google

Dispepsia.—Estado morboso del estómago, caracterizado por una digestion débil, lenta, muy penosa, y acompañada de padecimientos.

Gastritis.—No hemos tomado esta palabra en la acepcion que le ha dado la escuela fisiológica. Hemos querido designar con ella la *gastritis de los antiguos*.

Hemicránea.—Aunque esta palabra, tomada literalmente, expresa una *afeccion de cabeza semilateral*, la empleamos para designar cefalalgias caracterizadas por *dolores parciales con accesos periódicos, y acompañados en su mas alto grado, de vómitos y necesidad de acostarse*.

Misantropia.—Véase *Antropofobia*.

Morbilles.—Enfermedad que se designa ordinariamente con el nombre de *sarampion*, pero infundadamente, porque son dos enfermedades bien diferentes. Véase *Sarampion* (1).

Mortificacion.—Hemos empleado esta palabra para designar las emociones morales que resultan del *amor propio herido*, y caracterizadas mas bien por una afeccion profunda, que por un arrebato de cólera.

Nerviosos (Debilidad, Dolores nerviosos), etc.—La palabra *nerviosa*, unida á la de *fatiga* y *debilidad*, designa un estado de *fatiga* con mucha *susceptibilidad del sistema nervioso*. *Dolor nervioso* es sinónimo de *neuralgia* (cefalalgia, prosopalgia, odontalgia, etc., *nerviosas*).

Paralítico.—Esta palabra, unida á la denominacion de algunos dolores, tales como de dislaceracion, tirantez, etc., *paraliticas*, quiere decir que estos dolores están acompañados de una sensacion de debilidad paralítica en las partes afectas.

Tísis.—Cuando esta palabra se halla sin algun epíteto, entendemos siempre la *tisis pulmonar tuberculosa*. En cualquier otro caso le damos los epítetos de *tisis laringea, mucosa, intestinal*, etc.

Pituitas del estómago.—Hemos empleado esta palabra para traducir la alemana *Würmerbeseigen*, palabra con la cual Hahnemann ha designado la *evacuacion de cierta cantidad de agua del estómago*, sin esfuerzo de vómito, tal como la que acompaña algunas veces al estado morboso llamado *pirosis ó rescoldera*. (Véase esta palabra).

Pirosis.—Viene de la palabra griega *pyr* (el fuego), y la empleamos nosotros para designar la sensacion desagradable de un ardor en el epigastrio y en el esófago, haya ó no expulsion de serosidades.

Riñones, Afecciones de los riñones.—Con esta expresion

(1) El Autor al establecer esta distinción se ha olvidado darnos la explicacion de ella. (*N. del T.*).

se ha traducido la palabra alemana *Kreuzcshmerzen*, puesto que en el lenguaje familiar tiene la misma significacion que la palabra francesa *Maux des reins*, *mal aux reins*, etc. Para expresar los dolores *en los riñones mismos*, hemos dicho dolores *en los riñones* ó dolores *nefríticos*.

Somnambulismo.—Con esta palabra no hemos querido designar el estado de una persona magnetizada ó dotada de la segunda vista magnética, sino solamente el de aquella que, durante el sueño natural, se levanta y realiza todos sus actos como si estuviese despierta.

Estomacace.—Inflamacion del interior de la boca, con ulceracion que á veces pasa á ser gangrenosa.

Tifoídeas: Fiebres tifoídeas.—Se ha comprendido bajo este nombre todas las que ordinariamente se designan con el de *Fiebres malignas*, *nerviosas*, *atáxicas*, *adinámicas*, *pútridas*, etc.

IV.—EXPLICACION DE LOS SIGNOS

empleados para designar las diferentes especies de síntomas.

Los síntomas que no tienen *signo alguno* son puramente *patogenésicos*, es decir, producidos por la experimentacion pura.

(*) El *asterisco* designa los síntomas patogenésicos que han sido confirmados por curaciones.

(°) El *cero* indica los síntomas ó las circunstancias bajo las cuales el medicamento ha obrado favorablemente, pero que hasta el dia no han sido observados como síntomas patogenésicos.

(¯) La *línea superior* tiene por objeto *anular la indicacion del signo precedente*. Así es que donde no se halle esta línea, el último signo de una frase domina constantemente todo el resto. Por el contrario, todo lo que está *despues de esta línea*, es enteramente equivalente á los síntomas que no tienen signo alguno, y pertenecen á las observaciones puramente *patogenésicas*.

Frecuentemente se hallará en una sola frase todos los signos, como por ejemplo en la siguiente: *prurito*, **punzadas y presion en los ojos ¯y en los párpados*, °*sobre todo por la noche*, **ó por la tarde*, ¯*así como por la mañana*.

En esta frase hay, primero, *prurito*, *punzadas y presion*, que han sido observados *los tres* como síntomas *patogenésicos*; pero los dos últimos, *punzadas y presion*, han sido curados por el medicamento, como el (*) lo indica. La línea (¯) que está antes de *y en los párpados*, dice al mismo tiempo que la curacion hasta ahora no ha sido observada mas que en los *ojos*, y no en los *párpados*, respecto de los cua-

Digitized by Google

les la observacion no es mas que *patogenésica.* El (°) que viene colocado antes de *sobre todo por la noche*, dice que estas sensaciones en el caso curado han tenido lugar *por la noche*; pero que *fuera de esta hora* no han sido observadas mas que como efecto patogenésico. Pero el segundo (*), colocado delante de *ó por la tarde*, denota que en esta última época los expresados síntomas se han verificado lo mismo en el caso de curacion, como en calidad de efectos patogenésicos. La última (¯) indica, por último, que la aparicion de estos síntomas *por la mañana* no ha sido todavía observada sino como efecto patogenésico.

Los síntomas impresos en letra llamada *cursiva*, son aquellos que han sido observados ó mirados mas frecuentemente que los otros; pero esta distincion no se ha hecho sino relativamente á los síntomas del *mismo órgano*, y aun á veces solamente para el género de padecimientos; de modo que un *dolor*, por ejemplo, no se le ha distinguido sino con relacion á los otros *dolores*, y no á otros síntomas del *mismo órgano*, y menos aun respecto á los síntomas del medicamento. Así es que, por ejemplo, en la frase siguiente: «Presion, prurito y *punzadas en los ojos* y en los párpados,» el pasaje impreso en letra cursiva quiere decir solamente que las *punzadas* han sido observadas mas frecuentemente que el prurito y la presion, y que han tenido lugar mas comunmente en los *ojos* que en los párpados.

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA.

INTRODUCCION.

I.—Objeto y composicion de esta obra.

He indicado ya con claridad el objeto de esta obra en las dos primeras ediciones. No es el de la presente reemplazar la materia médica, y mucho menos hacer supérfluo su estudio; por el contrario es un medio para *facilitar su uso, adquirir el conocimiento de los medicamentos por recopilaciones tan completas y concisas como sea posible, y dar todas las indicaciones prácticas que la experiencia clínica ha hecho conocer hasta el dia como importantes para la acertada eleccion de los medicamentos.* Al efecto, he procurado reunir todas las observaciones puras y clínicas que hasta nuestros dias contienen las obras de HAHNEMANN y de sus discípulos, publicadas en Europa ó en América; á las cuales he añadido las de mis amigos y compañeros dignos de mi confianza, así como el fruto de mi propia experiencia. A fin de deducir lo que hay de esencial en el carácter de cada medicamento, he estudiado y comparado entre sí todas estas observaciones. De este modo los cuadros descritos en este MANUAL, *lejos de ser una compilacion* de hechos aislados y reunidos sin cuidado, son, por el contrario, el resultado de estudios concienzudos y razonados, y la idea mas exacta que he podido dar de lo que más importa conocer de la materia médica.

No he podido citar en cada una de las indicaciones la autoridad que me determina á hacer uso de ella, atendien-

Digitized by Google

do á que lo que he querido hacer ante todo, es un compendio y una obra práctica.

La nomenclatura usada en nuestra farmacopea, es la que he empleado para designar los medicamentos. Al preferirla, he tenido en cuenta que la mayor parte de los médicos homeópatas la conocen; sin embargo, con objeto de que los que desconocen nuestra terminología farmacéutica puedan comprenderla fácilmente, he colocado al fin de la obra una tabla con los nombres franceses usados y sus equivalentes latinos. A excepcion del *iman*, que he puesto al fin, todos los medicamentos están colocados por *órden alfabético*, y tambien he preferido poner los ácidos despues de la base; por lo que se hallará: *Mur. ac.*, *Nitr. ac.*, *Phosph. ac.*, *Sulf. ac.*, en vez de *Acid. mur.*, *Acid. nitr.*, etc.

En la parte intitulada *Clínica*, hemos usado constantemente *términos científicos*; pero en el texto corriente de los *síntomas*, hemos evitado todo lo posible las expresiones patológicas, reservando estos nombres para la denominacion de las *enfermedades* que se hallan consignadas á la cabeza. Por lo demás, en la explicacion de los términos científicos (Tabla III) (1), se encontrará tambien la de algunas palabras extraordinarias, ó poco usadas, de que nos hemos servido para designar los síntomas.

En el *órden de los síntomas* no figuran los de la cabeza como los primeros, sino los *síntomas generales*, seguidos de los de la *piel*, *sueño*, *fiebre* y *parte moral*, y despues los demás en el órden acostumbrado. En general, este órden es el mismo para todos los medicamentos; solo que á veces reunimos, bajo una misma rúbrica, dos ó tres artículos que contienen pocos síntomas; pero entonces ya lo indicamos en los títulos. Por lo demás, ya hemos dado (Tabla III) una idea del órden que hemos seguido con la indicacion de lo que contiene cada artículo.

II.--Sobre los síntomas consignados en esta obra.

Los elementos sobre que reposan los resúmenes de la accion de los medicamentos, son, ante todo, los *efectos pa-*

(1) Estas indicaciones se refieren á las *Advertencias* y *Explicaciones* diferentes que se encuentran al principio de este volúmen, despues de la *Tabla de las Materias*.

Digitized by Google

togenéticos, esto es, los resultados producidos por la experimentacion pura, y si hemos agregado las *indicaciones clínicas*, ó los *síntomas curados*, es tan solo para confirmar ó completar los primeros.

Hemos designado por un *cero* (°) aquellos que, sin haber sido observados como *síntomas patogenéticos*, han sido, sin embargo, curados por un medicamento; y con una *estrellita* (*) los que han sido observados al mismo tiempo como efectos *patogenéticos* y como indicaciones *clínicas*, dejando sin signo alguno á los que, sin estar bien observados como efectos *patogenéticos*, no han producido todavía curacion alguna que nos sea conocida. Así, todos y cada uno podrá apreciar cada síntoma en su justo valor, y resolverse segun la confianza que le inspire cualquiera de las clases que acabo de establecer. Por nuestra parte jamás nos atenemos á un *solo síntoma*, sino al *carácter general* del medicamento, tal cual resulte de toda la patogenesia, siendo esta nuestra única guía para apreciar los síntomas particulares de cada especie. Esta es la conducta que observo para la eleccion del medicamento; la misma que me propongo al trazar los cuadros de esta obra, y la que debe seguir el médico homeópata que quiera ponerse al abrigo de toda decepcion. Pues aun cuando algun hecho aislado careciera de exactitud en las sintomatologías de la materia médica de nuestra escuela, la *fisonomía total*, tal como resulta del conjunto de los síntomas, no seria por eso menos exacta que el mejor cuadro natural; y cualquiera llegará, por un estudio profundo, á asegurarse del carácter verdaderamente esencial de cada medicamento, y poseerá una ciencia que el conocimiento de los hechos aislados no le hubiera dado jamás.

He dado un número de síntomas mas considerable que en las precedentes ediciones, con objeto de precisar más la esfera de accion de los medicamentos. De este modo el golpe de vista indudablemente es mas difícil; mas por las *observaciones clínicas* que se hallan á la cabeza de cada medicamento y los síntomas impresos en *letra bastardilla*, se tendrán siempre puntos de apoyo que bastarán para hacer resaltar mas á la vista y tener un resúmen infinitamente mas conciso, pero sin privarnos por esto de lo demás. No se crea por lo expuesto que los síntomas marcados con *letra bastardilla* son los únicos en los que ha de

Digitized by Google

fijar la atencion el médico para la eleccion del medicamento con exclusion de los demás. TODO TIENE UN VALOR RELATIVO, PERO NADA DE UNA MANERA ABSOLUTA. Todo lo que es característico en la patogenesia de un medicamento, lo es solo relativamente á los medicamentos que no tienen aquel síntoma; y el mismo síntoma que, en tal ó cual série de comparaciones, no tiene valor alguno distintivo, porque es comun á todos, adquiere la mas alta importancia cuando se compara al medicamento con otro grupo.

En general, he distinguido de esta manera los fenómenos que parece predominan sobre los otros en un mismo órgano, ó las sensaciones que se presentan con frecuencia en los órganos mas diferentes, etc. Tambien distingo muchas veces, entre dos efectos *alternativos*, aquel que parece tiene lugar con preferencia á otro, aun cuando en casi todos los casos, ambos efectos tengan una importancia igual. Así es que en la *nuez vómica*, la *diarrea* y la *constipacion*; en la *pulsatila*, la *sed* y la *adipsia*, y en el *arsénico*, el *dolor quemante* y la *sensacion de frio glacial*; los unos y los otros son igualmente característicos para la eleccion del medicamento, cuando el resto de los síntomas conviene á la enfermedad. Este es un fenómeno mas constante de lo que se cree, de modo que todos los medicamentos, y principalmente los *policrestos*, que tienen algun síntoma bien pronunciado, *tienen igualmente el fenómeno opuesto en calidad de síntoma alternativo*; y en general se considera sin razon al uno como *primitivo*, y al otro como *secundario* ó *consecutivo*, porque en realidad uno ú otro (segun los indivíduos) pueden manifestarse primero. ¿No vemos suceder este mismo hecho en un gran número de enfermedades *sui generis*? Por ejemplo, el tífus ¿no produce tan pronto el insomnio mas completo, luego un coma profundo, ya la estupidez, ya el delirio, ahora la constipacion tenaz ó la diarrea mas violenta, *segun la constitucion y circunstancias del individuo que padece*? La cuestion de los *semejantes* y de los *contrarios* no está limitada á algunos síntomas aislados, sino al conjunto de los fenómenos, al aspecto general de la enfermedad y de la patogenesia del medicamento.

Digitized by Google

III.—Sobre las advertencias clínicas que se hallan á la cabeza de cada medicamento.

En las ediciones precedentes habíamos mencionado, entre los síntomas, *algunos nombres de enfermedades*, en las que se habia empleado ó recomendado un remedio. Nuestra intencion al hacerlo no era de modo alguno designarle como específico contra aquellas enfermedades, á las que tan frecuentemente se las da nombres enteramente impropios, sino solamente llamar la atencion del médico, invitándole á examinar la oportunidad del medicamento en un caso dado. De esta manera, aunque los nombres hubiesen sido mal aplicados, no por eso resultaba mas inconveniente que la pérdida de algunos minutos.

Para aquellos que siguen nuestros principios y no hacen uso de medicamento alguno sin haber consultado la patogenesia, estas indicaciones tienen la inmensa ventaja de presentarles, entre los doscientos medicamentos de nuestra materia médica, un círculo muy reducido que les proporcionará casi siempre muy buenos datos para determinarse á obrar. Hé aquí por qué no he podido abstenerme de dar tambien en esta edicion, un resúmen de los casos clínicos; pero los he colocado por esta vez con el título de CLÍNICA, al principio de la patogenesia, y recordando constantemente los estrechos límites de su uso. Algunas veces hasta van seguidos de una interrogacion, cuando el medicamento no ha sido empleado en los casos que está recomendado; en tanto que hemos distinguido con *letra bastardilla* las afecciones contra las que el medicamento ha sido empleado varias veces.

La nomenclatura nosológica que he seguido, es, en general, la de la antigua escuela, en la cual una palabra tiene un sentido mas extenso ó mas estricto que en la moderna. Hubiera, sin duda, preferido esta última, si los autores estuvieran siempre de acuerdo sobre la definicion precisa de las palabras. Mas para evitar errores en todo lo posible, he dado al principio de esta obra una tabla (véase Tabla III) de las expresiones que en el sentido en que las he empleado podria ser dudoso; y ordinariamente he adoptado el mas lato, para que el médico, al consultar los síntomas, halle el medio de precisar lo que hay necesaria-

Digitized by Google

mente vago en la expresion general. *Nada mas indiferente que el nombre dado á una enfermedad*; los verdaderos discípulos de Hahnemann lo saben bien. *Todo medicamento curará si se halla indicado por los sintomas; y el mejor diagnosticador no encontrará en solo esta ciencia el medio de suplir á su exámen.* Es pues á las Tablas sintomatológicas á las que remito definitivamente á todos los que quieran tener noticias seguras y precisas sobre los casos especiales, en los cuales podrán recurrir á tal ó cual medicamento. Todas las citas que se hallan en el artículo Clínica, aunque estas descansen sobre hechos justificados, no tienen otro objeto que *aconsejar* al médico homeópata el exámen de tal ó cual medicamento, para ver si, estudiándole detalladamente, le halla *acaso* indicado. Examinar este asunto bajo otro punto de vista; considerar estos nombres como indicaciones infalibles, y tomarlos por guía en la *determinacion* de la eleccion, seria cometer el abuso mas deplorable, *abuso contra el cual no protestaré jamás con bastante energia.*

IV.—Sobre las dósis homeopáticas usadas.

Además de la patogenesia y el resúmen de los casos clínicos, se encontrarán á la cabeza de cada medicamento algunas palabras sobre las *dósis usadas* y su *duracion de accion*. Para las dósis usadas he indicado las que se encuentran en nuestros autores, aunque en mi concepto solo miro estas cifras como citas históricas, y de ninguna manera como reglas absolutas. La cuestion de la dilucion será siempre secundaria relativamente á la del medicamento. Hahnemann empleó, durante algun tiempo, con preferencia la trigésima dilucion; otros las que se encuentran en las farmacopeas, y algunos pasan de una dilucion á otra, especialmente en caso de repeticion. El doctor Mure (1) ha querido reservar el empleo de las primeras (bajas) atenuaciones á las enfermedades agudas, y las últimas á las enfermedades crónicas. En el prefacio de mi primera edicion (traduccion de Paris de 1833), habia expresado ideas semejantes sobre la oportunidad de las dife-

(1) *Bibliotheque homœopathique* de Ginebra.

Digitized by Google

rentes diluciones, y aun hoy conservo en cierto modo la misma opinion, entendiéndose *que si hubiese que hacer una distincion con respecto á la práctica*, opinariamos que en general las primeras atenuaciones estarian mas indicadas en las enfermedades cuya marcha es mas rápida, y las últimas, en aquellas cuyos progresos son mas lentos. Mas seria conveniente resolver otra cuestion, y es, si en los casos que parecen exigir atenuaciones mas bajas (tales como algunas formas *primitivas* de sífilis, de gonorrea), se obtendria todo el resultado que es de apetecer, administrando las *últimas* diluciones en dósis reiteradas, y sobre todo en disolucion acuosa para tomar á cucharadas. Cualquiera que sea el aumento de energía que obtienen nuestros medicamentos por la trituracion y sucusion, no es menos cierto que al mismo tiempo hay pérdida de fuerza, de modo que un volúmen cualquiera de la trigésima será siempre mas débil que un volúmen igual de la primera. Este hecho aparece evidente cuando se comparan los efectos que producirian diez gotas de tintura madre de arsénico con las que resultan de otras diez de la trigésima dilucion. Mas tambien para las sustancias llamadas *inertes* en el estado natural, la observacion es la misma, pues si se toma un grano de *Licopodio* ó de *carbon puro*, pero suficientemente triturado para desenvolver su accion, este grano obrará con mas actividad que un volúmen igual de la trigésima dilucion de estas sustancias. Lo que hay de cierto es que, por estas diluciones, el cuerpo de las sustancias se dilata mas en superficie; y de esta manera, no solamente afecta á los órganos en su mayor extension cuando se administra, sino, lo que es más, desarrolla todos sus átomos, que serian inertes en estado compacto, y por consecuencia, les permite desplegar toda su accion. Así es, por ejemplo, que cien gotas de la primera dilucion producen *juntas* un efecto infinitamente mas pronunciado que el que produciria la sola gota de tintura madre que se halla disuelta en ellas, y sin embargo, en estas cien gotas de la primera dilucion no hay mas sustancia medicinal que en la gota de tintura madre. Todavía hay más; convengamos que una sola gota de la trigésima sea en sí misma mas débil que una gota de la primera, un cierto número de estas últimas puede constituir una dósis que, por la extension de sus átomos activos, no solamente iguale, sino que supere

Digitized by Google

la fuerza de las primeras diluciones. Fuera de esto, nada mas difícil que distinguir las altas diluciones en cuanto á su fuerza; que la octomilésima obra tan bien como la trigésima: esto es un hecho; mas decir que tenga una accion mas fuerte, nadie puede asegurarlo.

V.—De la repeticion de las dósis.

En otra obra (1) se ha tratado con mas extension de la dilucion que se ha de emplear: cuestion que, sin embargo, me parece mucho menos importante para la práctica, que la de la *multiplicidad* de las dósis, ó de la *repeticion* con relacion á su oportunidad. Y si no, dad por cierto tiempo á todos vuestros enfermos dósis de 10, 12, 15 glóbulos, y aun una gota entera de las *primeras* diluciones: *absteniéndoos de repetir estas dósis* hasta que sobrevenga una nueva indicacion, no notareis ninguna agravacion mas sensible que si hubierais administrado algunos glóbulos de las *últimas* diluciones, y en todo caso, la diferencia no estará seguramente en proporcion con el volúmen relativo de la sustancia medicinal ingerida.

Pues ahora bien; cambiad el experimento, tomad un SOLO GLÓBULO de una dilucion cualquiera, sea de la primera, sea de la trigésima; disolvedle en 10, 12, 15 cucharadas de agua, y dad á vuestros enfermos esta dilucion *por cucharadas*: las agravaciones que resultarán en ciertos casos, especialmente en algunas afecciones *crónicas*, serán mucho mas fuertes y menos fáciles de combatir que las que sobrevienen á consecuencia de una gota entera, aun siendo de la primera dilucion, tomada de una *sola vez*. Al menos esto es lo que he creido notar mas de cien veces en mis observaciones; y el mismo HAHNEMANN nos ha confiado que, segun su opinion, no habia dósis mas débil ni mas dulce que uno ó dos glóbulos tomados de una vez, mientras que estos mismos glóbulos, disueltos en una cantidad de agua y tomados á *cucharadas*, tenian mucha mas ac-

(1) Jahr y Catellan, *Nueva Farmacopea homeopática*, ó Historia natural y preparacion de los medicamentos homeopáticos y Posologia ó de la administracion de las dósis; segun la edicion acompañada de 155 grabados intercalados en el texto. Traducida por D. S. R. Lopez. Madrid, 1858, lib. de D. C. Bailly-Bailliere.

cion sobre el organismo. Frecuentemente, es verdad, el enfermo puede tomar durante unos quince dias, todas las tardes ó todas las mañanas, una cucharada de una disolucion semejante, sin que resulte ningun accidente; pero frecuentemente tambien sucede que cuando se ha concluido de tomar la dilucion, sobreviene una agravacion tanto mas violenta, cuanto mas satisfactorio haya sido el estado del enfermo durante el tiempo que tomaba el medicamento, agravacion que en muchos casos no cede á una nueva dósis en dilucion mas que para volver despues con mayor intensidad, y obrando así absolutamente como meros paliativos. Hé aquí que por saludable y preferible que sea en muchos casos este modo de administrar los medicamentos á dósis reiteradas, no es, sin embargo, aplicable siempre, y necesita, para ser empleado con buen éxito, estar basado sobre principios y reglas fijas. Estas reglas, lo sabemos muy bien, no pueden establecerse con certeza mas que por la comparacion de un gran número de observaciones las mas opuestas.

El principio de que es necesario partir, segun mi opinion, y conforme á las bases de nuestra ciencia, para examinar la cuestion bajo su verdadero punto de vista, es que *no es jamás por la accion directa del medicamento*, SINO POR LA REACCION DE LA NATURALEZA, *por la que se efectúan las curaciones verdaderas durables y radicales*; y de esto resulta, como primera consecuencia general, *que toda repeticion de dósis es al menos supérflua*, SI NO DEL TODO INÚTIL, *mientras que esta reaccion siga su curso.* Así es que vemos en un gran número de *lesiones de funciones muy inveteradas*, establecerse, despues de una sola toma del medicamento conveniente, una mejoría que, con interrupcion de poca importancia, continúa en general hasta la completa desaparicion de los padecimientos. Administrar desde luego en estos casos dósis reiteradas, ó renovar la primer toma á cada ligera disminucion *momentánea* que sufra esta mejoría, seria contrariar á la naturaleza en su trabajo, y retardar seguramente la curacion. Aun en algunos casos de lesiones orgánicas recientes ó poco intensas, se obtendrá frecuentemente una curacion mucho mas pronta por la administracion de una *sola dósis*. Pero sucede de muy diferente modo en todos los casos de lesiones orgánicas de mucha intensidad, y sobre todo de aquellas que son el re-

Digitized by Google

sultado de la accion enérgica de algun vírus, de algun miasma, ó de sustancias medicinales. En estos casos, la enfermedad parece que tiene una especie de fuerza vital, propia, que domina á la del organismo y que impide ó neutraliza con prontitud la reaccion, la cual necesita, para sostenerse, ser constantemente provocada de nuevo, hasta que predomine sobre la enfermedad. En este caso es en el que se administrarán con mejor éxito las dósis reiteradas, sea de las primeras diluciones, sea de las últimas, con tal que se continúen por el tiempo necesario hasta ver establecida la reaccion victoriosa del principio vital. Sucede lo mismo en todas las lesiones orgánicas que, por su naturaleza, sostienen un foco contínuo de irritacion en las partes afectadas, tales como las inflamaciones con supuracion, las úlceras, algunas especies de desorganizaciones, etc. En todos estos casos, las dósis *reiteradas* pueden ser de la mayor utilidad.

En algunos casos de enfermedades crónicas, *caracterizadas por una especie de inercia y falta de reaccion*, se podrá á veces recurrir igualmente á las dósis reiteradas de algunos glóbulos disueltos en agua; pero esto será por otra razon, y bajo un punto de vista mas diferente que en los casos anteriores. Porque mientras antes se trataba de combatir la violencia de la enfermedad que dominaba en la reaccion, en estos casos se quiere agravar, se puede decir así, la enfermedad, á fin de obligar á salir de su estado de inercia, y provocar de este modo la reaccion de la vitalidad del organismo. Sin embargo, estos ensayos no están exentos de peligro, y es necesario proceder con mucha precaucion para que la agravacion, una vez declarada, no sea tan violenta que haga insuficiente la reaccion de la fuerza vital. Por esta razon, se obrará prudentemente administrando, en casos semejantes, las dósis reiteradas en los intervalos mas cortos posibles, y de detenerse cuando se vean sobrevenir los primeros signos de la agravacion.

En fin, hay todavía otro caso en el cual se podrán repetir las dósis; y es cuando despues de un tiempo de mejoría mas ó menos prolongado, la enfermedad empieza á reaparecer, y los síntomas indican más el mismo medicamento que otro cualquiera. Pero estos casos no se presentan sino cuando se ha dado *una sola dósis de una vez*, ó bien muchas cucharadas hasta la agravacion, aguardando des-

pues los efectos sin hacer nada, y aun es necesario estar bien seguro que la agravacion no cesará luego por sí misma, antes de haber apelado á la repeticion.

VI.—De la duracion de accion de los medicamentos.

Lo que acabo de exponer de la época, en la cual la repeticion de una sola dósis podria parecer indicada, es igualmente aplicable *á la eleccion de un nuevo medicamento*; porque toda agravacion, despues de un tiempo de mejoría, no siempre es una agravacion natural de la enfermedad; frecuentemente, sucede, por el contrario, que es debida á una nueva excitacion provocada por el medicamento cuya accion dura aun, y en este caso no hay cosa mejor que esperar; pues que ordinariamente cesa á los pocos dias para despues dar lugar á una mejoría mucho mas pronunciada. Esto es lo que observamos con frecuencia despues de la administracion de una *sola* dósis *por una sola vez*, y con particularidad en las afecciones *crónicas*. Generalmente los dos ó tres primeros dias se pasan bien; despues sobreviene una ligera agravacion que desaparece y se renueva alternativamente por algun tiempo; de suerte que, en general, en la primera quincena, y sobre todo en la segunda semana, el número de dias de agravacion supera al de mejoría, hasta que al fin de la cuarta semana varía enteramente: la mejoría excede; no tarda en declararse un bienestar durable, y continúa con frecuencia hasta la séptima ú octava semana; época en la que los restos de la enfermedad, que no han sido completamente destruidos, comienzan á reaparecer. Sin embargo, hay casos en que esta agravacion no es mas que el último esfuerzo de la accion del medicamento, esfuerzo que concluye al cabo de algunos dias, dejando la enfermedad, si no enteramente curada, al menos en un estado tal que no se pueda obtener una mejoría mas pronunciada por ningun otro medio. Administrar en estos casos un medicamento nuevo sin estar seguro de lo que va á suceder, seria, pues, perder el tiempo; pero sabiendo observar y comprender la marcha de la reaccion vital, se obtendria muchas veces más en dos meses con *una sola dósis* de un medicamento,

Digitized by Google

que lo que haria en dos años aquel que, por un cambio contínuo de medicamentos ó por una multiplicacion inoportuna de sus dósis, quisiera acelerar la curacion. Tal es la observacion que tengo hecha muchas veces, siguiendo los preceptos que HAHNEMANN ha consignado para este objeto en su ORGANON y en el primer tomo de sus *Enfermedades crónicas*; y sobre esto llamo especialmente la atencion de todo médico homeópata. Jamás en ninguna enfermedad CRÓNICA se debe cambiar de medicamento sin haber observado, al menos por cinco ó seis dias, la agravacion que haya de causar, y *tambien las que sobrevienen algunas veces despues de la cesacion de un medicamento administrado á cucharadas, debieran tratarse de la misma manera*; es decir, que se deje obrar al medicamento tanto tiempo cuanto se pueda esperar algun bien de él.

Sin embargo, por indispensable que sea el dejar que un medicamento apropiado agote toda su accion, y de no dejarse engañar por agravaciones momentáneas, no se debe titubear en intervenir cuando las circunstancias lo exijan, sea que el medicamento dado no *produzca efecto alguno*, sea que le *produzca desfavorable*. El primero de estos casos se revelará al médico atento, cuando no observe *síntoma alguno propio* del medicamento, y que la enfermedad permanezca *estacionaria* ó *se agrave progresivamente sin mejorarla*, no presentando mas que síntomas pertenecientes á un período avanzado del mal. Entonces el médico hará bien en *repetir al instante la dósis del medicamento administrado*, hasta que este produzca un cambio cualquiera. Si se manifiesta una mejoría, por ligera que sea, se esperará observando las alteraciones, del bien ó del mal, como lo he indicado mas arriba; si, por el contrario, el estado se ha empeorado despues de esta repeticion, se observará si esta agravacion es saludable, ó si es debida *á un medicamento mal elegido y de cuya accion prolongada no habrá que esperar mas que malos resultados*. Este último caso será fácil de conocer en que la agravacion que ha sobrevenido, aunque esté mezclada con síntomas del medicamento, *no va precedida ni interrumpida de mejoría alguna, y en que progresa al mismo tiempo la enfermedad en el sentido de sus síntomas generales*. En este caso, el médico deberá apresurarse á reemplazar el medicamento por otro que responda mejor al conjunto de los síntomas de la enfermedad, y de los que

han aparecido bajo la influencia del primer medicamento.

Se puede sentar como principio que, mejorándose el *estado general* del enfermo, y sobre todo, su parte *moral*, el médico debe dejar obrar al medicamento, *cualquiera que sea por otra parte el estado de los síntomas locales*; al paso que cuando el enfermo se halla mas agravado bajo este concepto, y sin que ninguna mejoría anuncie una terminacion favorable, deberá cambiar de medicamento. El tiempo que se debe emplear en la observacion, antes de decidirse en favor ó en contra, será, para las enfermedades *crónicas*, lo menos de 5, 6 ú 8 dias, como se ha dicho mas arriba, y en las *agudas* de 24, 12, 6 horas, hasta 30, 15 minutos, segun el grado de violencia ó la marcha mas ó menos rápida de la enfermedad. Examinando así el estado del enfermo, se verá con frecuencia prolongarse la accion saludable de los medicamentos hasta 6, 12, 24, 48, 96 horas en las enfermedades *agudas*, y hasta 7 ú 8 semanas en las enfermedades *crónicas*.

VII.—De los medicamentos analogos.

Cuando un medicamento apropiado ha gastado su accion, deja muchas veces á la enfermedad en un estado que se conocerá menos por el género de los síntomas que por la disminucion de su intensidad, de tal modo, que pudiera muy bien creerse que habia necesidad de repetir el mismo medicamento. Sin embargo, examinando al enfermo con mas atencion, se notarán constantemente algunas mudanzas por ligeras que sean, y en este caso, estará indicado muchas veces un medicamento, que en su patogenesia tenga mucha relacion con el primero. Así es, que Hahnemann ha indicado *Calcarea* ó *Nitri acidum* como convenientes despues de *Sulf. Lycopodium*, despues de *Calcarea*, etc. El doctor Hering ha aumentado tambien estas indicaciones, las que hemos tenido el cuidado de reunir á los cuadros de los medicamentos, á fin de facilitar á los médicos las investigaciones de toda clase. Y para ponerles aun en el estado de utilizar otras afinidades que las que Hahnemann y Rering han indicado, he colocado á la cabeza de cada medicamento con la señal de: Compárese con, una

Digitized by Google

lista de los que parece tienen mas analogía, y que, en caso preciso, pueden no solamente ser administrados despues, sino servir tambien de antídoto al medicamento. Esta lista difiere muchas veces de la publicada por Bœnninghausen, porque, en los hechos de pura apreciacion, no reconocemos mas autoridad que la nuestra.

Por lo demás, la principal ventaja que puede sacar el médico de estas indicaciones, será la de hacer estudios comparativos de los medicamentos análogos para establecer mejor los puntos de semejanza, y ponerse al abrigo de una multitud de decepciones, que no dejarian de ocurrir, si se les confundiese y se administrase uno por otro; como por ejemplo, *Lachesis* en lugar de *Mercurio*, *Veratrum* ó *China* en lugar de *Arsénico*, etc. Un abuso deplorable de estas indicaciones seria, por el contrario, tomarlas por guia absoluta en la eleccion, y dar séries de medicamentos análogos sin otra razon que esta analogía; lo mismo que hacer preceder al medicamento indicado otro que no lo estuviese, solo por creerle mas eficaz despues del uso de aquel. La ley fundamental para el uso de los medicamentos es siempre la semejanza de los síntomas *y la necesidad de dejar á todo medicamento agotar su accion*. Solamente despues de la cesacion de esta es cuando se puede pensar en el medicamento análogo, y aun es necesario que por la comparacion de los síntomas se esté bien convencido de su oportunidad antes de emplearle.

En el artículo Antídotos, hemos indicado tambien los medicamentos, de los cuales es antídoto aquel de que se trata, persuadidos, como estamos, que en muchos casos las relaciones antidotarias de los medicamentos son *recíprocas*, y que por los unos se podrá casi siempre reemplazar á los otros. Por lo demás, hay tambien necesidad de elegir los antídotos como se eligen los medicamentos en su série respectiva ó en general. El mejor antídoto será siempre aquel medicamento que mejor responda á los síntomas, y en general será mucho mejor no perder el tiempo en buscar un antídoto, sino emplear inmediatamente el medicamento que responda mejor al conjunto de todos los síntomas que presente el enfermo. Si este medicamento forma parte á la vez de los antídotos y análogos del primero, tanto mejor; pero si no reune estas condiciones, no debe vacilarse en hacer una nueva eleccion

VIII.—Sobre el modo de servirse de este Manual.

Cuanto más hemos comprendido las diferentes opiniones de nuestros lectores, tanto más nos hemos convencido de que todo cuanto pudiera decirse sobre ello no serviria absolutamente de nada para las personas que no reunan profundos conocimientos en homeopatía. Por esto mismo hemos publicado un tratado especial, que contiene la exposicion detallada y razonada de todos los puntos esenciales de la teoría y de la práctica de esta doctrina y la discusion de todos sus teoremas controvertibles: *Principios y reglas que deben guiar en la práctica de la homeopatia. Exposicion razonada de todos los puntos esenciales de la doctrina de Hahnemann.* Paris, 1857, 1 vol. en 8.°, XVI-528 pág.

En esta obra encontrará el lector todo cuanto pueda desear, de una manera mucho mas completa que cuanto hayamos podido decir hasta aquí.

Digitized by Google

ADVERTENCIA.

A la cabeza de cada sustancia se encontrará, despues del nombre del autor, que ha publicado su estudio, las abreviaturas siguientes:

Hist. nat. y *prep.* Pharm. homœop., p. 155.

Esto quiere decir:

Para todo lo que se refiere á la *historia natural* y á la *preparacion* de la sustancia, *véase* nuestra obra, que tiene por título:

Nueva Farmacopea homeopática, ó *Historia natural y preparacion de los medicamentos*; *y Posologia* ó *administracion de las dósis*; segunda edicion, acompañada de 135 figuras intercaladas en el texto. Madrid, 1858, lib. de D. C. Bailly-Bailliere.

Digitized by Google

MATERIA MEDICA HOMEOPATICA.

1.—ACONITUM NAPELLUS.

ACON.—Acónito napelo.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 3, 24, 30.—*Duracion de accion*: 8, 16, 24, 48 horas, segun las circunstancias.

ANTÍDOTOS: Acet. vinum. par.?—*Se emplea como antídoto de*: Cham. coff. n-vom. petrol. sulf. sep. veratr.

COMPÁRESE CON: Agar. anac. ant.-crud. *arn. ars.* asar. *bell. bry. cann. canth.* caus. *cham. coff.* colch. *croc.* dros. *dulc. graph.* hep. hyos. ipec. *merc.* nitr. ac. *n-vom. op. phos.* plat. *puls. rut.* sabin. *sep. spig. spong.* stram. *sulf. veratr.* —El acónito se halla algunas veces indicado como remedio intermediario despues de *arn.* y *sulf.*—Despues del acónito, ya se administre desde el principio, ya en el curso del tratamiento, se hallarán con frecuencia convenientes: *Arn. ars. bell bry. cann. ipec. spong. sulf.*, etc.

CLINICA.—Estando indicado este medicamento por el *conjunto de síntomas*, podrá algunas veces ser útil en uno ú otro caso de las afecciones siguientes (1): —*Inflamaciones locales agudas*; *Inflamaciones reumáticas y artríticas con tumefaccion*; *Afecciones* principalmente de las personas *pletóricas de un carácter vivo, constitucion biliosa y nerviosa, ojos y cabellos oscuros ó negros, cútis de color rosado muy subido*, etc.; *Congestiones sanguíneas activas*, neuralgias, y accesos de espasmos, principalmente en los jóvenes (en particular en las niñas), de un *temperamento sanguíneo*, y llevando una vida sedentaria; *padecimientos debidos á un enfriamiento por un frio seco* (viento de Este), ó por una corriente de aire; *Afecciones ocasionadas por un gran miedo*, ó

(1) NOTA. Al hacer la enumeracion de las afecciones en las cuales se ha empleado ó recomendado este medicamento, no queremos ni justificar los *nombres patológicos* de que los autores se han servido, ni responder de ninguna manera de la eficacia absoluta del medicamento en estos casos. Todo lo que queremos decir, es que, en una afeccion parecida, el médico podrá dirigirse á este medicamento, *no para emplearle como específico*, sino solamente *para asegurarse por la comparacion de los síntomas, si hay realmente indicacion suficiente ó no para propinarle.*

Obrar de otro modo seria no solamente el mejor medio de no obtener jamás ninguna curacion, *sino que seria hacer el mas deplorable abuso de nuestras citas*, ABUSO CONTRA EL CUAL PROTESTAMOS AQUÍ UNA VEZ POR TODAS, Y PARA TODOS LOS MEDICAMENTOS Á LOS QUE HEMOS DADO UNA ENUMERACION IGUAL.

Digitized by Google

un arrebato de cólera; Accesos de convulsiones; Tétanos?; Trismus?; *Accesos de desvanecimientos*; Ataques de catalepsia?; Quemaduras; Erupciones miliares; *Miliar purpúrea*; Roseola; *Sarampion;* Período eruptivo de la viruela; *Inflamaciones erisipelatosas*; Erupciones urticarias; *Fiebres inflamatorias*, aun con síntomas biliosos ó nerviosos; Fiebre catarral con carácter inflamatorio; Somnambulismo?; Soñolencia comatosa?; *Enajenaciones mentales con ideas fijas de una muerte próxima*; *Congestiones cerebrales con vértigos;* Apoplejía sanguínea; *Cefalalgias congestivas*, catarrales, nerviosas, etc.; Jaqueca; *Encefalitis*; Hidrocéfalo agudo: *Oftalmias agudas*, aun las producidas por la introduccion de cuerpos extraños; *Prosopalgias y odontalgias congestivas* ó nerviosas; *Anginas agudas*, flegmonosas ó catarrales; Angina escarlatina; Denticion difícil con fiebre; *Padecimientos biliosos*; Vómitos en las embarazadas ó histéricas; Vómitos de lombrices; Hematémesis; *Ictericia*; *Hepatitis*; Enteritis; Peritonitis; *Orchitis*, despues de una gonorrea; Metrorragias y reglas muy copiosas á consecuencia de plétora; Peritonitis puerperal; Metritis; *Flores blancas*; *Hernias estranguladas*; Catarro ordinario y Grippe en el período inflamatorio; *Crup, primer período*: Coqueluche, primer período; Accesos de asma congestiva; Asma de Millar; Laringitis y bronquitis agudas; *Pleuresía*; Neumonitis; Hemoptísis; Afecciones de corazon; *Palpitaciones*, etc.

SINTOMAS GENERALES. —**Dolores lancinantes* °ó reumáticos que se renuevan bebiendo vino ó bajo la accion de otras causas excitantes.—**Padecimientos que principalmente por la noche parecen insoportables*, y que la mayor parte desaparecen estando sentado.—**Accesos de dolores con sed y rubicundez de las mejillas.*—*Sensibilidad dolorosa del cuerpo á cualquier movimiento y al menor contacto, y sobre todo de las partes enfermas.—°Dolor como de magullamiento y sensacion de pesadez en todos los miembros.—Tirantez con debilidad paralítica en los brazos y piernas.—Falta de fuerza y solidez, dolores y chasquido en las articulaciones principalmente de las piernas.—Caida rápida y general de las fuerzas.—**Accesos de desvanecimiento*, principalmente al incorporarse estando echado, °y algunas veces con congestion de san-

gre en la cabeza, *zumbido de oidos, °palidez mortal de la cara y despeluzamiento.—**Malestar como á consecuencia de la supresion de la transpiracion ó debido á un enfriamiento*, con dolor de cabeza, zumbido de oidos, cólicos y romadizo.—Sensacion de frio y de estancacion de sangre en todos los vasos.—Sacudidas en los miembros.—Ataque cataléptico con gritos, rechinamiento de dientes é hipo.—Tumefaccion con color negruzco de todo el cuerpo.

Piel.—Hormigueo en la piel con prurito y descamacion, principalmente en las partes enfermas.—**Piel seca y quemante.*—°Tumefaccion y calor quemante de las partes heridas.—**Color amarillento de la piel.*—Punzadas con sensacion de excoriacion en varios puntos.—Manchas semejantes á las picaduras de pulgas en las manos, cara, etc.—**Botoncitos rojos y anchos con prurito quemante.* —°*Miliar purpúrea.*—°*Sarampion.*

Sueño.—Excesivo deseo de dormir, á veces andando, y principalmente despues de comer.—Somnolencia con desvarío angustioso y respiracion rápida.—*Desvaríos é ideas confusas con los ojos cerrados sin dormir.—**Insomnio por ansiedad con agitacion y jactacion continuas.*—*Sobresaltos durante el sueño.—Sueños angustiosos con pesadilla.—Ensueños con una especie de somnambulismo. —Sueño ligero.—*Imposibilidad de estar echado de lado. —Durmiendo, posicion supina, la mano debajo de la cabeza, ó sentado con la cabeza inclinada hácia adelante.

Fiebre.—**Calor seco, ardiente, con sed extremada precedida á veces* (principalmente al principio de la enfermedad) *de escalofrios con temblor.—**Calor principalmente en la cabeza* y en la cara, con *rubicundez de las mejillas, horripilacion por todo el cuerpo*, dolor presivo de cabeza, humor lloroso, lastimero y contradictorio, °ó sensacion de calor general con rubicundez de las mejillas, dolor de cabeza volviendo los ojos y humor jugueton.—**Calosfrios, apenas se descubre durante el calor.*—Frio por todo el cuerpo con calor interior, frente y lóbulos de las orejas calientes ó **con rubicundez de las mejillas y dolores en los miembros*, ó con rigidez de todo el cuerpo, calor y rubicundez de una mejilla, y frio y palidez de la otra, ojos abiertos y fijos, pupilas contraidas dilatándose difícil-

Digitized by Google

mente.—Frio y calofrios en los dedos, seguidos de calambres en las pantorrillas y plantas de los piés.—Calor de la cara con tristeza, exasperacion y ganas de vomitar precedido de frio y calofrios en los piés y manos.—*Calor general con la cara pálida.*—°Horripilaciones frecuentes con calor ardiente y seco de la piel.—Sudor contínuo, sobre todo de las partes cubiertas.—Sudor ácido.—°*Pulso duro, frecuente y acelerado.*

Moral.—**Grande agitacion y jactancia* con *angustia, exasperacion inconsolable, gritos, lloros, gemidos, lamentos y vituperios.*—**Aprensiones y miedo de una muerte próxima.* —Presentimientos como en un estado de somnambulismo.—Antropofobia y misantropía.—**Mucha disposicion á irritarse, á asustarse* y á querellarse.—El menor ruido, aun la música, parece insoportable.—Humor inconstante, unas veces triste, abatido, pendenciero y desesperado; otras alegre, provocativo, lleno de esperanza y dispuesto á cantar y bailar.—*Alternativas de risas y lloros.—*Inquietud acerca de su enfermedad y sin esperanza de curacion.—Miedo de espectros.—*Disposicion á salirse de la cama.—Inteligencia embargada con imposibilidad de reflexionar, y sensacion como si todas las funciones intelectuales se hubieran trasportado á la region precordial.—Accesos de manía y de locura.—Instabilidad de las ideas.—**Delirios principalmente por la noche.*—Debilidad de la memoria.

Cabeza.—Malestar de la cabeza en la frente, como si el cerebro estuviese taponado, principalmente con el calor de la habitacion.—*Vértigos, sobre todo al incorporarse*, ó bien levantándose de su sitio, bajándose, moviendo la cabeza, y frecuentemente *con sensacion de embriaguez, vahido, pérdida del conocimiento, oscurecimiento de la vista, náuseas y sensacion de debilidad en la boca del estómago.—*Sensacion como si el cerebro flotase en el cráneo, aumentada con el mas pequeño movimiento, y tambien hablando y bebiendo.—*Dolor de cabeza con ganas de vomitar y vómito.—Cabeza como quebrantada con sensacion de quebrantamiento en los miembros.—**Dolor estupefaciente en la cabeza* con sensacion de compresion y de constriccion calambroídeas, principalmente en la frente y la raiz de la nariz.—**Pesadez y plenitud en la frente y las sienes* con *presion expansiva como si todo*

quisiese salir por allí, principalmente al inclinarse hácia adelante.—Sacudidas, **punzadas y latidos en la cabeza.*—Cefalalgia tractiva, algunas veces semilateral.—Sensacion como si ascendiese una bola á la cabeza esparciendo frescura.—**Congestion de sangre en la cabeza*, con calor y rubicundez de la cara, ó con sensacion de calor en el cerebro, sudor en la piel del cráneo y palidez de la cara.—Ardor y hervidero en la cabeza como si hubiera agua hirviendo en el cerebro.—Zumbido y chasquido en la cabeza.—Sensacion en el vértice como si tiraran de los cabellos.—Dolor de cabeza como por un enfriamiento ó transpiracion suprimida, con zumbido de oidos, romadizo y cólicos.—**Agravacion de las afecciones de la cabeza por el movimiento, hablando, incorporándose en la cama y bebiendo; mejoría al aire libre.

Ojos.—**Ojos rojos, inflamados, con excesiva rubicundez de los vasos sanguíneos* y *dolores insoportables.*—**Lagrimeo abundante.—Calor y ardor en los ojos con **dolores presivos y °lancinantes, sobre todo moviéndolos.—°Tumefaccion de los ojos.—**Pupilas dilatadas.*—Sequedad, pesadez é **hinchazon inflamatoria de los párpados.—°*Ojos centellantes*, ¯convulsos y prominentes.—Vista fija.—**Fotofobia excesiva*, ¯ó grande deseo de la luz.—Manchas negras y sensacion como de niebla delante de los ojos.—Accesos de ceguera repentina.—Traccion de los párpados con somnolencia.

Oidos.—Retintin y **zumbido en los oidos.*—Cosquilleo y dolor vivo en los oidos.—Sensacion como si hubiese alguna cosa delante de los oidos.—Sensibilidad excesiva del oido; toda clase de ruido es insoportable.

Nariz.—Compresion atolondrante en la raiz de la nariz.—**Epistaxis.*—Sensibilidad excesiva del olfato.—Estornudo violento con dolor en el vientre y en el lado izquierdo.—*Coriza* con catarro, dolor de cabeza, zumbido de oidos y cólicos.

Cara.—**Cara abotagada, caliente y roja*, ó ¯azulada, ó °*alternativamente roja y pálida.*—Al incorporarse, la cara que hasta entonces estaba roja, adquiere una palidez mortal.—Rubicundez de una mejilla con palidez de la otra, ó **placas rojas en las dos mejillas.*—Sudor en la frente, en el labio superior y en la mejilla sobre la que está echado.—Contorsion de las facciones.—Dolor hor-

Digitized by Google

migueante y sensacion de hinchazon en las mejillas.—Dolor como de ulceracion en los pómulos.—°Prosopalgia semilateral, con tumefaccion de la mandíbula inferior.—*Labios negros* y secos.—Dolores quemantes, hormigueo, punzadas con tirones sucesivos en las mandíbulas.

Dientes.—*Sacudidas lancinantes, °ó DOLORES PULSATIVOS EN LOS DIENTES, frecuentemente *con congestion de sangre* hácia la cabeza y calor de la cara.—°Odontalgia ocasionada por un frio debido á un viento áspero y seco.—°*Odontalgias reumáticas.*

Boca.—*Sensacion de sequedad ó *sequedad* en la boca y sobre la lengua.—°Lengua blanca.—Hormigueamiento, *picotazos y sensacion quemante en la lengua* con acumulacion de saliva en la boca.—Parálisis de la lengua.—*Palabra temblorosa y balbuciente.—Dolor de excoriacion en los orificios de los conductos salivales, como si estuvieran ulcerados.

Garganta.—*Afeccion á la garganta con rubicundez oscura de las partes afectas y deglucion difícil.—Picor, hormigueo, sensacion de estrangulacion, quemazon y *comezon en la garganta*, principalmente al tragar.—Sensacion de contraccion en la garganta, como por materias ácres.

Apetito.—*Gusto de la boca amargo* ó pútrido.—Gusto amargo de todos los alimentos y bebidas, á excepcion del agua.—**Sed excesiva é inextinguible*, algunas veces con deseo de la cerveza.—**Pérdida del apetito y disgusto de los alimentos.*—La cerveza produce como un peso sobre el estómago.

Estómago.—Hipo.—Regurgitacion en seco y eructos abortados.—*Vómito acuoso como de pituitas con afeccion del corazon.—Ganas de vomitar como despues de haber comido alguna cosa dulce ó grasienta.—**Vómitos biliosos, verdes ó mucosos y sanguinolentos.*—Vómito de sangre pura.—Vómito de lombrices.—*Dolores en el estómago despues de haber comido y bebido.—*Sensacion de tumefaccion, tension y *presion como por un peso en la region epigástrica y en el estómago*, algunas veces con dificultad de respirar.—Sensacion de contraccion en el estómago como por sustancias ácres.

Vientre.—Constriccion, **tension y presion en los hipocon-*

Digitized by Google

drios, á veces con plenitud y sensacion de peso.—*Dolor quemante, punzadas, pinchazos y *presion en la region hepática*, con respiracion difícil.—**Sensibilidad dolorosa en la region hepática al tacto.*—**Ictericia.*—Dolores tractivos en el vientre agachándose.—Constriccion, pinchazo y *quemazon en la region umbilical, con retraccion á veces del ombligo.—Retortijones insoportables por la mañana en la cama.—Tension y timpanitis dolorosa del vientre; principalmente en el epigastrio.—*Tumefaccion del vientre como en la ascitis.—**Sensibilidad dolorosa del vientre al tacto* y al menor movimiento.—Cólico flatulento, principalmente por la noche, con presion, tension, borborigmos y ruido sordo en el vientre.

Defecacion.—**Supresion de las evacuaciones ventrales.*—Deposiciones en corta cantidad, frecuentes, blandas, con tenesmo.—*Deposiciones diarréicas, acuosas.—**Deposiciones blancas*, con orinas rojas.—Deposiciones involuntarias por parálisis del ano.—Antes y despues de las deposiciones diarréicas, náuseas y sudor.—Dolores en el recto.—Presion y picazon en el ano.—Hemorróides que dan sangre.—Diarrea con flujo de orina y cólicos.

Orinas.—Supresion de orina, con presion en la vejiga y dolores renales.—Necesidad frecuente de orinar, con ansiedad y dolores.—*Flujo de orina*, con sudor, diarrea y cólicos.—Emision involuntaria por parálisis del cuello de la vejiga.—**Orinas raras, quemantes, de un rojo oscuro* y con sedimento color de ladrillo.—Depósito sanguinolento en las orinas.—Ardor y tenesmo en el cuello de la vejiga.

Partes viriles.—Apetito venéreo alternativamente aumentado y disminuido.—Accesos eróticos.—Hormigueo en las partes genitales.—Dolores de contusion en los testículos.—Prurito en el prepucio.—Punzadas y latidos en el glande al orinar.

Menstruacion.—*Reglas muy abundantes.—Furor á la aparicion de las reglas.—Metrorragia.—Leucorrea viscosa y amarillenta.—Aumento de leche en los pechos.

Laringe.—Sensacion de entorpecimiento en la tráquea.—Ataque de parálisis en la epiglotis con facilidad á atragantarse.—*Sensibilidad dolorosa en la laringe.—*Voz crascitante.—*Ganas continuas de toser*, producida por una irritacion ó cosquilleo en la laringe.—Tos despues de

Digitized by Google

beber ó fumar.—**Tos corta y seca*, principalmente por *la noche*.—°*Tos convulsiva*, ó ronca y crascitante algunas veces, con peligro de sofocacion y constriccion de la laringe.—Expectoracion de materias espesas y blancas, °ó de mucosidades sanguinolentas, *ó *esputos de sangre por la tos*.—**Tosiendo, punzadas y dolores en el pecho.*

Pecho.—**Respiracion corta, principalmete durante el sueño* °y al levantarse.—**Respiracion penosa, angustiosa y lastimera*, ó rápida y superficial, ó *fuerte, estrepitosa y á boca llena*.—Respiracion lenta durante el sueño.—*Aliento fétido.—*Constriccion y *opresion angustiosa del pecho*, con dificultad de la respiracion.—°Accesos de sofocacion con ansiedad.—Sensacion de peso y de compresion en el pecho.—**Punzadas dolorosas en el pecho*, principalmente *respirando, tosiendo y con el movimiento* (aun cuando no se muevan mas que los brazos).—**Punzadas en el costado*, con humor lloroso y lastimero, mitigado algun tanto estando echado sobre la espalda.—Hormigueo en el pecho.—Dolores contusivos en el esternon y costillas.—**Sensacion de angustia en el pecho* que corta la respiracion.—**Palpitaciones del corazon con gran ansiedad*, calor, principalmente en la cara, y grande laxitud en los miembros.—°Latidos en la region del corazon durante el movimiento y al subir una escalera.—Sensacion de compresion y palpitaciones en la region del corazon.

Tronco.—Dolores de magullamiento en el dorso, riñones y nuca.—**Rigidez dolorosa en la nuca*, riñones y articulaciones coxo-femorales.—Dolor terebrante en el dorso y riñones.—Hormigueo y comezon en el dorso.—Debilidad y dolor de contusion en la nuca.

Brazos.—Dolor contusivo y debilidad en los brazos, principalmente en las espaldas, con hinchazon.—Pesadez de los brazos, con adormecimiento de los dedos.—Debilidad paralítica del brazo y mano, sobre todo al escribir.—Tirantez de los brazos.—Manos como muertas.—Hinchazon de las manos.—Calor en las manos, con frio en los piés.—Sudor frio en la palma de las manos.—Hormigueo en los dedos, principalmente escribiendo.—°Hinchazon inflamatoria del codo con adormecimiento, y estado paralítico de los dedos.

Piernas.—Dolor contusivo en las articulaciones coxo-femorales, especialmente despues de haber dormido, ó de

estar echado.—Tirantez con debilidad paralítica en las piernas.—°Dolor lancinante en la articulacion coxo-femoral hasta la rodilla, el que obliga á gritar á cada paso. —*Falta de fuerza y de solidez en las articulaciones de la cadera y de la rodilla.*—°Inflamacion de la rodilla con rubicundez lustrosa, dolores lancinantes, inmovilidad y mucha sensibilidad al tacto.—Sensacion de rigidez en las piernas, moviéndolas.—*Sensibilidad dolorosa del empeine del pié, con desesperacion y temor de morir.*—Entorpecimiento de las piernas.—Pesadez de los piés.—Frio en los piés, principalmente en los dedos gruesos, y sudor en la planta de los piés.

2.—ÆSCULUS HIPPOCASTANUM.

ÆS HIPP.—Castaña de Indias.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Medicamento poco estudiado todavía, pero usado con buen éxito hasta aquí contra las afecciones siguientes: *Constipacion crónica* y *hemorróides*, con sensacion de sequedad en el recto, ó como si el ano estuviese lleno de pequeños pedazos de madera; hemorróides muy dolorosas, pero que sangran poco; dolor y sensacion paralítica en los riñones, hasta en las caderas, empeorados al levantarse de su asiento.—*Leucorrea*, con dolores y sensacion paralizante en los riñones y caderas, que se extiende del vientre al sacro y casi imposibilitando á la paciente para levantarse de su asiento.—*Parálisis* de las extremidades inferiores.

3.—AGARICUS MUSCARIUS.

AGAR.—Agárico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunas afecciones crónicas.
ANTÍDOTOS: Camph. coff. puls. vinum.
COMPÁRESE CON: Acon. bell. *cof.* graph. phos. *puls.*

CLINICA.— Las afecciones en las cuales hasta ahora se ha usado este medicamento, son:—Ambliopia amau-

rótica; Odontalgia; Debilidad por abuso del cóito; Dolores osteócopos en las piernas; Convulsiones y temblor de los miembros?; Ataques epilépticos; Erupcion como de granos de mijo; Sabañones.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES. — Dolores calambroídeos en los músculos estando sentado.—Tirantez en los miembros, principalmente estando en reposo, sea sentado ó de pié, y desapareciendo por el movimiento.—Síntomas que se manifiestan en cruz (por ejemplo, en el brazo derecho y en la pierna izquierda), y andando lentamente, se mejoran.—Grande sensibilidad de todo el cuerpo; la presion mas dulce produce dolores contínuos.—Dolor de contusion en los miembros y en todas las articulaciones despues de un ejercicio aun cuando sea moderado.—Dolores terebrantes en diversas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, con deseos de dormir y postracion estando sentado.—Mucha debilidad y pesadez en todos los miembros. — Temblor. — Convulsiones.— Ataques epilépticos. —Grande sensibilidad al aire fresco.

Piel.—Prurito y comezon que obligan á rascarse.—**Prurito*, dolor quemante, y *rubicundez como por sabañones* en diversas partes del cuerpo.—*Erupcion miliar, blanquecina, y de granos aproximados, con prurito excesivo.

Sueño.—Deseo de dormir por el dia, sobre todo despues de la comida.—Bostezo violento seguido de vértigos.— Por la mañana no parece haber dormido bastante, y disgusta mucho levantarse.

Fiebre.—Disposicion excesivamente friolenta y calofrios al aire libre ó destapándose en la cama, aunque los miembros estén frecuentemente calientes. — Calofrios violentos y temblor por todo el cuerpo con calor en la cara y frio en las manos.—Sudores aun por un paso moderado y haciendo pocos esfuerzos.

Moral.—Aversion á la conversacion.—Horror al trabajo. Disposicion á hacer versos y profetizar.—Manía tímida ó furor desplegando grandes fuerzas.

Cabeza. — Vértigos como por embriaguez, principalmente al aire libre, por la mañana y meditando.—La luz viva del sol produce instantáneamente un vértigo que

Digitized by Google

hace caer.—Dolores terebrantes en la cabeza estando sentado.—Dolor sordo principalmente en la frente, contraccion de los párpados.—*Dolores tirantes desde la cabeza* hasta los ojos y raiz de la nariz, particularmente por la *mañana al despertar*.—Dolor como si un clavo estuviese metido en la cabeza.—Sensacion de contusion en el cerebro, y como si escarbaran.—Cefalalgia semilateral, tirante y presiva, con embarazo en la cabeza.—Pulsaciones en el vértice con desesperacion casi furiosa.—Presion en la cabeza hasta el fondo del cerebro, aumentada por la presion ó contacto de los cabellos, y acompañada de un decaimiento completo.—Sensacion de frio glacial en la cabeza.—*Estremecimiento en la frente y en las sienes.*

Ojos.—Picazon en los ojos.—Sensacion quemante en los ángulos internos de los párpados, con sensibilidad dolorosa al tacto. Presion en los ojos.—Legaña en los ángulos de los ojos, y aglutinacion de los párpados.—Estrechez de los ángulos de los párpados.—*Palpitacion en los ojos y en los párpados.*—*Debilidad y turbacion de la vista como si hubiese un velo delante de los ojos.—**Manchas negruzcas (como de moscas) delante de los ojos.*—Miopia.—Diplopia.

Oidos.—Otalgia, provocada y agravada por las corrientes de aire libre.—*Prurito en las orejas con rubicundez y dolor quemante como de sabañones.—Zumbido de oidos.

Nariz.—Excoriacion é inflamacion de las ventanas de la nariz, con sensibilidad dolorosa.—Prurito en el interior y en el exterior de la nariz.—Mucosidad sanguinolenta y epistaxis.—Exaltacion del olfato.—Estornudo frecuente sin coriza.—Sequedad de la nariz.—Flujo de un agua clara por la nariz, sin coriza.—Color azulado de la nariz.

Cara.—*Dolores lancinantes ó tirantes *en las mandibulas*, mejillas y barba.—Prurito, rubicundez y ardor en las mejillas como por sabañones.—Palpitacion y pulsacion en las mejillas.—Facciones alteradas.—Labios azulados, grietas quemantes en el labio superior.—Tirones calambroídeos en la barba y mandíbula inferior.

Dientes.—Dolores dislacerantes en los dientes, agravados por el frio.—Encías hinchadas, doloridas y que sangran fácilmente.

Boca.—Dolores de excoriacion en la boca y en el paladar.

Digitized by

Excoriacion en la lengua.—(Despues de la comida), lengua sembrada de aftas de un amarillo súcio, con sensacion como si la piel se fuera á levantar.—Ulcera en el frenillo de la lengua.—Mal olor de la boca, como si hubiese comido rábanos.—Espuma en la boca.—Flujo de saliva de un gusto ácre.

Apetito.—Gusto soso y fétido en la boca.—Inapetencia á el pan.—Hambre con falta de apetito.—Accesos de bulimia, principalmente por la tarde.—Despues de comer, presion en el estómago, en el vientre, con plenitud.

Estómago.—Eructos en seco alternando con hipo.—Eructos con el gusto de los alimentos que se han tomado.—Náuseas con retortijones.—Ganas de vomitar inmediatamente despues de haber comido.—Presion en el estómago y en la region precordial despues de la comida.—Dolor calambroídeo y pesadez presiva en el estómago.

Vientre.—Latidos en la region hepática.—Punzadas en la region esplénica, en el acto y despues de la inspiracion.—Retortijones y pinchazos en el vientre como por una diarrea.—Movimientos y ruidos en el vientre.—*Expulsion abundante de flatuosidades*, y *un olor fétido como el del ajo.*—*Retortijones violentos con diarrea*, angustias, sed ardiente, alteracion de las facciones, sudores frios, pulso pequeño y regular, deposiciones muy fétidas, temblor y delirio.

Defecacion.—*Deposiciones duras de un color oscuro*, despues de algun tiempo de estreñimiento.—*Deposiciones *diarréicas* en forma de papilla, *con mucha cantidad de gases* y *cólicos muy fuertes*.—Durante las deposiciones diarréicas, traccion dolorosa en el estómago y vientre.—Hormigueo en el ano.

Orinas.—Orinas raras y poco abundantes.—Orinas claras y de un amarillo de limon.—Flujo de un moco viscoso por la uretra.

Partes viriles.—Exaltacion del apetito venéreo, con flacidez del miembro.—Eyaculacion insuficiente en el cóito.—**Despues del cóito*, *grande debilidad con sudor nocturno.*—Prurito en las partes genitales.—Tirones en los testículos.

Laringe.—Expectoracion de pequeños glóbulos mucosos, casi sin tos.

Pecho.—Respiracion corta y oprimida, con dificultad

para andar aunque sea con lentitud.—Respiracion difícil, como si el pecho estuviese lleno de sangre.—Opresion constrictiva del pecho con necesidad de respirar frecuente y profundamente.—Dolor principalmente en la parte inferior del pecho, como si todo estuviera comprimido.—Punzadas dolorosas en el pecho.—Latidos con dolor del corazon.—Sudor nocturno abundante en el pecho.—Prurito en las mamas.

Dorso.—Dolor de cansancio sumo y luxacion en el dorso, nuca y riñones, especialmente estando sentado ó acostado.—Debilidad dolorosa en los músculos del dorso.—Dolor paralítico en los riñones, aumentado por la marcha ó estando de pié.

Brazos.—Brazos débiles sin vigor.—Dolor quemante en los brazos, seguido de una *erupcion de pequeños granos blancos con descamacion de la epidérmis.—Temblor de las manos.—Dislaceracion de los dedos.—Dolor calambroídeo en el pulgar.—Palidez y torpeza en los dedos con mucha impresionabilidad al frio.—*Prurito, dolor quemante y rubicundez de los dedos como por sabañones.

Piernas.—Pesadez y cansancio en las piernas, sobre todo en los muslos.—*Tirantez en las piernas como en el interior de los huesos, sobre todo estando sentado ó de pié, y mejorada por el movimiento.—Sensacion de dolor en la cadera, andando.—Tirantez en las piernas.—Dolor lancinante en los piés y en los dedos.—Presion tractiva en los maléolos.—*Prurito quemante y rubicundez en los dedos gruesos de los piés, como por sabañones.

4.—AGAVE AMERICANA.

AGAV.—Aloe Pitter.—*Véase* HALE, *Remedios americanos.*

Recomendado por los médicos americanos, principalmente contra: *Escorbuto*, con cara pálida, semblante doliente, encías hinchadas y brotando sangre, piernas hinchadas, duras, con manchas azuladas, color oscuro.—*Gonorrea encordada*, con erecciones muy dolorosas, estranguria, distension en los testículos y los cordones espermáticos, con tal violencia, que se desea la muerte.

Digitized

5.—AGNUS CASTUS.

AGN.—Sanzga'illo comun.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: de 8 á 15 dias en algunos casos.

ANTÍDOTOS: Camph.

COMPÁRESE CON: Bov. cupr. natr-m. nitr-ac. oleand. plat. selen. sep.

CLINICA.—Las principales afecciones para las cuales se ha empleado y recomendado este medicamento, son: *Impotencia; Gonorrea secundaria; Reglas suprimidas; Agalactia*; Ulceras en la boca y encías; Hinchazon ó *Induracion del bazo*; Ascitis; Timpanitis; Excoriacion y grietas en el ano (aplicacion exterior); Hinchazon é induracion de los testículos; Leucorrea; Luxaciones; Nudosidades artríticas; Hinchazon inflamatoria y reumática de las articulaciones; Esterilidad, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Comezon, picazon en diferentes partes.—Somnolencia.—Sueño agitado, despertando sobresaltado.—Sueños angustiosos ó lascivos.—Calofrios con temblor, aunque el cuerpo esté caliente al tacto.—Despeluzamiento sin sed, con frio en las manos.—Por la tarde, en la cama, calor pasajero en el cuerpo, con frio en las rodillas.

Moral.—Humor melancólico é hipocondríaco con apatía, ausencia ó falta de ideas é incapacidad de hacer cosa alguna.—Estado de exaltacion alternando con desprecio de sí mismo.—Decaimiento completo y deseo de la muerte.—*Excesiva tristeza con idea fija de una muerte próxima.—Mucha distraccion*, falta de inteligencia y aturdimiento.—Concepcion difícil de los discursos ajenos.—Acceso de angustia con debilidad y sensacion como si fuera á tener diarrea.

Cabeza.—Dolor contractivo en la cabeza, principalmente leyendo.—Dolor de cabeza como cuando se ha estado algun tiempo en habitacion llena de humo, con sensacion de pesadez, mejorándose al fijar la vista sobre al-

gun objeto.—Tirantez presiva principalmente en la frente y sienes aumentada por el movimiento.—Dolor de contusion como por un golpe en la sien.—Escozor lancinante en la cabeza como en los huesos, principalmente por la tarde, y que se siente aun durante el sueño.—Prurito y comezon lancinante en la piel del cráneo.—Tension y escalofrios en los tegumentos de la cabeza, los que, sin embargo, parecen estar calientes al tacto.

Ojos y oidos.—Sensacion quemante en los ojos, por la tarde, leyendo.—Prurito y picazon en los párpados y alrededor de los ojos.—Pupilas fuertemente dilatadas.—Retintin y zumbido en los oidos.

Nariz.—Olor de almizcle ó de arenque.—Presion en la raiz de la nariz, desapareciendo por la compresion.

Cara y dientes.—Hormigueo y escozor pruritoso en las mejillas.—Dolor dislacerante en la mandíbula inferior.—Odontalgia excitada por bebidas ó alimentos cálidos.

Boca y garganta.—Sequedad de la boca con saliva viscosa.—Rubicundez de la campanilla y del velo del paladar.—Rascamiento en la garganta que obliga á toser con expectoracion de un moco muy viscoso.—°Ulceras en la boca y en las encías.

Apetito.—Gusto metálico ó de cobre en la boca.—Hambre y apetito aumentado.—Adipsia y aversion á toda clase de bebida.—Despues de comer, plenitud y timpanitis.—Hipo frecuente, con disposicion á irritarse.

Vientre.—Malestar al principio en la boca del estómago, despues en el vientre, como si todas las vísceras descendiesen.—Presion en la region hepática, aumentada por el tacto.—Borborigmos en el vientre durante el sueño.

Defecacion y orinas.—Deposiciones diarréicas ó blandas.—Deposiciones duras y constipacion.—Deposiciones difíciles sin ser duras.—Prurito y comezon en el periné.—°Grietas y fisuras ulcerosas profundas en el ano.—Orinas mas frecuentes y abundantes, saliendo en un chorro mas fuerte.

Partes genitales.—Debilidad en las funciones genitales.—Los órganos genitales están frios, insensibles y poco dispuestos al cóito.—Tirantez en los cordones espermáticos.—°*Flujo blenorréico por la uretra* **con falta de apetito venéreo y erecciones.*—*Flujo amarillo por la uretra.—Derrame del líquido prostático durante una deposicion

Digitized by Google

difícil.—(Aumento del apetito venéreo con erecciones frecuentes y acompañadas de una especie de furor; efecto alternativo?).—Reglas suprimidas con dolores tractivos en el vientre.

Pecho.—Tos, por la tarde en la cama, antes de dormirse. —Presion en el esternon, sobre todo, respirando profundamente.

Extremidades.—Dolor de luxacion en las articulaciones de la espalda, de la mano y de la rodilla.—Tirantez en los piés y en los dedos gruesos, principalmente andando.—Torsion fácil de los piés al andar sobre el empedrado.—Pesadez tractiva de los piés.—Hinchazon y tirantez artrítica en las articulaciones de los dedos.

6.—ALOES SOCCOTRINA.

ALS.—Aloes.—Hering, *Estudios patogenéticos de la América del Norte*, p. 764. *Hist. nat.* y *prep.* Farmacop. homeop., p. 159.
Antídotos.—Sulf. alum. *n-vom.* lycop. sinapis.

CLINICA.—(*Véase la nota, pág.* 17).—Comparando los síntomas característicos de este medicamento con los de las afecciones morbosas, se verán los casos particulares contra los que se podrá administrar con éxito en las enfermedades siguientes:

Parálisis; ictericia; úlceras antiguas; heridas pútridas; gangrena; cáries de los huesos; fiebres; pesadilla; estado pituitoso; estado atrabiliario; afecciones edematosas.—Hipocondría; manías; congestiones cerebrales; cefalalgias; caida de los cabellos.—Oftalmías asténicas; legañas; manchas y otras enfermedades de la córnea.—Afecciones de los oidos; sordera.—Epistaxis.—Ulceras en los labios.—Cáries de los dientes; úlceras en las encías.—Neuralgia sublingual; ulceracion de la lengua; hemorragias bucales; estomacace y úlceras en la boca.—Gastralgias; dispepsias en las personas de constitucion flemática, humoral, con desgana; vómitos con constipacion; hematémesis.—Infarto é induracion del bazo; dolores hepáticos; cálculos biliarios; infarto é induracion de las glándulas del mesenterio; ascitis; tísis intestinal.—Cólicos y diarrea; excre-

mentos gris blanquecinos; constipacion ó estreñimiento, por consecuencia de atonía; aglomeracion de materias fecales por consecuencia de constipacion ó estreñimiento; secrecion biliosa insuficiente, disenterías; hemorróides suprimidas; sufrimientos abdominales en relacion con las afecciones esplénicas y hepáticas; acumulaciones mucosas en los intestinos; ascárides.—Ulceraciones en el ano, en las partes sexuales y en el prepucio.—Dolores uterinos; retencion de los ménstruos; amenorrea; clorosis; esterilidad.—Congestiones pulmonares; asma.—Paperas.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores como por una contusion ó una luxacion; distension paralizante en los músculos; punzadas en las articulaciones; dolor como de debilidad, en las articulaciones de los piés y de las manos; chasquido en las vértebras del cuello, en los hombros y en las caderas.—Abatimiento, laxitud, pereza.—*En la mañana*: Sobreexcitacion, irritacion, mal humor en el sentido de creerse desgraciado; nariz seca ó dando sangre; sufrimientos gástricos, diarrea, ventosidades, frio y escalofrios.—*Despues de medio dia*: Sufrimientos de las membranas mucosas; coriza fuerte, diarreas mucosas; necesidades frecuentes de orinar; frio, escalofrios y pulso lento.—*Por la tarde*: Agravacion de la mayor parte de los padecimientos, ventosidades, piés frios.—*En el lado izquierdo, despues en el derecho*: Punzadas en el oido, palpitaciones del corazon, latidos en el pecho, coriza; chasquidos en la articulacion del hombro izquierdo, y en la del fémur derecho con el innominado.—Sufrimientos de los ojos y de la nariz derechos; así como en el lado izquierdo timpanitis del cólon, punzadas en el pecho, dolores en la mano.—Los ácidos agravan los sufrimientos.—Grande sensibilidad *al frio*, sobre todo en tiempo nublado.—Adelgazamiento; flacidez de los músculos.—El *calor* agrava el dolor de cabeza que las compresas frias alivian; el contacto del *agua* agrava los sufrimientos de la cara; *despues de pasear al aire libre*, aunque con repugnancia, *se alivian los sufrimientos*.—*Durante el movimiento*: Aumento de las náuseas así como de los dolores en la cabeza, el tronco, los miembros y sobre todo, los sufrimientos abdominales;

Digitized by Google

apoyando el pié al andar, punzadas en las sienes y dolor en la boca del estómago.—*Al esperezarse*, dolor en el vientre y desfallecimiento en el pecho.—*Estando acostado*, aumento de los latidos en la cabeza; estando sentado, dolor en los riñones y pulsaciones en el ano.—°Los niños se acuestan sobre el vientre.—(°Consecuencias de una alimentacion demasiado suculenta; de una vida sedentaria.—°Sufrimientos de la vejez?).

Piel y tegumentos del cuerpo.—°Prurito, sobre todo en los miembros pelvianos.—Pequeños granos en el vientre.—Forúnculo en el brazo.—Los puntos excoriados por el rascamiento están extremadamente doloridos.—°Antiguas úlceras y llagas; °úlceras pútridas, fétidas?; °quemaduras?—Ictericia.—°Sequedad de la piel.

Sueño.—Bostezos despues de la siesta; bostezos por la noche sin ganas de dormir; bostezos con hambre.—Sueño pesado durante la siesta.—Sueño impedido por afluencia de pensamientos, ó bien por frio de piés.—Sueño agitado, con despeluzamiento.—*Por la noche*: despertar con sed; necesidad de orinar; poluciones y apetito venéreo pronunciado; dolores en el dorso; escalofrios.—*Ensueños penosos*: de peligros que se arrostran, con imposibilidad de gritar; ensueños, como si se ensuciase en sus calzones.—*Al despertar*: dolor de riñones; *despues de despertar estado de aturdimiento.*

Fiebres.—*Estado friolento*: durante la coriza, al aire libre, en tiempo frio, así como en la cámara caliente; horripilacion con laxitud por la mañana al levantarse; horripilacion y frio al ir al sillico; frio en el cuero cabelludo, que se extiende á todo el cuerpo, con pulso débil; *frio en los piés y en las manos*, despues de comer, así como por la noche en la cama, que quita el sueño; *escalofrios por la noche*, así como durante los dolores y al levantarse.—*Hervidero* de sangre por todo el cuerpo; calores parciales, sobre todo en la piel de la cabeza y la cara, etc.—*Pulso* acelerado, oprimido, lento, irregular.—*Sudor*, bajo las axilas, en las partes genitales; sudor de mal olor.

Moral é inteligencia.—Inquietudes y ansiedades, durante el hervidero de sangre, los vértigos y los estremecimientos nerviosos; agitacion, miedo, antropofobia.—Mal humor; humor desapacible, durante un tiempo

Digitized by Google

nublado; cólera contra sí mismo, agravada durante los dolores, ó la defecacion tardía, aliviada al aire libre.—Repugnancia por el trabajo.—Abatimiento, que alterna con actividad.—Carácter conciliador, contentamiento interior. Los niños rien y parlotean.

Cabeza.—Vértigo durante el movimiento, con inquietud, como si se estuviese sobre un asiento muy alto.—Embarazo en el vértice de la cabeza con escalofrios.—Presion por cima de los ojos; punzadas por cima de las cejas; presion en las sienes, de dentro afuera, con centellas delante de los ojos y calor en la cara; punzadas en las sienes á cada paso.—Sensacion de peso en el vértice de la cabeza.—Dolor de cabeza durante los sufrimientos abdominales, así como despues de defecar insuficientemente.—Agravacion de los dolores de cabeza con el calor y su alivio por las compresas frias.—*Afluencia de sangre á la cabeza; latidos que obligan á sentarse en la cama.—Sensibilidad del cuero cabelludo por placas circunscritas.

Ojos.—Afluencia de sangre á los ojos; presion en las órbitas.—Durante el dolor frontal, contraccion de los párpados.

Oidos.—**Otalgia*; punzadas, que se dirigen hácia los oidos; punzada tractiva, primero en el oido izquierdo, despues en el derecho.—Calor por dentro y por fuera del oido.—Chasquido en el oido al leer en alta voz; chirrido al mover la mandíbula.—Sordera con otalgia violenta.

Nariz.—Nariz dolorida por la mañana durante el movimiento.—Nariz roja al aire libre.—Frialdad en la punta de la nariz.—Sequedad de la nariz por la mañana en la cama.—*Epistaxis por la mañana en la cama despues de despertar.—Excoriacion del ala derecha de la nariz.—Estornudo abortado; *coriza fluente despues de medio dia.

Cara.—Cara pálida durante un tiempo nublado.—Calor de la cara durante la sobreexcitacion, así como durante el dolor de cabeza.—Labios mas rojos, secos, agrietados, que se exfolian, hinchados, con placas excoriadas, fungosas.

Dientes.—Sensibilidad en un molar hueco, despues pústula ulcerada en las encías.

Boca.—Sequedad en la boca; placa inflamada; mal olor. Lengua dolorosa; punzadas bajo la lengua, hácia ade-

Digitized by Google

lante, al moverla; lengua seca; úlceras pequeñas en la lengua.

Garganta.—Picazon, apretamiento, ronquera en la garganta, que está como quemada.—Hinchazon del paladar.—Dolor al tragar, así como al mascar los alimentos sólidos; ó bien agravados por la tarde ó por la mañana al despertar.—Acumulacion de mucosidades tenaces en pedazos espesos.

Gusto y apetito.—Gusto amargo, ácido, como de tinta, ó bien fastidioso y pastoso.—Apetito nulo por la carne, con deseo de frutas y de cosas jugosas; hambre como por indisplicencia; por la noche hambre redoblada.—*Sed*, comiendo; despues de haber comido; por la noche.—Despues de haber bebido, sufrimientos en el estómago.—La cerveza disminuye los sufrimientos del ano. Los ácidos repugnan.—*Despues de haber comido*: flatuosidades; pulsaciones en el ano; apetito venéreo excitado.

Síntomas gástricos.—*Eructos*: sin gusto; amargos; ácres; ácidos.—Náuseas durante los dolores en el ombligo.—Vómito de sangre.

Estómago.—Presion en el estómago con sensacion de calor; sensacion de plenitud, con dolor en el hipocondrio izquierdo.—En la boca del estómago: dolor al dar un falso paso; presion que atraviesa hasta el dorso.

Hipocondrios.—Hipocondrios dolorosos, con diarrea y escalofrio; hinchazon, sensacion de aflujo y apretamiento en los hipocondrios.—En el *izquierdo*: dolor, presion; sacudidas de arriba abajo; apretamientos; punzadas que se dirigen hácia arriba ó bien hácia el sacro.—En la region *hepática*: tension penosa; presion; dolores fuertemente presivos que alternan con dolores en el pecho; dolores durante la estacion; punzadas al respirar profundamente; punzadas que cortan la respiracion.

Vientre.—Hormigueo en el vientre y en el estómago con diarrea.—*En el vientre*: congestion de sangre; sensacion de plenitud; calor, quemazon é inflamacion.—En la region *umbilical*: latidos; sacudidas por cima de las caderas hácia las ingles, con latidos y una especie de furor, como cuando se sufre la supuracion del panadizo ó como un hervidero ú orgasmo de sangre, todas las tardes, con alivio por la progresion, y renovamiento en el reposo.—Dolor, aumentado al apretar encima; terebracion; pun-

Digitized by Google

zadas.—*Dolor de todo el vientre, que está sensible al tacto.*—*Timpanitis y movimientos dentro del vientre*, sobre todo á la izquierda, á lo largo del cólon, que se aumenta despues de comer; **movimientos*, borborigmos, cloqueo, ruido sordo, zurrido y toda clase de ruidos en el vientre.—*Emision abundante de ventosidades*, despues de cada comida, así como por la tarde y la mañana; emision de ventosidades quemantes, ó de un olor repugnante, con alivio.—*Retortijones*: como despues de un resfriamiento; con necesidad de plegarse sobre sí mismo ó de acostarse; inmediatamente despues de haber comido; antes de ir al sillico; *con mal humor y repugnancia de salir al aire libre, que alivia sin embargo.*—Dolor de los tegumentos del vientre: al enderezarse; al esforzarse sobre el sillico; y al tacto.—Dolores en las ingles, partiendo de las caderas.—En la region *pelviana*; afluencia de sangre; pesadez; plenitud; *presion hácia abajo;* sensacion como de una clavija entre el púbis y el coxis.

Ano y defecacion.—*Evacuaciones alvinas*: de color amarillo de oro; grises; calientes; de un olor específico; con materias no digeridas; **cámaras liquidas mezcladas con sangre*; cámaras en forma de papilla.—**Diarreas*: acuosas, con cólicos, frio, dolores en los hipocondrios y la espalda; diarrea por la mañana; sensacion contínua como de necesidad de deponer; gana apremiante; tenesmo; salida desapercibida de los excrementos; *cámara involuntaria durante la emision de flatos*, gana de defecar, al orinar.—Deposicion dura, insuficiente, muy luego despues de comer, durante la estacion.—*Al defecar*: flatuosidades; pellizcos y retortijones; dolores en el recto y en la espalda.—*Antes* de defecar: pellizcos en el vientre; dolor alrededor del ombligo; borborigmos, picotazos.—*Despues* de defecar por la *mañana*: dolor de vientre; emision de ventosidades; nueva gana; dolores en el ano.—*Durante* la defecacion, hambre.—En el *recto*: pesadez, calor, *picazon, *sensacion de flujo; dolores incisivos; *quemazon.—En el *ano*: *ardor*, *prurito*, hormiguco, pulsacion; dolor como de una grieta. **Tumores hemorroidales en forma de racimo*, saliendo muy dolorosos, excoriados, sensibles, picantes y quemantes; alivio de los sufrimientos por la aplicacion del agua fria.—Mucosidades y sangre con las deposiciones.

Digitized by Google

Orinas.—Necesidad frecuente de orinar; necesidad apremiante.—Orinas mas frecuentes y abundantes, sobre todo por la noche.—Orinas: amarillas de azafran; oscuras; que se enturbian; acuosas y abundantes.

Partes viriles.—Prurito en el prepucio; sudor fétido de las partes; excoriacion en el perineo al andar.—Testículos frios, pene contraido, epidídimo sensible.—Aumento del apetito venéreo, por la mañana al despertar, así como por la tarde ó despues de comer.—Erecciones por la mañana, así como despues de orinar.—Poluciones en la siesta, así como por la noche hácia la madrugada.—Despues de las poluciones aumento del apetito venéreo: ganas de orinar; necesidad de ir al sillico; sueño agitado.

Partes de la mujer.—Ménstruos: demasiado anticipados; demasiado abundantes.—*Durante las reglas*: dolor de cabeza, que se alivia por la aplicacion de agua fria: dolor de oidos; dolor de riñones; presion en el recto.—Sensacion de plenitud en la pélvis; leucorrea.—En la region del *útero*: pesadez, presion, dolores como de parto: distensiones hasta en los muslos.

Lengua y tos.—Voz apagada.—Tos y picazon en la garganta.—Expectoracion de sangre.

Pecho y respiracion.—*Respiracion fatigosa por punzadas en el costado izquierdo del pecho.*—Congestion de sangre en el pecho.—Presion detrás del esternon.—Dolor de quebrantamiento en la parte anterior del pecho.—En la region del *corazon*: dolor hasta por bajo del omóplato: fuerte latido en el corazon.

Tronco.—Dolores en los riñones: tractivos, mas fuertes por la tarde, que se extienden al través de la pélvis, con mal humor; durante las reglas con evacuacion de sangre por el ano; pesadez en el sacro, que fatiga el recto. aumentada en la posicion sentada y que el movimiento alivia; pesadez por la mañana al despertar con laxitud: punzadas á través del sacro hasta los riñones; en el coxis dolor como por consecuencia de una caida; chasquido en el coxis.—Dolor en el *dorso* agravado por el decúbito supino; punzadas por cima del omóplato.—En el *cuello*, á la derecha, tirantez, extension; ardor.

Miembros torácicos.—En el *hombro*: presion de dentro afuera, punzadas; chasquido en la articulacion.—En el *brazo derecho*: pesadez; estiramiento; presion en el ante-

Digitized by Google

brazo hasta la articulacion carpiana.—En el *antebrazo* izquierdo y la mano, entorpecimiento.—Sensacion como si hubiese un cabello en el dorso de la *mano* y de los dedos; manos como heladas; *manos frias* con piés calientes.—En los dedos, distension en los huesos del metacarpo del tercero al cuarto dedo; dolor y luxacion en la articulacion del pulgar; dolor en las primeras articulaciones de los dedos; punzadas en las articulaciones de los dedos.

Miembros pelvianos.—En los *miembros inferiores*: laxitud; fácil entorpecimiento.—En los *muslos*: pesadez, dislaceracion; presion; tirantez.—En las *pantorrillas*, fatiga.—En el *tendon de Aquiles*, dolor violento, sobre todo por la tarde.—En los piés, articulacion como luxada; distension en un sitio del tarso, por bajo del pié; la planta del pié dolorosa durante el reposo, así como al andar; *piés frios*, despues de la comida, por la tarde y por la noche.—Los *dedos* como helados; el grueso doloroso por la noche, en términos que interrumpe el sueño, con frio.

7.—ALUMINA.

ALUM.—Arcilla.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: mas de 40 dias en algunos casos.

ANTÍDOTOS.—Bry. camph. cham. ipec.

COMPÁRESE CON: Ars. bar. bel. calc. *cham. ign. ipec. lach.* led. magn. merc. n-vom. *phos. plumb.* rhus. sil. sulf.—Este medicamento conviene en algunos casos, sobre todo despues de *Bry. lach.* y *sulf.*, al paso que despues de *alúmina*, la *bryonia* es muchas veces de grande utilidad cuando está indicada.

CLINICA.—Estando indicado por el *conjunto de síntomas* este medicamento podrá algunas veces ser útil en uno ú otro caso de las afeccienes siguientes:—Debilidad intelectual; Cefalalgia congestiva y cefalalgia nerviosa ó histérica con vómitos; Estrabismo?; Otorrea; *Ocena;* Odontalgia de las embarazadas; ulceracion de las encías, Anginas agudas; Dolores hepáticos?; Cólico saturnino; Estreñimiento de las embarazadas y de los niños en la lactancia; Derrame de líquido prostático; *Leucorrea*; Coriza crónico; Padecimientos por contrariedades; Ragadas; Panadizos; *Herpes* húmedos y corrosivos; Afecciones mercuriales, etc.

Véase la nota, pág. 17.

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—Dolores tirantes en los miembros.—*Sensacion de constriccion en muchos órganos.*—Agravacion de los padecimientos por el alimento de patatas, y muchas veces cada dos dias.—*Muchos padecimientos se manifiestan despues de comer* y duran hasta la tarde, ó desaparecen, ó son reemplazados por otros que empiezan entonces.—Los padecimientos que han aparecido por la mañana ó la tarde, se mejoran despues de la comida.—°Padecimientos por contrariedad.—*Temblor y *movimientos convulsivos de los miembros*, y aun de la cabeza.—Espasmos, con lloros y risas alternativamente.—Exaltacion de todo el sistema nervioso.—Temblor de todo el cuerpo, con deseo de acostarse, lo que sin embargo aumenta la fatiga.—*Gran fatiga general*, aun despues de un pequeño paseo á pié, pero principalmente *despues de haber hablado.*—°Pandiculaciones frecuentes, estando sentado.—°Falta de calor vital.

Piel.—Erupcion miliar en los brazos y en las piernas, con mucho prurito, la que da una sangre serosa, despues de haberse rascado.—La menor lesion de la piel escuece y se inflama.—°Tuberosidades leprosas.—°Costras y herpes exudantes, ¯ó pruritosas, principalmente por la tarde.—Renovacion de los síntomas cutáneos á cada novilunio ó plenilunio.—*Ragadas.

Sueño.—*Sueño pesado é ¯*insomnio antes de media noche.*—**Sueño nocturno*, *muy ligero*, *agitado*, con sobresaltos frecuentes.—*Sueño atolondrante, *no reparador*, con ganas de dormir mas por la mañana.—Despierta muchas veces por la noche.—**Sueños frecuentes*, ¯*angustiosos*, con palabras, risas, lloros, lamentos, gemidos y somnambulismo.—Sueños de caballos, de querellas y de vejaciones, de incendios, de bodas, de espectros, *de muertos*, *de ladrones.*—Sueño con miedo de la muerte, despues de despertar.—Pesadilla.—*Por la noche ansiedad*, agitacion; ó calor, odontalgia, dolor de cabeza, espasmos y opresion de pecho, ó diarrea con dolor en el estómago y calofrios.—Despues de dormir, por la mañana al despertar, la moral abatida por ideas tristes, ó náuseas con disgusto en el estómago y movimientos febriles.

Fiebre.—*Despeluzamiento aun cuando se esté junto á una chimenea*, y por la noche hasta el punto de no poderse calentar.—*Fiebre por la tarde con predominio de frio.*—

Digitized by Google

*Aparicion del frio inmediatamente despues de haber comido la sopa al medio dia.

Moral.—*Humor desazonado, ¯triste, sin esperanza alguna de curacion.—Lloros involuntarios.—**Angustia* y *ansiedad*, como si estuviera amenazado de algun accidente penoso, ó que hubiese cometido algun crímen.—*Aprensiones.—Disposicion á asustarse.—Aire triste y moroso.—Mal humor, con *inaptitud para el trabajo; disposicion á irritarse.—Obstinacion y humor contrariante.—De todo se ofende.—Humor inconstante, unas veces colérico, otras tímido.—*Debilidad de la memoria.*—Distraccion, inadvertencia é **imposibilidad de seguir una idea.*—*Ausencia de ideas.—Se equivoca siempre que habla.—Grande vivacidad de ingenio, alternando con inadvertencia é insensibilidad de la vista y del oido.—Sensacion como si no tuviera conciencia de sí mismo.

Cabeza.—*Vértigos rotatorios*, frecuentemente hasta el punto de hacer caer, algunas veces con náuseas ó tension en la nuca.—Estado de embriaguez despues de haber fumado ó tomado la mas débil bebida espirituosa, principalmente por la mañana.—**Dolor de cabeza*, como si se tirara de los cabellos, ó punzadas vivas en el cerebro, **con ganas de vomitar*.—Pesadez de la cabeza, con palidez de la cara y fatiga.—*Cefalalgia compresiva*.—Latidos y pulsaciones en la cabeza.—°Congestion de sangre en los ojos y en la nariz, con *presion en la frente y epistaxis.—El padecimiento de la cabeza aumenta durante el paseo al aire libre.—Cuando apoya suavemente la cabeza, estando acostado, el dolor se mejora.—*Prurito en la frente.—Dolor de excoriacion en la piel del cráneo.—°Costras húmedas en las sienes.—Sequedad de los cabellos.—Prurito en la piel del cráneo, la que se descama mucho.

Ojos.—*Presion en los ojos* con imposibilidad de elevarlos.—*Presion como por un grano de arena en el ángulo del ojo, por la tarde.—Sensacion de *quemazon en los ojos*, *con ¯aglutinacion nocturna de los párpados*, *y lagrimeo por el dia*.—°Sensacion de frio en los ojos paseando al aire libre.—Parálisis del párpado superior.—(Orzuelo).—Caida de las cejas.—Traccion espasmódica de los párpados por la noche, con dolores en los ojos abriéndolos.—Fotofobia.—Turbacion de la vista como con un velo, y

Digitized by Google

brillo delante de los ojos.—Aspecto amarillo de todos los objetos.—Reflejo encarnado alrededor de la bujía al principio de la noche.—Estrabismo en ambos ojos.—Claridad delante de los ojos cerrándolos.

Oidos.—*Punzadas en los oidos*, principalmente por la tarde ó por la noche.—Prurito y sensacion de ardor en los oidos.—Calor y rubicundez de un solo oido, muchas veces por la tarde.—Otorrea purulenta.—Crepitacion y *zumbido, principalmente masticando y deglutiendo.

Nariz.—Dolor en la raiz de la nariz y en la frente.—*Sensacion de dolor, tumefaccion y *rubicundez de la nariz.*—Corrosion y costras en la nariz.—°Salida de mocos sólidos, amarillos, verdes.—*Acumulacion y *flujo de una materia espesa y amarilla por la nariz.*—*Ventanillas nasales ulceradas.—Obturacion de la nariz.—Forúnculo en la nariz.—Moco sanguinolento y **epistaxis*.—Olor ágrio en la nariz.—Olfato excesivamente fino ó *debilitado.—Coriza fluente de una de las ventanas de la nariz con obturacion de la otra.—Coriza alternativamente seco y fluente.—*Obturacion de la nariz.

Cara.—Aire sombrío, moroso.—Alternan con rapidez la rubicundez y la **palidez de la cara*.—Rubicundez cobriza de las mejillas como en los borrachos.—Hormigueo en la cara, y tension como si estuviera cubierta de clara de huevo seca.—*Sensacion de hinchazon y de *pesadez en la cara.—Mancha roja, dolorida en la mejilla.—Aspereza de la piel de la cara, y sobre todo en la frente.—Prurito y erupcion de botoncitos en la cara.—°Costras exudantes en las sienes.—*Tirantez lancinante en las mejillas.—Calor pasajero de la cara.—Forúnculos en las mejillas.—°Tuberosidades leprosas en la cara.—Labios secos y hendidos con exfoliacion de la piel.—Hinchazon de los labios.—Granos y erupciones costrosas en los labios.—Hinchazon de las mandíbulas, con dolor tensivo abriendo la boca y masticando.—Contraccion de la mandíbula inferior.

Dientes.—*Dolores en los dientes masticando*, ó por la tarde en la cama.—Dislaceracion en los dientes hasta en el hueso cigomático, la frente y sienes.—Dolor terebrante en los dientes cariados.—Ulceracion en la raiz de los dientes.—Ulceras en las encías.—Hinchazon, y facilidad de las encías á dar sangre.—Sensacion de prolongacion

Digitized by Google

en los dientes.—Odontalgia con irritacion nerviosa, como despues de un enfriamiento ó del uso de la manzanilla.

Boca.—Dolor de excoriacion en la boca, paladar, la lengua y en las encías, que casi impide comer.—Ulceritas en la boca.—*Sequedad de la boca, principalmente al despertar.—*Acumulacion de una saliva dulce ó ágria en la boca*, como una verdadera salivacion. Olor pútrido de la boca.—Lengua cubierta de una capa blanca ó amarilla.—Expectoracion de mucosidades sanguinolentas.

Garganta.—Afeccion de la garganta, que se agrava por la tarde y la noche, y que se mejora en tomando alguna cosa caliente, así como por la mañanita.—**Dolores contractivos* ó lancinantes en la garganta, *principalmente al tragar.—***Deglucion difícil, como por estrechez de la garganta.*—°Dolor de garganta, con hinchazon de las encías y del velo del paladar, acompañado de dolor de erosion en toda la boca, con imposibilidad de tragar líquidos.—Presion calambroídea y apretamiento en el esófago.—Hinchazon de las amígdalas.—Mucha sequedad en la garganta.—*Acumulacion de un moco espeso y viscoso en la garganta, con dificultad de expectorarle.

Apetito.—Gusto dulce ó de sangre en la boca.—Gusto áspero, astringente, ó amargo y soso.—**Apetito irregular, unas veces muy pronunciado, otras muy débil.—Insipidez de los alimentos,* sobre todo en la tarde, y principalmente del pan y de la *carne*.—Repugnancia á la carne.—Hambre con falta de apetito.—Bulimia.—Deseo de legumbres, de frutas y de alimentos tiernos.—Depues de comer, y principalmente por la tarde, hipo, presion en el estómago y vientre, disgusto, náuseas y laxitud.—Las patatas excitan náuseas y eructos amargos.

Estómago.—**Eructos ágrios*, ácres y *pirosis*.—°Disposicion crónica á eructar.—*Eructos frecuentes.—***Náuseas frecuentes* y gana de vomitar, principalmente hablando, entrando en la habitacion despues de haberse paseado y por la mañana.—Presion en el estómago, con particularidad por la tarde y despues de haber comido.—*Contraccion y constriccion en la region del estómago*, extendiéndose con frecuencia *hasta en la garganta y el pecho*, y algunas veces con opresion de la respiracion.—*Dolor de excoriacion en la boca del estómago y los hipocondrios, principalmente volviéndose en la cama ó bajándose.

Digitized by Google

Vientre.—*Sensibilidad dolorosa del hígado encorvándose, ¯seguida algunas veces de punzadas.—Cólicos por cualquier enfriamiento.—*Cólicos con desfallecimiento*, principalmente por la tarde, ó por la noche, ó despues de comer.—**Retortijones*, principalmente por la mañana.—Cólico flatulento.—*Los cólicos se mejoran con el calor exterior.*—*Salida y encarcelacion de las hernias inguinales.

Defecacion.—*Deposiciones duras, raras y muy poco abundantes, algunas veces con dolores en el ano.—*Estreñimiento y compresion del vientre.—**Deposiciones difíciles por inactividad de los intestinos.*—Salida de muchas *materias viscosas con las fecales* durante los cólicos.—Deposiciones diarréicas mucosas con dolor de vientre y tenesmo.—Evacuacion de sangre durante y despues de deponer.—Ardor y **prurito en el ano.*—Hemorróides.—Presion y latidos en el periné.

Orinas.—*Dolores en los riñones*, particularmente al andar y bajarse.—Sensacion de debilidad en la vejiga y en las partes genitales.—Necesidad urgente de orinar, *con evacuacion aumentada y acuosa*, acompañada algunas veces de sensacion de ardor.—Orinas menos abundantes, con sedimento rojo y arenoso.—*Miccion nocturna.—Orinas turbias, blancas, como si se echase creta.—Sedimento espeso y blanquecino.

Partes viriles.—**Apetito venéreo exaltado*, ¯ó suprimido.—*Poluciones frecuentes* y erecciones nocturnas.—Secrecion abundante en la parte posterior del glande.—Excoriacion del prepucio.—Dolor contractivo en el cordon espermático con retraccion del testículo.—Dureza y *sensibilidad dolorosa en uno de los testículos.*—°Eyaculacion de licor prostático, durante las deposiciones difíciles.—Dolores en el periné durante el cóito y las erecciones.—Aumento de los padecimientos despues de las poluciones.

Menstruacion.—**Reglas escasas*, ¯muy precoces y de muy corta duracion.—Reglas muy abundantes con timpanitis.—Durante las reglas, sueño agitado con ensueños, hervidero de sangre, calor en la cara, dolor de cabeza y palpitaciones de corazon.—*Antes* y **durante las reglas, cólicos*, dolor de cabeza y otros padecimientos.—Despues de las reglas, mucha fatiga.—**Leucorrea corrosiva*, con escozor en las partes genitales.—*Leucorrea antes ó despues de las reglas, ¯y frecuentemente con temblor, fati-

Digitized by Google

ga y cólicos.—Flores blancas sanguinolentas, acuosas y que dejan tiesa la ropa.

Laringe.—*Tos seca*, principalmente por la mañana, y seguida despues algunas veces de expectoracion. —*Tos corta, seca.—**Tos con respiracion dificil*, ó con dolor á la cabeza y á la nuca.—*Catarro de la laringe y de los bronquios, con prurito ó comezon de la garganta.—Ronquera súbita, con afonía, por la mañana y la tarde.

Pecho.—*Opresion en el pecho.—*Disnea estando sentado.—*Presion* nocturna *en el pecho.—Sensacion de constriccion en el pecho*, principalmente estando sentado y encorvado ó bajándose.—Dolor de excoriacion en el pecho y en la boca del estómago, algunas veces con tos.—*Palpitaciones y °sacudidas en el corazon.—°Dolor en el esternon al tacto.

Tronco.—**Dolor en los riñones*, durante el reposo.—*Dolor contusivo en los riñones* y dorso.—*Punzadas en la espalda* —Sensacion en la espalda como si se clavase un yerro caliente.

Brazos.—°Dolores en los brazos mientras se les tiene colgantes ó extendidos en la cama.—*Dislaceracion en los brazos desde la espalda* hasta los dedos.—Dolor de quemadura como con un yerro ardiente en los codos y dedos.—**Pesadez paralítica en los brazos.*—Hinchazon en los brazos y en los dedos.—°Herpes y costras húmedas en el antebrazo.—Descamacion farinácea de las manos.—**Grietas en las manos*, que sangran fácilmente.—Dolor corrosivo debajo de las uñas, á veces con hormigueo en los brazos.—Las uñas se rompen fácilmente cuando se las corta.—*Panadizo.

Piernas.—°Rigidez, adormecimiento é insensibilidad de las piernas por la noche.—Dislaceracion en casi todas las partes de los miembros interiores.—**Mucha pesadez* y debilidad de las piernas, °principalmente en las caderas.—Dolor tractivo en las rodillas al subir la escalera.—Tension en las pantorrillas andando, y calambres al cruzar las piernas y al apoyar los dedos gordos en el suelo. —°Dolor como de fatiga en las articulaciones de los piés, estando sentado.—Dolores en las plantas de los piés, andando.—Frio en los piés.—Prurito y rubicundez de los dedos gordos como por sabañones.—°Sensacion quemante debajo de los dedos gruesos.

Digitized by Google

8.—AMBRA GRISEA.

AMB.—Ambar gris.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas,

ANTÍDOTOS: Camph. n-vom. puls.—*Se emplea como antídoto de:* Staph. n-vom.

COMPÁRESE CON: Calc. cham. graph. lyc. *n-com.* phos. *puls.* sabad. sep. *staph.* veratr. verb.

CLINICA.—Por el *conjunto de síntomas* se verá si este medicamento debe consultarse en uno ú otro caso de las afecciones siguientes:—Melancolía; Epistaxis; Ránulas!; Dolores hepáticos?; Ictericia?; Hemorróides? Leucorrea; Padecimientos por un coriza suprimido; Coqueluche?; Tos convulsiva, sobre todo en personas delgadas; Afecciones asmáticas con especialidad en los niños, ó personas escrofulosas; Enfermedades del corazon?; Padecimientos de los viejos y de personas de una constitucion seca y fibrosa; dolores artríticos y reumáticos?; Gota, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Calambres y **estremecimiento en los músculos.—*Dolores dislacerantes* con especialidad en las *articulaciones*, y con frecuencia de un solo lado.—Fácil adormecimiento de muchas partes.—Aparecen muchos padecimientos durante el sueño, y se disminuyen despues de haberse levantado.—Otros muchos se alivian con el paseo al aire libre, ó echándose sobre el lado afecto.—Por la tarde y con el calor se agravan muchos síntomas.—*Sensacion de tirantez por todo el cuerpo.—*Dolor incisivo en las manos y piés.—*Timpanitis y pulsacion por todo el cuerpo*, con gran debilidad despues de pasear al aire libre.—Despues de haber hablado, agitacion y temblor por todo el cuerpo con insomnio.—*Fatiga, sobre todo por la mañana, en la cama y por la *noche* al despertarse.—Sensacion de adormecimiento y de torpeza en toda la superficie del cuerpo, principalmente por la mañana.

Piel.—**Prurito y sensacion de picazon* en muchas partes de la piel, como por la sarna.—*Los herpes y las erupcio-

nes sarnosas reaparecen durante el uso de este medicamento.—*Sequedad de la piel.—°Herpes quemantes.

Sueño.—*Deseo de dormir durante el dia.—Insomnio nocturno.—Sueño agitado á causa de frio en el cuerpo y de estremecimientos en los miembros.—**Sueño lleno de ensueños angustiosos y de desvarios.*—En durmiéndose, sobresaltos con espanto.

Fiebre.—Despeluzamiento, sobre todo por la mañana, con fatiga y soñolencia, mejorado por la comida.—*Calofrios febriles en diversas partes, seguidos de calor en la cara.—*Calor pasajero, á veces con ansiedad en el corazon.—*Sudor contínuo por el dia, sobre todo en el vientre y en los muslos (andando).—Sudor nocturno despues de media noche, sobre todo en el lado enfermo.

Moral—**Tristeza inconsolable.*—Ansiedad, sobre todo por la tarde.—°Timidez.—Desesperacion y *disgusto de la vida.—°Repugnancia á la risa y la conversacion.—Excitacion, agitacion, precipitacion, con particularidad durante los trabajos intelectuales.—La imaginacion se ocupa de figuras tontas é imágenes lascivas.—Falta de ideas.—Concepcion difícil de las ideas.—*Timidez en sociedad.

Cabeza.—*Accesos de vértigos*, sobre todo marchando al aire libre.—Vértigos que obligan á acostarse, con sensacion de debilidad en el estómago.—Por la mañana, cefalalgia, como despues de un desarreglo por la noche.—Sensacion de debilidad en la cabeza, con despeluzamiento al exterior.—*Dolor presivo en la cabeza*, con calor cada dos dias, ardor en los ojos y palidez de la cara.—Presion en la frente, con miedo de perder la razon.—Apretamiento presivo, con peso, principalmente en la frente y en el occipucio.—*Congestion de sangre á la cabeza*, principalmente oyendo música.—Tirantez aguda en la cabeza con úlceras en la piel del cráneo.—Dolor á la cabeza como despues de un derrengamiento.—**Sensacion de dolor en la piel del cráneo al tacto*, con *alopecia*.

Ojos.—*Presion en los ojos*, con pesadez y sensacion como si estos estuvieran hundidos, con dificultad de abrirlos por la mañana.—Cosquilleo insoportable alrededor de los ojos.—*Prurito en el párpado, como si se formase un orzuelo.—*Rubicundez inflamatoria de la esclerótica con inyeccion de los vasos.—*Turbacion de la vista,

Digitized by Google

como por un velo, y oscurecimiento delante de los ojos.

Oidos.—Tiron agudo en los oidos.—Tension en los mismos.—Hormigueo y cosquilleo en el interior de los oidos.—*Ruido sordo y zumbido en los oidos.—*Dureza de oido en un solo lado.

Nariz.—Espasmos en las alas de la nariz.—**Hemorragia nasal*, principalmente por la mañana.—Costras de sangre secas en la nariz.—Estornudo frecuente.—Sequedad y **obturacion de la nariz*, con dolor de excoriacion.—*Coriza seco.—°Supresion crónica de un romadizo.

Cara.—Rubicundez y *calor* (algunas veces pasajero) de *la cara*.—*Cara ictérica.—Temblor y movimientos convulsivos de los músculos de la cara.—Comezon hormigueante y pruritoso en la cara, con erupcion de granos en la frente y en el sitio de las patillas.—Manchas rojas sobre la mejilla.—Convulsiones en los labios.—Labios calientes.

Dientes.—**Dolores tractivos, lancinantes*, principalmente en los dientes cariados, y sobre todo al aire libre, aumentados tomando alguna cosa caliente.—Salida de sangre de los dientes y encías.—Hinchazon dolorosa de las encías.

Boca.—Por la mañana, al despertarse, sequedad y sensacion de entorpecimiento en la boca, en la lengua y labios.—Comezon y escozor en la boca.—Vesículas en la boca con dolor quemante.—Nudosidades con dolor de excoriacion debajo de la lengua.—Lengua cargada de una capa blanca ó amarilla gris.—Mal olor de la boca.

Garganta.—Sensacion como si hubiera un tapon en la garganta, con dificultad de tragar.—*Ahogamiento con presion en la garganta al pasar los alimentos.—*Corrosion °y arañamiento en la garganta.—Acumulacion de mucosidades grises en la garganta, con vomituricion y vómitos al arrojarlas.—*Por la mañana, expectoracion de mucosidades.

Apetito.—*Gusto soso ó rancio.—*Falta de apetito.—Acedía en la boca despues de haber tomado leche.—Despues de haber comido, presion en la foseta del cuello, como si estuviese un cuerpo extraño detenido.

Estómago.—*Eructos entrecortados.—*Eructos frecuentes*, y muchas veces *agrios*, ó con el gusto de lo que se ha tomado.—Hipo despues de fumar.—*Pirosis*, principal-

miente por la tarde, ó paseándose al aire libre, ó despues de haber bebido leche.—*Náuseas y vómitos.—Presion y dolor calambroídeo en el estómago.—Sensacion de ardor en el estómago y region precordial

Vientre.—**Dolores hepáticos*, generalmente presivos.—Dolor presivo en el epigastrio y en el bajo vientre.—*Pesadez en el vientre.—Tension y **timpanitis en el vientre*, principalmente despues de haber comido ó bebido.—Compresion en el vientre, algunas veces por la mañana.—Retortijones por la tarde, despues de media noche y por la mañana en la cama, con diarrea.—*Dolor como de una herida en los músculos abdominales, tosiendo y volviendo el cuerpo.—*Sensacion de frio en el vientre, algunas veces de un solo lado.—Por la tarde, estremecimientos en los músculos abdominales.—*Incarceracion de gases.—Cólico flatulento por la noche.

Deposiciones.—Constipacion y deposiciones tardías.—Deseo inútil de deponer, con ansiedad é imposibilidad de soportar la aproximacion de una persona.—**Deposiciones irregulares*, *intermitentes*, regularmente cada dos dias.—Deposiciones blandas (diarréicas) de un moreno claro.—Despues de la deposicion, presion en el bajo vientre.—Flujo de sangre con la deposicion.—*Hemorróides en el ano.—Prurito y cosquilleo en el ano y en el recto.

Orinas.—Por la mañana, despues de haberse levantado, gana urgente de orinar.—*Secrecion de orina aumentada*, principalmente por la noche y por la mañana.—Orinas de un color oscuro amarillento, y turbias con sedimento oscuro.—Nube rojiza en la orina.—Orina sanguinolenta.—*Olor ácido de la orina.—Sensacion de ardor en el orificio de la uretra.

Partes viriles.—*Viva sensacion de voluptuosidad y prurito en las partes genitales*, sin excitacion exterior.—Ardor en la region de las vesículas seminales.—Ereccion por la mañana, con adormecimiento de las partes genitales.

Menstruacion.—Reglas prematuras.—Flujo sanguíneo fuera del tiempo de la menstruacion.—Durante las reglas, hinchazon de las varices con presion en las piernas.—**Leucorrea* espesa, mucosa, precedida de punzadas en la vagina.—Salida de materias blancas, azuladas por la vagina.—La leucorrea es mas abundante por la

Digitized by Google

noche.—*Sensacion de ardor*, dolor como de excoriacion y prurito en las partes sexuales de la mujer.

Laringe.—Tos con coriza y expectoracion de un moco blanquecino y salado.—*Tos nocturna*, excitada por un vivo cosquilleo en la garganta.—Tos por la tarde, con dolores debajo de las costillas izquierdas, como si se arrancase alguna cosa.—**Tos convulsiva*, con eructos y ronquera.—*Al toser, dolor de caboza presivo en las sienes.—Voz ronca y acumulacion de muchas mucosidades espesas en las vías aéreas.

Pecho.—**Aliento corto*.—**Opresion en la respiracion*.—Aliento fétido por la mañana, despues de haber despertado.—Silbido en el pecho.—**Opresion dolorosa en el pecho* y en el dorso.—Presion en el pecho, principalmente en la region del corazon.—*Sensacion de corrosion en el pecho.—*Por la noche temblor en el pecho.—*Palpitaciones de corazon*, por lo general paseando al aire libre, con palidez de la cara y presion en el pecho, como por una masa.—Dolor contusivo, reumático en el pecho.

Tronco.—Dolores lancinantes en los riñones.—*Rigidez en los riñones despues de haber estado sentado.—Pesadez en el dorso, con dolor en el vientre, como si los intestinos estuvieran comprimidos.—Dolor presivo, tirante en la nuca y dorso.

Brazos.—**Facilidad de los brazos á adormecerse*, ya que los apoye hácia abajo, *ó que levante cualquier cosa, aun por la noche con sensacion de torpeza.—**Tirantez paralítica, como de luxacion*, en las articulaciones escapulares, en los codos, en los antebrazos y en las manos.—*Temblor de los brazos.—*Dolor esteócopo del codo al tacto.—*Calambres en las manos al coger alguna cosa.—Frio prolongado de las manos.—Contraccion de los dedos.—Por la tarde, acceso de temblor en el pulgar.—Por la mañana rigidez de la piel de la yema de los dedos.—Por la noche, debilidad de los dedos.—Herpe pruritoso entre los dedos.

Piernas.—Sensacion de torpeza en las piernas, con marcha incierta.—Pesadez, adormecimiento y laxitud de las piernas.—*Calambres en las piernas, y por la noche en las pantorrillas.—**Tiron agudo en las piernas*, desde el sacro hasta los piés, con imposibilidad de apoyar el pié en el suelo: la pierna afecta parece mas corta que la otra.

Digitized by Google

—Excoriacion en las corvas, con dolor, principalmente por la tarde.—Zumbido ó ruido en las pantorrillas y los piés.—Dolores artríticos en las articulaciones de los piés y de los dedos gruesos de estos.—*Rigidez de las articulaciones de los piés.—*Dolor de ulceracion en las plantas de los piés, andando.—*Quemazon en las plantas de los piés.—*Hinchazon de los piés.—*Punzadas en los sabañones de los dedos.—Dolor de excoriacion en los callos.

9.—AMMONIUM CARBONICUM.

AMM.—Carbonato de amoníaco.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Arn. camph. hep.

COMPÁRESE CON: *Am-mur. arn.* ars. *bell.* bry. chin. fer. graph. *hep.* kal. laur. lyc. mang. merc. n-vom. *phos.* puls. rhus. sil. sulf.

CLINICA. — Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá si este medicamento se podrá consultar en las afecciones siguientes:—Jaqueca?; Cefalalgia por congestion sanguínea; Catarro nasal; Orzuelo; Ambliopia amaurótica; Miopia; Parotitis?; Erupciones (y herpes?) en la cara; Ocena?; *Estado escorbútico de las encías*; Dispepsia; Gastralgia; Hematémesis; Dolores hepáticos; *Hemorróides*; Dolores en los testículos; Dismenorrea (esterilidad); Leucorrea; Hemoptisis; Padecimientos asmáticos; Hidrotorax; Bócio; Gota?; *Dolores por luxacion*; Convulsiones?; Tétanos? Inflamaciones locales?; Escrófulas; Raquitismo; Erupciones miliares; Escarlatina; Verrugas; Herpes farináceos; Fiebres tifoídeas?; etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores de ulceracion en diferentes partes, ó *punzadas y tiron agudo*, mejorándose con el calor de la cama.—Dolores de luxacion ó *tirantez y tension en las articulaciones, como por acortamiento de los tendones.—El lado derecho del cuerpo parece es-

tar mas afectado que el izquierdo.—La mayor parte de sufrimientos aparecen, ó por la tarde y la noche ó por la mañana.—**Por la tarde, agitacion general en el cuerpo.*—Necesidad de extender los brazos y las piernas.—Hablando mucho ú oyendo hablar, se fatiga.—Fatiga, cansancio sumo, y **excesiva debilidad de los miembros*, principalmente paseándose al aire libre, ¯ó por la tarde, y algunas veces con necesidad de acostarse.—*Repugnancia á pasear.—Convulsiones.—Inflamaciones locales.—Tétanos.—Discrasia escorbútica.—Disposicion de la sangre á descomponerse.—*Marasmo.*—Grande sensibilidad al frio y al aire libre, con mucho sufrimiento despues de pasear.

Piel.—Fuerte prurito en varios puntos, con vesículas y granos quemantes despues de haberse rascado.—*Erupciones miliares, °crónicas.—Rubicundez, sobre todo en la parte superior del cuerpo, como de escarlatina.—**Escarlatina.*—¯Efélides.—¯Sensacion de ardor, punzadas y tirones agudos en el cuerpo.—Excoriacion de la piel (entre las piernas, ano y partes genitales).—Quistes.—Infartacion de las glándulas.—Raquitismo.

Sueño.—**Soñolencia diurna.*—*Insomnio y ¯sueño pesado, sobre todo, cuando se acuesta tarde.—*Pesadilla en durmiéndose.—Despierta frecuentemente, con espanto, ¯y dificultad de volverse á dormir.—Sueño lleno de ensueños tan angustiosos como románticos, históricos y lascivos.—*Sueños de espectros, de muertos*, de gente de mal arte y de querellas.—Sueño agitado, y que no deja descansar.—*Por la noche, accesos de angustia*, vértigos, congestion de sangre á la cabeza, cefalalgia, dolor de dientes, náuseas, *gastralgia*, cólicos, deseos de orinar, expectoracion de un material viscoso, dolores en los dedos gruesos y en los tendones, sacudidas en el cuerpo, dolores en los miembros, prurito y picazon en la piel, agitacion, *hervidero de sangre*, calor seco, sudor, sobre todo, en las piernas despeluzamiento y frio.

Síntomas febriles.—**Accesos de calofrios por la tarde.*—Antes de dormirse, violentos calofrios con temblor.—*Calor febril en la cabeza, con frio en los piés.—Sudores todas las noches, y hácia la mañana.

Moral.—Tristeza con humor lloroso, *aprensiones y angustia*, que desaparecen muchas veces por la tarde.—*Inquietud por la tarde.—*Ansiedad con debilidad, ¯y pe-

sadilla nocturna.—Carácter tímido.—*Disgusto de la vida.—*Mal humor*, por la mañana y cuando hace mal tiempo.—Humor moroso y colérico.—*Carácter desobediente y difícil de conducir.—Alegría excesiva.—Inadvertencia.—*Mucha distraccion* y falta de memoria.—*Se equivoca hablando, escribiendo y calculando.—*Disminucion de las facultades intelectuales.

Cabeza.—*Vértigos, °en estando leyendo sentado, ¯ó *por la mañana*, ó por la tarde, algunas veces con *náuseas*.—**Dolores de cabeza pertinaces*.—**Cefalalgia con náuseas*.—Los padecimientos de la cabeza aparecen sobre todo por la tarde, despues del paseo al aire libre, ó por la mañana, ó despues de la comida.—Dolor de ulceracion en la cabeza, principalmente moviéndola ó apretándola.—*Como martilleo, ¯*presion y pulsacion en la cabeza*, con **sensacion como si todo quisiera salir por la frente*, ¯ó *estallase*.—Punzadas en el fondo del cerebro.—Dolor de cabeza como por gas ácido carbónico.—Sensacion como si el cerebro vacilase.—Sensacion de dolor en la piel del cráneo y los cabellos.—Prurito en la cabeza.—*Alopecia

Ojos.—**Sensacion de ardor en los ojos*, principalmente °por la tarde, ó la *mañana* con fotofobia.—°Sensacion de frio en los ojos.—Orzuelo.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—*Legaña seca en los párpados.—Inmovilidad de los ojos.—*Vista turbia con chispas delante de los ojos.—°Miopia.—°Catarata.—Diplopia.—*Puntos negros y como bandas luminosas delante de los ojos.—Lagrimeo.

Oidos.—Zumbido en los oidos, particularmente por la noche.—*Ruido confuso y tintineo en los oidos.—*Dureza del oido, con supuracion y comezon.—*Hinchazon de las glándulas del cuello ¯y de las parótidas.

Nariz.—Pesadez en la punta de la nariz, al encorvarse, como por congestion de sangre.—*Prurito y granos purulentos en la nariz.—Forúnculo en la punta de la nariz.—Hinchazon, sensacion de excoriacion y sensibilidad dolorosa de las ventanillas de la nariz.—Flujo de pus por la nariz.—Excrecion de mucosidades sanguinolentas.—**Epistaxis*, particularmente por la mañana al levantarse, ó ¯despues de la comida.—Sequedad pertinaz de la nariz.—**Coriza* pertinaz.—**Coriza seco* ¯y *obturacion de la nariz, principalmente por la noche*, con peligro de sofocacion.

Digitized by Google

Cara.—*Abotagamiento y *palidez de la cara*, con náuseas y fatiga de cuerpo y espíritu.—*Aspecto enfermizo.—Calor en la cara durante los trabajos intelectuales.—Tension y *tirones agudos, con punzadas en el lado derecho de la cara.—Tension en la piel de la cara, como si esta estuviera hinchada.—Hinchazon dura de las mejillas.—Contorsion de los rasgos de la cara.—*Erupciones en la cara °con prurito.—Forúnculos en las mejillas.—°Efélides.—Erupciones herpéticas en las mejillas, alrededor de la boca y de la barba, con descamacion de la piel.—*Labios secos, esquebrajados, quemantes* que dan sangre.—Hinchazon dolorosa de las glándulas submaxilares.

Dientes.—*Dolores en los dientes apretándolos*, ó por la tarde despues de acostarse, ó despues de un enfriamiento, ó durante las reglas: los dolores, por lo general, son *tirantes ó súbitos*, ó lancinantes, ó como de ulceracion, y generalmente se propagan hasta las mejillas y oidos.—Dolor lancinante y pertinaz en los dientes.—Cáries, prolongacion y *vacilamiento crónico de los dientes.—Tumefaccion inflamatoria, supuracion y hemorragia fácil de las encías.

Boca.—Rubicundez, inflamacion, dolor de excoriacion y *sensacion de hinchazon en el interior de la boca.*—Erupcion de vesículas en la boca y sobre la lengua.—Dificultad de hablar como por debilidad de los órganos.—Mucha sequedad en la boca, principalmente por la noche.—Acumulacion de saliva en la boca y salivacion contínua.—Mal olor en la boca, conocido por sí mismo.

Garganta.—*Afeccion de la faringe, como si hubiera un cuerpo extraño*, principalmente por la mañana y por la tarde.—*Dolor de excoriacion y arañamiento en la garganta.—Inflamacion de las amígdalas con dificultad de tragar.—Despues de haber bebido, los músculos anteriores del cuello se contraen espasmódicamente.

Apetito—Gusto de sangre en la boca.—*Gusto amargo, particularmente despues de haber comido, °ó por la mañana despues de despertar.—Gusto ácido de los alimentos, despues de haber tomado leche.—Gusto metálico de los alimentos.—**Sed contínua.*—Imposibilidad de comer sin beber.—Mucha hambre y apetito.—*Inapetencia por la mañana.—Se sacía pronto por poco que coma.—Repugnancia á la leche.—*Gusto excesivo por el azúcar.—

Digitized by Google

*Comiendo, vértigos con atolondramiento y calor en la cara.—**Despues de la comida, pirosis y con arañamiento en la garganta* y deseo de dormir.

Estomago.—*Eructos agrios ó secos, ó detenidos.—*Eructos con el gusto de los alimentos ingeridos.—*Pirosis.—*Eructos y vómitos.—*Náuseas y vómitos despues de tomar alimento*, con presion en la boca del estómago.—Hematémesis violenta.—*Presion en el estómago*, principalmente *despues de la comida, con náuseas* y sensibilidad dolorosa en la boca del estómago.—*Gastralgia.—*Dolor contractivo en la boca del estómago, extendiéndose.—Calor y sensacion de quemazon en el estómago.—°La ropa sobre el estómago es insoportable.

ientre.—Presion, dolor de excoriacion y *sensacion de ardor en la region hepática.—° Punzadas terebrantes en el hígado, por la tarde estando sentado.—*Dolor en el vientre con diarrea.—**Cólicos contractivos espasmódicos*, con náuseas y acumulacion de agua en la boca.—°Dolor de conmocion en el bajo vientre al andar.—*Ruido en el vientre.—Hinchazon elástica en la ingle, como si fuera una hernia gaseosa.—Cólico flatulento doloroso.

Defecacion.—**Estreñimiento.*—*Deposiciones difíciles.—*Deposiciones tardias, duras*, en pequeñas porciones.—Deposiciones blandas ó diarréicas, mucosas, seguidas ó precedidas de retortijones.—*Despues y *durante las deposiciones, salida de sangre por el ano.—**Hemorróides* en el ano que dan sangre, con dolores que producen escozor.—Salida de las hemorróides durante la deposicion, con muchos dolores despues.—Sensacion de ardor por la noche y **prurito en el ano.*—Excoriacion entre los músculos y el ano.

Orinas.—Deseo contínuo de orinar, aun por la noche, con evacuacion poco abundante.—Por la tarde, sobre todo, miccion frecuente y abundante.—**Miccion nocturna.*—*Miccion en la cama.—Orinas blancas, arenosas.—Orinas rojizas como de agua mezclada con sangre.—Hematuria.

Organos genitales.—Violento apetito venéreo, sin ideas lascivas ni erecciones; ó *falta de apetito venéreo y repugnancia al cóito.—*Poluciones frecuentes,* y compresion, tirantez y pesadez en los testículos.—Polucion de licor prostático despues de una deposicion difícil.

Digitized by Google

Menstruacion.—Hinchazon, prurito y sensacion de ardor en las partes genitales de la mujer.—*Excoriacion de la piel en las partes genitales y en el ano.—*Reglas muy precoces y abundantes*, de una sangre negra y ácre.—Antes y **durante las reglas, cólicos y dolores renales.—***Durante las reglas, odontalgia*, presion sobre la matriz, retortijones, tirones agudos en el dorso, en las partes genitales, *necesidad de acostarse, ¯palidez de la cara, despeluzamiento, coriza y tristeza.—Flujo seroso por la matriz.—*Leucorrea ácre, corrosiva ¯ó quemante.

Laringe.—Ronquera, voz ronca con dificultad de hablar.—Catarro con dureza de oido y sensacion de ardor en el estómago.—*Tos con ronquera.—*Tos seca*, como si hubiera un pelo en la garganta.—**Tos con opresion asmática*, particularmente por la noche en la cama.—**Tos con cosquilleo y espectoracion.—**Tos solamente por la noche* ó por el dia, °ó por la tarde antes de dormirse, ó por la mañanita sobre las tres ó las cuatro.—°Tosiendo, punzadas en los riñones, ¯en el esternon ó la boca del estómago.—**Tos con expectoracion mucosa*, *sanguinolenta*, respiracion corta y sensacion de un peso en el pecho.—Expectoracion de sangre pura por efecto de la tos.

Pecho.—*Respiracion corta ¯con sofocacion, principalmente al subir la escalera.—*Dificultad asmática de respirar* y disnea, principalmente con el calor de la habitacion, así como despues de un esfuerzo cualquiera, á veces con latidos del corazon.—Disnea nocturna.—Sensacion dolorosa de asma espasmódico, con tos corta y lenta.—**Punzadas en el pecho y en las costillas*, particularmente respirando, cantando, bajándose, andando ó por la noche, con imposibilidad de echarse sobre el lado afecto.—Pecho como fatigado.—*Congestion en el pecho.*—Sensacion de pesadez en el pecho.—°Sensacion de ardor en el pecho.—Punzadas muchas veces en el corazon.—**Palpitacion de corazon*, principalmente despues de un esfuerzo, y algunas veces con retraccion del epigastrio y debilidad en la boca del estómago.

Tronco.—°Punzadas en los tegumentos del pecho.—Miliar purpúrea, y forúnculos en el pecho.—*Dolores de riñones* y **en la nuca*, generalmente *tirantez*.—*Tension tractiva en el dorso y riñones.—°Tirones agudos desde un costado hasta la articulacion escapular.—*Hinchazon

Digitized by Google

dolorosa de las glándulas del cuello y axilares.—°Bocio.

Brazos.—**Brazos y dedos paralíticos y rígidos* por la noche, así como por la mañana y al coger cualquiera cosa.—Pesadez y debilidad paralítica de los brazos.—Tirantez aguda en las articulaciones de los brazos, de las manos y dedos, mejorada por el calor de la cama.—**Dolor de luxacion en el puño*.—Accesos de temblor en las manos.—Venas hinchadas y color azulado de las manos, despues de lavarlas en agua fria.—*Exfoliacion de la piel de las manos.—La piel de las manos se pone dura y agrietada.—Calambres en los dedos.—*Entorpecimiento de los dedos.—°Hinchazon de las manos, dejando caer los brazos.—Hinchazon de las articulaciones de los dedos.

Piernas.—Tension en las piernas como si los tendones estuvieran mas cortos.—Temblor y contraccion de las piernas.—*Mucha fatiga en las piernas.—*Dolor como de cansancio sumo* en la articulacion *coxo-femoral y los músculos*, particularmente por la mañana en la cama, mejorado por la marcha.—*Calambres en los piés, en las pantorrillas y en la tibia.—*Estremecimientos en las rodillas* y en las piernas.—*Dolor tractivo en las piernas estando sentado.—Tirantez aguda en las articulaciones de los piés, mejorada por el calor de la cama.—Dolor de ulceracion y *punzadas en los talones.—Sensacion de quemadura en los piés.—*Hinchazon de los piés.—*Sudor de los piés.—Frio y calofrios en los piés, principalmente al anochecer, al irse á la cama.—**Dolor* (de luxacion) *en el dedo grueso*, principalmente *por la noche en la cama*, moviéndole.—Por la tarde, rubicundez, calor ó hinchazon del dedo grueso, como por sabañones.

10.—AMMONIUN MURIATICUM.

AMM-MUR.—Muriato de amoníaco.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 7 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. hep. ?

COMPÁRESE CON: *Amm. arn.* ars. *bell.* bry. chin. fer. graph. *hep.* kal. laur. lyc mang. merc. n-vom. *phos.* puls. rhus. sil. sulf.

Digitized by Google

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas* se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—Melancolía; Jaqueca; Ambliopia amaurótica; Hemorróides; Dismenorrea; Tos crónica; Dolores de luxacion; Infartacion de las glándulas; Estado escorbútico de las encías; Gota?; Panadizo?, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolor de ulceracion en muchas partes del cuerpo.—Tension en las articulaciones, como por acortamiento de los tendones.—El lado derecho del cuerpo parece estar mas afectado que el izquierdo.—Los padecimientos de la cabeza y el pecho se agravan, principalmente por la mañana; los sufrimientos gástricos y abdominales despues de comer, y los dolores en los miembros, las afecciones cutáneas, así como los síntomas febriles, por la tarde y por la noche.—Hervidero de sangre con ansiedad.—**Debilidad paralítica y °fatiga*, principalmente en las extremidades inferiores, *algunas veces con aturdimiento ó con tension y tirantez en las piernas.—Caquexia escorbútica.—Disposicion de la sangre á descomponerse.—Dolores osteócopos, tirantez por la noche.—*Disiaceracion temblorosa en los miembros, sobre todo, en los dedos, y con especialidad en el pulgar.

Piel.—Prurito y comezon con necesidad de rascarse, seguidas de erupcion granulosa.—Erupcion miliar.—Erupciones vesiculosas que forman costras.—Exfoliacion de la piel en muchos sitios.

Sueño.—°Soñolencia diurna con pereza y horror al trabajo.—Por la tarde, temprano, gana de dormir.—Insomnio antes de media noche.—Despierta muy temprano.—Muchos *sueños angustiosos*, *espantosos ó lascivos*.—Por la noche retortijones, estornudos frecuentes, hormigueo en la garganta, pesadez y presion al pecho (pesadilla?), *dolor violento en los riñones, en el tronco y miembros*, frio en los piés, calor en la cabeza, calofrios y prurito en la piel.

Fiebre.—*Frio y calofrios, generalmente* hácia las 6 de *la tarde*.—Calor con sed y cara encendida, hinchada.—**Sudor nocturno*, °despues de media noche.

Digitized by Google

Moral.—*Estado angustioso* y melancolía como por miedo ó cuidados, con °*humor lloroso.*—°Humor moroso, apático, °con repugnancia á la conversacion.—Irritabilidad y disposicion á enfadarse.—Antipatía con ciertas personas.

Cabeza.—Aturdimiento y vértigos que desaparecen las mas de las veces al aire libre.—Sensacion de *plenitud en la cabeza y pesadez en la frente*, principalmente por la mañana al levantarse.—Presion en la frente, hácia la raiz de la nariz, con sensacion, como si el cerebro estuviera contundido.—Tiron agudo, semilateral en la cabeza y cara.—Congestion de sangre á la cabeza, con calor interior.—Prurito en la piel del cráneo, el que obliga á rascarse contínuamente.

Ojos.—*Sensacion de ardor en los ojos* y en sus ángulos, por la tarde al crepúsculo, ó por *la mañana* con *fotofobia.*—Palpitacion en los párpados.—Vista turbia como por una niebla.—°*Manchas y puntos ondulantes delante de los ojos,* °por el dia y al anochecer á la luz de las bujías.—Manchas amarillas delante de los ojos, mirando fijamente algun objeto.

Oidos.—Punzadas en los oidos de dentro á fuera, sobre todo al aire libre.—Estremecimiento terebrante en los oidos.—Erupcion en los oidos.—Otorrea.—°Dureza de oido.—°Tintineo y zumbido en los oidos.

Nariz.—Hinchazon y sensibilidad dolorosa en la nariz, al tacto con dolor de ulceracion y costras sanguinolentas en las ventanillas de la nariz.—°Estornudo con punzadas en la nuca y hasta en las espaldas.—Coriza con obturacion en la nariz y pérdida del olfato.—Secrecion de agua clara, corrosiva, durante el coriza.

Cara.—Tiron agudo, violento en los huesos zigomáticos.—Calor quemante de la cara.—Erupcion en la cara.—°*Ulceracion en las comisuras de los labios*, y °en el superior.—Labios lustrosos, como por grasa.—Labios secos, rígidos, hendidos, excoriados, con dolor quemante.—°Dolor tensivo en la articulacion témporo-maxilar masticando y abriendo la boca.—Hinchazon de las glándulas sub-maxilares, con dolor pulsativo.

Dientes.—Tiron agudo en los dientes.—Hinchazon de las encías, con dolor lancinante.

Boca.—Vesículas quemantes en la punta de la lengua.—

Digitized by Google

Dolor lancinante en la garganta al tragar.—Mucosidades tenaces en la garganta, principalmente por la mañana.

Apetito.—Gusto amargo en la boca, principalmente por la mañana, con eructos amargos y ansiedad.—Anorexia.—Mucha sed, sobre todo por la tarde.—Despues de la comida náuseas, secrecion de agua por la boca con horripilacion, diarrea con cólicos y dolores en los miembros, y algunas veces con palpitacion en el pecho, calor en la cara é inquietud.

Estómago.—**Eructos* muchas veces *amargos* ó en seco.—Regurgitacion de lo que se ha tomado, ó de una agua amarga y ácida.—Hipo frecuente, violento, á veces con punzadas en el pecho.—Pituitas del estómago.—Dolores tractivos ó corrosivos en el estómago, como por lombrices.—Sensacion de ardor en el estómago y en la region precordial.

Vientre.—**Punzadas en la region esplénica*, °particularmente por la mañana al despertar, con disnea que obliga á incorporarse.—Timpanitis.—Pellizcos en el vientre.—Tension é hinchazon en las ínglos.—*Tosiendo, sensacion de hinchazon y dolor de ulceracion en las ínglos.

Defecacion.—*Estreñimiento.—Deposiciones duras o frecuentes y blandas.—Diarrea con dolor de excoriacion ó de contusion en el vientre.—Deposiciones diarréicas, mucosas, verdes.—Antes de la deposicion dolor de vientre alrededor del ombligo.—*Salida de sangre con la deposicion.—*Dolor de excoriacion en el recto, °estando sentado.—Dolores en el periné andando.

Orinas.—Miccion de orina aumentada, principalmente por la noche.—Orinas encendidas, claras, sin sedimento.

Partes viriles.—Punzadas y pulsaciones en el cordon espermático.—Erecciones frecuentes.

Menstruacion.—**Reglas muy precoces y abundantes* **con malestar en los riñones y dolores* (compresivos y contractivos) en el *dorso*.—°Durante las reglas, vómitos y diarrea, tirantez en los piés, ¯ó salida de sangre con la deposicion.—Flores blancas con timpanitis, ó como clara de huevo, precedidas de pellizcos alrededor del ombligo, ó mucosas, oscuras, y cuyo flujo sale despues de orinar.

Laringe.—Ronquera con sensacion de ardor en la laringe.—**Tos violenta*, ¯principalmente por la *tarde* y por la

noche, echándose sobre el dorso.—**Tos seca* por la mañana, °con expectoracion de materias blancas y espesas.—°La tos es mas fuerte despues de la comida, así como despues de beber cosa fria y cuando se acuesta con la cabeza baja.—Tos al respirar profundamente, sobre todo estando acostado sobre el lado derecho.—En tosiendo, punzadas en el pecho y en los hipocondrios.—Expectoracion de sangre precedida de comezon en la garganta.—°Tos pertinaz que viene del fondo del pecho.

Pecho.—Estado asmático, al mover fuertemente los brazos y al bajarlos.—*Pesadez y opresion en el pecho*, con disnea, principalmente al aire libre, ó por la *noche*.—Presion y punzadas en el pecho.—Pulsacion en el pecho estando de pié.

Tronco.—Tension y dolor como de cansancio sumo en el exterior del pecho.—°Erupcion y ¯manchas rojas, quemantes y pruritosas en el pecho.—*Dolores como de sumo cansancio en los riñones, principalmente por la noche*, estando acostado, andando y bajándose.—*Rigidez dolorosa en los riñones, ¯que obliga á andar encorvado.—*Punzadas en los omóplatos, °sobre todo respirando.—*Tirones agudos á los lados del cuello y en las clavículas.—Rigidez del cuello con dolor al moverle desde la nuca hasta las espaldas.

Brazos.—Brazos pesados y rígidos, como paralizados.—Por la noche tiron agudo en los brazos como si fueran los huesos.—Tirantez en las espaldas.—Hinchazon de los puños con dolores tirantes.—Vesículas en la muñeca formando costras.—Dolores de luxacion en las muñecas.—Tiron estremeciente, ó punzadas, latidos, hormigueo, y *dolor de ulceracion en la yema de los dedos*.—Exfoliacion de la piel entre los dedos.

Piernas.—Tension en las caderas y en las corvas,—°Punzadas, dolor de luxacion y *tirantez en la cadera.—*Acortamiento de los tendones de las corvas y rigidez de la articulacion de la rodilla.—Por la noche, tiron agudo en las piernas como si fueran los huesos.—Dolor lancinante en las pantorrillas despues de haber andado largo tiempo.—*Piernas como muertas ó insensibles.—*Dolor de ulceracion y tirantez en los talones.—**Frio en los piés*.—Sudor fétido en los piés.—Tiron, estremecimiento, punzadas, latidos y hormigueo en la yema de los dedos.

Digitized by Google

11.—ANACARDIUM ORIENTALE.

ANAC.—Haba de Malac.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 30 dias en algunas enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS: Camph. n.-jugl?.
COMPÁRESE CON: Acon. ars. *calc.* oleand.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—*Enajenacion mental* y manías que conducen hasta el furor; Melancolía; Imbecilidad?; Histerismo é Hipocondria?; Cefalalgia por trabajos intelectuales muy penosos; Ambliopia; Dureza de oido; Otorrea; *Dispepsia*; Hemorróides; Coriza crónico; Debilidad nerviosa y física?; Coqueluche?; Padecimientos asmáticos?; Parálisis?; Consecuencias funestas por el abuso del cóito?; Padecimientos por miedo? etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores presivos en muchos sitios como por una clavija ó un tapon.—Los padecimientos aparecen con frecuencia periódicamente.—La mayor parte de los padecimientos desaparecen durante la comida, pero poco tiempo despues se renuevan y aparecen otros muchos.—El menor movimiento fatiga demasiado.—Excesiva fatiga, **temblor y debilidad extrema en los miembros, y principalmente en las rodillas* aumentando hasta la parálisis.—Mucha laxitud al marchar, y en subiendo una escalera.—**Disposicion á resfriarse fácilmente*, y grande sensibilidad al frio y á corrientes de aire.

Piel.—Prurito quemante aumentado rascándose.—Poca disposicion de la piel á ser excitada por los irritantes.—Dolor como de un absceso en las partes enfermas.

Sueño.—Soñolencia comatosa de dia y noche.—Deseo de dormir muy temprano, con sueño nocturno agitado.—*Sueño tardío.—**Sueños ansiosos*, desagradables ú horribles, con gritos, sueños vivos con meditacion y actividad del espíritu seguidos de dolor de contusion en la ca-

beza, despues de despertar.—Sueños de proyectos, de fuego, de enfermedades, de muertos y de peligros.—Por la noche, odontalgias, dolores en los miembros y en los huesos, diarrea, calambres en las pantorrillas y temblor de la boca y de los dedos durante el sueño.

Fiebre.—*Mucha disposicion á *despeluzamiento*, y °calofrios contínuos aun con el calor de la habitacion.—Frio y temblor con tirantez de la cabeza, mal humor y agitacion cada dos dias.—Frio interior con calor exterior.—*Calor en la cara* todos los dias despues de medio dia, sobre las cuatro de la tarde, con náuseas y fatiga.—*Sudor de dia estando sentado.—*Sudor nocturno*.

Moral.—**Tristeza hipocondriaca* é ideas melancólicas.—°*Antropofobia*.*—*Ansiedad*, aprensiones y miedo de una muerte próxima.—Miedo y desconfianza del porvenir con *desaliento y desesperacion.—Disposicion á incomodarse por todo, á contradecir y á *encolerizarse*.—Modales torpes, necios.—Disposicion á reirse de las cosas sérias, y estar sério cuando otros se rien.—°Estado como si tuviera dos voluntades, rechazando con la una lo que exige con la otra.—°Falta de sentimiento moral (maldad, impiedad, dureza de corazon, crueldad).—*Deseo irresistible de blasfemar y jurar.—°Sensacion como si el espíritu estuviera separado del cuerpo.—*Debilidad de espíritu y de la memoria*.—Ausencia de ideas.

Cabeza.—°Cabeza entorpecida.—Aturdimientos.—Vértigos al andar, como si todos los objetos estuviesen muy distantes ó vacilasen.—Vértigos rotatorios con oscurecimiento de la vista al bajarse.—*Dolor de cabeza hácia el occipucio por el ruido, y á cada (en falso) paso.—Cefalalgia con aturdimiento y vértigos, agravada por el movimiento.—*Afeccion de cabeza por un trabajo intelectual*, con dolor de contusion en el cerebro ó presion tractiva en la frente.—**Dolores presivos principalmente en las sienes*,—Dolores constrictivos en la cabeza.—Tirantez en la cabeza, principalmente del lado derecho, y muchas veces hasta la cara y cuello seguida de zumbido de oidos.—Por la tarde, sensacion como de escarbamiento en la cabeza, desapareciendo al dormirse.—Comezon en la piel del cráneo.

Ojos.—Presion dolorosa sobre los ojos.—Fotofobia.—Contraccion de las pupilas.—**Debilidad y turbacion de la vista*,

Digitized by Google

—Miopia.—°Hilitos y manchas negras delante de los ojos.—Auréola alrededor de la luz de la bujía, al principio de la noche.

Oidos.—Otalgia lancinante y tirante.—Presion dolorosa en los oidos.—*Dolor de ulceracion en los oidos*, principalmente apretando los dientes y deglutiendo.—*Flujo (oscuro) por los oidos.—*Comezon en los oidos.—**Dureza de oidos*.—*Zumbido y ruido en los oidos.—*Hinchazon dolorosa de los oidos.

Nariz.—*Epistaxis.—*Anosmia.—Olor contínuo á la nariz, como de excremento de pichon ó yesca quemada.—*Obturacion de la nariz, con sensacion de sequedad en las ventanillas.—*Coriza y flujo mucoso de la nariz, crónicos.—Coriza violento con fiebre catarral, tension en las pantorrillas y en las piernas, y agitacion en el corazon.

Cara.—*Cara pálida, enfermiza*, con ojos profundos, cóncavos y secos.—Presion sobre los pómulos.—Manchas excoriadas, herpéticas y farináceas, alrededor de la boca y en las mejillas, con comezon hormigueante.—Sensacion de ardor alrededor de la barba.

Dientes.—Odontalgia tirante, estremecimiento, principalmente introduciendo algo caliente en la boca.—Dolores tensivos, calambroídeos, desde los dientes hasta los oidos, frecuentemente por la noche, sobre las diez.—Hinchazon y facilidad de las encías á dar sangre.

Boca.—**Mal olor de la boca*, sin percibirlo él mismo.—Pesadez é hinchazon de la lengua con dificultad de hablar.—Lengua blanca, áspera.—*Acumulacion de agua en la boca.—Sequedad en la boca y la garganta.

Apetito.—Gusto soso de todos los alimentos.—Gusto amargo con sequedad de la boca y de la garganta.—°Gusto fétido de la boca.—Sed violenta, contínua, con ahogamiento en bebiendo.—Falta de apetito.—**Debilidad de la digestion*.—*Despues de comer, humor hipocondriaco*, calor de la cara, *presion y tension en la region precordial, en el estómago* y vientre; deseo de vomitar ó de deponer; repugnancia para el trabajo; *grande fatiga* y *deseo de dormir*.

Estómago.—Por la tarde, pituitas del estómago, y vómitos seguidos de acedías en la boca.—**Náuseas por la mañana*.—*Presion en el estómago*, principalmente despues de comer, así como meditando y trabajando mentalmente.—

Digitized by Google

Por la mañana, al despertarse, presion en la region precordial.—*Punzadas en la boca del estómago*, principalmente respirando.—Cloqueo y fermentacion en la boca del estómago.—Despues de la comida, conmocion en la region precordial á cada paso.

Vientre.—*Presion del hígado.—Cólicos en la region umbilical, lo mas generalmente presivos, ó lancinantes, obtusos, agravados por la respiracion, la tos y la presion exterior.—*Dureza de vientre.—Cólico flatulento con pinchazos y *borborigmos en el vientre*, y gana de deponer.

Defecacion.—*Deseo inútil de deponer.—Excrecion dif* , *aun de deposicianes blandas*, á causa de la inercia del recto.—Deposiciones de un color pálido.—°Salida de sangre con la deposicion.—°Hemorróides dolorosas en el ano.—*Prurito en el ano.—°Resudacion del recto.

Orinas.—Evacuacion frecuente de una orina clara, acuosa.—Miccion nocturna.—°Durante y despues de la evacuacion de la orina, sensacion de ardor en el glande.—Orinas turbias, color de arcilla.

Partes viriles.—°Erecciones (sin causa) por el dia.—Poluciones.—Prurito voluptuoso en el escroto.—Apetito venéreo exaltado, ó inexcitable.—Falta de placer en el cóito.—*Poluciones de licor prostático* durante las deposiciones, y despues de haber orinado.

Menstruacion.—°Leucorreas, con prurito y excoriacion de las partes.

Laringe.—Ronquera y sensacion de excoriacion en la garganta, principalmente despues de la comida.—Tos, con cosquilleo en la garganta y sofocacion.—Tos despues de la comida, con vómitos de lo que se ha tomado, ó por la noche, en la cama, con congestion de sangre á la cabeza.—*Tos fatigosa*, como la coqueluche, principalmente por la *noche*, ó hablando con exceso.—*Tos (corta) con expectoracion purulenta.—Expectoracion de sangre con la tos.—En tosiendo, punzadas en la cabeza.—Despues de un acceso de tos, bostezos.

Pecho.—*Inspiracion corta* y *respiracion asmática.—Opresion de pecho*, con calor interior y angustia, que obliga á buscar el aire libre.—*Presion* y sensacion de excoriacion en el pecho.—*Punzadas en la region del corazon.*—°Estertor en la tráquea-arteria, estando echado sobre el lado izquierdo.—Inquietud en el corazon.

Digitized by Google

Tronco.—*Dolores en el dorso y entre los omóplatos*; pero la mayor parte *tractivos y lancinantes*, ó presivos.—Hormigueo entre los omóplatos.—Presion sobre las espaldas, como por un peso.—Rigidez de la nuca.

Brazos.—*Debilidad y dolor tensivo en los brazos.—*Temblor de la mano y del brazo.—Dolores presivos en los músculos y los huesos de los brazos, con fatiga.—Punzadas y pesadez en el antebrazo.—Dolores calambroídeos en los huesos y las articulaciones de las manos y de los dedos.—Sensacion de sequedad en las manos y dedos.—Sudor viscoso en la palma de las manos.—Torpeza de los dedos.

Piernas.—Rigidez de las piernas, como si estuvieran envueltas, con agitacion en su interior.—Temblor, *tirantez y estremecimientos en las rodillas* y en los muslos, como despues de haber fatigado las piernas andando mucho.—Presion igual en los muslos.—Sensacion de parálisis en las rodillas.—Erupcion pruritosa alrededor de las rodillas hasta las pantorrillas.—Estremecimiento y *presion calambroidea en las pantorrillas* y en las piernas.—Dolor tensivo en las pantorrillas, por el dia, andando, y por la noche, en la cama, con insomnio.—*Sensacion de ardor en la planta de los piés, y en las piernas.—*Frio en los piés andando*, particularmente por la mañana.

12.—ANGUSTURA.

ANG.—Angustura verdadera (corteza de Bonplandia trifoliata).—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 4 dias algunas veces.

ANTÍDOTOS: Coff.

COMPÁRESE CON: Canth. coff. bruc. carb-an. plat.

Advertencia.—Los síntomas colocados entre dos paréntesis son mirados por algunos como pertenecientes á la *falsa Angustura.*

SINTOMAS GENERALES.—Sensacion de debilidad y rigidez en todo el cuerpo.—*Rigidez y extension de los miembros.*—Tension en los músculos andando.—Parálisis en diferentes partes.—*Temblores convulsivos.—Accesos de tétanos*, provocados generalmente por el tacto, bebiendo y por el ruido.—*Convulsiones*, que terminan por ponerse

Digitized by Google

azules las mejillas y los labios, respiracion difícil y fatigosa, gemido y oclusion de los párpados.—Conmocion del tronco (como por sacudidas eléctricas).—Accesos (histérico?) con deseos de vomitar, sensacion espasmódica en el estómago y en el pecho, vértigo y sensacion de hinchazon en la matriz.—Chasquido en las articulaciones.—°Cáries y úlceras dolorosas que atacan á los huesos, perforándolos hasta la médula.—*Dolores en muchos sitios como causados por golpes.*

Sueño.—Por la tarde, mucho deseo de dormir, seguido de insomnio hasta media noche.—Sueño agitado, con desvaríos frecuentes.—Al anochecer, en la cama, sensacion angustiosa, como si todo el lado izquierdo estuviera dormido.

Fiebre.—°Horripilacion en la parte afecta.—Por la tarde y la noche, calor con embarazo y dolor en la cabeza.

Moral.—Carácter miedoso y disposicion á asustarse.—Pusilanimidad y *desconfianza de sí mismo.*—*Mal humor y disgusto* con grande susceptibilidad á las ofensas.—*Excitacion extremada y alegría exaltada.*—Distraccion y delirios.—Vivacidad de espíritu, principalmente despues de medio dia.

Cabeza.—Cabeza turbada y atontada, como despues de la embriaguez.—Vértigos al aire libre, ó pasando por una corriente de agua.—Vértigos como si el cuerpo estuviera echado hácia atrás.—La cabeza está tirada hácia atrás, con bostezos que alivian.—Despues del dolor de cabeza, el cuello parece estar hinchado.—Al andar, la cabeza está frecuentemente echada de lado.—Por la tarde *dolor de cabeza presivo*, con calor á la cara.—Dolor contusivo en el cerebro.—*Dolores calambroideos en la cabeza.*—Terebracion en las sienes.—Los dolores de cabeza aparecen generalmente en el crepúsculo, y duran hasta que se duerme.—Sensacion de torpeza en los músculos temporales, con tension al abrir la boca.

Ojos.—*Tension y presion en los ojos*, como por una luz muy viva.—Sensacion de sequedad y dolor de excoriacion en los párpados.—Rubicundez, calor y *ardor en los ojos*, con aglutinacion nocturna de los párpados.—(Separacion espasmódica de los párpados.—Ojos fijos, prominentes, inmóviles).—Vista turbia como por una niebla, ó como si la córnea estuviera empañada.—Miopia.

Oidos.—*Dolor calambroideo* en los oidos.—Estremecimiento tirante delante y dentro de los oidos.—Sensacion como si hubiera alguna cosa delante y dentro de los oidos.—Calor en los oidos.—Disminucion de la audicion.

Cara.—(Calor y rubicundez azulada de la cara).—Tension de los músculos faciales.—*Dolores calambroideos en los pómulos y maseteros.—Trismus*, con labios fuertemente separados y enseñando los dientes.—(Despues de los espasmos, la cara y labios quedan azulados por algun tiempo).—Exóstosis en la mandíbula inferior.

Dientes. — Odontalgia tractiva.—Latidos en los dientes cariados.

Boca.—Sequedad de la boca y labios.—(Por la tarde) mucosidades viscosas, sosas y pútridas en la boca, con deseo contínuo de beber. — Lengua blanca y como áspera. —Sensacion de quemadura en la lengua. — Secrecion abundante de saliva.

Apetito.—*Gusto amargo*, principalmente despues de comer y fumar.—Sed de bebidas frias, ó sensacion de sed sin deseo de beber.—**Disgusto de los alimentos*, principalmente *de los sólidos*, con *deseo irresistible de tomar café*, ó con un hambre insaciable.—*Repugnancia al tocino. —Despues de haber comido, eructos abortados, con sensacion de plenitud en el pecho.—Pérdida del apetito con deseo de diferentes cosas, que repugnan luego que se han obtenido.

Estómago.—Eructos biliosos.—Náuseas, comiendo ó paseándose al aire libre con un malestar hasta producir desvanecimientos.—Dolor de excoriacion incisivo en el estómago, particularmente al empezar á comer.—*Dolor calambroideo en la boca del estómago*.—Sensacion de vacuidad en el estómago despues de haber bebido.

Vientre.—Dolor de contusion en el vientre.—*Cólicos calambroideos.—Retortijones*, principalmente despues de tomar leche (caliente).—Dolor lancinante en el vientre.—Borborigmos y fermentacion en el vientre, como por diarrea.

Defecacion. — Deposiciones frecuentes, abundantes.—*Diarrea mucosa con retortijones.—Dolor presivo y contractivo en el ano, con hinchazon de las hemorróides.—Sensacion de ardor en el ano durante la deposicion.

Partes genitales. — Descenso de la matriz con punzadas

Digitized by Google

por la mañana al levantarse.—Sensacion como si la matriz se hinchara ó se volviera hácia atrás.—Derrame de un líquido lechoso por la vagina.—*Parece tener una fuerte accion sobre el sistema uterino.*—Presion en el ovario derecho.—Sensacion como si alguna cosa de forma redonda estuviera dentro de la vagina y la hiciera hincharse. —Granos pruritosos en los labios.—Prurito en las partes, con grande irritacion interior; despues de haberse rascado vierten sangre con lo que se alivian.

Orinas.—Deseo frecuente de orinar con evacuacion poco abundante, ó evacuacion frecuente de orinas abundantes, precedidas de presion sobre la vejiga y seguida de tenesmo.—Orina de color de naranja, y que no tarda en enturviarse.—Prurito violento en las partes genitales.

Laringe.—Ronquera por mucosidades en las vías aéreas. —Voz débil, tímida.—*Tos seca* con estertor y arañamiento en el pecho.—Tos violenta, profunda, con expectoracion de mucosidades amarillentas.

Pecho.—*Respiracion convulsiva* (intermitente).—*Opresion de pecho*, andando aprisa y subiendo.—*Sacudidas incisivas ó punzadas en el pecho*, y en la region del corazon.—Palpitacion violenta del corazon, estando sentado é inclinado hácia delante, ó por la noche en la cama echándose sobre el lado izquierdo.—Palpitacion de corazon con angustia.—Sensacion de contraccion dolorosa del corazon. —Calambres en el pecho con espasmos dolorosos de los músculos del pecho.—Punzadas en el pulmon derecho, con sensacion como si se volviera.

Tronco.—Dolor de contusion en los músculos del pecho, cuando se mueven los brazos.—Afeccion de los riñones, como quebrantados frecuentemente por la noche y principalmente sobre las cuatro de la mañana.—Rigidez dolorosa en la nuca y entre los omóplatos, por la mañana en la cama.—*Opistótonos.*—Prurito violento á lo largo del dorso.

Brazos.—Brazos cansados y pesados, como paralizados, con rigidez del codo.—Debilidad paralítica de los codos y de las manos.—*Tirones calambroideos* en los antebrazos, las manos y los dedos.—Frio en los dedos.

Piernas.—Dolor de luxacion ó de calambres en la articulacion coxo-femoral, en las piernas y en los piés.—Dolor de cansancio en los músculos y piernas, andando

como si estos se quebrantasen.—Tension en el sacro y en la cadera hasta la rodilla, como si estas partes estuvieran mas cortas.—Tirantez presiva en todas las partes de las extremidades inferiores.—*Apoyando el pié, dolor en la articuiacion del mismo, que obliga á saltar.——Parálisis en las articulaciones del pié.

13.—ANTIMONIUM CRUDUM.

ANT-CRUD.—Antimonio crudo.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 4 semanas, y aun más en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Hep. merc.

COMPÁRESE CON: Acon. ars. asa. cham. coff. *hep. ipec. merc.* n-vom. *puls. sep. sulf.*—Despues del antimonio es cuando conviene algunas veces, sobre todo si se hallan indicados *puls.* y *merc.*

CLINICA.—Si hemos de guiarnos por el *conjunto de síntomas*, los casos en que se puede consultar este medicamento son:—Inflamacion reumática de los músculos; Afecciones artríticas con hinchazon, y aun con nudosidades; Fungus articular; Afecciones hidrópicas?; Coma soñolento; Ulcera fistulosa: Erupciones miliares y urticarias?; Viruelas conóides?; *Fiebres intermitentes*; Melancolía negra?; Blefaroftalmía; Odontalgia; *Malas consecuencias de una indigestion*; *Anorexia crónica*; *Afecciones gástricas y biliosas*; Gastritis aguda?; *Gastralgia;* Enteritis?; Cólicos; Constipacion alternando con diarrea en los viejos; Diarrea en las mujeres paridas; Blenorrea del recto y de la vagina; Afonía; *Padecimientos asmáticos*; *Callos é induraciones callosas en los piés*; Fungus en la rodilla?, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores reumáticos é **inflamacion de los tendones*, con rubicundez y contraccion de la parte afecta.—**Tirones* ó punzadas y tension, principalmente en los miembros.—Los síntomas se agravan con el calor del sol, despues de haber bebido vino, *despues de la comida*, por la noche y por la mañana; mejoría durante el reposo y al aire fresco.—*Mucha sensibili-

dad al frio.—Pesadez de todos los miembros.—Debilidad general, sobre todo por la noche, despertándose.—**Marasmo* ó excesiva obesidad.—**Hinchazon hidrópica de todo el cuerpo.*

Piel.—Comezon, sobre todo en el cuello, pecho, dorso y miembros.—Erupciones que aparecen principalmente por la tarde, y á las que el calor de la cama produce picazon, impidiendo dormir.—**Erupciones miliares y urticarias.*—**Vejigas y ampollas* como por picaduras de insectos.—*Erupciones semejantes á las vesículas conóides*, con dolor lancinante apretando por debajo.—Pústulas con costras amarillentas ú oscuras.—Efélides.—Manchas hepáticas.—*Ulceras fistulosas.*—*Callos en los piés y excrescencias callosas.—Uñas descoloridas y deformes.—Hinchazones rojas y cálidas.—Degeneracion de la piel.

Sueño.—Mucho deseo de dormir por el dia, y **somnolencia* comatosa, principalmente por la tarde ó la mañana.—Coma con delirio.—Vigilia con espanto por la noche.—Sueños angustiosos, horribles, voluptuosos ó penosos y llenos de querellas.

Fiebre.—*Fiebres intermitentes, con *afecciones gástricas ó biliosas*, principalmente con *disgusto*, *náuseas*, *vómitos*, eructos, lengua súcia, *amargor de la boca y sed moderada*, diarrea, tension y presion en la boca del estómago con retortijones.—**Fiebre terciana.*—Sudor cálido por la mañanita, cada dos dias.—Pulso irregular, unas veces acelerado, otras lento.—°Mucho calor como si estuviera al sol.

Moral.—Reflexiones tristes sobre su suerte.—*Disgusto de la vida* con tendencia á matarse ó ahogarse.—Disposicion á asustarse.—*Humor triste, mal humor.—Las miradas y caricias son insoportables (al niño).—Deseos y amor exaltados.—Inteligencia obtusa, imbecilidad.—*Mania.*—Demencia.

Cabeza.—Atontamiento, como despues de un largo trabajo al frio.—Embriaguez.—*Vértigos con náuseas.*—Ataque de apoplejía con salivacion espumosa.—Cefalalgia despues de bañarse en agua corriente.—Cefalalgia con aturdimiento por fumar tabaco.—Sensacion como si la frente estallase.—Dolor sordo en el sincipucio y el vértice, aumentado al subir una escalera.—Dolor calambroídeo en la cabeza, mejorado por la marcha al aire

libre.—Dolor terebrante en la frente y en la sienes.—**Congestion* de la cabeza, dolorosa y seguida de epistaxis.—Dolor osteócopo en el vértice como por hinchazon del periostio.—**Comezon incómoda en la cabeza, *con alopecia.*

Ojos.—*Punzadas en los ojos.*—**Párpados rojos, inflamados.*—*Inflamacion de los ojos*, con comezon y aglutinacion nocturna de los párpados.—Ligera supuracion de la piel cerca del ángulo externo del ojo.—*Legañas en los ángulos de los ojos.*—Agrandamiento de los ojos.—Sensibilidad de los ojos á la luz del dia.—Ceguera.

Oidos.—Punzadas en los oidos.—Rubicundez, inflamacion y calor del oido.—Ruido sordo y como si escarvaran en los oidos.—*Sordera*, como si hubiese una venda sobre el oido.—*Zumbido en los oidos.*

Nariz.—Erupcion en la nariz.—**Excoriacion de la nariz* y de los conos de estas.—*Narices hendidas* y costrosas.—**Obturacion de la nariz.—Epistaxis, sobre todo por la tarde.—Sequedad de la nariz, principalmente paseándose al aire libre.—Acumulacion de mucosidades espesas, amarillentas en las fosas nasales.—Sensacion de frio en la nariz al inspirar el aire.

Cara.—**Calor de la cara, y principalmente en las mejillas con comezon.—Erupciones *de la cara*, *supurantes*, rojas, quemantes, con costras amarillentas.—Vejigas y ampollas en la cara, como por picaduras de insectos.—Erupciones granulosas, en la piel de la cara, de un color amarillo como la miel.—En la cara y en la nariz, erupciones semejantes á las viruelas conóides.—Sensacion de excoriacion en la barba.—*Fisuras dolorosas en las comisuras de los labios.*—Granulacion sobre el labio superior.—Sequedad de los labios.

Dientes.—**Dolores en los dientes cariados*, con picotazos sordos, tirones sucesivos y erosion hasta en la cabeza, renovados despues de comer, aumentados por el agua fria y aliviados al aire libre.—Odontalgia repentina al anochecer, en la cama y despues de la comida.—Rechinamiento de dientes durmiéndose estando sentado.—*Salida de sangre de los dientes* y de las encías, con vacilacion de los primeros.

Boca.—*Sequedad de la boca.*—Acumulacion de agua en la boca y sobre la lengua.—*Salivacion.*—**Lengua cargada

Digitized by Google

de una capa blanca.—Dolor de excoriacion en los bordes de la lengua.—Vesículas sobre la lengua.—Incomodidad de la garganta, como si hubiera un tapon.—Disfagia.—Sequedad y rascamiento, ó acumulacion de mucosidades viscosas en la garganta.—Saliva de un gusto salado.

Apetito.—*Gusto amargo.*—*Sed*, principalmente *por la noche.*—**Pérdida del apetito.*—Sensacion de hambre y de vacuidad en el epigastrio, sobre todo por la mañana, no apaciguándose por la comida.—Despues de comer, abatimiento, laxitud, plenitud y tension en el vientre.

Estómago.—**Eructos con gusto de los alimentos*, ¯ó bien ágrios.—Regurgitacion de un líquido acuoso.—Hipo, fumando tabaco.—*Hastío, náuseas y deseo de vomitar, como por una indigestion.—Náuseas despues de haber bebido vino.—*Vómitos de mucosidades y de bílis, ¯algunas veces acompañados de diarrea, grande ansiedad y convulsiones.—Dolor quemante y **calambroideo en la boca del estómago*, á veces con deseo de sumergirse en el agua.—°Tension y presion en la boca del estómago.—*Sensacion dolorosa como si el estómago estuviera sobrecargado de *alimentos*.—Sensibilidad dolorosa en la region del estómago al tacto.

Vientre.—*Hinchazon de vientre con sensacion de plenitud*, principalmente despues de la comida.—**Retortijones violentos*, algunas veces con falta de apetito, orina roja y deposiciones duras.—Sensacion de vacuidad en el vientre, como despues de una diarrea violenta.—Sensacion de hinchazon y dureza en la region inguinal, al tacto y á la presion.—*Acumulacion de flatuosidades en el vientre, con agrandamiento y borborigmos.*

Defecacion.—Evacuacion difícil de deposiciones duras. Deseo forzoso de deponer.—Deposiciones de consistencia de papilla.—**Diarrea con retortijones*, generalmente *acuosas.*—**Secrecion continua de mucosidades* blanco-amarillentas *por el ano.*—Efusion de sangre negra por el ano.—*Botones hemorroidales*, ciegos y fluentes, con quemazon y hormigueo.—Comezon quemante y fisuras en el ano.—Presion expansiva en el recto y en el ano.—Forúnculo quemante en el periné.

Orinas.—Deseo frecuente de orinar con emision poco abundante.—**Emision frecuente y abundante de orinas*, °*con derrame abundante de mucosidades y quemazon en la uretra*,

Digitized by Google

acompañada de dolores en los riñones.—Miccion involuntaria de orinas al toser.—Orinas acuosas ó doradas, ó de un rojo oscuro, y á veces mezcladas de pequeños corpúsculos rojos.—Dolor incisivo de la uretra, al orinar.—°Mal de piedra.

Partes viriles.—*Excitacion del apetito venéreo* y excesiva lascivia.—Poluciones.—°*Atrofia de los testículos*; dolores en los testículos.

Reglas.—Metrorragias.—Flujo ácre y corrosivo por la vagina.

Laringe.—Mucho calor en la garganta, durante el movimiento al aire libre.—Debilidad suma ó pérdida entera de la voz, principalmente calentándose.—*Sensacion de un cuerpo extraño en la laringe*, con imposibilidad de expectorarle.—Espasmo violento en la laringe, con sensacion de excoriacion.—Tos, con ardor en el pecho.—Tos por la mañana, seca y con quebrantamiento.

Pecho.—*Opresion sofocante* y ortopnea paralítica.—Respiracion profunda y suspirosa.—*Punzadas en el pecho*, durante la inspiracion y despues de respirar.—Dolor de contusion en el gran pectoral, al levantar los brazos y apretando hácia abajo.

Tronco.—Traccion calambroídea en los músculos del cuello y de la nuca.—*Dolores reumáticos en la nuca*.—Miliar en la nuca, °en los omóplatos y detrás de las orejas.

Brazos.—*Dolores reumáticos* en los brazos.—Vesículas rojizas en los brazos con quemazon.—°Inflamacion dolorosa en los tendones del codo, con mucha rubicundez y corvadura de los brazos.—°Hinchazon roja y caliente del antebrazo con tension lancinante.—Traccion en el antebrazo, los dedos y en las articulaciones de estos.—*Dolores artríticos en las articulaciones de los dedos*.—Sensibilidad dolorosa de la piel, debajo de las uñas, y desarrollo lento de estas.

Piernas.—*Tirantez de los miembros inferiores*, sobre todo en la articulacion coxo-femoral.—Vesículas con auréola roja en los glúteos y en las piernas.—°Dolores violentos en las extremidades inferiores.—°Adormecimiento de las piernas, despues de estar sentado.—Dolor lancinante en la rodilla y en la tibia.—Rigidez dolorosa de la rodilla, que no permite extender la pierna.—Vesículas en la rodilla, despues de rascarse.—Sensibilidad de la planta

Digitized by Google

de los piés al andar sobre el empedrado.—*Tumor rojo del talon*, con punzadas quemantes, que se agravan por la marcha.—*Callos* en la planta de los piés, y *excrescencia callosa* al principio de los dedos gordos.—Dolor presivo en los callos.—Quemazon en la parte carnosa del dedo grueso.—*Excrescencia callosa debajo de la uña del mismo dedo.

14.—APIS MELLIFERA.

APIS.—Abeja melífera.—Hering, *Estudios patogenéticos.—Hist. nat. y prep.*—Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: de 24 horas á 30 y 40 dias, segun los casos.

Antídotos: *Graph. canth. merc. hep. sulf. iod. ther. m-arc.*

CLINICA.—Estando indicado este medicamento por el conjunto de los síntomas, se le verá frecuentemente de una grande eficacia en los casos siguientes:—Enfermedades de los niños, de las *mujeres*, y particularmente de las *viudas*; consecuencias de un *exantema repercutido*, especialmente de la *urticaria*, de la *escarlatina*, del *sarampion*, de la *miliar*; *Llagas*; *Heridas por instrumentos puntiagudos*; Llagas erisipelatosas; *Edemas de los miembros*; *Tumores*; *Herpes*; *Urticarias*; *Forúnculos*; *Escarlatina*; *Sarampion.—Reumatismo*; *Gota*; *Nodosidades artríticas*; *convulsiones histéricas.—Manías* de diversas especies, sobre todo las que tienen su orígen en las *funciones sexuales de las mujeres*; *Hidrocéfalo* de los niños; Apoplejía de los viejos; Cefalalgias de todas clases; Neuralgias de la cabeza por causas *biliosas*, *abdominales*; *Hemicránea*, *que tiene su origen en los centros ganglionarios*; *Placas de calvicie sobre la cabeza.—Oftalmias* externas palpebrales, reumatismales, artríticas; *Iritis*; *Corneitis*; *Edema del globo del ojo*; *orzuelo*; *oscurecimiento y cicatrices en la córnea*; *Estafiloma*; *Fístulas lagrimales*; diferentes *debilidades de la vista.—Erisipelas de la cara*, sobre todo semilaterales, pálidas, lívidas ú ocupando la barba, la mandíbula inferior y la region del cuello; *Edema de la cara*; *Neuralgias de los labios*, *de la lengua*, *de las encías.—Glositis*; *Hinchazon*, *ulceracion*, *cáncer de la lengua*; *Inflamacion del paladar*, *de la boca*, *de la garganta*; *Ulceras en la garganta*,

de naturaleza erisipelatosa; *Difteritis.—Gastralgias*; *Urticaria é inflamacion erisipelatosa del estómago ó de los intestinos*; *Diafragmitis*; *Splenitis*; *Enteritis*; *Ascitis.—Diarreas crónicas*, sobre todo biliosas y erisipelatosas; *Afecciones hemorroidales*; *Disuria*; *Estranguria*; *Cistitis*; *Albuminuria*; *Diabetes sacarina*; *Gonorrea.—Afecciones de los ovarios*, tales como dolores, inflamaciones, hipertrofias, tumores, hidropesía de estos órganos; *Hipertrofia de la matriz*; *Hidropesia del útero*; *Sufrimientos menstruales*; *Tumores y Neuralgias de la vulva*; *Abortos inminentes*; *Metrorragia*; *Histeria*; *Escirro de los pechos.—Edema de la laringe*; *Pleuresias*; *Hidrotorax*; *Pericarditis*; *Hidropesia del pericardio.—Panadizo*; *Hinchazon de la rodilla*; *Podagra*.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Nodosidades pruritosas en las articulaciones.—*Extrema sensibilidad de las partes musculares á la menor presion.—*Irritabilidad é inquietud.—Debilidad con temblor.—**Penosa laxitud, debilidad y grande fatiga*; debilidad y flaqueza en los centros ganglionarios.—Cansancio, sobre todo en la espalda, como despues de penosos trabajos.—*Postracion, que obliga á acostarse.—Debilidad*, sobre todo en el dorso.—Accesos de desfallecimiento con vértigos.—Desfallecimiento con palidez, frio, vómitos y diarrea.—*Excesiva sensibilidad al tacto ó á la presion exterior.*—El calor, sobre todo el de una habitacion cerrada, agrava los sufrimientos; el agua fria alivia los dolores, las hinchazones y las sensaciones quemantes; horror al aire frio.—La posicion echada agrava mucho los sufrimientos, que se disminuyen en la derecha; la marcha y el movimiento alivian muchos sufrimientos, hasta los accidentes mas graves.—Se agravan ó aparecen principalmente por la *tarde*: la *tos*, los *escalofrios*, el *calor*, los vértigos, la cefalalgia, los dolores oculares, la odontalgia, los cólicos y la ronquera.—Por la *noche*, sufrimientos en los ojos y en el pecho; por la *mañana*, *diarrea con tenesmo*, cólicos, mucosidades en la boca, dolores de cabeza, frios y la mas grande agitacion.—*Estado convulsivo durante el parto.

Piel y fenómenos exteriores.—Violento prurito, lancinante, como por alfileres ó insectos, que se repiten

Digitized by Google

despues del movimiento; prurito sobre pequeños sitios circunscritos; prurito nocturno, que quita el sueño; prurito quemante, lancinante, insoportable y que excita enfado.—**Tumefacciones con violentos dolores lancinantes*; *tumores de un rojo vivo con estrías rojas á lo largo de los miembros; hinchazon de la piel, roja-pálida, como con edema, que se extiende mucho; °*tumores chatos*; *quemantes*, *lancinantes*, *duros*, rojos ó blancos, ó lo uno y lo otro á la vez; °pequeños granos muy sensibles con dolores quemantes y lancinantes; °punzadas en las erupciones.—°Forúnculos con dolores lancinantes.—°Ampollas corrosivas.—**Erupciones urticarias*; manchas rojas; *pequeñas manchas blancas con aréola roja, prurito violento; **flictenas pálidas*, *muy sensibles; *manchas duras, dolorosas, de un rojo morado.—**Tumores edematosos* en el vientre, en los miembros, en las manos y en los piés.—Dolores quemantes, lancinantes en todas las partes de la piel, con ó sin erupcion; *dolores de excoriacion, *particularmente por bajo de las costillas; tension de la piel de los músculos, sobre todo en los hombros, en la nuca y en la cabeza.—°*Palidez de la piel y enflaquecimiento*; °piel de color de cera durante la menstruacion. —°Herpes anulares.

Sueño.—Bostezos, con grandes ganas de dormir y pronto despertar.—Sueño impedido por la tension de la cara, punzadas en la piel, dolores quemantes por bajo de las costillas y otros sufrimientos; sueño con sobresaltos; *sueño agitado, con despertar frecuente y ensueños contínuos.—Ensueños con zozobra *como si se volase por el aire*; de viajes, de corridas de toros.—*Debatimiento*, sobre todo por la mañana; sueño no reparador; *prolongado por la mañana; °despertar con descontento.

Fiebre y fenómenos febriles.—*Horripilaciones*, despues de medio dia (hácia las 3 ó 4 de la tarde), mas pronunciadas en un medio caliente y seguidas de ardor con tos; horripilaciones al menor movimiento estando sentado; *escalofrios por la tarde*, con cefalalgia, calor en la cara y manos calientes; *frio con temblor en la urticaria; *escalofrios durante los padecimientos de la garganta y del pecho; frio tembloroso despues del calor.—Sensacion de calor por todo el cuerpo, principalmente en el pecho y en la region del estómago; calor con rubicundez de la

Digitized

piel; **calor por la tarde y la noche*, con sobreexcitacion y dolor de cabeza; calor con la diarrea, las tumefacciones y la tos; manos y piés quemantes.—Sudor á ratos alternando con sequedad de la piel.

Moral.—*Indiferencia.—*Tristeza; *angustia; *presentimiento de la muerte.—*Sobreexcitacion; *humor irritable; repulsivo, que nada agrada; *arrebato á causa de los sufrimientos; *inquietudes morales, intelectuales y corporales.—*Carácter cuidadoso, ligero, festivo y demasiado alegre.—*Envidia celosa por las mujeres.—*Torpeza, que ocasiona la rotura de todo lo que se maneja.

Cabeza.—**Imposibilidad de fijar sus pensamientos sobre ningun sujeto.*—**Delirios*, durante las congestiones, los exantemas, el calor febril y el sueño.—*Congestion de sangre á la cabeza; cabeza como demasiado llena ó como demasiado voluminosa; embarazo de la cabeza, sobre todo por cima de los ojos.—*Vértigos*, durante la estacion, así como en la posicion sentada ó acostada, al cerrar los ojos; vértigos, con oscurecimiento de la vista, náuseas, estornudos y dolor de cabeza.—Cefalalgia gravativa, presiva, principalmente al levantarse de su asiento, ó al enderezarse de la posicion acostada; **aumento de los dolores de cabeza en la cámara caliente, alivio al comprimirla con las dos manos*; *dolores de cabeza hasta el través de los ojos, alrededor y por bajo de ellos; °*accesos de jaqueca* en la frente, las sienes y por cima de los ojos.—Tiron, tension, punzadas quemantes, prurito y picotazos en la piel de la cabeza.—°Hidrocéfalo inminente.

Ojos.—**Temblor y palpitacion del globo del ojo (izquierdo) sobre todo por la noche*: pesadez, plenitud, presion, en los ojos y en los párpados; **Terebracion, punzadas y dolores* como de golpes en los ojos; *dolor incisivo, quemante y *rubicundez de los ojos*; prurito lancinante en los ojos, los párpados y sus inmediaciones; prurito en los ojos y á su rededor, en los párpados y en sus ángulos.—**Lagrimeo, rubicundez* y *ardor en los ojos*; lagrimeo con inquietud moral y dolor de cabeza, por la noche, con fotofobia, quemazon y rubicundez de los ojos; *sensacion como si hubiese legañas en los ojos*; **aglutinacion de los párpados*; **párpados inflamados, rojos é hinchados*; **inflamacion violenta de los ojos, con rubicundez y fuertes dolores*; *hinchazon

edematosa, erisipelatosa y otras *alrededor de los ojos*; *excoriaciones de los bordes de los párpados y de los ángulos de los ojos; °orzuelos; °*inflamacion*, *engrosamiento* y *opacidad de la córnea*; °estafiloma.—**Fotofobia*, más durante los sufrimientos de los ojos y los dolores de cabeza. —°Mirada incierta.

Oidos.—Orejas ardientes, con tirantez; °hinchazon roja de las orejas.—Grande sensibilidad del oido.

Nariz.—Nariz roja é hinchada; prurito y dolor de la nariz.—Coriza, con sensacion de hinchazon en la nariz, sequedad de la boca y labios quemantes; estornudo seguido de presion en el sincipucio y de vértigos.

Cara.—**Cara pálida*; *de color lívido, azul rojizo.—Calor y rubicundez de la cara, con sensacion de plenitud, deseo de lociones frias y punzadas quemantes; *hinchazon de la cara con tension y rubicundez; *erisipela de la cara. —Picotazos y hormigueo en la cara.—*Labios doloridos*, hasta las encías y la cabeza; labios como contundidos é hinchados; picotazo, tension, dolor quemante y grietas en los labios; hinchazon y ranversamiento de los labios; °cáncer en los labios?.—Serramiento de la mandíbula inferior.

Dientes.—Odontalgia hasta la cabeza; *sacudidas* y *tirantéces en las muelas superiores izquierdas*.

Boca.—*Boca sensible, como si estuviese quemada; **sequedad de la boca y de la garganta*, *fetidez de la boca.— Salivacion; saliva viscosa, espumosa.—**Lengua como quemada*, sobre todo en su punta; *vesículas en los bordes de la lengua*, *sobre todo en el lado izquierdo*, con excoriacion, punzadas y ardor; *sequedad, rubicundez ardiente, punzadas quemantes, *hinchazon* é *inflamacion* de la lengua; *lengua cargada, °en las afecciones gástricas y más en las diarreas.

Garganta.—*Garganta como en carne viva al hablar, con saliva viscosa; *ruido de mucosidades todas las mañanas; presion, como por un cuerpo duro, en las fáuces y cámara posterior de la boca; *ardores, picazon y punzadas en la garganta, más al tragar; *dificultad de deglutir por picazon y contraccion en la garganta.—°*Inflamacion de la garganta*, *con hinchazon*, *rubicundez* y *dolores lancinantes*; °inflamacion de la úvula; *amigdalas rojas é hinchadas*, con picazon dolorosa.

Digitized by Google

Apetito.—**Apetito nulo*, totalmente perdido; °*adipsia*, sobre todo en las ascitis, en la sequedad de la garganta y durante el calor febril; deseo de una gota de agua fria, durante la postracion de fuerzas.

Síntomas gástricos.—Eructos con pituitas del estómago; eructos con gusto á los alimentos ingeridos; aumento de los eructos despues de beber agua fria.—*Desgana y náuseas*, con desfallecimiento, postracion y vértigos; °náuseas con dolor de cabeza; gana de vomitar durante la hinchazon de la cabeza; náuseas con los dolores de estómago y las diarreas.—*Vómitos biliosos.*

Estómago.—Sensibilidad muy dolorosa del estómago, con quemazon como por ácidos; *dolores violentos en el epigastrio; *presion, punzadas como por alfileres, *dolor de excoriacion*, *quemazon* y fuerte sensibilidad en el estómago.

Vientre.—*Dolor como de contusion bajo los hipocondrios, sobre todo en el izquierdo.*—Dolor de vientre por la mañana, con ganas de deponer; terebracion pulsativa por cima de la cresta ilíaca izquierda, aliviada por los eructos; pesadez, presion, violenta compresion, contraccion y presion distensiva en el vientre; cólicos al andar; dolores abdominales violentos en la posicion acostada, aliviados al sentarse; **quemazon*, sensacion de excoriacion interna y *grande sensibilidad exterior del vientre al solo contacto de las cubiertas de la cama*; °quemazon en el vientre en las mujeres histéricas.—Náuseas, borborigmos.—*Vientre inflado, como demasiado lleno y sensible, con edema de los piés y orinas escasas; *hinchazon hidrópica del vientre*, en muchos casos.

Ano y defecacion.—*Cámaras blandas, por la mañana de color claro*; propension á la diarrea, ganas urgentes y tenesmo en el ano; **diarreas amarillo-verdosas*, *indolentes, sobre todo por la mañana*; diarreas fétidas, seguidas de tenesmo con estilicidio de sangre; evacuacion de mucosidades con dolor, como si los intestinos estuviesen lastimados.—Ano como obstruido, con calor y latidos en el recto; sacudida eléctrica en el recto, antes de deponer· ano como excoriado durante la diarrea; °prurito insoportable é hinchazon del ano; °dolores insoportables, lancinantes, terebrantes, en los botones hemorroidales; exudacion sanguinolenta por el ano, que está hinchado.

Orinas.—Miccion mas abundante dia y noche; ganas frecuentes de orinar.—Imposibilidad de orinar, ó muy poca orina á la vez, con fuertes dolores; *orinas escasas, muy encendidas.—*Ardor* y picazon en la uretra, como á consecuencia de una quemadura.

Partes viriles.—Sensacion en los cordones espermáticos.—Exaltacion del apetito venéreo.

Partes de la mujer.—Reglas intermitentes, que cesan y reaparecen alternativamente; *menstruacion dolorosa.—*Metrorragia* con aborto; *fácil aborto.*—*Hinchazon de los labios de la vulva.—**Presion hácia abajo en la region de la matriz*, como para las reglas.—*Dolor cortante, punzada *en los ovarios*, como si hubiese levantado una pesada carga; °*hinchazon, induracion é hipertrofia de los ovarios.* —**Dolores quemantes y lancinantes en los pechos escirrosos.*

Laringe y tos.—Ronquera, con sensibilidad dolorosa de la laringe; picazon en la garganta y sequedad.—*Tos,* cosquilleo detrás de la foseta del cuello, por la tarde; tos con cefalalgia, antes de media noche en la cama, despues de haber dormido; tos, que cesa desde que se desprende la menor mucosidad; **tos ronca*, °como en el croup, con respiracion penosa y fiebre.

Pecho y respiracion.—**Respiracion penosa*, con constriccion de la garganta; **respiracion acelerada*, sobre todo durante el movimiento, al subir la escalera, y al andar, á veces con calor y dolor de cabeza, ó con ganas de dormir; sensacion como si fuese á faltar el aliento.—**Las habitaciones calientes son insoportables.*—*Plenitud en el pecho, que obliga á sentarse; dolores del pecho á la izquierda, cerca del esternon; punzadas, sobre todo en el costado izquierdo; **dolores de excoriacion, como despues de una contusion, sobre todo en las últimas costillas y mas frecuentemente á la izquierda*; frio en el pecho; *calor en el pecho; °*hidrotorax* en muchos casos.—**Dolores en la region del corazon*, lancinantes y que impiden respirar.

Tronco.—Rigidez en los riñones.—*Dolores en la espalda, bajo los omóplatos, mas fuertes con el movimiento*; °erupcion en el dorso como de picaduras de mosquito.—Dolor tensivo en la nuca, desde el hombro á la cabeza; °herpe anular en la nuca.—Punzadas en la nuca, á la derecha, al volver la cabeza de este lado.—*Glándulas infartadas en el cuello.

Miembros torácicos. — Dolores distensivos desde el hombro hasta la punta de los dedos.—Entorpecimiento del brazo izquierdo; *hinchazon edematosa del brazo derecho.—Ardor y punzadas en las manos; rubicundez, calor é hinchazon de las manos; manos frias y moradas; °erupcion en las manos; prurito, ardor y grietas en las manos. Las uñas están como desprendidas.

Miembros pelvianos. — Debilidad y excoriacion en la articulacion de la cadera izquierda.—Distensiones en los miembros pelvianos hasta la punta de los dedos gordos. —Sensacion de mortificacion en los músculos del muslo. —Dolor alrededor de la rodilla.—Hinchazon de los piés; por la tarde los piés están doloridos, duros, pesados, hinchados; punzadas en el maléolo externo izquierdo y en el dedo grueso del pié; ardor de los piés y del dedo grueso; hormigueo y prurito en los piés, como por sabañones.—Sensacion como si el dedo grueso estuviese demasiado abultado.

15.—APOCYNUM ANDRESEMIFOLIUM.

APOC-ANDR.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Usado con buen éxito contra la: *Gota* y *el Reumatismo*, sobre todo en el hombro y la rodilla derechos, así como en el dedo grueso del pié, con vómito bilioso.

16.—APOCYNUM CANNABINUM.

APOC-CAN.—Cáñamo americano.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Medicamento, que los homeópatas de la América del Norte han empleado con buen éxito contra toda clase de *hidropesías* (sobre todo contra la *ascitis* y el *hidrocéfalo agudo*), así como contra las *Metrorragias* y las *Amenorreas* de las jóvenes.

Digitized by Google

17.—ARGENTUM FOLIATUM.

ARG.—Plata.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion*: 2 á 3 semanas en las enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS: *Merc.* puls.?
COMPÁRESE CON: Asa. aur. chin. merc. nitr. ac. n-vom. puls. plat. stram.

CLINICA.—Hasta el presente tan solo se ha empleado este medicamento contra las *anginas por el abuso del mercurio*, y con muy buen éxito contra las *laringitis crónicas*, *y sobre todo*, las de los *abogados*, de los *predicadores*, y en general de todas las personas que están obligadas á hablar largo tiempo y sin interrupcion.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Presion calambroídea, tirantez, principalmente en los miembros y en los huesos. —Dolor de quebrantamiento, con especialidad en el sacro y en las articulaciones de los miembros inferiores. —*Abatimiento y sensacion como de rotura, sobre todo por la mañana, y particularmente despues de despertar.*—Sensacion de excoriacion en la piel y los órganos internos.—Sensacion de entorpecimiento y de rigidez en los miembros. —Ataques de epilepsa.—Sensacion de conmociones eléctricas, sobre todo en los miembros del lado izquierdo.— Exacerbacion de los síntomas todos los dias despues de medio dia.—Picazon quemante en diversas partes de la piel, y prurito ó quemazon, como de pulgas ó de chispas eléctricas.—Erupcion granulosa, con dolor quemante de excoriacion.—Sueño agitado con ensueños ansiosos y terribles.—Horripilacion y frio, sobre todo despues de medio dia y por la noche.—Sudor nocturno.—Inquietud que obliga á andar de prisa.—Mal humor y aversion á hablar.—Idea fija que se le figura estar atacado de apoplejía.

Cabeza.—Entorpecimiento y sensacion de vacuidad en la cabeza. — Oscurecimiento, como por haber fumado. y *sensacion de embriaguez con hormigueo en la cabeza.*— Vértigos con oscurecimiento de la vista, ó con adormeci-

miento y caida de los párpados.—Dolor tractivo y presivo en el occipucio, como causado por un cuerpo extraño, con sensacion de rigidez en la nuca.—Dolores tractivos semilaterales, como en el fondo del cerebro.—Presion adormeciente en el sincipucio.—Ataques de compresion en el cerebro, con náuseas y ardor en el epigastrio, leyendo ó estando de pié.—*Dolores calambroídeos y lancinantes en la cabeza.—Dolor de excoriacion en la piel del cráneo, con la mas ligera presion.—Dolor osteócopo, calambroídeo y presivo en la cabeza.—Temblor doloroso en los músculos de las sienes y de la frente.—Granos en las sienes con dolor de ulceracion.

Ojos.—Prurito en los ojos y principalmente en los ángulos.—Hinchazon y rubicundez del borde de los párpados.

Oidos.—Punzadas en los oidos, con dolor incisivo que se extiende hasta el fondo del cerebro.—Prurito corrosivo en la parte exterior de la oreja, que obliga á rascarse hasta hacerse sangre.—Sensacion de obturacion de los oidos.—Violentos latidos y estirones en la foseta detrás del lóbulo de la oreja.

Nariz.—Epistaxis despues de haberse mojado, ó precedida de hormigueo y cosquilleo en la nariz.—Obturacion de la nariz, con picazon en las ventanillas nasales.—Violento coriza fluente con estornudos frecuentes.—Secrecion de materias purulentas por la nariz, mezcladas de coágulos de sangre.

Cara.—Rubicundez de la cara.—*Dolores osteócopos, corrosivos, calambroideos* y *presivos en la cara.*—Latidos y sensacion de hinchazon en la mejilla izquierda.—Hinchazon del labio superior, inmediatamente debajo de la nariz.

Dientes.—Dolores de dientes como si estuvieran descarnados.—Sensibilidad dolorosa de las encías al tacto.—Encías descoloridas y que sangran fácilmente.—Los dientes inferiores se pegan á los superiores como por medio de una capa viscosa.

Boca.—*Sequedad de la boca.—Sensacion de sequedad en la lengua*, aunque esté húmeda, ó se pegue al paladar.—**Acumulacion de una saliva viscosa* °adherente al paladar, ó en la boca, con horripilacion.—Vesículas sobre la lengua, con dolor quemante de excoriacion.

Faringe.—Dolor en la garganta, como por un tumor en el gaznate, con dificultad de tragar.—Ronquera y ras-

camiento en la garganta.—°Inflamacion de la faringe, con sensacion de excoriacion y de encogimiento al deglutir y respirar.—Terebracion y sensacion como de escarbamiento en la garganta.—Acumulacion de mucosidades grises y viscosas en la garganta, con expectoracion fácil.

Apetito.—Repugnancia á todos los alimentos, aun pensando en ellos, con pronta saciedad.—Apetito pronunciado, aun cuando el estómago esté cargado.—*Hambre corrosiva*, que no puede ser calmada por los alimentos, con dolor en el corazon y sensacion de vacuidad en el estómago.

Estómago.—Pirosis.—Hipo en fumando tabaco.—Náuseas y malestar contínuo.—Vomituricion y vómitos de materias ácres, de un gusto desagradable, y que dejan en la garganta una sensacion de picor y quemadura.—Presion en el epigastrio.

Vientre.—Presion violenta en todo el bajo vientre hasta el púbis, apareciendo desde que se empieza á comer, agravada en inspirando, y aliviada levantándose.—*Hinchazon presiva y dolorosa del vientre.*—Dolores cólicos.—Contraccion de los músculos del abdómen, andando.—Borborigmos estrepitosos en el vientre.—Hinchazon timpanítica de todo el lado derecho.

Defecacion.—Gana frecuente de deponer, con evacuacion poco copiosa de materias blandas.—Deposicion seca arenosa.—Vómitos durante la deposicion.—Despues de una deposicion por la mañana, dolor de contraccion en el vientre.—Sensacion como si una lombriz picara en el ano.

Orinas.—Deseo frecuente de orinar, con emision abundante.—*Dolor de contusion en los testículos.*—Poluciones.

Laringe.—Dolor de excoriacion en la laringe, sobre todo en tosiendo.—En la cama al principio de la noche en durmiéndose, crujido en la laringe, con una especie de sonido metálico.—*En comiendo, y sobre todo manzanas, entra fácilmente cualquiera cosa en la laringe*; °en la parte superior y anterior de la laringe en un corto espacio se siente una sensacion de frio.—°Sensacion como de una pequeña desolladura en la laringe, en los alrededores de la foseta del cuello, mas fuerte en hablando y cantando.—Acumulacion de mucosidades en la tráquea-arteria,

que se desprenden cuando se baja ó se rie, ó que se sube una escalera, las que se expectoran fácilmente.—Acumulacion abundante de mucosidades en el pecho.—Tos excitada por un dolor incisivo en la tráquea-arteria, con expectoracion de materias serosas.—Ataques de tos corta y estertorosa por el dia, con expectoracion fácil de materias espesas y blanquecinas.—*Tos excitada al reir*; °durante la tos, sensacion como si la garganta estuviera en carne viva.

Pecho.—Presion en el pecho.—Presion y punzadas en el esternon y costillas.—Dolores incisivos en los lados del pecho, inspirando y echándose hácia adelante.—Dolores calambroídeos en los músculos del pecho y costados.—Palpitaciones espasmódicas frecuentes, sobre todo estando echado de espaldas.

Tronco.—Dolores de quebrantamiento, ó de tirantez en los riñones.—Dolores calambroídeos en las espaldas, y en los omóplatos.

Brazos.—Tension y tirones agudos, calambroídeos y presivos en los brazos y en las manos.—Dolores calambroídeos y presivos en los huesos, y en las articulaciones de las manos y de los dedos.—Contraccion de los dedos.

Piernas.—En andando dolor lancinante, presivo y como paralítico en la articulacion coxo-femoral.—Estremecimiento de los músculos de los muslos.—Dolores calambroídeos agudos, incisivos, en las rodillas y en los maléolos.—Calambres de las pantorrillas, con sensacion de acortamiento de los músculos, en bajando la escalera.—Dolor de quebrantamiento y pulsacion en las articulaciones del pié.—Dolores calambroídeos en los huesos y en las articulaciones de los piés y de los dedos gruesos.—Sensacion de entorpecimiento en el talon y en el tendon de Aquiles.

18.—ARGENTUM NITRICUM.

ARG-N.—Nitrato de plata.—Diario de Viena.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Duracion de accion?*.

ANTÍDOTOS: *Ars. natr-m.*

COMPÁRESE CON: *Ars. aur. chin. iod. merc. natr-m. phosph. puls. rhus. stann. zinc.*

Digitized by Google

CONSEJOS CLINICOS.—Hasta el dia se ha empleado y recomendado este medicamento, principalmente contra las afecciones siguientes: *Temblor nervioso*; *Epilepsia*; Catalepsia; Baile de San Vito; Convulsiones histéricas; *Parálisis*; Hemorragias; Afecciones sifilíticas, mercuriales, escrofulosas, etc.; Afecciones leprosas; Escorbuto; Psoriasis; Herpes; Ulceras cancerosas; Fiebres tifoídeas; Quemaduras; Sabañones; Erisipelas; Ulceras atónicas; Viruelas; Supuraciones pertinaces; Abscesos; Estado letárgico ó comatoso; Fiebres tifoídeas; *Rabia canina;* Manías y locuras; Apoplejía; Hidrocéfalo; Meningitis; Jaqueca; Pterigion; Enfermedades de la córnea; Fístula lagrimal; Amaurosis; Sordera; Otorrea; Ocena; Prosopalgia nerviosa; Lupus de la cara ó de la nariz; Erisipela de la cara; Mentagra; Impétigo de los labios; Aftas; Salivacion y úlceras mercuriales de la boca; Angina membranosa (Difteritis); Amigdalitis crónica; Pirosis y ágrios del estómago; Melena; Reblandecimiento del estómago; Cáncer del estómago; Cólico de plomo; Diarrea de la denticion; Disentería; afecciones verminosas; Flujo hemorroidal; Catarro de la vejiga; Gonorrea; Calambres uterinos; Tísis laríngea; Coqueluche; Tísis tuberculosa; Asma convulsivo; Panadizo; Coxalgia; Tumor blanco.

SINTOMAS GENERALES.—Andar vacilante con falta de solidez en los miembros.—*Mucha fatiga y laxitud de las piernas*, con horror al trabajo, soñolencia y mal semblante.—Fatiga, sobre todo al subir las escaleras.—**Temblor de los miembros.*—Sensacion de distension de los miembros y de la cabeza.—Convulsiones violentas.—°*Ataque de epilepsia.*—**Parálisis* y °hemiplegia.—Caquexia, enflaquecimiento, hidropesía.

Piel.—Prurito picante, lancinante, particularmente por la noche con el calor de la cama.—Erupciones escabeiformes que sangran, con costras sanguinolentas despues de haberse rascado.—Pústulas ectimatosas.—Excrescencias verrugosas.

Sueño.—*Mucha gana de dormir estando sentado*, sobre todo *por la tarde.*—Bostezos profundos frecuentes.—Estado soporoso.—Muchas ideas imaginativas antes de dormirse.—Sobreexcitacion nerviosa, por la noche, con insomnio.

Digitized by Google

—Sueño agitado, con ensueños, con mucha anhelacion. —*Ensueños penosos llenos de horrores.*—Por la noche: cefalalgia, dolor de garganta, flatuosidades.

Fiebre.—Calofrios y horripilaciones por la mañana temprano. — Durante los calofrios color del rostro amarillento con náuseas y eructos secos.—Fiebre con cefalalgia violenta, y como un gran ruido en la cabeza, con náuseas, gana de vomitar y deseo de cosas saladas, ácidas ó picantes.—*Sudores nocturnos* abundantes; sudores por la mañana.

Moral.—Ansiedad con suspiros y sensacion de un profundo malestar.—Escrupulosidad alternando con indiferencia.—Apatía y falta de confianza en sí mismo, con mucha debilidad y fatiga nerviosa.—Humor hipocondríaco, sombrio.

Intelecto y cerebro.—Vértigos como si diera vuelta todo en derredor.—Vértigos con cefalalgia, náuseas, privacion de la vista y zumbido de oidos.—Embriaguez vertiginosa y atolondramiento.—Vértigo con desfallecimiento.—Estupidez é incapacidad para meditar, con falta de expresiones convenientes.—Demencia con sonrisas inocentes, maneras imbéciles, y visiones con gestos cerrando los ojos durante el dia.— Embarazo confuso de la cabeza con sensacion dolorosa especialmente despues de haber tomado café.

Cabeza.— Pesadez y plenitud dolorosa en la cabeza, particularmente por la mañana al despertarse.—Cefalalgia como si la cabeza quisiera abrirse, seguida de esfuerzos intelectuales.—Sensacion de un aire fresco que parece atravesar el cerebro. —Dolor semilateral en la cabeza desde la frente hasta el lado de la cara y ojo izquierdo, con lagrimeo, encendimiento y brillantez del ojo.—*La mayor parte de los males de la cabeza se manifiestan de un solo lado y principalmente en el derecho.—Congestion fuerte en la cabeza*, con pulsacion de las carótidas, melancolía, estupor é inaptitud para la meditacion.—**Cefalalgia continua.*—El aire fuerte aumenta los dolores de cabeza; la compresion de esta por una venda los alivia.—La mayor parte de los dolores de cabeza van acompañados de mucha sensibilidad al frio.

Piel del cráneo.—Mucho prurito en la piel del cráneo; con comezon y hormigueo como causado por piojos.—

Digitized by Google

Pápulas inflamadas y fluyentes en la cabeza con prurito violento y dolores de excoriacion.—Bultos como protuberancias en la piel del cráneo y nuca con prurito.

Ojos.—Inflamacion de los ojos, compresion, mucosidades que obligan á enjugarse los ojos, rubicundez color escarlata, reblandecimiento de la conjuntiva, vista empañada y acortamiento de las hendiduras de los párpados. —Aglutinacion nocturna de los ojos. — Acumulacion abundante de mucosidades en los ojos.—Los ángulos de los ojos de color rojo de sangre, con hinchazon de la glándula lagrimal, como un pedazo de carne encarnada, y formacion de un hacecillo de venas procedentes de los ángulos.—Conjuntiva roja y tumefacta.—Mejoría de la oftalmía al aire libre y frio; dolores insoportables al calor del cuarto.—Lipitudo.— Acceso de ceguera súbita al crepúsculo con quejidos en alta voz.— Escotomía frecuente y confusion de las letras al leer y al escribir.— *Presbiopia* leyendo. — Córnea turbia con una mancha blanca encima.

Oidos.—Otalgia.—Sonido de campanas, retintin, zumbido de oidos.—Dureza de oidos y oclusion frecuente de estos.

Nariz.—Dolor de contusion en los huesos de la nariz.— Prurito violento, contínuo en las ventanillas nasales, obligando á rascarse hasta hacerse sangre.—Moco de sangre y mucosidades sanguinolentas, purulentas.—Costras dolorosas ensangrentadas dentro de la nariz.—Olfato embotado.—Obturacion de la nariz con mucho prurito.—Estornudos frecuentes.—Coriza con calofrios, mal humor, lagrimeo, estornudos, y cefalalgia estupefaciente que obliga á acostarse.

Cara.—Cara desencajada, pálida, azulada.—Aire enfermizo, envejecido.— Dolor de dislaceracion y tirantez de un lado de la cara.—Convulsiones de los músculos de la cara con apretamiento de la mandíbula.—Hinchazon del labio superior, debajo de la nariz. — Nudosidades inflamadas y pústulas en los labios y en las comisuras.—Labios azulados.

Dientes.—Gran sensibilidad de los dientes á la impresion del agua fria.—*Dolor de dientes, sobre todo durante la masticacion y al contacto de las cosas frias ó acidas.*—Exfoliacion de los dientes.—Encías desprendidas, que sangran fácilmente.

Digitized by Google

Boca.—*Sequedad de la lengua*, sobre todo por la mañana.—Lengua cubierta de una capa azulada ó amarillo-pardusca.—Lengua esquebrajada por ereccion de las papilas.—Hinchazon de la lengua con dolor de excoriacion.—Fetidez de la boca por la mañana.—Mucha saliva viscosa en la boca.—Pronunciacion difícil y tartamudez por sequedad del paladar.

Garganta.—Rubicundez muy fuerte en la parte posterior de la boca y de la úvula.—Excoriacion, sequedad, esquebrajamiento y *dolor de excoriacion en la garganta.—Dolor como de una espina dentro de la garganta al tragar.—Acumulacion abundante en la boca y la garganta de una mucosidad espesa y viscosa con un ruido continuo y tan estrepitoso como el que hace el aliento de una persona colérica.*—Calambre y compresion en la garganta.—*Calambre en el esófago con necesidad dolorosa de eructar*, dolor de estómago, náuseas, desfallecimiento y acumulacion de agua en la boca.

Apetito y gusto.—*Gusto amargo de la boca*, algunas veces astringente y metálico, ó pastoso y desabrido.—Pérdida del apetito, la comida tiene el sabor como á paja.—Deseo de queso añejo ó de azúcar.—Gran debilidad de la digestion con sensacion contínua de plenitud de estómago.

Gastroses.—*Eructos de aire frecuentes y violentos*, que acompañan casi á todos los demás padecimientos.—Náuseas é inapetencia contínua hasta el desfallecimiento.—Vómitos que tiñen de negro la ropa blanca.—Vómitos con angustia, diarrea y cólicos violentos.

Estómago.—*Presion dolorosa en el estómago*, con especialidad por la noche, como causada por una piedra, y seguida de vómitos.—Sensacion de plenitud como si el estómago fuese á reventar.—*Gastralgia*, algunas veces con despeluzamiento interno y mal semblante, ó turbando sobre todo el sueño *de la noche*.—Sensacion de ardor quemante en el estómago y como si un garfio estuviese clavado en él, ó como si algo le royese y dolor de excoriacion.—Inflamacion, ulceracion y reblandecimiento de la mucosa del estómago.

Vientre.—Presion y plenitud en la region del hígado.—Latidos en el hígado y la region esplénica.—Estirones presivos en el vientre, como por una ascitis.—Dolor de

Digitized by Google

excoriacion y ulceracion en el vientre.—Sensacion como si ascendiera una bola.—Cólicos calambroídeos.—Expulsion frecuente de ventosidades, seguido de alivio de todos los síntomas.

Ano y deposiciones.—Deposiciones diarréicas, mucosas, verdosas y muy fétidas.—Diarreas amarillentas de un olor pútrido.—Despues de haber comido azúcar, diarrea nocturna, acuosa con muchos borborigmos y ruido de tripas.—Diarreas mucosas y sanguinolentas con gran debilidad.—Ulceracion de los intestinos, tísis intestinal.—Mucho prurito en el ano que obliga á rascarse hasta hacerse sangre.—Expulsion de ascárides y fragmentos de lombriz solitaria.

Orinas.—Deseo frecuente con emision abundante de orina de un amarillo pálido.—Deseo frecuente de orinar por la noche.—Sensacion como si la uretra estuviera tapada por hinchazon, con emision de algunas gotas despues de haber orinado.—Sensacion de encogimiento de la via de la orina al orinar.—Dolor de excoriacion orinando, y aun fuera del tiempo de la miccion.—Inflamacion é hinchazon de la uretra con derrame mucoso, priapismo, miccion sanguinolenta y fiebre.—Hematuria.

Partes viriles.—Ulceras semejantes al chancro en el prepucio.—Hipertrofia y dureza en el testículo derecho.—Poluciones frecuentes.—Falta de deseos sexuales y las partes genitales endurecidas.

Partes genitales de la mujer.—Reglas muy abundantes; con dolor de riñones y en las ingles.—Metrorragias.—Aborto.—Infarto bultuoso de las glándulas mamarias con dolor de excoriacion.

Laringe.—Silbido en el ritmo del pulso en la laringe despues de la comida, estando acostado.—Ronquera nocturna con expectoracion de mucosidades sanguinolentas, despues de algunos accesos de tos seca.—Tos excitada por un cosquilleo en la garganta.—El humo del tabaco es insoportable durante la tos.—Tos con vómitos por la noche.—Tos sofocante despues de medio dia.—Excitacion persistente á la tos con hemoptísis y opresion.

Pecho.—Opresion con suspiros.—Disnea con angustia.—Accesos de sofocacion.—Presion y pesadez en el pecho.—Palpitaciones violentas, particularmente por la noche, ó con náuseas y desfallecimiento.

Digitized by Google

Tronco.—Dolores dorsales nocturnos con tension y apretamiento.—*Dolores de riñones violentos como por luxacion*; por la mañana se alivian estando de pié y andando.—Pesadez paralítica en la region lumbar hasta la articulacion coxo-femoral.—Glándulas axilares doloridas.

Extremidades superiores,—Dolor osteócopo nocturno en el cúbito.—Vesículas amarillentas sobre una base roja, precedidas de ampollas rojas en el dorso de la mano derecha.

Extremidades inferiores.—Pesadez paralítica y laxitud de las piernas.—Tirantez calambroídea periódica desde la cadera hasta la rodilla, de tal modo dolorosa que obliga á gritar.—Dolor de la cadera hasta la garganta del pié.—Enflaquecimiento y debilidad paralítica de las piernas.—Pápulas en los muslos con prurito nocturno.—Dolor desgarrante, como si escarbasen y dolor fuertísimo en las rodillas.—Gran laxitud y fatiga tensiva en las pantorrillas como despues de una larga marcha.—Dolor artrítico en el pié.

19.—ARMORACIA RUSTICANA.

ARMOR.—*Cochearia armoracia. Raphanus rusticus*, Rábano oficinal, Gran rábano Cochearia, Cochearia de Bretaña.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.

CLINICA.—Este medicamento es aun poco conocido en sus efectos, sin embargo, se ha empleado con buen éxito contra las *gonorreas recientes y antiguas*.

SINTOMAS.—Encendimientos fugaces é inflamatorios á la piel, con erupciones vesiculosas.—*Moral*, falta de resolucion; estupidez é imposibilidad de reunir sus ideas; dificultad de meditar por la tarde.—*Cabeza*, sufrimiento con dolores presivos y terebrantes, como si la frente quisiera estallar; presion al fondo del cerebro, agravada en abriendo mucho los ojos.—*Ojos* hinchados; lagrimeo.—Accesos de pérdida de la vista.—*Dientes* como muy blandos y vacilantes durante la masticacion.—*Náuseas* y deseo de vomitar con cosquilleo en la garganta; eructos

Digitized by Google

penosos con olor de azufre y ajo, vómitos y regurgitacion de materias amargas.—*Orinas* muy abundantes; disuria y hematuria; °*gonorreas con escozor y quemazon violenta durante la miccion*, y secrecion mucosa poco abundante; °*gonorreas crónicas* y descuidadas.—Aliento fétido.

---

20. — ARNICA MONTANA.

ARN.—Arnica de las montañas.—HAHNEMANN.—*His. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Dósis usadas*: 0, 6, 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 12 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. ign.—*Se emplea como antídoto de:* Amm. chin. cic. fer. ipec. seneg.—*El vino agrava los padecimientos.*

COMPÁRESE CON: *Acon. amm. ars. bell. bry.* cann. caps. cham. *chin. cic. cin. coloc.* euphras. *fer.* hep. ign. *ipec.* mere. *natr. n-vom. puls. rhus. rut.* samb. sabin. seneg. *staph. sulf-ac. veratr.* — Sobre todo despues de *acon. ipec. veratr.* es cuando el árnica será de una grande utilidad si además está indicada.—Despues de árnica, conviene algunas veces: *Acon. ipec. rhus. sulf-ac.*

CLINICA. — Guiándose por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos en los que se podrá consultar este medicamento, contra:—Afecciones, sobre todo de personas *pletóricas y de color encendido*; ó bien linfáticas, ó extenuadas, de cara pálida, amarilla, térrea; *Afecciones reumáticas y artríticas*, con hinchazon inflamatoria y erisipelatosa de las partes afectas; Atrofia de los niños?; *Afecciones producidas por lesiones mecánicas* (caida, conmocion, golpes, etc.); Heridas, principalmente por instrumentos obtusos; Mordeduras; Excoriaciones; Ulceras por decúbito; *Contusiones*; *Luxaciones*; *Torceduras y fracturas*; Accidentes á causa de una derrengadura; Epilepsia debida á lesiones mecánicas?; Trismus; Tétanos; Convulsiones traumáticas; *Sugilaciones; Picaduras de insectos; Forúnculos;* Callos (por aplicacion exterior despues de haberlos extirpado); Caquexia por el abuso de la quina; Parálisis apoplética; Fiebre intermitente; *Fiebre traumática;* Fiebre tifoídea?; Enajenacion mental; *Congestion cerebral*, con vértigos y pérdida del conocimiento; *Apoplejia sanguinea;* Cefalalgia congestiva; Cefalalgia nerviosa; Jaqueca?; Conmocion del cerebro y de la médula espinal; Hidrocéfalo agudo?; *Oftalmia traumática; Hemorragias* de la nariz y de la boca; Odontalgia con hinchazon de la mejilla; Hematemesis; Esplenalgia; Có-

licos, sobre todo los que provienen de derrengadura; Peritonitis puerperal?; Diarrea; Lienteria?; Hinchazon inflamatoria de los testículos; Hematocele; Dolores despues del parto; Inflamacion de las partes genitales á consecuencia de un parto laborioso; Inflamacion erisipelatosa de las mamas y *excoriacion de los pezones*; Coqueluche?; Grippe?; *Pleurodinia*; Pleuresía?; *Hemoptisis*; Hinchazon inflamatoria de las articulaciones, principalmente de las rodillas y de los piés; Tumor blanco?; *Gota*, etc., etc.

Véase la nota, pag. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Tiron agudo, ó *picazon hormigueante, ó dolores paralíticos y sensacion de contusion* en los miembros y las articulaciones, así como en las partes heridas.—*Dolores de luxacion.*—*Dolores reumáticos y artríticos.—Inquietud de las partes enfermas que obliga á moverlas constantemente.—Agravacion de los dolores por la tarde y por la noche, así como por el movimiento y aun por el ruido.—Dolores vagos que pasan rápidamente de una articulacion á otra.—Cansancio sumo, doloroso de todo el cuerpo, con hormigueo.—Rigidez de los miembros despues de algunos esfuerzos.—Estremecimiento muscular.—Pesadez y *laxitud de todos los miembros.—*Sensacion de agitacion y de temblor en el cuerpo, como si todos los vasos pulsasen.—*Sensibilidad exaltada de todo el cuerpo, principalmente de las articulaciones y de la piel.*—*Hervidero de sangre y *congestion en la cabeza, con calor y ardor en las partes superiores del cuerpo*, y frio ó frescura en las partes inferiores.—*Accesos de desfallecimiento con pérdida del conocimiento °por lesiones mecánicas —°Convulsiones, trismus y tétanos traumáticos.—Caida general de las fuerzas.—°Estado paralítico (del lado izquierdo), á consecuencia de una apoplejía.—*Sensacion como si las partes enfermas estuvieran endurecidas.

Piel.—**Multitud de pequeños forúnculos.*—*Hinchazon caliente, dura y lustrosa de las partes afectas.—°*Manchas rojas, azuladas y amarillentas, como de cardenales en la piel.* —Erupcion miliar.

Sueño.—*Excesiva soñolencia por el dia*, sin poder dormir.—Deseo de dormir por la tarde temprano.—°Soñolencia

Digitized by Google

comatosa con delirio.—Sueño no reparador y lleno de *ensueños angustiosos y terribles*, con sobresalto y espanto. —Desvaríos de muertos, de cuerpos mutilados, de infamias, de indecision.—*Durante el sueño, gemidos, *palabras*, respiracion estertorosa, *deposiciones* y orinas involuntarias.—Estado de aturdimiento al despertar.

Síntomas febriles.—*Calofrios*, principalmente por la *tarde*, y algunas veces con sensacion como si se le rociase con agua fria.—*Calor por la tarde y por la noche*, con calofrios á poco que se descubra en la cama, y con dolor frecuente en el dorso y miembros.—**Fiebre con mucha sed aun antes de los calofrios.*—Antes de la fiebre, tirantez en todos los huesos.—Durante la apirexia: Dolor en el estómago, falta de apetito y repugnancia á la carne. —Sudor nocturno, ácido.

Moral.—**Ansiedad hipocondriaca* con miedo de morir y *humor desapacible.*—*Grande agitacion y angustia con gemidos.—Inaptitud para el trabajo é indiferencia para los negocios.—Aprensiones y desesperacion.—Sobreexcitacion y sensibilidad moral excesiva.—Disposicion á asustarse.—Humor contrariante, pendenciero.—Lloros.— **Resistencia tenaz.*—°Locura, alegría, ligereza y terquedad.—Ausencia de ideas.—Distraccion ó ilusiones.— *Pérdida del conocimiento.—*Delirio.

Cabeza.—**Vértigos rotatorios* con oscurecimiento de la vista, principalmente *levantándose*, moviendo la cabeza ó andando.—*Vértigos con náuseas.—**Dolores de cabeza presivos, principalmente en la frente.—**Compresion calambroidea en la frente*, como si el cerebro estuviera contraido formando una masa dura, principalmente cerca del fuego.—Dolor como si tuviera un clavo metido dentro del cerebro.—**Tirones con estremecimiento y punzadas en la cabeza*, principalmente en las sienes.—Dolor incisivo atravesando la cabeza.—°Dolor de cabeza sub-orbitario, con vómito verde (despues de un derrengamiento).—**Calor y ardor en la cabeza*, con falta de calor en lo restante del cuerpo.—Pesadez y debilidad de la cabeza.—Agravacion y aparicion de los dolores de cabeza, principalmente andando, subiendo, meditando, leyendo, *así como despues de la comida.—Hormigueo en el vértice.—Fijeza é inmovilidad de la piel del cráneo.

Ojos.—**Dolor de excoriacion en los ojos y en los párpados* con

Digitized by Google

dificultad de moverlos.—°*Ojos rojos inflamados.*—Sensacion de ardor en los ojos y derrame de lágrimas quemantes.—°Párpados hinchados, equimosados.—*Pupilas contraidas.—*Ojos tiernos, turbios y abatidos.—*Ojos prominentes, ó °medio cerrados.—Mirada fija, angustiosa.—°Oscurecimiento de la vista.

Oidos.—Dolor de contusion en los oidos.—Tiron agudo en los oidos.—*Punzadas en y detrás de las orejas.*—Dureza de oido y zumbido.

Nariz.—Dolor de contusion en la nariz.—Hormigueo en la nariz.—Nariz hinchada °y equimosada.—**Hemorragia nasal.*—Ventanillas de la nariz ulceradas.—Coriza con sensacion de ardor en la nariz.

Cara.—**Cara pálida, desencajada*, °ó amarilla y tumefacta.—*Calor en la cara sin calor en el cuerpo.*—*Hinchazon dura, rubicundez lustrosa y calor de una mejilla con dolor pulsativo.—Hormigueo alrededor de los ojos, de las mejillas y labios.—Erupcion pustulosa, en la cara principalmente alrededor de los ojos.—*Sequedad, calor quemante, hinchazon y labios agrietados.—Ulceracion de los conos de la boca.—Estado paralítico de la mandíbula inferior.—Hinchazon dolorosa de las glándulas sub-maxilares y de las del cuello.—°Trismus.

Dientes.—°Dolor en los dientes con hinchazon de la mejilla y hormigueo en las encías.—Tirantez en los dientes comiendo.—Vacilamiento y prolongacion de los dientes.

Boca.—Sequedad de la boca con sed.—Saliva sanguinolenta.—Sensacion de excoriacion y comezon en la lengua.—**Lengua seca ó cubierta de una capa blanca.*—**Por la mañana olor pútrido de la boca.*

Faringe.—Sensacion como si hubiese un cuerpo duro en la garganta.—Impedimento en la deglucion por una especie de náusea.—Ruido durante la deglucion.—Secrecion de ardor en la garganta, con ansiedad, como por un calor interior.—Mucosidades amargas en la garganta.

Apetito.—**Gusto pútrido ó amargo*, ó de una materia glutinosa.—Sed ó gana de beber, con repugnancia á toda bebida.—**Repugnancia á los alimentos*, principalmente (á la leche?), á la carne, el caldo y el tabaco.—*Deseo de vinagre.—Falta de apetito con lengua cubierta de una capa blanca ó amarillenta.—(Por la tarde) apetito inmoderado, con sensacion de plenitud y presion calambroí-

Digitized by Google

dea en el vientre, inmediatamente despues de la comida.—Humor triste y lloroso despues de la comida (por la tarde).

Estómago.—**Eructos pútridos ó amargos*, ó violentos y vacíos, ó abortados.—Regurgitacion de un moco amargo, ó de aguas saladas.—*Náuseas con deseo de vomitar principalmente por la mañana.—**Vomituricion*, aun por la noche, con presion en la region precordial.—**Vómito de una sangre coagulada* y de color oscuro.—°Despues de haber bebido (ó comido), vómito de lo que se ha tomado, mezclado frecuentemente de sangre.—Presion, plenitud, **contraccion y dolor calambroideo en el estómago y region precordial.*—°Punzadas en la boca del estómago, con presion hasta el dorso y constriccion del pecho.

Vientre.—*Punzadas en la region esplénica* con dificultad de respirar.—Presion en la region hepática.—**Vientre duro é hinchado*, °con dolor de excoriacion incisivo en los costados, aliviado por la emision de gases, principalmente por la mañana.—*Dolor en la region umbilical durante el movimiento.—Como si se sintieran golpes á través del bajo vientre.—Dolor de contusion en los costados.—Flatuosidades de olor á huevos podridos.—*Cólicos con iscuria.

Defecacion.—**Constipacion* con deseo inútil de deponer.—*Deposiciones en forma de papilla* de un olor ácido.—Diarrea con tenesmo.—Frecuentes deposiciones mucosas en corta cantidad.—**Deposiciones involuntarias*, principalmente *por la noche.*—**Lienteria.*—Deposiciones purulentas y sanguinolentas.—Hemorróides.—Presion en el recto.—Tenesmo.

Vías urinarias.—Tenesmo.—*Retencion espasmódica de la orina*, con presion en la vejiga.—Deseo inútil de orinar.—**Emision involuntaria de orina*, por la noche en la cama, y por el dia andando.—**Orinas de un color rojo oscuro con sedimento*, color de ladrillo.—°Hematuria.

Organos genitales.—°Hinchazon rojo-azulada del miembro y del escroto.—°Hinchazon inflamatoria de los testículos (por contusion).—°Hidrocele.—°Hinchazon dolorosa del cordon espermático, con punzadas en los testículos que suben hasta el vientre.—Apetito venéreo aumentado, con erecciones, poluciones y pérdida seminal á la menor excitacion erótica.

Reglas.—Evacuacion de sangre del útero fuera del tiempo de las reglas, con náuseas.—°Excoriacion y ulceracion de las mamas, ó inflamacion erisipelatosa.—°Vagina y matriz inflamadas despues de un parto laborioso.

Vías aéreas.—**Tos seca y corta*, producida por una titilacion en la laringe.—Tos por la noche durante el sueño.—°Accesos de tos, que se anuncian por lloros, y **tos en los niños despues de haber llorado y sollozado* por capricho y terquedad.—Los bostezos provocan tambien la tos.—**Tos con expectoracion sanguinolenta*; °la sangre es clara, espumosa, mezclada de coágulos y mucosidades.—°Aun sin tos, expectoracion de una sangre negra, coagulada, despues de un esfuerzo corporal cualquiera.—**Imposibilidad de expectorar las mucosidades*; *y se hace indispensable deglutir lo que se desprende con la tos.—En tosiendo, punzadas en la cabeza*, ó dolor de contusion en el pecho.

Pecho.—**Respiracion corta, entrecortada, *difícil* y ansiosa.—Estertor en el pecho.—**Opresion de pecho y dificultad en la respiracion.*—Frecuentemente respiracion lenta y profunda.—*Respiracion de un olor pútrido.—**Punzadas en el pecho y en los costados*, con dificultad de la respiracion, que se agravan al toser, respirando profundamente y por el movimiento.—**Dolor de contusion y compresion en el pecho.*—Latidos y palpitaciones de corazon.—*Punzadas dolorosas en el corazon con accesos de desfallecimiento.

Tronco.—*Dolores de contusion y de luxacion en el dorso, pecho y riñones.*—Hormigueo en el dorso.—Debilidad de los músculos del cuello; la cabeza se cae hácia atrás.—Hinchazon dolorosa de las glándulas del cuello.

Brazos.—*Dolor como de cansancio sumo y hormigueo en los brazos y en las manos.*—Dolores de luxacion en las articulaciones de los brazos y de las manos.—Estremecimiento en los brazos.—Venas de las manos hinchadas, con pulso lleno y fuerte.—Debilidad de las manos al coger alguna cosa.—Calambres en los dedos.

Piernas.—*Dolor como de sumo cansancio ó de luxacion*, ó tiron agudo en diferentes partes de los miembros inferiores.—**Debilidad dolorosa*, paralítica en las articulaciones, principalmente de las caderas y rodillas.—Falta de fuerza en la rodilla con genuflexion al andar.—Tension en la rodilla, como por acortamiento de los tendones.—Hin-

Digitized by Google

chazon pálida de la rodilla.—**Hinchazon inflamatoria, erisipelatosa de los piés*, con endolorimiento y agravacion de los dolores por el movimiento.—**Hinchazon cálida, dolorosa, dura y lustrosa de los dedos gruesos.*—Hormigueo en los piés.

21.—ARSENICUM ALBUM.

ARS.—Arsénico.—Hahnemann.—*Hist. nat y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 30, 40.—*Duracion de accion*: 36 á 40 dias, en algunas enfermedades crónicas.

Antídotos: Chin. fer. hep. ipec. n-vom. samb. veratr.—*Contra el envenenamiento por fuertes dósis*: el óxido-hidratado de hierro, ó una solucion de hígado de azúfre, leche gruesa tomada en abundancia, el carbo ato de potasa mezclado con aceite, el agua de jabon.—*Se ha empleado el arsénico como antídoto de:* Carb-veg. chin. graph. ipec. lach. veratr.

Compárese con: Acon. *arn.* bell. bry. calc. *carb-v. cham. chin.* coff. dig. dulc. *ferr. graph.* hell. hep. *iod, ipec. lach,* lyc. merc. natr-m. *n-vom.* phos. *puls.* rhus. *samb.* sep. *sulf. veratr.*—Sobre todo despues de: *Acon. arn. bell. chin. ipec. lach. veratr.* es cuando el arsénico produce mejor efecto si se halla indicado.—Despues del arsénico conviene algunas veces: *Chin. ipec. n-vom. sulf. veratr.*

CLINICA.—Los casos en que podrá ser consultado este medicamento guiándose por el *conjunto de síntomas*, son: Afecciones, sobre todo de *personas débiles, de constitucion nerviosa ó leuco-flemática*, con *disposicion á catarros y blenorreas, afecciones hidrópicas*; ó bien afecciones de personas de constitucion *linfática*, con disposicion á *erupciones, herpes, ulceraciones y supuraciones; ó á sujetos de constitucion biliosa, de temperamento colérico y vivo*, ó con *disposicion á la melancolía*, etc.; *Padecimientos de los borrachos;* Consecuencias de un enfriamiento en el agua; *Caquexia por el abuso de la quina y del iodo*; Atrofia de los niños escrofulosos y marasmo de las personas adultas; *Afecciones escrofulosas*; Ictericia; Clorosis?; *Afecciones hidrópicas*; Debilidad nerviosa de personas histéricas, con accesos de desvanecimiento; Espasmos y convulsiones; Convulsiones epilépticas; Parálisis?; Debilidad muscular con temblor de los miembros; *Temblor de los borrachos; Erupciones miliares* urticarias y sarnosas; *Herpes flictenóides y furfuráceos*; Herpes corrosivos; *Ulceras pútridas, carcinomatosas y gangrenosas*; *Carbúnculo; Pénfigo sanguíneo;* Variolóides y viruelas; Verrugas?; Sa-

Digitized by Google

bañones?; Várices; Coma vigil y coma soñolento; *Fiebres intermitentes aun las producidas por el abuso de la quina*, y principalmente *fiebres tercianas y cuartanas*, *fiebres tifoideas con síntomas de putridez*; Fiebres inflamatorias con síntomas biliosos ó mucosos; Fiebres lentas, hécticas; Fiebres gástricas; Melancolía religiosa, *Melancolía maligna*, aun con tendencia al suicidio; *Enajenacion mental de los borrachos;* Manía?; Imbecilidad; *Reblandecimiento del cerebro?*; *Jaqueca; Tiña*, con hinchazon de las glándulas, de la nuca, y del cuello; *Oftalmias* (artríticas?), escrofulosas?, reumáticas?; Oftalmías á consecuencia de la grippe ó de un enfriamiento en el agua; Manchas y *úlceras en la córnea*; *Cáncer en la nariz, en la cara y en los labios*; Costras de leche; Acné rosa en la cara; Herpes farináceos en la cara; *Prosopalgia*; Coriza crónico; Infarto de las glándulas submaxilares; Estomacace; Aftas en la boca; Hinchazon inflamatoria de la lengua; Anginas, aun las ocasionadas por la viruela; Angina gangrenosa?; Indigestion á causa de un enfriamiento en el estómago por los helados, ácidos, etc.; *Mal de mar; Padecimiento por un baño de mar;* Dispepsias con vómito de los alimentos; Hematémesis; Vómitos de los borrachos y de las embarazadas; *Afecciones gástricas y biliosas; Melena; gastritis aguda; Escirro del estómago?; Colerina, cólera asiático;* Padecimientos á consecuencia del cólera; *Cólicos;* Cólicos espasmódicos; Tabes mesentérica; *Ascitis*; Bubones escrofulosos; *Diarreas*, hasta la de los niños durante la denticion, y las que son producidas por la viruela; Disentería; Lientería?; Padecimientos hemorroidales; inflamacion del recto; Iscuria; Parálisis de la vejiga; Disuria; Inflamacion ó hinchazon de las partes genitales; Erisipela en el escroto?; Pápulas en el escroto; Amenorrea; Flores blancas; Cáncer y escirro del útero: Náuseas y vómitos de las embarazadas; Grippe; *Laringitis agudas y crónicas*; Coqueluche?; Hemoptísis?; Síntomas tísicos; *Hidrotorax; Afecciones asmáticas*; *Asma espasmódico;* Asma de millar?; Angina de pecho; Afecciones orgánicas del corazon; Nostalgia; Ciática?; *Ulceras en las piernas;* Tumor blanco?; Inflamacion flegmonosa de los piés; Coxalgia; Decoloracion de las uñas; Gota en los piés; *Ragades en las manos.*

Véase la nota, pág. 17

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—*Accesos de padecimientos con ansiedad, frio, caida rápida de las fuerzas, y necesidad de acostarse.—**Sensacion de ardor, principalmente en el interior de las partes afectas, ó dolores vivos* y tractivos. —**Dolores nocturnos*, los que se sienten aun durante el sueño, y que son *de tal modo insoportables, que conducen á la desesperacion y al furor.*—*Agravacion de los padecimientos oyendo hablar, así como *despues de comer, por la mañana al levantarse, por la tarde en la cama, echándose sobre el lado afecto*, ó durante el reposo, despues de ejercicios prolongados; alivio *por el calor exterior*, estando de pié, ó *por la marcha* y el movimiento del cuerpo.—**Aparicion de los padecimientos por intermitencia ó accesos periódicos.*—*Hinchazon edematosa, con dolor quemante en las partes afectas.—*Mucha pereza y horror á todo movimiento.*—**Falta de fuerza, debilidad excesiva y astenia completa hasta la postracion*, algunas veces °con parálisis de la mandíbula inferior, ojos empañados y hundidos, y la boca abierta.—**Caida rápida de las fuerzas*, y sensacion de debilidad como por falta de nutricion.—*Imposibilidad de andar y *necesidad de estar acostado.*—*Estando acostado, se siente mas fuerte; pero cuando se levanta, se cae de debilidad.—**Marasmo y atrofia de todo el cuerpo,* con *sudores colicuativos*, suma debilidad, cara térrea, y ojos hundidos y descarnados.—*Accesos de convulsiones violentas; ¯espasmos y tétanos.—**Accesos de epilepsia*, precedidos de sensacion de ardor en el estómago, presion y calor en el dorso, que se elevan hasta la nuca y el cerebro, con vértigos.—*Edema é hinchazon de todo el cuerpo, principalmente de la cabeza y la cara, con abultamiento de vientre é infartacion de las glándulas. —**Temblor de los miembros*, principalmente de los brazos y piernas.—*Rigidez é inmovilidad de los miembros*, algunas veces con dolores vivos, reumáticos.—Parálisis y contraccion de los miembros.—*Accesos de desvanecimiento*, algunas veces con vértigos é hinchazon de la cara.—Sensacion de torpeza en los miembros, como si estuvieran muertos.

Piel.—Descamacion de la piel.—**Piel seca como el pergamino, fria y azulada.*—*Color amarillento de la piel.—Punzadas, prurito quemante y *sensacion de ardor violenta en la piel.*—**Manchas rojizas* ó azuladas en la piel.—**Pe-*

tequias.—Manchas encendidas como las del sarampion, principalmente en la cabeza, en la cara y cuello.—*Erupciones miliares, rojas y blancas.*—Granos conóides, blanquecinos ó rojizos, con *prurito quemante.*—*Erupciones urticarias.—Erupcion de *pústulas negras*, dolorosas.—Erupciones de granos sarnosos, pequeños y pruritosos.—°Erupcion de granos rojos muy pequeños, que profundizan y pasan á úlceras corrosivas, cubriéndose de una costra.—°Pústulas llenas de sangre y de pus.—°Manchas herpéticas cubiertas de flíctenas y de escamas, con *dolores quemantes nocturnos.*—**Ulceras de bordes elevados y callosos, rodeados de una aureola roja y lustrosa*, de fondo lardáceo, ó de un azul muy oscuro, y con *dolores quemantes* ó lancinantes, principalmente cuando las partes afectas se enfrian.—*Olor fétido, *supuracion icorosa*, facilidad á sangrar, putridez y color azulado ó verdoso de las úlceras.—°Carbúnculo maligno.—*Costras delgadas ó excrescencias carnosas en las úlceras.—Ulceras secas.—°Tumores inflamatorios con dolores quemantes.—Verrugas.—°Ulceras en forma de verruga.—Sabañones.—*Várices.—Decoloracion de las uñas.—°Tumores frios.

Sueño.—Deseo contínuo de dormir, con bostezos fuertes y frecuentes.—**Insomnio nocturno con agitacion y desasosiego continuos.*—Somnolencia por la tarde.—*Coma vigil, interrumpido muchas veces por gemidos y rechinamiento de dientes.—Sueño no reparador, por la mañana parece que no ha dormido bastante.—*Durante el sueño, sobresalto con espanto, gemidos*, palabras y querellas, castañeteo de dientes, movimientos convulsivos de las manos y dedos, sensacion de un malestar general y desasosiego.—En durmiendo posicion supina con la mano debajo de la cabeza.—Sueño ligero; se oye el menor ruido, y despierta contínuamente.—*Sueños frecuentes, llenos de amenazas, de cuidados, de aprensiones*, de pesares y de *inquietud; sueños angustiosos*, horribles, fantásticos, vivos y penosos; sueños de tempestad, de incendio, de nubes y de oscuridad; sueños con meditacion.—**Por la noche temblores rápidos de los miembros*, calor y agitacion, *sensacion de ardor debajo de la piel, como si hubiese agua hirviendo en las venas*, ó frio con imposibilidad de calentarse, sofocacion en la laringe, *accesos asmáticos, grande agitacion y angustia en el corazon.*—°Despierta frecuente-

Digitized by Google

mente por la noche, con dificultad de volverse á dormir.

Fiebre.—*Frio en todo el cuerpo*, algunas veces *con sudor frio y viscoso.*—*Calofrios y *horripilacion*, *principalmente por la noche en la cama*, *ó paseándose al aire libre*, y despues de comer ó *beber y regularmente apareciendo otros padecimientos*, tales como *dolores vivos en los miembros*, *pandiculaciones*, cefalalgia, *opresion en el pecho y respiracion dificil*, tirantez en los miembros, ansiedad, inquietud.—*Calor general*, *principalmente por la noche*, y con frecuencia *ansiedad*, *inquietud*, delirios, pesadez y atontamiento en la cabeza, aturdimiento, vértigos, opresion y punzadas en el pecho, rubicundez de la piel, etc.—**Accesos febriles*, principalmente por la mañana ó por la tarde, *frecuentemente con calofrios y calor poco desarrollados*, *sed ardiente*, *ó adipsia completa*, *tipo de cuartana ó terciana*, ó algunas veces cotidiana, *padecimientos antes de los accesos*, *y sudores despues*, *en durmiéndose*; apirexia (ó calofrios, ó calor) con *mucha debilidad*, *afecciones hidrópicas*, sensibilidad dolorosa en las regiones del hígado y esplénica, *cefalalgia atolondrante ó lancinante*, *dolores vivos y tractivos en los miembros*, *en el dorso y la cabeza*, presion, plenitud, tension y *sensacion de ardor en el estómago y en el epigastrio*, punzadas en el pecho y en las costillas, *respiracion dificil*, ansiedad, *cara tumefacta*, terrosa, etc.—**Pulso irregular ó acelerado*, *débil*, *pequeño y frecuente*, ó suprimido y tembloroso.—**Sudores frecuentes*, *colicuativos*, ó frios y viscosos; **sudor por la noche ó por la tarde durmiendo*, ó por la mañana despertando; sudores parciales, principalmente en la cara y en las piernas.—Traspiracion que tiñe de amarillo el lienzo y la piel.—Durante el sudor, pesadez en la cabeza, zumbido de oidos y temblor de los miembros.

Moral.—**Melancolía*, algunas veces con ideas religiosas, tristeza, zozobras, disgustos, gritos y lamentos.—**Ansiedad*, *inquietud y angustias excesivas* que no permiten estar en ninguna parte, principalmente *por la noche en la cama*, ó por la mañana al despertarse y frecuentemente con temblor, sudor frio, opresion en el pecho, dificultad en la respiracion y *accesos de desvanecimiento.*—*Ansiedad de conciencia, como si hubiese cometido un crímen.—*Angustia inconsolable*, *con llantos y lamentos.*—Humor hipocondríaco, con inquietud y ansiedad.—**Mie-*

Digitized by Google

do de la soledad, de espectros y de ladrones, con deseo de ocultarse.—Indecision y humor variable, que pide ya una cosa, ya otra, rechazándolo todo despues de haberlo obtenido.—*Desaliento, desesperacion, *disgusto de la vida*, tendencia al suicidio ó **temor excesivo de la muerte*, creyéndola algunas veces muy próxima.—Grande sensibilidad y escrúpulos de conciencia, con ideas tristes como si ofendiese á todo el mundo.—Mal humor, impaciencia, *despecho, disposicion á irritarse, repugnancia por la conversacion, deseo de criticar* y mucha susceptibilidad.—Espíritu satírico y burlon.—*Sobreimpresionabilidad de todos los órganos*; todo ruido, toda conversacion y la luz viva son insoportables.—Grande apatía é indiferencia.—*Mucha debilidad de la memoria.*—Estupidez y embrutecimiento.—**Delirio* con grande afluencia de ideas.—*Pérdida del conocimiento y de los sentidos*; chochez, *acciones maniáticas* y furor.

Cabeza.—**Pesadez, sensacion de debilidad y atontamiento en la cabeza*, principalmente en la habitacion, mejorándose al aire libre.—Estupor y aturdimiento.—*Vértigos*, principalmente *por la tarde*, cerrando los ojos, andando ó al aire libre, y algunas veces con vacilacion y peligro de caer; embriaguez, pérdida de los sentidos, oscurecimiento de la vista, deseo de vomitar y dolor de cabeza.—**Dolores pulsativos* ó presivos, con atolondramiento, ó tractivos, lancinantes y quemantes en la cabeza, generalmente *de un solo lado*, y principalmente debajo de un ojo, ó á la raiz de la nariz, ó en el occipucio, y algunas veces con deseo de vomitar, ¯y zumbido de oidos.—Tension, apretamiento y dolor de contusion en la cabeza.—**Las afecciones de la cabeza aparecen generalmente de un modo periódico*, y sobre todo, *despues de cada comida*, por la mañana, por la tarde y por la noche en la cama, y siendo algunas veces insoportables, °con lloros y gemidos, ¯aliviándose momentáneamente con el agua fria, y se renuevan con mas fuerza despues.—Sensacion, moviendo la cabeza como si el cerebro chocase contra el cráneo.—Crujido ó ruido confuso en la cabeza.—**Endolorimiento de la piel del cráneo y de los tegumentos de la cabeza*, como si estuvieran ulcerados ó contundidos, *aumentados fuertemente por el menor contacto.—Hinchazon excesiva de la cabeza y de la cara.*—Prurito corrosivo ó quemante, **erup-*

ciones costrosas, *pustulosas*, y úlceras corrosivas en la piel del cráneo.

Ojos.—*Dolores presivos*, *quemantes y lancinantes* en los ojos, °*agravados por la luz*, *así como por el movimiento de estos, y á veces con necesidad de acostarse ó con angustia que no permite estar en la cama.—**Ojos inflamados*, *rojos*, con *rubicundez de la conjuntiva* ó de la esclerótica, é inyeccion de las venas de la conjuntiva.—Hinchazon de los ojos.—**Hinchazon inflamatoria* ó edematosa de los párpados.—*Excesiva sequedad de los párpados*, principalmente *en los bordes*, y en leyendo á la luz (de las bujías).—*Lágrimas corrosivas.—*Aglutinacion de los párpados.—*Oclusion espasmódica de los párpados, por efecto algunas veces de la luz.—*Fotofobia excesiva*.—*Manchas y *úlceras en la córnea*.—Ojos convulsos, prominentes; mirar fijo y furioso.—Pupilas contraidas.—*Color amarillento de la esclerótica*.—Color amarillo, manchas ó puntos blancos y chispas delante de los ojos.—Debilidad, oscurecimiento y pérdida de la vista.—Ojos empañados y hundidos.

Oidos.—Apretamiento, dolores vivos, punzadas, hormigueo voluptuoso y sensacion de ardor en los oidos.—Retintin, ruido confuso y sonido de campanas en los oidos.—Sensacion como si los oidos estuviesen tapados; dureza del oido, *especialmente para la palabra*.

Nariz.—Dolores osteócopos en la nariz.—Hinchazon de la nariz.—*Epistaxis violenta*.—Descamacion de la piel de la nariz en forma de caspa.—°Tumores nudosos en la nariz.—Ulceracion en la parte superior de la nariz, con secrecion de un humor icoroso, fétido y de un gusto amargo.—Olor de pez ó de azufre delante de la nariz.—Estornudo violento.—Mucha sequedad en las ventanillas nasales.—**Coriza fluente* con obturacion de la nariz, sensacion de ardor en las narices y secrecion de un moco seroso y corrosivo.

Cara.—**Cara pálida*, *desencajada y cadavérica*.—**Color amarillo azulado* ó verdoso de la cara.—**Tinte aplomado y térreo*, con manchas y estrías verdosas y azuladas.—**Cara descompuesta*, con distorsion de los rasgos ó con *ojos hundidos y ojeras*, y nariz afilada.—*Rubicundez y tumefaccion de la cara.—*Hinchazon dura y elástica de la cara*, principalmente *debajo de los párpados*, y en particular

por la *mañana*.—Entumecimiento de la cara, con accesos de desvanecimiento y vértigos.—Vesículas, granos, **úlceras costrosas*, °acné rosa y herpes farináceos en la cara. —Color negruzco alrededor de la boca.—**Labios azulados ó negruzcos*, °*secos* y *agrietados*.—Hormigueo en el labio excoriado, como si estuviera en carne viva.—Faja muy oscura en la parte roja de los labios.—Piel áspera, herpética alrededor de la boca.—*Erupcion en la boca y labios en su borde rojo.—*Nudosidades duras y *úlceras carcinomatosas*, con costra espesa y fondo lardáceo en los labios.—Labios excoriados con sensacion de hormigueo. —Tumefaccion y hemorragia de los labios.—**Hinchazon de las glándulas submaxilares, con dolores de contusion* y endolorimiento al tacto.—°Parálisis de la mandíbula inferior.

Dientes.—Dolores vivos, presivos ó tirones sucesivos en los dientes y las encías, principalmente por la noche, los que se propagan algunas veces hasta la mejilla, oidos y sienes, con hinchazon de la mejilla y *dolores insoportables* que conducen á una desesperacion furiosa, *ó que se agravan cuando se echa sobre el lado enfermo, mejorándose con el calor del fuego*.—Rechinamiento convulsivo de dientes.—Sensacion de prolongacion y rechinamiento doloroso de los dientes, con hinchazon y °salida de sangre de las encías.

Boca.—*Mal olor de la boca.—**Mucha sequedad en la boca*, ó acumulacion de una saliva algunas veces amarga ó sanguinolenta.—*Lengua azulada ó blanca.—Torpeza é insensibilidad de la lengua, como si estuviera quemada. —°*Lengua de un color muy oscuro ó nezgruzca, seca, esquebrajada* y temblorosa.—°Lengua de un rojo vivo.—Ulceracion de la lengua en su borde anterior.—°Aftas en la boca.—Palabra rápida, precipitada.

Faringe.—*Arañamiento, dolor vivo y *sensacion de ardor en la garganta*.—Inflamacion y gangrena de la garganta. —*Constriccion espasmódica de la faringe y del esófago*, con *imposibilidad de tragar*.—Deglucion dolorosa y difícil, *como por parálisis del esófago*.—Sensacion de *excesiva sequedad en la garganta y en la boca*, que obliga á beber constantemente.—*Acumulacion de mucosidades grises ó verdes, de un gusto salado ó amargo, en la garganta.

Apetito.—**Gusto amargo en la boca*, principalmente *despues*

Digitized by Google

de haber comido ó bebido, ó bien por la mañana.—Gusto astringente, pútrido ó *ácido* en la boca.—Gusto ácido de los alimentos.—Gusto insípido ó muy salado de los alimentos.—°Insipidez de los alimentos.—Gusto amargo de los alimentos, principalmente del pan y de la cerveza.—*Adipsia completa, ó *sed violenta, ardiente, sofocante é inextinguible*, con *deseo de beber continuamente, pero poco de cada vez.*—**Deseo de agua fria, de los ácidos, del aguardiente*, del café y de la leche.—*Falta de apetito y de hambre*, generalmente con sed ardiente.—*Disgusto insoportable de todos los alimentos*, principalmente de la carne y de la manteca.—*Todo lo que se deglute causa una presion en el esófago, como si estuviera allí detenido.—°Hambre contínua, con falta de apetito y pronta saciedad.—*Despues de la *comida*, náuseas, *vómitos*, eructos, *dolores en el estómago*, cólicos y otros muchos padecimientos.—*Despues de haber bebido, calofrios ú horripilacion, renovacion de los vómitos y la diarrea, eructos y cólicos.

Estómago.—*Eructos frecuentes*, principalmente *depues de haber bebido ó comido*, lo mas generalmente en seco, ácidos ó amargos.—Regurgitacion de materias ácres ó de mucosidades amargas, verdosas.—Hipo frecuente y convulsivo, principalmente por la noche.—*Náuseas frecuentes y excesivas*, algunas veces ascendiendo hasta el cuello, con *deseo de vomitar, necesidad de acostarse*, sueño, accesos de desfallecimiento, temblor, horripilacion ó calor; dolores en los piés, etc.—*Evacuacion de agua del estómago, como de pituitas.—**Vómitos*, algunas veces *muy violentos*, y principalmente *despues de haber comido ó bebido*, ó *por la noche*, hácia la mañana; **vómitos de los alimentos y de las bebidas*, ó de materias *mucosas*, *biliosas* ó serosas, de color *amarillento*, *verdoso*, *muy oscuro ó negruzco*; vómitos de materias sanguinolentas.—*En vomitando, dolores violentos en el estómago, sensacion de excoriacion en el vientre, gritos, *calor interior*, *ardiente*, *diarrea* y *miedo de la muerte.*—*Meteorismo y tension de la region precordial y del estómago.—*Endolorimiento excesivo del epigástrio y del estómago*, principalmente *al tacto.*—**Presion en el estómago como por una piedra ó como si el corazon fuera á estallar*, y angustia excesiva en la region precordial, con llantos y lamentos.—

Digitized by Google

*Sensacion de constriccion, *dolores calambroideos*, *tirantez, terebracion y sensacion de corrosion en el estómago.—*Sensacion de frio ó *calor y sensacion de ardor insoportable en el estómago y la region precordial.*—*Los dolores en el estómago se manifiestan principalmente *despues de la comida* ó por la noche.—Herpes en la boca del estómago.

Vientre.—Compresion de la region hepática.—Hinchazon del brazo.—**Dolores de vientre excesivos*, principalmente del lado izquierdo, y á veces con *mucha angustia en el vientre.*—*Acumulacion de gases en el vientre.—**Hinchazon del vientre, como en la ascitis.*—**Retortijones violentos, dolores calambroideos*, escarbamiento; tirantez, dislaceracion y como corrosion en el vientre.—*Los cólicos se manifiestan principalmente *despues de haber comido ó bebido, ó en la noche*, y generalmente *acompañados de vómitos* ó *de diarrea*, con frio, calor interno ó sudor frio.—*Sensacion de frio ó *de ardor insoportable en el vientre.*—°Dolores como de una herida en el vientre, principalmente al toser y reir.—°Hinchazon é induracion de las glándulas del mesenterio.—Desarrollo de flatuosidades, con borborigmos y ruido sordo en el vientre.—Flatuosidades de un olor pútrido.—Hinchazon dolorosa de las glándulas inguinales.—°Ulceracion del ombligo.

Deposiciones.—*Estreñimiento*, con deseo frecuente, pero inútil, de deponer.—Tenesmo, con sensacion de ardor en el ano.—Salida involuntaria é inapercibida de las deposiciones.—**Diarrea violenta, con deposiciones frecuentes*, náuseas, *vómitos*, sed, *mucha debilidad*, *cólicos* y tenesmo.—**Diarreas nocturnas*, renovándose *despues de haber bebido* ó comido.—**Deposiciones quemantes* y corrosivas; **deposiciones mucosas*, biliosas, sanguinolentas, serosas, etc.; *de color verdoso, amarillento*, °*blanquecino*, *ó *muy oscuro y negruzco;* *deposiciones fétidas y pútridas; °deposiciones de materias no digeridas.—Secrecion de mucosidades por el ano con tenesmo.—Prolapsus del recto con muchos dolores.—*Prurito, *dolor de excoriacion y sensacion de ardor en el recto y el ano*, así como *en los tumores hemorroidales*, principalmente *por la noche.*—Punzadas en los tumores hemorroidales.

Orinas.—*Retencion de orina, como por parálisis de la vejiga.—Deseo frecuente de orinar, aun por *la noche*, con

evacuacion abundante.—*Incontinencia de orina y evacuaciones involuntarias*, aun por *la noche*, en la cama.—°Emision difícil y dolorosa de las orinas.—°Orinas raras, de un color amarillo oscuro.—Orinas acuosas, verdosas, oscuras ó *turbias*, °con sedimento mucoso.—*Orinas sanguinolentes.—**Sensacion de ardor en la uretra*, al orinar.

Partes viriles.—Prurito, punzadas y sensacion de ardor en el glande y el prepucio.—Inflamacion, hinchazon dolorosa y gangrena de las partes genitales.—Glande hinchado, hendido y azulado.—Hinchazon de los testículos.—Poluciones nocturnas,—Salida de licor prostático durante las deposiciones diarréicas.

Reglas.—Deseo venéreo en la mujer.—**Reglas muy precoces y abundantes*, con muchos sufrimientos.—Reglas suprimidas, con dolores en el sacro y en las espaldas.—*Flores blancas, ácres, corrosivas, espesas y amarillentas.

Laringe.—Catarro con *ronquera*, coriza é insomnio.—Voz ronca y áspera.—Voz temblorosa, ó desigual, tan pronto fuerte, como débil.—**Mucosidades tenaces en la laringe* y en el pecho.—*Sensacion de sequedad y de ardor en la laringe.—°Constriccion espasmódica de la laringe.—**Tos seca*, algunas veces profunda, fatigosa y temblorosa, principalmente *al anochecer despues de acostarse*, *ó por la noche*, con necesidad de incorporarse, así como por la mañana, ó bien *despues de beber*, estando *al aire libre y frio*, durante el movimiento, ó al *respirar*, y muchas veces *con respiracion difícil*, *sofocacion*, dolor contractivo ó sensacion de excoriacion en la boca del estómago y el pecho, dolor de constriccion en el vientre, punzadas en los hipocondrios, en el epigastrio y en el pecho, etc.—*Tos excitada por una sensacion de constriccion y de sofocacion en la laringe, como por el vapor de azufre.*—°Accesos de tos periódica.—*Tos con expectoracion de mucosidades sanguinolentas, °algunas veces con calor quemante por todo el cuerpo.—Expectoracion difícil ó poco abundante y espumosa.—°Tos inmediatamente despues de acostarse.—Tos con expectoracion rara y espumosa.

Pecho.—**Respiracion corta y difícil, ahogos, disnea y accesos de sofocacion*, algunas veces con sudor frio, *constriccion espasmódica del pecho ó de la laringe*, *angustia*, *mucha debilidad*, frio en el cuerpo, dolor en la boca del estómago,

y accesos de tos.—Aparicion de los padecimientos principalmente **por la tarde ó por la noche estando acostado*, así como por un tiempo ventoso, al aire libre y frio, ó °al calor de la habitacion, ó abrigándose mucho, ¯fatigándose, irritándose, *andando, moviéndose* y aun riendo.—**Respiracion ansiosa, dolorosa* y sibilante.—**Opresion de pecho*, tosiendo al aire libre, andando ó en subiendo una escalera.—**Constriccion y compresion del pecho*, algunas veces con grande ansiedad, imposibilidad de hablar y accesos de desfallecimiento.—Tension y presion en el pecho.—**Punzadas en el pecho y en el esternon.*—Despeluzamiento ó *excesivo calor y sensacion de ardor en el pecho.*—**Palpitaciones violentas é insoportables del corazon*, principalmente estando acostado sobre el dorso, en particular *por la noche.*—*Palpitaciones irregulares del corazon, algunas veces *con angustia excesiva.*

Tronco.—Manchas amarillentas en el pecho.—*Dolor violento y ardiente en el dorso*, fuertemente agravado por el contacto.—Dolores *tractivos y agudos en el dorso* y entre los omóplatos, con *necesidad de estar acostado.*—Hinchazon edematosa y no dolorosa del cuello y de la mandíbula inferior.—Herpes entre los omóplatos.

Brazos.—Dolores tractivos, agudos en los brazos y en las manos.—°*Hinchazon del brazo con pústulas negruzcas*, de olor pútrido.—*Dolores tractivos, agudos, por la noche, partiendo del codo y ascendiendo hasta la axila.—Tirones agudos y lancinantes en los puños.—Calambres en los dedos.—°Por la noche sensacion de plenitud y de hinchazon en la palma de las manos.—°Excoriacion entre los dedos.—Hinchazon dura de los dedos, con dolores osteócopos.—°Ulceras en la yema de los dedos con dolor quemante.—Decoloracion de las uñas.

Piernas.—Calambres en las piernas.—°*Dolores tractivos y agudos en las caderas*, hasta las ingles, los muslos, y extendiéndose algunas veces hasta los maléolos, con inquietud que obliga á mover constantemente el miembro.—Dolor reumático en las piernas, y especialmente en la tibia.—Debilidad paralítica del muslo.—*Dolor de quebrantamiento en la articulacion de la rodilla.—Acortamiento de los tendones de la corva.—*Herpes en las corvas.—Calambres en las pantorrillas.—°*Ulceras quemantes* y lancinantes en la pierna.—°Fatiga de las piernas y de

Digitized by Google

los piés.—°*Hinchazon del pié, quemante*, dura y lustrosa con vesículas quemantes, color azulado negruzco sobre el empeine del pié.—°Vesículas corrosivas y ulceradas en la planta de los piés y en los dedos.—Dolores en la parte carnosa de los dedos, como si estuvieran gastados á consecuencia de haber andado mucho.

22.—ARUM TRIPHYLLUM.

ARUM-TR?.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Esta sustancia es muy frecuentemente de un auxilio inapreciable en las *afecciones de la laringe* y de la *tráquea*, á consecuencia de la *fatiga de la voz*, en los cantantes, los abogados, los predicadores, etc., sobre todo cuando hay fuerte acumulacion de mucosidades, voz ronca y poco segura, ya baja, ya alta, etc.

23.—ASA FŒTIDA.

ASA.—Goma resina de férula.—HAHNEMANN.—*Hist. na'. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Dósis usadas:* 3, 6, 9.—*Duracion de accion*: de 4 á 6 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Caus. chim. electric.—*Se emplea como antídoto de:* Merc. puls?.

COMPÁRESE CON: Ant. aur. *caus.* chin. coff. con. merc. n-vom. phos. plat. *puls.* rhus. rut. *thui.* tart.—Sobre todo despues de *thui.* y *puls.* es cuando la asafétida merece la preferencia si está indicada.—Despues del asafétida conviene algunas veces: *Puls.* y *caus.*

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de sintomas* se verá los casos en que este medicamento puede ser consultado contra:—*Afecciones escrofulosas y raquíticas*; Inflamaciones; reblandecimientos, desviacion, supuracion y cáries de los huesos; *Supuraciones icorosas*; Infarto de las glándulas; Padecimientos histéricos é hipocondríacos; Hemorragias?; Consecuencias funestas del abuso del mercurio; Corea; Otorrea y dureza del oido despues del abuso del mercurio; oftalmía, ocena y flemon de la nariz en los niños escrofulosos; Padecimientos gástricos y biliosos; Gastritis?; Esofagitis; Tabes mesentérica?; Ascitis con hidropesía general, dependiente de afecciones orgánicas en el

vientre; Afecciones asmáticas de personas escrofulosas, provocadas por esfuerzos, el cóito ó comidas muy abundantes; Afecciones orgánicas y palpitaciones del corazon, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores como por sacudidas, simultáneos*, generalmente tractivos, agudos, con tirones sucesivos, ó bien presivos con punzadas sordas, ó dolores vivos que se *manifiestan de dentro afuera*, mejorándose ó *cambiando de naturaleza* por el *tacto*, y acompañados de *sensacion y adormecimiento*.—Dolores en los músculos flexores.—Los síntomas aparecen estando sentado y se mejoran por el movimiento al aire libre.—*Palpitaciones y estremecimientos de algunos músculos y fibras musculares*.—Rascamiento y terebracion en el periostio.—°Inflamacion dolorosa y ulceracion de los huesos.—°Cáries.—Hinchazon cálida y roja de las partes afectas.—°Hinchazon de las glándulas.—Sensacion de pesadez en todo el cuerpo.

Piel.—Ulceras con bordes duros, azulados y muy sensibles al tacto.—°*Pus seroso, fétido y sanioso.*

Sueño.—*Mucha disposicion á dormir.*—Afluencia de ensueños, generalmente alegres.—Sueño no reparador con agitacion y despertamiento frecuente.

Fiebre.—Sensacion de calor en la cara despues de la comida, sin sed, con angustia y deseo de dormir.—Horripilacion pasajera.—Pulso acelerado.

Moral.—*Inquietud y angustia histérica* ó hipocondríaca.—Volubilidad.—Mal humor y poco gusto para el trabajo.—Mucha irritabilidad con indiferencia para todo.

Cabeza.—Confusion y *vértigos*.—Confusion en la cabeza con fuerte presion y dificultad de reflexionar.—Embotamiento de los sentidos sin pérdida del conocimiento.—Dolores de cabeza *que cambian de carácter* ó se disipan al tacto.—Tension, atolondramiento en la cabeza.—Punzadas obtusas ó *presion en los lados de la cabeza, las sienes y la frente*, como si un tapon apretara de fuera adentro.—Dolores constrictivos en la cabeza.—*Congestion en la cabeza*, con latidos.—Dolores calambroídeos en la frente debajo de las cejas.

Ojos.—Dolores en los ojos como si tuvieran arena, con sensacion de frio.—*Sensacion de ardor en los ojos* con traccion de los párpados, como por el sueño.—Sensacion penosa de sequedad, ó sequedad real de los ojos.—Temblor de los párpados.—Oscurecimiento de la vista escribiendo.

Oidos.—Dolores presivos en el oido.—°Dureza de oido, con *otorrea*.

Nariz.—Dolores presivos en la nariz, y principalmente en las alas.—Tension con *sensacion de adormecimiento* en los huesos de la nariz.—°*Derrame purulento por la nariz* de materias fétidas, verdosas.

Cara.—Dolores en la cara, generalmente tensivos, con *sensacion de entorpecimiento en los huesos de la cara*, principalmente en los pómulos.—Sensacion de plenitud presiva en la cara.—*Presion de entorpecimiento en el menton*.—Dolores tractivos agudos en la mandíbula inferior.

Boca.—Labios hinchados con punzada ardiente.—Sequedad de la boca con sensacion de quemadura y dolor de excoriacion.—Sensacion de sequedad, aunque la boca esté húmeda.

Garganta.—Dolores de garganta, *como si un cuerpo extraño ascendiese del esófago*, con presion.—Sensacion de ardor, *de sequedad* y de excoriacion en la *garganta*, con tension durante la deglucion.

Apetito.—Gusto generalmente amargo ó rancio como de grasa.—Gusto insípido y disgusto como despues de una indigestion causada por alimentos grasos.—Aversion á la cerveza que parece tener un gusto mucoso.

Estómago.—Eructos como despues de haber comido ajo, ó bien con gusto ácre y rancio.—*Presion en el estómago* con tension y sensacion como si ascendiese algo al esófago, aun despues de la comida.—Dolores calambroídeos, contractivos, en el estómago.—Dolor como de rotura y *sensacion de plenitud en la region del estómago*.—Sensacion de quemadura en el estómago y diafragma.—°*Pulsacion* visible y sensible en el *epigastrio*.—Alteracion en el estómago por los alimentos crasos.

Vientre.—*Dolores hepáticos generalmente presivos* ó lancinantes.—Punzadas profundas en los hipocondrios, dirigiéndose hácia la periferia al respirar.—Dolores de vientre con excesivo malestar en el hipogastrio é inquie-

Digitized by Google

tud ansiosa.—Presion y *lancinacion en los lados del vientre.*—Fuerte meteorismo en el vientre.—*Pesadez en el vientre*, con frio en el interior, principalmente despues de haber bebido.—Punzadas en la region umbilical.—*Cólicos gaseosos con pellizcos en el vientre.*

Deposiciones.—Estreñimiento con emision abundante de gases fétidos.—Necesidad urgente de deponer, con estreñimiento y cámaras lentas, claras y difíciles.—*Deposiciones diarréicas*, de consistencia de papilla, muy oscuras ó amarillas y fétidas, generalmente acompañadas de *dolores de vientre* y emision abundante de gases.—Presion en el periné.

Orinas.—Orina oscura, de olor ácre, picante.—*Calambres en la vejiga durante y despues de la emision de las orinas.*

Partes viriles.—Sensacion como si todo se dirigiese hácia las partes genitales, con dolores en los testículos.

Menstruacion.—Reglas precoces y muy débiles.—Presion sobre el útero como por el parto.—Inflamacion de las partes, con infarto de los pechos y secrecion lechosa de estos.

Pecho.—Tos corta, ronca, con sensacion de vapores en los bronquios.—*Opresion de pecho*, principalmente estando acostado; y despues de la comida, con *respiracion acelerada* y pulso pequeño.—Accesos de asma espasmódico, como si los pulmones no se dilatasen bastante.—Presion en el pecho, con punzadas, sobre todo estando acostado, con respiracion difícil y sollozante.—*Presion en el torax.*—Punzadas hácia la periferia, en el pecho.—Pulsacion y *latido en el pecho.*—*Palpitaciones en el corazon.*

Miembros.—Dolores de riñones muy violentos.—Dolores lancinantes en los músculos lumbares.—*Estremecimientos frecuentes en los músculos de los brazos y de las manos.*—Rigidez y torpeza de las manos.—*Estremecimiento de los músculos de las piernas y piés.*—Rigidez y torpeza de los piés.—*Hinchazon, frio alrededor de los maléolos.*—*Pulsacion muy sensible en el dedo gordo.*

Digitized by Google

24.—ASARUM EUROPÆUM.

ASAR.—Asaro de Europa.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. —*Dósis usadas*: 12, 15.—*Duracion de accion*: hasta 15 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS: Camph. aceitum.
COMPÁRESE CON: Acon. hep. puls. sep. stram.

CLINICA.—Estudiando los síntomas se verá si se puede consultar este medicamento contra algunos casos de:—Jaqueca; Oftalmía; *Afecciones gástricas* y biliosas; Helmintiasis; Lienteria, etc. etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Susceptibilidad excesiva de todo el sistema nervioso.—*Dolores tractivos, agudos, tirones sucesivos y traccion calambroídea, principalmente en los miembros, con vómitos y lientería despues de las operaciones.—Mucho abatimiento, principalmente despues de comer, con dejadez y aversion al trabajo.—Debilidad por la tarde y náuseas con deseo de acostarse.—*Grande agilidad de todos los miembros*; que parece vuela en lugar de andar.—Los padecimientos se disipan lavándose la cara con agua fria.—Deseo de dormir por el dia.—No se puede dormir por la tarde á causa de la excitacion de la sangre.—Sueños penosos, desagradables.—Frio, calofrios y temblores.—°Alternativa de frio y de calor quemante.—Humor triste, melancólico.—Tristeza con disposicion á llorar.—*Mucha sobreexcitacion moral.

Cabeza.—*Pesadez presiva* con tension y atontamiento de la cabeza é incapacidad para trabajar.—*Confusion de ideas.*—Vértigo, como por embriaguez al levantarse de su asiento, ó andando.—Dolores en la cabeza provocados ó agravados por el trabajo intelectual.—Traccion atolondrante, ó *presion en la cabeza*, y principalmente en las sienes, en la frente y debajo de la raiz de la nariz.—Compresion de las partes laterales de la cabeza.—*Accesos de cefalalgia en el lado izquierdo de la cabeza todos

los dias hácia las cinco de la tarde.—Pulsaciones y latidos en la cabeza, principalmente en la frente, bajándose.—Tension de la piel del cráneo con endolorimiento de los cabellos.

Ojos.—Dolores en los ojos leyendo como si separaran fuertemente los párpados.—Dolores vivos pulsativos en los ojos.—Sensacion de frio en los ojos.—*Sensacion de sequedad en los ojos, ó *sensacion de ardor y lagrimeo*, sobre todo por la tarde en su habitacion.—*Ojos inflamados con lagrimeo abundante.—*El aire frio es agradable á los ojos, mas el viento y la luz del sol son insoportables.—Fijeza de la vista.—°Ojos empañados, abatidos.—*Temblor de los párpados.*—Oscurecimiento de la vista.—Rubicundez de la conjuntiva con punzadas en los ángulos de los ojos.

Oidos.—Tension dolorosa, presiva, en el orificio del conducto auditivo.—Calor de la oreja al exterior.—*Dureza de oido, como por obstruccion ó estrechez del conducto auditivo.*

Boca.—Sensacion de frio en los dientes incisivos (superiores).—Calor quemante en la boca y sobre la lengua.—Contraccion en la boca, con *acumulacion de saliva fresca, y serosa.*—Acumulacion de mucosidades viscosas en la boca y en la garganta.

Estómago.—*Amargor del pan* y del tabaco.—Eructos en seco con expulsion de gases.—Hambre con sensacion de plenitud en el estómago.—*Eructos pútridos.—*Pirosis con eructos ácidos y que causan dentera.—**Náuseas* con disgusto y temblor.—Gana de vomitar, con presion en la frente y acumulacion abundante de agua en la boca.—*Vomituricion violenta*, con exacerbacion de todos los síntomas.—*Vómitos con esfuerzos violentos* y dolor en el estómago, en el epigastrio y en la cabeza, con excesiva angustia.—Sensacion como si pellizcaran en el estómago.—Presion en la region del estómago y epigastrio.—Constriccion en la region del diafragma.

Vientre.—Acumulacion de gases en el vientre, con sensacion de plenitud.—°Escozor y dolor como de herida en el bazo.—°Pinchazos en el lado izquierdo del vientre, que se extienden hasta el dorso.—Retortijones en la parte superior del vientre.—*Cólicos dolorosos con vómitos.*—Hernia inguinal.

Deposiciones.—*Deposiciones diarréicas* de mucosidades

Digitized by Google

blancas, viscosas, con *expulsion de ascárides.* — Deposiciones de color gris blanquecino, ceniciento. —°Evacuacion de una sangre negra y espesa durante la deposicion. —°Diarrea con evacuacion de materias no digeridas, principalmente despues de haber comido patatas.—°Retortijones antes de la deposicion.—Prolapsus del recto durante la deposicion.—°Despues de la deposicion, presion sobre el recto, con evacuacion de mucosidades tenaces, blancas y sanguinolentas.

Orinas.—Gana casi contínua de orinar.—Presion sobre la vejiga durante y despues de la orina.

Reglas.—°Reglas muy adelantadas y de muy larga duracion, con flujo de una sangre negra.—°A la aparicion de las reglas, violentos dolores en los lomos, que cortan la respiracion.

Pecho.—Tos excitada por un cosquilleo en la garganta, con expectoracion abundante de mucosidades.—Respiracion corta por constriccion de la garganta.—°Dificultad de la respiracion, como por sofocacion.—Presion en el pecho.—Constriccion de los pulmones.—*Lancinaciones en los pulmones*, al inspirar.—Temblores sucesivos de los músculos de la clavícula.

Tronco.—Dolores de contusion y sensacion de debilidad paralítica en los riñones, en el dorso y en los omóplatos.—*Contraccion calambroidea en el cuello y nuca.*—Calambres en los músculos del cuello, que obligan á inclinar la cabeza á un lado.—°Sudor ácido en los sobacos.

Brazos.—Dolor de luxacion en la articulacion escapular, en moviendo los brazos.—*Tirantez con sensacion de debilidad* paralítica *en las articulaciones de las manos y de los dedos.*

Piernas.—*Dolor presivo, obtuso en la articulacion coxo-femoral* y en el muslo, principalmente apoyándose sobre el pié y andando.—Calambres en los muslos.—Tirones en la rodilla y en los tendones de la corva.—°Laxitud de los muslos y de las rodillas, con marcha vacilante.—Temblores sucesivos en las pantorrillas.—°Punzadas en el empeine.

Digitized by Google

25.—ASTERIAS RUBENS.

AST.—Asteria roja, Estrella de mar. (Roth., *Mat. med.*, t. III, 246).—Observador, *Petroz.—Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.
ANTÍDOTOS?.

SINTOMAS PARTICULARES.—Aumento de los síntomas despues de medio dia, sobre todo hácia la tarde; °parece obrar favorablemente contra algunos casos de epilepsia; necesidad de respirar al aire libre, con ansiedad é impaciencia dentro de la habitacion; °*Ulceras escrofulosas*; erupcion de manchas rojas, furfuráceas, secas y circulares.

Sueño lleno de ensueños de una vivacidad extraordinaria, como si lo hubieran visto y tocaran realmente las personas con que han soñado.

Calorificacion aumentada durante todo el tiempo de la duracion de accion del medicamento; mucho deseo de lociones frias y beber frio.

Moral extraordinariamente alegre por la tarde; tristeza alternando con excitacion moral, que obliga á querer trabajar y agitarse mucho; *sensacion de angustia*, como por aprension de una desgracia; irritabilidad, cólera y deseo de reñir; gana de morder; sensibilidad moral con mucha disposicion á llorar.

Cabeza *pesada*; congestion de sangre; sensacion de plenitud y calor en la cabeza; dolores presivos en la frente; debajo del ojo izquierdo, dolor delirante que obliga á fruncir las cejas; en el vértice, sensacion como si le apretaran, sobre todo durante un esfuerzo intelectual; sensacion en la coronilla de la cabeza, como si el cráneo se abriera ó aplastara la cabeza; al fin del dia, los dolores de cabeza aumentan y obligan á acostarse; endolorimiento de toda la caja huesosa del cráneo.

Ojos fácilmente fatigados por la luz; ojos estirados hácia atrás. En los **oidos**, ruido como de oleadas, con el oido obtuso.

Nariz.—Epistaxis, con algunas interrupciones.

Lengua hinchada, entorpecimiento de la lengua y repugnancia para hablar; saliva muy abundante; sensacion de irritacion y sequedad en la garganta.

Apetito solo de cosas picantes, los manjares con especias, los licores, el café, el té, el queso añejo, etc.

Vientre alternativamente hinchado y disminuido de volúmen; cólicos con calofrios y bocanadas de calor, ó seguidos de diarrea.

Deposiciones difíciles; estreñimiento; deposicion líquida que se expele con violencia; *flujo hemorroidal* (durante dos dias).

Orinas muy abundantes y frecuentes: orina espesa, viscosa.—*Apetito venéreo exaltado*, mortificacion de ideas por deseos sexuales.

Menstruacion con retardo; sensacion de presion sobre los órganos inferiores del vientre; sensacion de angustia en la matriz, como por alguna cosa que quiere echar fuera; dolores tractivos en los pechos; °*parece obrar favorablemente contra las afecciones escirrosas y cancerosas*, sobre todo de la mama izquierda.

En la region del **corazon**, ansiedad causada por palpitaciones ondulosas en el pecho; sensacion de plenitud en el pecho, que hace temer el síncope; palpitaciones frecuentes; palpitaciones de corazon poco perceptibles y sordas, como si el corazon hubiera dejado de latir.

Extremidades inferiores débiles, con disminucion de la sensibilidad; °*parálisis incompleta de los miembros inferiores mejorada; dolor lancinante*, como el de la gota, en los dedos pulgares, con calor y encogimiento de la piel, aumento por el calor y sensibilidad excesiva al menor contacto.

26.—AURUM FOLIATUM.

AUR.—Oro metálico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 3, 9, 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos.

ANTÍDOTOS: Bell. chin. cupr. merc.—*Se emplea como antídoto de*: Merc. spig.

COMPÁRESE CON: Asa. bell. crin. cupr. *merc.* ni r-ac. puls. spig.—Sobre todo, despues del uso de *bell. chin. puls.* es cuando el oro conviene con frecuencia, siempre que se halle indicado.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—*Ictericia*, *padecimientos mercuriales* (y sifilíticos); Convulsiones y espasmos histéricos; Gota nudosa?;

Digitized by Google

Afecciones escrofulosas; Afecciones hidrópicas?; *Inflamaciones y cáries de los huesos, principalmente por el abuso del mercurio*; Ragades; *Melancolia religiosa*; *Hipocondria*; Histerismo; Dolores de cabeza histéricos; Fatiga de la cabeza por trabajos intelectuales; *Jaqueca*; *Exóstosis en el cráneo*; *Oftalmias;* Abscesos y fístula lagrimal; Manchas de la córnea? Ambliopia amaurótica; Otorrea por cáries de los huesos del conducto auditivo; *Ocena* con cáries de los huesos de la nariz; Afeccion carcinomatosa de la nariz.—*Hinchazon y ulceracion de la nariz* y de los labios, principalmente en los sujetos escrofulosos; Prosopalgia inflamatoria por el abuso del mercurio; Ulceracion y cáries del paladar; Odontalgia congestiva; Enfermedades de las encías, Granos de mala naturaleza en los labios; Gastritis y Gastralgia; Enteritis y Enteralgia; Hepatitis; *Induracion del hígado*; Afecciones hemorroidales; *Infarto de la próstata*; Enfermedades del útero; Vaginitis; Hernia de los niños; Iscuria; Orquitis; Induracion de los testículos; Prolapsus ó induracion de la matriz; Asma congestivo; Hidrotorax y afecciones orgánicas del corazon, principalmente las que son producidas por el abuso del mercurio, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores de contusion con tirones agudos* y debilidad paralítica de los miembros en general, y principalmente en las articulaciones, sobre todo en descubriendo la parte afecta, por la mañana al despertarse, y con el reposo, disipándose cuando se levanta.—Dolores lancinantes en los miembros con grande abatimiento.—°*Inflamacion de los huesos* con dolores nocturnos.—*Exóstosis en la cabeza, en los brazos y en las piernas.—Mucha perspicacia y finura de las sensaciones con *sensibilidad excesiva al menor dolor.—Espasmos histéricos*, con lloros y risas alternativas algunas veces.—*Excesiva sensibilidad al frio*, ó grande deseo de salir al aire libre, porque se alivia, aunque haga mal tiempo.

Sueño.—Deseo de dormir despues de la comida.—Somnolencia contínua.—Sueño nocturno solo hasta las 4 de la mañana.—*Por la mañana en despertándose, fatiga y debilidad.*—Sueño inquieto, *sueños angustiosos*, penosos que fatigan.—Desvaríos nocturnos en forma de preguntas.

Fiebre.—*Calofrios febriles por todo el cuerpo, por la noche en la cama*; que no son seguidos de calor ni de sed.—*Frio por todo el cuerpo con color azulado de las uñas*, gusto nauseabundo y gana de vomitar, seguido algunas veces de un aumento de calor.—Calor de la cara con frio de las manos y de los piés.—Sudor fuerte general por la mañana temprano.

Moral.—**Melancolia con inquietud* y deseo de la muerte.—Deseo de la soledad.—*Deseo irresistible de llorar*.—Deseo de volver á ver los suyos como una especie de nostalgia.—Necesidad de cambiar de sitio, de ir y de venir.—**Mucha angustia que conduce hasta el suicidio*, con contraccion calambroídea en el abdómen.—Escrúpulos excesivos de conciencia.—*Desconfianza de si mismo y de otros*.—Mal humor y aversion á la conversacion.—Humor gruñon, querelloso.—*Cólera é ira*.—Alternativa de alegría, de irritabilidad y de *melancolia*.—°Humor hipocondríaco.—Debilidad de las facultades intelectuales.—*Debilidad de la memoria*.—Exaltacion religiosa.

Cabeza.—**Fatiga de la cabeza por trabajos intelectuales*.—Aturdimiento repentino con pérdida de los sentidos.—Violentos aturdimientos en bajándose.—Jaqueca tres ó cuatro dias, con latidos y pulsaciones en un lado de la frente, náuseas y vómito de bilis.—**Dolor de contusion en el cerebro*, sobre todo por la mañana, ó durante *un trabajo intelectual*, llegando algunas veces hasta hacer confusas las ideas.—*Dolor en la cabeza, como si el aire traspasara el cerebro, no teniéndola muy caliente.—Sensacion de ardor en toda la cabeza, mas fuerte en el occipucio.—Dolores tractivos, agudos en la cabeza.—Dolor batiente y martillante en un solo lado de la cabeza.—**Congestion de sangre á la cabeza*.—*Zumbido en la cabeza.—*Dolor osteócopo en el cráneo*, sobre todo estando acostado.—*Exóstosis en la cabeza.—Alopecia.—Erupcion de pequeños granos blancos en toda la piel del cráneo, *con calor* y prurito.—Excesiva y contínua sensacion de ardor en lo alto de la cabeza.

Ojos.—Dolor en los ojos agravados por el tacto, como si el globo del ojo estuviera apretado por dentro.—*Tension en los ojos* con disminucion de la vista.—Dolor quemante y rubicundez en los ojos.—*Oscurecimiento de la vista.—Manchas negras delante de los ojos.—*Ojos muy promi-*

Digitized by Google

nentes.—*Sensacion de ardor, punzadas*, estirones y *prurito* en los párpados y dentro del ángulo interno de los ojos. —Rubicundez de la esclerótica.—Rubicundez de los párpados á la aproximacion de las reglas.—Aglutinacion de los párpados por la mañana.—Ulceracion de los párpados, con gran dificultad de separarlos por la mañana. —Sensacion contínua como si tuviera arena dentro de los ojos.—Lagrimeo contínuo.—Llamas y chispas delante de los ojos.—Hemiopia; se ven los objetos cortados en línea horizontal.

Oidos.—Dolor en los oidos, como por una tension interior.—Sensacion de ardor, picazon, prurito y resudacion detrás de las orejas.—Sensacion de ardor y latidos dentro de los oidos.—*Cáries de las apófisis mastóides.*—°Otorrea purulenta y fétida.—**Dureza de oido* °por hipertrofia de las amígdalas con impedimento de la palabra.—**Zumbido en los oidos*, silbido y ruido de campanas.—Hinchazon de las parótidas.

Nariz.—Dolor osteócopo de la nariz al tacto.—Picotazos corrosivos en la nariz; prurito y sensacion de ardor en el exterior.—Granos muy encendidos sobre la nariz.—*Hinchazon inflamatoria y rubicundez en la nariz*, seguida de descamacion.—Manchas oscuras, de un encarnado oscuro sobre la nariz.—**Cáries de los huesos de la nariz.* —**Fosas nasales ulceradas y cubiertas de costras espesas.*— **Flujo por la nariz de un pus fétido, amarillo-verdoso.*— *Obturacion de la nariz.—*Coriza fluente*, espeso, como clara de huevo.—Estornudos frecuentes.—Descamacion furfurácea de la epidérmis de la nariz.—Exaltacion ó *falta del olfato*.—Olor insípido, pútrido ó de aguardiente. —Prurito, sensacion de ardor, latidos y escozor en la nariz.

Cara.—Cara tumefacta, lustrosa como por el sudor.—Encendimiento de la cara.—La cara está cubierta de manchas rojas y violadas.—Cara abultada.—°Inflamacion de los huesos de la cara.—*Entumescencia de la mejilla.— Inflamacion de los huesos de la frente, de la mandíbula superior y de la nariz.—**Erupcion roja*, °que se descama, en la frente y en la nariz.—Granos muy gruesos encarnados en la cara.—Traccion en las mandíbulas con tumefaccion de las mejillas.—°Dolor tensivo en la mandíbula superior.—Granos en los labios, con sensacion

Digitized by Google

de ardor, latidos, picazon y mucho prurito.—*Infarto doloroso de las glándulas submaxilares.

Dientes.—Odontalgia con calor y congestion en la cabeza.—Vacilacion de los dientes.—*Ulceras en las encías con tumefaccion de las mejillas.—Encías de un color encarnado muy subido, hinchadas y sangrando fácilmente.

Boca.—*Olor fétido de la boca*, como de queso rancio.—Calor, escozor y aftas en la boca.—Mortificacion para comer.—(Salivacion abundante).—Dolor terebrante en el velo del paladar.—°Cáries en el paladar con úlceras de color azulado.—**Amigdalas hinchadas* °y ulceradas.—Salida de lo que se bebe por las ventanillas nasales.—Prurito, punzadas, sensacion de ardor, estirones y arañamiento en la garganta.

Apetito.—Gusto lechoso ó dulzaino.—Repugnancia á los alimentos y sobre todo á la carne.—Gran deseo de café.—*Hambre y *sed excesivas*; deseo de bebidas frias, ó bien alcohólicas.—Gana de vomitar despues de haber comido, ó comiendo.—Hipo.—Eructos acuosos.

Estómago.—Dolor de estómago, como por hambre.—Sensacion de un malestar indecible en el epigastrio.—Hinchazon en el epigastrio é hipocondrios, con dolores lancinantes al tacto.—Sensacion de ardor, estirones y dolores cortantes en el estómago.—Sofocacion inmediatamente despues de la comida.

Vientre.—Cólicos con sensacion de un gran malestar en el vientre y necesidad de deponer.—Presion tensiva y plenitud en el vientre.—Vientre timpanítico.—Exóstosis en el bacinete.—*Disposicion de las hernias á salir, algunas veces con dolores calambroídeos y encarcelacion de gases.—*Cólicos ventosos nocturnos*, con pinchazos, ruidos y borborigmos.—*Emision frecuente de gases* muy fétidos.—Calor y estirones en el vientre.—Sensibilidad del vientre al tacto.—Peso sobre el púbis.—Dolor de tension en el vientre durante y antes de las deposiciones.—Sensacion de ardor y dolores cortantes en el hipocondrio derecho.—Punto fijo doloroso en el hipocondrio izquierdo.—Calor y sensibilidad en el hipogastrio.—Dolor cortante, calor y picazon en las ingles.—°Salida de las hernias inguinales.

Deposiciones.—**Deposiciones copiosas.*—**Diarrea nocturna.*—Diarrea dia y noche; deposiciones de un color ver-

Digitized by Google

doso.—Sensacion de ardor y dolores con estirones agudos en el ano.—Deposiciones nocturnas, diarreas de un amarillo padusco.—Hemorróides externos, con derramamiento de sangre durante las deposiciones.—Calores y dolores sordos en el periné.

Orinas.—°*Retencion dolorosa de las orinas*, con conato forzoso de orinar y presion sobre la vejiga.—Emision frecuente de orinas acuosas.—Orina turbia, como de suero, con sedimento mucoso, espeso.—Orinas raras, amarillentas, en pequeña cantidad.—Orinas encendidas, muy calientes, que contienen arenas.—Orinas espesas, de un olor fuerte amoniacal, y que se descomponen prontamente.—Disminucion considerable de las orinas.—Dolores al orinar.—Necesidad contínua de orinar.—Sensacion de ardor, estiron y escozor en la uretra.

Partes viriles.—Apetito venéreo muy exaltado.—Todo el sistema genital está fuertemente atacado.—*Erecciones* y *poluciones nocturnas*.—Erecciones dolorosas.—Poluciones prostáticas con flacidez del miembro.—*Hinchazon de los testículos*, con dolor presivo al tacto y al roce.—Induracion de los testículos.—Resudacion alrededor del glande.

Reglas.—Dolores en el vientre, como si las reglas quisieran presentarse.—Retardo de las reglas.—Leucorrea blanca espesa.—Sensacion de ardor y picazon en la vagina.—°Prolapsus é induracion de la matriz.—Color encendido é hinchazon de los grandes labios.—Calor, picazon y escozor en la vulva.

Laringe.—Acumulacion de mucosidades en la tráquea-arteria y en el pecho, que por la mañana se expectoran difícilmente.—°Voz nasal.—Tos por falta de respiracion, por la noche.—Tos frecuente, fuerte y aguda; pequeña tos seca, rara; tos ruidosa, durante la noche.—(Tos por la mañana en la cama, con expectoracion difícil de materia amarilla, tenaz).

Pecho.—*Mucha dificultad en la respiracion*, por la noche y andando al aire libre, con necesidad de respirar profundamente.—°Accesos de sofocacion, con opresion constrictiva del pecho, caida, pérdida de los sentidos y color azulado de la cara.—Dolor como si hubiera una clavija colocada bajo las costillas.—Presion permanente en el lado izquierdo del pecho.—Dolor incisivo y punzadas

Digitized by Google

obtusas cerca del esternon.—°Fuerte congestion en el pecho.—*Palpitaciones de corazon irregulares*, ó por accesos, algunas veces *con angustia* y opresion de pecho.—Sensacion de ardor y punzadas en el pecho.—Accesos de sofocacion con compresion de pecho.—Calor y prurito al corazon; palpitaciones por la noche ó cuando se está acostado de espalda.—Estirones y dolores cortantes en el corazon.—Conmocion del corazon al andar, como si este estuviera caido.

Tronco.—Dolores generalmente presivos ó tractivos agudos en el dorso, principalmente por la mañana y á veces tan violentos que tiene que permanecer inmóvil.—Infarto inflamatorio en los sobacos.—Mortificacion para volver el cuello, como por tortícolis.—Calor en los sobacos, dolor de rotura y calor en los riñones; sensacion de ardor desde los riñones hasta la vejiga.

Brazos.—Dolores presivos en los brazos y antebrazos.—Dolores calambroídeos y tractivos agudos en los huesos del carpo y del metacarpo.—*Dolores tractivos agudos*, con debilidad paralítica, en los huesos y en *las articulaciones de los dedos*.—Sensacion de ardor, punzadas, comezon y cansancio en los brazos.

Piernas.—Dolores vivos en los músculos, sobre todo por mañana y tarde.—Debilidad paralítica y dolorosa en las rodillas, como si hubiera una ligadura apretada por debajo; están débiles y se doblan.—Dolores tractivos y tirones agudos, con debilidad paralítica, *en los huesos y en las articulaciones de los dedos*.—Entumescencia de los piés.—Rubicundez y entumecimiento de los dedos de los piés.

27.—AURUM MURIATICUM.

AUR-M.—Muriato de oro.—*Journ. de méd. homœop.* del doctor Molin.—*Hist. nat y prep.* Farmacopea homeop.

CONSEJOS CLINICOS.—Los casos para los cuales se podrá consultar este medicamento son: Hipocondría; Afecciones hidrópicas; Coriza; Eczema; Acné rosa; Lupus de las alas de la nariz; Granos cancerosos en los labios; Rubicundez é hinchazon de los párpados; Oftalmía aguda; Oftalmías escrofulosas; Cáries de los huesos de la nariz;

Digitized by Google

Hinchazon de los labios; Inflamacion de las encías; Gastritis; Gastralgia; Afecciones crónicas del hígado; Hinchazon escrofulosa de las glándulas del mesenterio; Metritis; Leucorrea; Hemorróides; Flujo hemorroidal; Vaginitis; Hinchazon de los testículos; Catarro pulmonar; Irritacion crónica de las vías respiratorias; Enfermedades del corazon; Enfermedades de los huesos; Cáries; Afecciones mercuriales; Laringitis crónica en las personas sifilíticas, ó despues del abuso del mercurio.

Este medicamento remedia los malos resultados debidos á una pesadumbre.

Sueño.—Ganas de dormir durante el dia y aun trabajando; insomnio por la noche; ensueños penosos; despierta con sobresalto.

Moral.—Tristeza; lloros frecuentes.—Pereza, disgusto á toda clase de trabajo.—Alegría excesiva, indiferencia.—Carácter caprichoso.—Displicencia, contrariedad sin motivo.—Disgusto de la vida, tendencia al suicidio.

Cabeza.—*Sensacion de ardor* en la frente.—(Sensacion de ardor quemante casi contínuo en toda la cabeza, pero mas fuerte en el lado izquierdo, tirones en el mismo lado; por instantes la cabeza se pone como insensible). Aturdimientos frecuentes.—Sensacion de frescura en lo mas alto de la cabeza; latidos en el lado izquierdo de la frente; cabeza torpe, pesada; la cabeza se mueve á menudo.—*Sensacion de ardor* y punzadas en la parte posterior de la cabeza.—Dolores tirantes y prurito con cosquilleo en la frente.

Ojos.—Rubicundez é hinchazon de los párpados; *Sensacion de ardor*, punzadas, sensacion de picoteo y escozor en los párpados; aglutinacion de los párpados por la mañana; lagrimeo; (rubicundez de la esclerótica con calor quemante y sensacion de picoteo); *Sensacion de ardor*, de picoteo, comezon en los ojos; dificultad de tenerlos cerrados; dolor dislacerante en el lado izquierdo.

Oidos.—Costras detrás de las orejas; *Sensacion de ardor* y prurito detrás de las orejas, sobre todo por la noche.—Zumbido en los oidos, seguido de sordera, como si lo interior estuviese ensanchado y vacío.

Nariz.—Rubicundez é hinchazon de la nariz; *Sensacion de ardor y prurito en la nariz*; coriza amarilla, espesa; cos-

tras en la nariz, necesidad contínua de meterse los dedos en la nariz.—Derrame acuoso, que irrita fuertemente el labio con muy mal olor.—**Rubicundez é inflamacion de la nariz con prurito* y descamacion; *hinchazon roja con ulceracion de las ventanillas nasales;* costras secas, amarillentas y sensacion de obturacion en la nariz.—°Ocena con *derrame de pus amarillo* y mucosidad de sangre.

Cara.—Cara encendida.—Cara pálida jaspeada de rojo.—Hinchazon de los labios, *sensacion de ardor* y prurito en los labios.—Boca pastosa, con mal olor.—°*Labios ulcerados é hinchados.*—Dolores estremecientes en los dientes.

Boca.—Aftas en toda la boca; *sensacion de ardor*, prurito y escozor en la boca.—Rubicundez é hinchazon de las encías, sobre todo durante la noche.—Granos en los labios; los que vienen acompañados de escozor y comezon.—Sed; inapetencia.

Garganta.—Picor y comezon en la garganta; dificultad de tragar.—Infarto doloroso de las glándulas sub-maxilares.

Estómago.—Malestar y peso en el estómago despues de haber comido.—Ganas de vomitar despues de comer.—Eructos con gusto pútrido.—*Sensacion de ardor*, punzadas y dolores roedores y cortantes en el estómago.—Digestiones de larga duracion.—Bostezos frecuentes despues de haber comido.

Vientre.—Sensibilidad del vientre al tacto.—Cólicos sordos.—Estirones en todo el vientre.—*Sensacion de ardor* en el hipocondrio derecho.—*Calor* y sensacion de picoteo en el hipogastrio.—Dolor en el hipocondrio izquierdo, como si se hubiera corrido mucho.—Sofocacion, por poco que apreten los vestidos.—Sensacion contínua de disgusto en el hipocondrio derecho.—Rubicundez, calor, prurito y escozor en el ombligo.—Erupciones de pequeños granos encarnados encima del púbis.—*Hinchazon* del vientre y timpanitis.

Deposiciones.—Diarrea, sobre todo por la noche; deposiciones parduscas blanquecinas.—Homorróides, con derrame de sangre cuando se va á defecar.

Orinas.—(Orinas muy frecuentes).—Orinas poco abundantes; orinas de un color subido, espesas y que contienen arenas.—*Sensacion de ardor* y escozor en el canal de la uretra al orinar.

Partes genitales.—Humedad contínua en la vulva; rubicundez é hinchazon de los labios.—*Sensacion de ardor* y prurito en la vulva; sensibilidad excesiva del mismo órgano; fuerte y contínuo escozor en la misma; *calor* y prurito en la vagina.—Hinchazon y tension en los testículos.—Estirones á lo largo de los cordones espermáticos.—*Calor* y comezon en el canal de la uretra.—Leucorrea de un amarillo claro líquido, sobre todo por la mañana.—Algunos dias antes de las reglas, aparicion de gruesos granos rojos en los grandes labios.—Rigidez en las ingles.

Laringe.—Tos chillona, frecuente; tos frecuente, sobre todo por la noche; tosecilla seca por accesos, especialmente por la noche, seguida de calor en la garganta.—Tos fuerte, frecuente, con expectoracion blanca mezclada de algunos filetes de sangre; tos contínua, crasa, con expectoracion amarilla espesa.—Palabra difícil; voz ronca, chillona.—Sensacion de obturacion en la laringe, con disnea.

Pecho.—Respiracion penosa.—Dolor en el lado izquierdo del pecho (este dolor es semejante á un dolor pungitivo muy circunscrito, cambia de sitio y no es contínuo).—Palpitaciones, tirones y dolores cortantes en el corazon; *sensacion de ardor* y comezon en el corazon.—Sofocacion por la noche.—Punzadas en la region superior del corazon.

Tronco.—Sensacion de picoteo en los riñones; fatiga dolorosa en los mismos.—*Sensacion de ardor* y de picoteo, dolores cortantes y rigidez en el dorso.

Extremidades superiores.—*Sensacion de ardor* y punzadas en los brazos y antebrazos; rigidez en los brazos; sensacion penosa en las espaldas y brazos.—*Sensacion de ardor* y prurito en las manos; dificultad de cerrar las manos; rigidez de las articulaciones de los dedos; sacudidas involuntarias de los brazos.—Movimientos convulsivos en los brazos.—Hinchazon de la muñeca, con tension al volver la mano y punzadas al coger algun objeto.—Dislaceracion en el dedo de enmedio despues de la comida.

Extremidades inferiores.—Clavo ó forúnculo en las nalgas y muslos; rigidez en los muslos y piernas; hinchazon de las rodillas; calor, sensacion de picoteo y pun-

zadas en las rodillas; entumescencia de los piés.—Ardor quemante en los piés; dolores cortantes en los dedos gordos; al andar; rubicundez de los dedos gruesos; color subido é hinchazon de los mismos, con *sensacion de ardor*, punzadas y dificultad de poner los piés en el suelo.

28.—AURUM SULFURICUM.

AUR-SULF.—Sulfato de oro.—*Journal* del doctor Molin.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.

CONSEJOS CLINICOS, ó casos contra los que se podrá consultar este medicamento:—La hipocondría, las neuralgias faciales y dentarias, oftalmías, inflamaciones agudas ó crónicas de la nariz, las enfermedades de la boca, acné rosa, la erisipela, las enfermedades de los labios, las del tubo digestivo, las afecciones hemorroidales, la incontinencia de orina, las afecciones del útero y demás órganos dependientes de este, la clorosis, las enfermedades del corazon, las afecciones de las mamas, paperas, catarro pulmonar, el infarto de los testículos, sea agudo ó crónico, las enfermedades de los huesos, las afecciones escrofulosas, consecuencias del abuso del mercurio; remedia igualmente las indisposiciones causadas por la tristeza, así como las otras dos preparaciones de oro.

SINTOMAS.—**Sueño.**—Somnolencia durante el dia, con insomnio por la noche; agitacion nocturna; sueños penosos, espantosos; sueños de ladrones, de asesinos, etc.

Moral.—Deseo de la soledad; carácter sombrío, receloso, mal intencionado; humor desagradable, impolítico, (lloros contínuos); tristeza, disgusto de la vida.

Cabeza.—Sensacion de ardor y escozor en la piel del cráneo; fuerte comezon en la cabeza, sobre todo por la noche; afluencia contínua de sangre á la cabeza; atolondramiento; caida de los cabellos; la cabeza está contínuamente trastornada; *punzadas* en la parte posterior de la cabeza.

Ojos.—Rubicundez de los párpados; *punzadas*, pinchazos y prurito en los párpados, los cuales están pegados por

Digitized by Google

la mañana; (ulceracion en los párpados); la luz hace daño; orzuelo hácia el ángulo externo del ojo; latidos dentro de los ojos.—Caida de las pestañas.—Ojos brillantes.

Oidos.—Sensacion de ardor y *punzadas* en los oidos.—(Zumbido contínuo en los oidos).—Dolores cortantes y profundos en los oidos.—Dureza de oido.

Nariz.—Rubicundez é hinchazon de la nariz; *punzadas* y comezon en la nariz; (herpes en las alas de la nariz); coriza seco; estornudos frecuentes; costras dentro de la nariz; viva sensibilidad de la nariz al menor contacto; palpitaciones y dolores agudos en la nariz.

Cara.—Granos muy encarnados en la cara; cara cubierta de manchas rojas; palidez de la cara; prurito; (cara retraida).

Boca.—Aftas solo en la parte interna de los carrillos, con escozor y *punzadas;* rubicundez, desangramiento é hinchazon de las encías; granos en los labios, con calor y punzadas muy pequeñas; lengua y encías descoloridas; sed viva; inapetencia; labios resquebrajados; *punzadas*, estirones y dolores agudos en los dientes; sensacion de adormecimiento en los dientes; dolores sordos que parten de las muelas superiores, subiendo hasta la cabeza y volviendo á descender á los dientes.

Garganta.—*Punzadas* y estirones en la garganta; dificultad de tragar.

Estómago.—Náuseas.—Deseo de vomitar poco tiempo despues de haber comido.—Hipo frecuente.—Eructos acuosos, sin gusto.—Digestiones excesivamente largas; eructos acuosos que tienen el gusto de los alimentos.—Calor y *punzadas* en el estómago.

Vientre.—Hinchazon del vientre y sensibilidad al tacto; sensacion como de una bola que rueda dentro del vientre.—*Punzadas* en diferentes puntos del vientre hácia la cintura.—Sensacion como si alguna cosa se rasgase dentro del vientre.—*Punzadas* y estremecimientos en el hipocondrio derecho.—Dolores sordos en el hipogastrio.—*Punzadas* en el hipogastrio.—Sensibilidad del útero al tacto.

Deposiciones.—Estreñimiento.—Deposiciones semejantes á excremento de conejo.—*Punzadas*, estremecimientos, dislaceracion, prurito y dolores agudos en el ano.

Orinas.—Orinas amarillas, espesas, ó encarnadas y arenosas.—Incontinencia de orina por la noche.

Partes genitales.—Calor, escozor y *punzadas* en el miembro; resudacion en la vulva y alrededor del glande.—Rubicundez é hinchazon de la vulva.—Calor, *punzadas* y prurito en la vulva.—Leucorrea amarillenta, espesa, fluyendo sobre todo por la mañana.—Hinchazon dolorosa de los testículos.—Supresion de las reglas.—Ménstruos irregulares; unas veces se adelantan y otras se atrasan.—Impotencia.—Erecciones frecuentes, con deseo del cóito, pero cesando en seguida.—Pesadez sobre las partes genitales en las mujeres; cuando están en pié parece que quiere salir del cuerpo alguna cosa.—Cansancio sumo, sufrimiento del corazon; náuseas en la época de la aparicion de las reglas.

Laringe.—Tos seca.—Tos chillona por accesos durante la noche.—Tos fuerte, con expectoracion de un poco de sangre pura.—Tos húmeda con expectoracion amarillenta.—Ronquera.—Tos húmeda, frecuente, sobre todo cuando hace mal tiempo.—Tos húmeda de dia y noche, con expectoracion amarillenta de un gusto insípido.

Pecho.—Respiracion penosa.—Punzadas y comezon en las clavículas.—Palpitaciones al subir, al correr, y despues de todos los movimientos violentos.—*Punzadas* en el corazon.—Dolores sordos en el corazon.—Sofocacion por la noche.

Tronco.—Dolores en las parótidas.—Dolores al volver el cuello.—*Punzadas*, pinchazon y calor en los riñones.—Sensacion como de rotura de los riñones.—Dolores cortantes y sensacion de ardor en el dorso.—Sensacion de dislaceracion á lo largo de la espina dorsal.—Hinchazon de la glándula tiróides.—Hinchazon de los pechos, los que están muy doloridos al tacto.—Resquebrajadura de los pezones.—Escozores y *punzadas* en las extremidades de los pechos.

Vientre.—Cólicos violentos.—Diarrea nocturna de materias parduscas.

Partes genitales.—Estirones á lo largo de los cordones espermáticos.

Laringe.—Afonía.

Extremidades superiores.—*Punzadas* y dolores dislacerantes en los brazos.—Rigidez de los brazos.—Dolores

Digitized by Google

agudos en los brazos cuando se los mueve.—Rubicundez é hinchazon del dorso de la mano.

Extremidades inferiores.—Rigidez en los muslos.—*Punzadas* en las piernas.—Vacilacion; al andar se levantan excesivamente las piernas, ó bien cuando se las tiende un poco.—Debilidad de las piernas.—Entumescencia de los piés.—Marcha difícil.

29.—BAPTISIA TINCTORIA.

BAPT.—Baptisia,—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Este remedio ha sido usado con buen éxito contra: *Ulceras pútridas en la garganta*, de color fusco, con aliento fétido y grande postracion.—*Difteritis* con opresion hasta la sofocacion, á causa de la congestion pulmonar.—*Disenteria*, con cólicos violentos para cada deposicion, tenesmo y evacuacion de sangre pura.—*Leucorrea*, con estilicidio acre y fétido, ulceracion del cuello de la matriz y de la vagina, y grande debilidad general.—*Tifus*, con fetidez del aliento, sudores y evacuaciones fétidas.

30.—BARYTA CARBONICA.

BARYT.—Carbonato de barita.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta muchas semanas en algunas afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. (merc. bell. dulc.)?

COMPÁRESE CON: Alum. bell. calc. cham. chin. dulc. magn. merc. natr. *sep.* sil. sulf. tart.—Es especialmente el *tart.* el que se empleará generalmente con buen éxito antes y despues de baryt. si el cuadro de síntomas de la enfermedad le indica.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede *consultar* este medicamento contra:—Debilidad física y nerviosa, y otros sufrimientos de los niños y de los viejos; *Padecimientos á consecuencia de un enfriamiento*; *Afecciones escrofulosas*; *Infarto é induracion de las glándulas*; Atrofia de los niños escrofulosos; tumores enquistados; Esteatoma; Somnolencia comatosa;

Apoplejía, principalmente en los viejos, así como en los borrachos; *Tiña*; Alopecia; Oftalmía y blefaritis de las personas escrofulosas; Prosopalgia inflamatoria; Herpes faciales; Costra láctea?; Odontalgias, principalmente las que son producidas por un enfriamiento; Anginas flegmonosas; Angina tonsilar con supuracion; *Angina á consecuencia de un enfriamiento*; Angina durante la viruela; Dispepsia; Escirro del estómago?; Catarro de las vías aéreas; Ortopnea paralítica de los viejos (despues de haber administrado tart.), etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores en las articulaciones y en los huesos largos.—Presion calambroídea, ó tirantez con debilidad paralítica, ó bien *tension* como por acortamiento de los tendones, en diferentes partes.—Dolores tractivos, agudos en los miembros con horripilacion.—Por la noche, *temblor de los músculos.—Sacudidas y estremecimientos* de algunos miembros y de todo el cuerpo por el dia.—Los síntomas se manifiestan principalmente en el lado izquierdo y cuando se está sentado; se disipan por el movimiento al aire libre.—*Infarto é induracion de las glándulas.—*Pesadez de todo el cuerpo.* —Excesivo malestar y sobreexcitacion de todos los sentidos.—Gran debilidad que no permite estar de pié.—*Necesidad de estar acostado* ó sentado.—**Debilidad intelectual*, nerviosa y física.—**Demacracion* ó °abotagamiento del cuerpo y de la cara con timpanitis.—**Mucha disposicion á resfriarse*, que ocasiona principalmente inflamacion de la garganta.

Piel.—Sensacion en diversas partes, como de *picaduras de alfileres*, *quemantes* y hormigueantes con cosquilleo.—Por la noche, comezon y hormigueo insoportable por todo el cuerpo.—*Excoriacion y exudacion* en muchas partes de la piel.—**Las lesiones de la piel se curan dificilmente*.—°Verrugas.—Panadizo.

Sueño.—Mucho deseo de dormir por el dia.—**Somnolencia soporosa dia y noche*.—Sueño nocturno, agitado con despertamiento frecuente y sueños angustiosos.—Por la noche arrebato de sangre, fuertes palpitaciones de corazon y sensacion en él, como si estuviera excoriado, con

mucha ansiedad é imposibilidad de estar acostado sobre el lado izquierdo.—*Sueño con desvarío.

Fiebre.—*Mucha disposicion á enfriarse.*—Horripilacion con la piel como carne de gallina y erizamiento de los cabellos, ó con tension en la cara.—Horripilacion que recorre el cuerpo, partiendo de la cara ó del epigastrio, seguido de un calor pasajero por todo el cuerpo.—**Sudores nocturnos.*

Moral.—°Humor lloroso.—*Repugnancia á las personas extrañas y á la sociedad.*—*Inquietud ansiosa por sus quehaceres domésticos.—Espíritu escrupuloso, irresoluto, sospechoso, con desconfianza de sí mismo.—Miedo y poltronería.—Aversion al juego (en los niños).—Accesos repentinos de cólera por bagatelas.—*Actividad incesante.* —**Gran debilidad de la memoria, olvidando fácilmente.* —*Los niños descuidan los estudios.

Cabeza.—**Vértigo con náuseas* ¯y dolor en la cabeza *al bajarse.—Dolores presivos en la cabeza, principalmente en la frente, **encima de los ojos* y la raiz de la nariz, ó con tension en el occipucio cerca de la nuca.—Dolores lancinantes en la cabeza, sobre todo al calor de la estufa. —Sensacion como si escarbaran y vacilacion en el cerebro.—Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo.— °Disposicion á acatarrarse.—Comezon y corrosion en la ¯piel del cráneo.—**Erupciones* °y costras húmedas ó secas en la cabeza.—Tension en la piel del cráneo y caida de los cabellos.—°*Calvicie.*

Ojos.—**Presion y dolor quemante en los ojos*, sobre todo fatigándose la vista.—*Inflamacion del globo del ojo y los párpados, con dolor de excoriacion, sensacion de sequedad y fotofobia.—Hinchazon de los ojos por la mañana. —**Aglutinacion de los párpados.*—°Turbacion de la vista que impide leer.—Puntos que revolotean y manchas negras delante de los ojos.—Chispas delante de los ojos en la oscuridad.—°Ofuscacion de la vista, por la luz.

Oidos.—Comezon en las orejas.—Pulsacion nocturna en los oidos estando acostado sobre ellos.—**Erupcion delante y detrás de las orejas.*—Parótidas hinchadas, dolorosas.—Dureza de oido.—*Tintineo y *ruido confuso en los oidos.*—*Crujido en los oidos deglutiendo*, estornudando y andando de prisa.

Nariz.—*Epistaxis*, sobre todo despues de sonarse.—°Cos-

Digitized by Google

tras encima de la nariz.—Olfato muy fino.—°*Coriza fluente* con secrecion abundante de mucosidades espesas.—*Sequedad penosa en la nariz.

Cara.—*Color rojo oscuro de la cara*, con labios encendidos y fuerte arrebato de sangre.—Sensacion de hinchazon y *tension en la cara*, como si estuviera cubierta de telas de araña.—*Dolores en la cara *con hinchazon tensiva*.—**Erupcion en la cara*.—Labios secos, hendidos.—Apretando las mandíbulas, dolor agudo en la articulacion.—**Hinchazon de las glándulas submaxilares y del labio superior*.

Dientes.—Dolores en los dientes solamente por la noche en la cama.—Tirones, latidos y *sacudidas en los dientes, ¯irradiando hasta el oido y la sien.—*Punzadas quemantes en los dientes cariados, °excitados por el contacto de alguna cosa caliente.—°*Dolores de dientes antes de las reglas*, con *hinchazon* de un rojo pálido en las *encías* y mejillas.—Hemorragia en los dientes y las encías.

Boca.—*Sequedad de la boca*.—Acumulacion de saliva en la boca.—Mal olor de la boca.—Vesículas inflamadas en la boca y sobre la lengua.—*Grietas en la lengua*, con dolor quemante de excoriacion.

Garganta.—**Afecciones en la garganta con hinchazon* del paladar y *de las amigdalas* con supuracion.—*Sensacion como si hubiera un tapon en la faringe*.—Opresion y contraccion en la garganta.—*Punzadas y dolor de excoriacion en la garganta, sobre todo durante la deglucion*.

Apetito.—*Gusto desagradable* ó amargo, generalmente *por la mañana*, con lengua fuertemente cargada.—*Gusto ágrio*, sobre todo *antes* y no despues de la comida.—Sed contínua.—*Apetito* débil y pronta saciedad, *aunque los alimentos sean agradables al gusto*.—*Despues de comer *dolores en el estómago*, malestar, pereza y disgusto para el trabajo.—**Debilidad de la digestion*.—Mucha gana de comer.

Estómago.—*Eructos despues de comer.—Eructos frecuentes en seco ó *ágrios.—*Evacuacion pituitosa del estómago.—Vómitos mucosos.—*Náuseas, principalmente por la mañana en ayunas, y algunas veces como á consecuencia de una indigestion.—**Dolores en el estómago*, en ayunas, *despues de comer*, y apoyándose sobre el epigastrio.—Sensibilidad y dolor en el epigastrio á cada paso

que se da.—*Pesadez, plenitud y *presion en el estómago* y en el epigastrio por poco que se coma.—**Dolor de excoriacion en la region del estómago*, con sensacion en comiendo, como si las partes por donde pasan los alimentos estuvieran excoriadas.

Vientre.—Dolores de vientre aliviados por los eructos ó por el calor exterior.—Tension y timpanitis dolorosa del vientre.—Cólicos con retraccion del ombligo.—Pinchazos y *retortijones de vientre* con gana de deponer, como por una diarrea.—Acumulacion de flatuosidades en el vientre.

Deposiciones.—*Deposiciones difíciles °y nudosas, *ó duras é °insuficientes.—*Deposiciones disentéricas con deseo frecuente de deponer, sensacion de un malestar angustioso en la region lumbar*, y calofrios extendiéndose por los muslos.—*Deseo forzoso de deponer*, sin poderse contener.—Salida de ascárides.—Salida de tumores hemorroidales, con dolor lancinante.—*Comezon, sensacion de quemadura, *excoriacion y resudacion por el ano.*

Orinas.—*Deseo frecuente de orinar, con *emision abundante.*—Conato forzoso de orinar, pudiéndose apenas contener.

Partes viriles.—**Disminucion del apetito venéreo y debilidad de las funciones genitales.*—Sueño durante el cóito, sin que se efectúe la eyaculacion.—Excoriacion y resudacion entre el escroto y los muslos.

Reglas.—*Disminucion del apetito venéreo en la mujer.—Reglas muy débiles y de corta duracion.—°Leucorrea poco antes de las reglas.

Laringe.—Catarro con tos, voz profunda y baja, y coriza fluente.—*Ronquera y extincion de la voz*; por acumulacion de mucosidades viscosas en la garganta y pecho, con tos seca, principalmente por la noche, la tarde ó la mañana.

Pecho.—Dificultad de respirar y respiracion asmática, con sensacion de plenitud en el pecho.—Dolores en el pecho, aliviados en parte por los eructos, ó por el calor exterior.—Plenitud y pesadez presiva en el pecho, sobre todo al subir, con punzadas al respirar.—*Palpitaciones de corazon muy violentas.—Palpitaciones de corazon* excitadas, estando acostado sobre el lado izquierdo, ó renovadas pensando en ellas.

Digitized by Google

Tronco.—**Dolores en los riñones*, mas fuertes cuando se está sentado que durante el movimiento.—**Rigidez tensiva en los riñones*, agravada por la tarde hasta el punto de no poder levantarse del asiento ni enderezarse.—Tension en los omóplatos, la nuca y los músculos del cuello, principalmente al aire recio y frio.—Dolor quemante y *pulsacion batiente en el dorso*, sobre todo despues de emociones morales.—**Rigidez de la nuca.*—Punzadas en la nuca.—*Dolor osteócopo en la nuca.*—°Esteatoma en la nuca, con dolor quemante en el fondo.—*Infarto y dureza de las glándulas de la nuca.*—°Tumor enquistado bajo la axila.

Brazos.—Entumecimiento de los brazos con *dolor de las glándulas axilares.*—Levantando los brazos, dolor en el músculo deltóides.—*Adormecimiento del brazo, echándose sobre él.—Manos frias con manchas azuladas.—Hinchazon de las venas y rubicundez de las manos.—Manos secas como pergamino.—Temblor de la mano, escribiendo.—Hormigueo y como si royeran violentamente la palma de las manos con necesidad de rascarse.—Descamacion de la piel del dorso de la mano y de la yema de los dedos.—*Los dedos se adormecen.—*Panadizo.*

Piernas.—*Dolor de luxacion ó de rigidez de la articulacion coxo-femoral.—Tension en las piernas*, como si los tendones estuviesen muy cortos.—**Traccion y dolores agudos en las piernas*, como en los huesos.—Comezon en los muslos hasta por la noche.—Punzadas en las articulaciones de la rodilla.—Tension en la tibia y en las pantorrillas.—Calambres en las pantorrillas y en los dedos, extendiendo los miembros.—Inquietud y temblor en las piernas y en los piés.—Dolor en la articulacion del pié, como por una relajacion.—°*Sudor fétido en los piés.*—°Ulceras en los piés.—°Tumefaccion linfática, dolorosa, en la parte carnosa del dedo grueso.—Dolor igual al de un callo en la parte callosa de la planta de los piés, en particular andando.—*Callos* con punzadas quemantes y pinchazos.

31.—BARYTA MURIATICA.

BAR-M.—Muriato de Barita.—HERING.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30?

CLINICA.—Estudiando los síntomas siguientes el médico verá si puede emplear este medicamento contra uno ú otro caso de las afecciones siguientes:—*Afecciones de las glándulas*; Escrófulas; Erupciones costrosas; Gastritis; Enteritis; Diabetes?; Gonorrea crónica; Asma húmedo; Hidropesía á consecuencia de la escarlatina, etc., etc.; Blenorrea de los pulmones; Viruela y variolóides; Anginas malignas; inflamaciones artríticas de las articulaciones de las manos y de los piés.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Mucha debilidad que obliga á acostarse.—Debilidad y postracion que conduce casi hasta la parálisis.—Síncope.—Rigidez é insensibilidad del cuerpo, con convulsiones periódicas.—Pesadez general.—Temblor de los miembros.—Temblor convulsivo.—Estremecimientos en la cara, ó en algunos miembros, ó en todo el cuerpo.—Accesos periódicos de convulsiones, con sacudimientos y agitacion excesiva.

Piel.—Picotazos en la piel.—Sensacion de ardor y picotazos en los sitios excoriados.—Pequeñas erupciones sarnosas en la cabeza, en la nuca, en el abdómen y en los muslos.—Glándulas inflamadas y ulceradas.—Hemorragia.

Fiebre.—Calor seco general, de noche y de dia.—Rubicundez y calor en la cara.—Pulso frecuente y lleno.—*Fiebre terciana*.—Traspiracion aumentada.—Sudor frio.

Moral.—Mucha ansiedad con gastralgia, náuseas y vomituricion.

Cabeza.—Vértigos, como remolinos delante de los ojos.—Atontamiento y pesadez de la cabeza.—Cefalalgia con vómitos.—Erupciones muy purulentas en la piel del cráneo.—Erupciones costrosas en la cabeza y cuello.—Erupcion en la nuca.

Ojos y oidos.—Ojos fijos é inmóviles.—Pupilas dilatadas é insensibles, con la mirada fija.—Blenorrea de los ojos, de los oidos y de la nariz.—Sordera vomitando.

Cara y dientes.—Dolores tractivos en los músculos de la cara.—Nudosidad dolorosa en la punta de la nariz con ligera picazon.—Dolores lancinantes, pulsativos, en los dientes, sobre todo al despertarse, despues de media noche.—Vacilacion de los dientes.

Boca y garganta.—Hinchazon de las glándulas salivales y del paladar.—Lengua súcia.—Lengua y boca secas.—Fetidez de la boca como por el mercurio.—Gusto pútrido de la boca y de los alimentos.—Anorexia.—Sed.—Deglucion difícil.

Estómago y vientre.—*Gana de vomitar.*—Vomituricion.—Vómito por la mañana con ansiedad.—Vómito de una pequeña cantidad de agua con náuseas.—Afeccion del corazon.—Presion en el estómago, con espasmo.—Sensacion de calor ascendiendo desde el estómago hasta el pecho y la cabeza.—Dolor quemante en el estómago, con vómitos.—Las membranas del estómago tienen un color rojo azulado, con manchas rojas en la parte muscular.—*El fondo del estómago está inflamado*, con equímosis aisladas.—Malestar como por lombrices.—Dolores quemantes en el abdómen.—Tumefaccion del hígado.

Deposiciones y orinas.—Deposiciones mucosas.—Deposiciones fáciles.—Diarrea lenta sin dolores.—Orinas frecuentes, involuntarias y dolorosas.—Incontinencia.—Sedimento blanquecino en la orina.—Hinchazon de los testículos.

Partes genitales.—Emision frecuente de esperma.—Reglas muy anticipadas.—Dolor de contusion en la cavidad pelviana.

Pecho.—Catarro con calor.—Calor en la parte superior del pecho.—Opresion.—Tos.—Palpitaciones de corazon aceleradas.—Palpitaciones de corazon.—El corazon late aun despues de la muerte y durante largo tiempo.—La cavidad del corazon está llena de sangre coagulada.

Tronco y miembros.—Dolores en el dorso.—Calambres en los dedos.—Dolores tractivos en los muslos.—Tumefaccion de las manos y de los piés.

32.—BELLADONA.

BELL.—Belladona.—Hahnemann.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 12, 30.—*Duracion de accion*: 4 y 5 dias en las enfermedades agudas, y hasta 8 semanas en algunas enfermedades crónicas.

Antídotos: Coff. hyos. hep. vinum. (Contra los envenenamientos por fuertes dósis: Coffea tosta).—La aplicacion del *vinagre* agrava los padecimientos.—Tienen su antídoto en la Belladona el: *Acon. cupr. fer. hyos. merc. plat. plumb.*

Compárese con: *Acon.* agar. alum. amm. arn. ars. aur. bar. calc. *canth.* caus. *cham. chin.* cin coff. coloc. *con.* cupr. dig. *dulc.* fer. *hep. hyos. lach. merc. nitr-ac. op.* phos. *phos-ac.* plat. *plumb. puls. rhus. seneg. sep.* sil. *stram.* sulf. *valer.* Sobre todo despues de *hep. lach. merc.* y *nitr-ac.* es cuando la belladona conviene frecuentemente.—Despues de belladona conviene algunas veces: *Chin. con. dulc. hep. lach. rhus. seneg. stram. valer.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos particulares en los cuales podrá ser *consultado* este medicamento, contra:—Afecciones, principalmente en personas de constitucion *linfática* ó *pletórica* con disposicion á infartarse las glándulas ó á *inflamaciones flemonosas*; Enfermedades de los niños y de las mujeres, así como de personas de temperamento dulce, ojos azules, cabellos rubios, color rosado y piel delicada, etc., etc.; *Padecimientos á consecuencia de un enfriamiento*; Afecciones causadas por un susto, un espanto ó una incomodidad; Malos resultados por el abuso de la valeriana, del mercurio, de la camomila ó del opio; *Afecciones reumáticas* y artríticas con ó sin fiebre inflamatoria é hinchazon; *Congestiones sanguíneas*; *Infarto de las glándulas con supuracion*; *Afecciones escrofulosas* y raquíticas; Atrofia de los niños escrofulosos; Caquexia, por el abuso de la quina; Ictericia; Ergotismo; Calambres, convulsiones, tétanos, espasmos histéricos, eclampsia, epilépsia, baile de San Vito y otras *afecciones espasmódicas*; Parálisis; Afecciones escirrosas y carcinomatosas; Ulceras escrofulosas y mercuriales; Carbúnculo; Forúnculos; Sabañones; Picaduras de insectos; Pénfigo?; *Erisipelas simples y flegmonosas*; Erisipela vesiculosa (antes que rhus); *Escarlatina*; Miliar purpúrea (despues de acónito); Sarampion; Metástasis de la viruela á las membranas del cerebro; Letargo; Insomnio; *Fiebres inflamatorias* con afecciones nerviosas, gástricas, ó reumáticas; Fiebres intermitentes; Fiebres lentas; Fiebres tifoideas:

Digitized by Google

Imbecilidad, *delirium tremens*, enajenaciones mentales, melancolía, manía y otras *afecciones morales*, sea por un susto, tristeza ú otras causas; *Hidrofobia*, *Congestiones cerebrales*, *con vértigos*; Apoplejía sanguínea; *Encefalitis*, primer período; Hidrocéfalo agudo; Cefalalgia, aun la que es producida por un enfriamiento; Jaqueca; *Oftalmías*, aun en las personas escrofulosas, ó artríticas; Hemorragia ocular; Oftalmodinia; Estrabismo?; Manchas y úlceras de la córnea; Fungus medular en los ojos; Ambliopia amaurótica, aun la producida por trabajos muy delicados; Otitis; Parotitis; Dureza de oido, aun á consecuencia de un enfriamiento; Inflamacion flegmonosa de la nariz; Hemorragia nasal; Prosopalgia nerviosa; Erupciones faciales, granulosas en los niños y en los adultos; Erisipela de la cara; Costra láctea?; Induracion escirrosa de los labios; Odontalgia, principalmente en las mujeres, y sobre todo en las embarazadas; Denticion difícil de los niños; Salivacion por el abuso del mercurio; Trismus; Glositis; Balbuceo; *Anginas flegmonosas*; Anginas tonsilares, faríngea y ovular; Anorexia, dispepsia, vómitos y otras afecciones gástricas; Hipo convulsivo; Hematémesis?; Gastralgia; Hepatitis; Ictericia; Cólicos espasmódicos y flatulentos; Enteritis?; Peritonitis?; Diarrea, á consecuencia de un enfriamiento aun con vómitos; Disentería; Hemorróides; Nefritis; Metritis; Dismenorrea; Metrorragia; Prolapsus; Induracion escirrosa y afeccion carcinomatosa (?) del útero; Padecimientos á consecuencia de un aborto; Afecciones morales, odontalgia, gastralgia y cólico de las mujeres embarazadas; *Dolores espasmódicos, pero inútiles para parir*, con temor y temblor en las mujeres de una fibra fuerte; Espasmos en las mujeres paridas; Adherencia de la placenta; Tumor blanco, ninfomanía y otras afecciones de las mujeres que han parido; *Peritonitis puerperal*, principalmente la ocasionada por emociones morales, ó supresion de la leche; Fiebre láctea; Galactorrea y padecimientos producidos por el destete; *Erisipela en las mamas*, principalmente á causa del destete; Hinchazon, induracion (y cáncer?) de las glándulas mamarias; Oftalmía, gritos, convulsiones y otros padecimientos de los recien nacidos; Afecciones catarrales de las vías aéreas; Afonía; Grippe; Tos, sobre todo la nerviosa y convulsiva; Coqueluche; Crup?; Neumonía; Asma espasmódico, histérico, con-

gestivo, etc., etc.; Hemoptísis; Rigidez reumática de la nuca; Coxalgia, etc., etc.; Luxacion espontánea en los niños.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores lancinantes, ó dislacerantes, presivos en los miembros.—Dolores de contusion en las articulaciones de los huesos.—Los dolores se agravan principalmente por la *noche*, y despues de medio dia sobre las tres ó las cuatro de la tarde.—*El menor contacto* y á veces tambien el movimiento agrava los padecimientos.—Algunos de los sufrimientos se agravan ó aparecen despues de dormir.—Temblores en los miembros, palpitaciones musculares y saltos de tendones.—Sensacion en los músculos como si corriese una rata.—**Calambres, espasmos y movimientos convulsivos, y contorsion violenta de los miembros*; **accesos de convulsiones con gritos* y pérdida del conocimiento; **convulsiones epilépticas*, con °retraccion de los pulgares.—**Acceso de inmovilidad y de rigidez espasmódica del cuerpo ó de algunos miembros*, ¯á veces con insensibilidad, hinchazon de las venas, tumefaccion y rubicundez de la cara, pulso lleno y acelerado, con sudor abundante.—**Ataques de tétanos, aun con inversion de la cabeza hácia atrás.*—*Accesos de espasmos con risas involuntarias.—°Antes de los accesos de convulsiones, hormigueo con sensacion de hinchazon y de torpeza en los miembros; ó cólicos y presion en el vientre, extendiéndose hasta la cabeza; despues de los accesos, opresion en el pecho, como por una cosa pesada.—°Los accesos se renuevan por el menor contacto, así como por la mas ligera contrariedad.—Mucha inquietud en la cabeza y los miembros, principalmente en las manos.—**Temblor de los miembros* con fatiga y laxitud.—*Pesadez en los miembros, con laxitud, excesiva pereza y ¯*horror á todo movimiento y trabajo.*—*Caida de las fuerzas, debilidad paralítica y *parálisis de los miembros*.—*Parálisis ó insensibilidad de todo un lado del cuerpo.—Accesos de desvanecimiento y de síncope, con pérdida de todo sentimiento y movimiento, como en la muerte.—°Arrebato de sangre, congestion á la cabeza y fatiga hasta el punto de desvanecerse.—Sobreexcitacion

Digitized by Google

y mucha impresionabilidad de todos los órganos.—*Disposicion á resfriarse fácilmente, con mucha sensibilidad al aire frio.*—*Hormigueo en los miembros.—**Congestiones diversas, con sensacion, como si la parte afecta quisiera estallar.*

Piel.—**Hinchazon con calor y rubicundez escarlata* en todo el cuerpo, ó en *muchas partes*, principalmente de la cara, del cuello, del pecho, del vientre y de las manos.—**Inflamacion erisipelatosa*, con flemon que algunas veces pasa á la gangrena.—Gangrena y esfacelo de muchas partes.—**Placas rojas, inflamadas y manchas de escarlata sobre muchas partes del cuerpo*, algunas veces con pulso pequeño, acelerado, dificultad en la respiracion, tos violenta, delirio, memoria mas viva, necesidad de frotarse la nariz, y pupilas dilatadas.—Manchas rojas de color de sangre por todo el cuerpo, principalmente en la cara, en el cuello y en el pecho.—*Erupcion semejante al sarampion.—Erupcion de petequias, con prurito y rubicundez de todo el cuerpo.—*Vesículas que resudan abundante serosidad*, y que son tan dolorosas que obligan á gritar y gemir.—°Erupcion de pústulas de bordes blanquecinos, con escaras negras, é hinchazon edematosa de la parte enferma.—Erupcion roja, escamosa en la parte inferior del cuerpo.—Tumores y nudosidades frias y dolorosas.—Dolores de excoriacion, *sensacion de ardor* y tirantez en las úlceras, principalmente al tacto, durante el movimiento y por la noche.—**Tumefaccion roja, caliente y lustrosa de las partes enfermas.*—Las úlceras segregan un pus sanioso y sanguinolento.—**Forúnculos.*—°Sabañones.—**Infarto doloroso de las glándulas.*

Sueño.—*Deseo contínuo de dormir, algunas veces con obnubilacion de la cabeza, pandiculaciones y bostezos, y principalmente hácia la tarde.—**Accesos de coma soñoliento y letárgico*, con *sueño profundo*, inmovilidad del cuerpo, salto de tendones, cara pálida y fria, manos frias y pulso pequeño, duro y acelerado.—**Coma interrumpido por momentos de vigilia*, con *mirada furiosa*.—Despues de los accesos de coma, hambre excesiva, calor ardiente y sequedad de la boca.—Sueño comatoso por la noche, con vigilia frecuente y movimientos convulsivos.—**Insomnio nocturno*, algunas veces con deseo de dormir y esfuerzos inútiles para dormirse, generalmente *á causa de*

Digitized by Google

una angustia excesiva, ó *de una grande agitacion*.—**En durmiéndose*, *sobresaltos frecuentes*, *con espanto*, *gemidos*, *gritos*, sacudida de los miembros, carfologia, *agravacion de los dolores*, cantando, hablando, *delirios* y sueños continuos.—**Sueños angustiosos*, ¯terribles, espantosos, fuertes, agitados; sueños de incendios, de malhechores y de asesinos; sueños con meditacion.—°*Cerrando los ojos para dormirse*, *visiones espantosas y agitacion de los miembros*. —*Al despertarse*, *dolor de cabeza* °y agravacion de los padecimientos.

Fiebre.—*Frio por todo el cuerpo*, *con palidez de la cara ó frio en las extremidades*, con abotagamiento y rubicundez de la cara.—**Calofrios y horripilacion parcial*, principalmente *en el dorso* ó *en la boca del estómago*, ó *en un brazo*, y algunas veces con *calor en otras partes*, principalmente en la cabeza, ó seguido de calofrios generales.—*Los calofrios aparecen frecuentemente por la tarde, algunas veces °con náuseas, cansancio sumo y tirantez en el dorso y en los miembros, ¯picazon en el pecho y oscurecimiento de la vista.—**Accesos febriles compuestos de calofrios*, *alternando con calor*, ó de *calofrios seguidos de calor*, con *exacerbacion nocturna ó vespertina*, tipo *cotidiano*, ó doble cotidiano, ó terciana y adipsia completa, ó sed ardiente ó inextinguible.—**Calor seco*, *quemante*, frecuentemente con *hinchazon de las venas*, *pulsacion de las carótidas*, *calor*, *rubor y tumefaccion de la cara*, *sed ardiente*, agitacion, delirio furioso y calofrios por poco que se descubra.—**Pulso fuerte y acelerado*, ó *lleno y lento*, ó *pequeño y lento*, ó *pequeño y acelerado*, ó *duro y tirante*.—Sudor con calor ó despues de él; *sudor abundante por la noche*, ó por la mañana; *sudor solamente de las partes cubiertas*; sudor en durmiendo, sudores de olor empireumático, ó que coloran el lienzo de amarillo.

Moral.—*Melancolía con tristeza, humor hipocondríaco, abatimiento moral y desaliento.—**Mucha angustia* con *anhelacion continua*, *inquietud y agitacion*, principalmente *por la noche* y despues de medio dia, á veces con dolor de cabeza y rubicundez de la cara.—Deseo de morir, y tendencia al suicidio.—*Lamentos, *gemidos*, gritos y *lloros*.—°Terquedad con lloros (en los niños).—*Timidez, *carácter medroso*, *desconfiado y suspicaz*, aprension y *disposicion á escaparse*.—Miedo de una muerte próxima.—

Sobreexcitacion moral, con mucha sensibilidad á toda impresion, alegria inmoderada y disposicion á asustarse fácilmente.—*Desvarios*, *delirios y manía*, con gemidos, disposicion á bailar, *á reir*, á cantar y á silbar; *manía con gemidos, ó con *risas involuntarias*; *delirios nocturnos; *delirios con murmullos; delirios en los que se ven lobos, *perros*, delirios furibundos; de incendios, etc., delirios por accesos, y á veces con vista fija.—Gran apatía é indiferencia, deseo de la soledad, horror á la sociedad y á todo ruido.—Repugnancia para la conversacion.—Mal humor, carácter irritable, susceptible, con disposicion á enfadarse, á querellarse y ofender.—**Locura*, con chistes ridículos, gesticulaciones, actos de demencia, maneras deshonestas.—**Furor y rabia* con deseo de herir, escupir, *morder y romperlo todo*, y algunas veces con aullidos y ladridos como los de un perro.—Decaimiento y debilidad física y moral.—Horror á todo trabajo y movimiento.—**Demencia*, hasta no conocer á los suyos, *ilusiones de los sentidos y visiones espantosas*.—*Pérdida completa de la razon, estupidez, inadvertencia y distraccion, inaptitud á la meditacion y *mucha debilidad de la memoria.*

Cabeza.—Turbacion de la cabeza, *obnubilacion* y *estado como de embriaguez*, principalmente despues de haber bebido y comido, ó bien por la mañana.—**Accesos de vértigos*, *con vacilacion*, *vahidos de cabeza*, torpeza, aturdimiento, náuseas, temblor de las manos, ansiedad y centelleo en la vista, principalmente por la mañana al levantarse, ó *al enderezarse y al bajarse*.—°*Vértigos con angustia*, *caida y pérdida del conocimiento*, ¯ó con laxitud y fatiga antes y despues de los accesos.—**Estupor y pérdida del conocimiento*, °hasta el punto de no conocer á los suyos, ó cuando más, solo por el oido: algunas veces con las pupilas dilatadas, boca y ojos medio abiertos.—**Plenitud*, *pesadez y presion violenta en la cabeza*, principalmente *en la frente, encima de los ojos* y de la nariz, ó en un lado de la cabeza, *y algunas veces con aturdimiento, estupor y sensacion *como si el cráneo fuese á estallar*, ó con mal humor y gemidos, *traccion de los párpados* y necesidad de acostarse.—*Sensacion como de hinchazon y de *expansion presiva en el cerebro*.—*Dolores vivos, tractivos y *lancinantes* en la cabeza.—

Punzadas en la cabeza como por cuchillos.*—*Pulsaciones violentas en la cabeza.—Pulsacion fuerte de las arterias de la cabeza.—**Ebullicion y congestion de sangre en la cabeza*, principalmente al *bajarse.*—*Sensacion de frio ó de calor en la cabeza. —*Sensacion de fluctuacion en el cerebro, como si hubiera agua.—Sensacion durante los dolores, como si el cráneo estuviese muy débil.—**Sensacion de ondulacion lenta en el cerebro y sacudidas en la cabeza*, principalmente andando deprisa y subiendo.—°Dolores de cabeza cotidianos desde las cuatro de la tarde hasta las tres de la mañana del dia siguiente, agravados por el calor de la cama y la permanencia en ella.—*Ordinariamente es por el movimiento, sobre todo por el de los ojos, por sacudidas, por el contacto, el aire libre y una corriente de aire, por los que se agravan los dolores de cabeza; ¯y se alivian inclinando la cabeza hácia atrás y apoyándola.—Dolor calambroídeo en la piel del cráneo.—°Sudor abundante en los cabellos.—*Vacilacion y *ranversamiento de la cabeza.*—En durmiendo se profundiza la cabeza en la almohada.—Hinchazon de la cabeza y de la cara.

Ojos.—**Calor y sensacion quemante en los ojos*, opresion como por arena.—**Dolores presivos en los ojos y en las órbitas hasta la cabeza.*—*Sensacion de pesadez en los párpados, que se cierran involuntariamente.—*Temblor en los párpados.—°Caida del párpado como por parálisis.—*Punzadas en los ojos y en los ángulos, con prurito.—**Ojos rojos, brillantes y convulsivos, ó fijos, centelleantes y prominentes*, °ó empañados y turbios.—**Mirada fija ó furiosa é incierta.*—*Espasmos y movimientos convulsivos de los ojos.—Párpados muy abiertos.—*Inflamacion de los ojos, con inyeccion de las venas y rubicundez de la conjuntiva y de la esclerótica.—Hinchazon inflamatoria y supuracion desde el lagrimal al ángulo del ojo.—°Reblandecimiento de la esclerótica.—°Manchas y úlceras de la córnea.—°Fungus medular en el ojo.—°Hinchazon y ranversamiento de los párpados.—*Color amarillento de la esclerótica.—°Ojos como equimosados y *hemorragia de estos.*—Sensacion de sequedad quemante en los ojos, *ó derrame de lágrimas ácres y corrosivas (saladas). —**Pupilas inmóviles* y ordinariamente dilatadas, pero algunas veces tambien contraidas.—*Aglutinacion

Digitized by Google

(nocturna) de los párpados.—°Deseo de la luz ó **fotofobia*, °con movimientos convulsivos de los ojos cuando les hiere la luz.—**Vista turbia y debilitada*, ú oscurecimiento y ¯pérdida completa de la vista.—*Presbiopia*.—Sensacion de un velo, llamas y chispas delante de los ojos.—*Difusion de la luz de las bujías la que parece rodeada de una aureola encarnada.—Estrellas blancas y nubes plateadas delante de los ojos, sobre todo en mirando al techo de la habitacion.—**Los objetos parecen dobles ó colocados al revés*, ó de un color rojo.—°Ceguera nocturna desde que se pone el sol.—Temblor y brillo de las letras leyendo.—°Los objetos parece tienen un círculo rojo.

Oidos.—*Terebracion, presion, dolor vivo, pinchazos, apretamiento y punzadas en los oidos.—Otorrea purulenta.—*Titilacion, ruido y zumbido en los oidos.—Mucha sensibilidad del oido.—*Dureza de oido, ¯algunas veces como si hubiese una piel delante de ellos.—°*Hinchazon de las parótidas*, *con dolores lancinantes y tractivos, °que algunas veces se propagan hasta la garganta.

Nariz.—*Dolor de magullamiento en la nariz, particularmente tocándola, °y algunas veces con sensacion de ardor.—*Punzadas nocturnas en la nariz.—°Hinchazon, *rubicundez y sensacion de ardor en la punta de la nariz.—*Ulceracion dolorosa de las ventanas de la nariz.—Nariz muy fria.—*Epistaxis, ¯principalmente por la noche y en la mañana.—°Hemorragia nasal y bucal.—°Mucha sequedad de la nariz.—**Olfato muy sensible*, ¯sobre todo por el humo del tabaco, °ó disminuido.—*Olor pútrido de la nariz.—Coriza fluente de una sola nariz, ó alternando con obturacion.—Olor de arenque en la nariz durante el coriza.

Cara.—**Cara pálida*, alternando algunas veces repentinamente con rubicundez.—*Cara descompuesta, con rasgos inquietos y aire indiferente.—**Calor quemante de la cara*, algunas veces con rubicundez.—*Rubicundez ardiente y abotagamiento de la cara, como despues de haber bebido vino.—**Rubicundez oscura* ó *escarlata*, ó *azulada de la cara*.—**Hinchazon dura y rubicundez azulada de la cara*, principalmente (*de una*) *de las mejillas*, y algunas veces con sensacion de ardor y punzadas, terebracion y pulsaciones.—Manchas de color escarlata ó rojo oscuro.

Digitized by Google

en la cara.—*Erupcion de granos rojos en las sienes, en las comisuras de la boca y en la barba.—*Granos purulentos y costrosos, principalmente en las mejillas y en la nariz.—Engrosamiento de la piel de la cara.—Presion calambroídea, dolores vivos y tractivos en los pómulos. —°Dolor neurálgico, violento, incisivo en la cara, siguiendo la direccion del nervio sub-orbitario.—*Palpitaciones musculares y movimientos convulsivos en la cara, principalmente en la boca, la que está retraida háeia la oreja.—°Induracion é *hinchazon de los labios, °con punzadas por un tiempo crudo.—°Rubicundez oscura y *sequedad de los labios.*—*Granos, costras y úlceras (con aureola roja) en los labios y comisuras de la boca. *Apretamiento convulsivo de las mandíbulas, con imposibilidad de abrir la boca.—Sensacion como si la mandíbula inferior estuviera retraida.—°Dolores vivos en las mandíbulas; *punzadas y tension en las articulaciones sub-maxilares.—*Infarto de las glándulas sub-maxilares y de las del cuello, ¯con dolores (lancinantes) nocturnos.

Dientes.—Rechinamiento violento de los dientes.—**Dolores vivos y tractivos, tirones sucesivos en los dientes*, algunas veces con dolores en los oidos, y principalmente *por la noche y por la tarde*, durante un trabajo intelectual, ó bien *despues de haber comido.—El contacto y el aire libre agravan los padecimientos de los dientes.*—*Odontalgia con fluxion en la mejilla.—Terebracion en los dientes cariados y salida de sangre, chupando.—Hinchazon dolorosa de las encías, con calor, prurito y pulsacien, ó con dolor de ulceracion al tacto.—Hemorragia de las encías.—Vesículas en las encías, con dolor quemante.

Boca.—**Sensacion de una sequedad considerable*, ó *sequedad real, excesiva, sofocante en la boca.*—*Espuma en la boca, °algunas veces rojiza, ¯ó de un olor á huevos podridos. —*Acumulacion y derrame de una saliva ¯viscosa, espesa y blanquecina.—**Acumulacion excesiva de mucosidades viscosas blanquecinas en la boca y en la garganta.*—Mal olor de la boca, principalmente por la mañana.—°Hinchazon inflamatoria y rubicundez de la boca y faringe. —**Hemorragia violenta de la boca.*—Excoriacion de la parte interna de la mejilla; los orificios de los conductos salivales están como ulcerados.—Sensacion de frio, de torpeza y de adormecimiento en la lengua.—**Lengua roja*,

Digitized by Google

caliente, *seca* °*y hendida*, *ó cubierta de mucosidades blanquecinas*, amarillentas ó parduscas; °*rubicundez de los bordes de la lengua*.—*Hinchazon inflamatoria y rubicundez de las papilas de la lengua.—°Inflamacion flegmonosa de la lengua.—**Endolorimiento de la lengua*, sobre todo al tacto, ¯con sensacion como si estuviera cubierta de vesículas.—°*Pesadez*, **temblor y debilidad paralítica de la lengua* con *dificultad para hablar y balbuceo*.—Mutismo.—*Voz débil, sibilante y nasal.

Garganta.—**Dolor de excoriacion*, arañamiento y *punzadas en la garganta* y las amígdalas, *principalmente al deglutir*, °y algunas veces se propagan hasta los oidos.—*Mucha sequedad y sensacion de ardor en la garganta y sobre la lengua.—**Inflamacion y tumefaccion de la faringe*, *del velo del paladar*, °*de la campanilla* **y de las tonsilas*; **supuracion de las amigdalas*.—*Deglucion dolorosa y difícil.—**Imposibilidad completa de deglutir aun la menor cantidad de líquido*, °que sale frecuentemente por las narices.—**Necesidad continua de tragar*, ¯con sensacion de sofocacion si no se efectúa.—**Sensacion de estrechamiento, estrangulacion y constriccion espasmódica en la garganta*.—*Sensacion como si hubiera en la garganta un tumor ó un tapon que no puede quitarse.—Debilidad paralítica de los órganos de la deglucion.

Apetito.—**Pérdida del gusto*.—Insipidez y gusto muy salado de los alimentos.—**Gusto pútrido*, ó soso, ó mucoso, ó amargo de la boca.—**Gusto ácido de pan de centeno*.—**Falta de apetito y disgusto de todos los alimentos*, principalmente á la carne, los ácidos, el café, la leche y la cerveza.—**Sed ardiente, excesiva, é insoportable*, muchas veces con *horror á toda bebida ó deseo continuo de beber*, con imposibilidad de tragar una sola gota.—Se bebe con una precipitacion temblorosa.—°Hambre muy notable é insoportable.—Despues de haber comido embriaguez, cólicos, dolor de estómago, calor y sed.

Estómago.—*Eructos frecuentes, regularmente amargos ó pútridos, ó agrios y quemantes.—Pirosis.—*Eructos impelidos ó abortados*.—**Náuseas y deseo de vomitar*, principalmente en el momento de comer, ó al aire libre, ó despues de desayunarse, algunas veces con sed ardiente.—**Vomituricion* y *vómitos violentos*, ¯principalmente por la tarde ó por la noche; **vomituricion conim-*

Digitized by Google

posibilidad completa de vomitar; vómitos de los alimentos ó de *materias mucosas*, ó biliosas, °ó ácidas y serosas.—°Vómitos con diarrea ó con vértigos, calor y sudor.—*Hipo espasmódico*, algunas veces sudores y convulsiones.—**Presion, dolores calambroideos y contractivos*, sensacion de plenitud y abultamiento *en el estómago* y epigastrio, principalmente *despues de haber comido* ó comiendo.—Punzadas, palpitaciones, pulsaciones y sensacion de ardor en el estómago y en la region precordial.—Inflamacion del estómago y del duodeno.

Vientre.—Cólicos con estreñimiento, flujo abundante de orina, eructos y gana de vomitar.—°Dolor violento en el vientre que no deja parar en ninguna posicion.—Punzadas en el lado izquierdo del vientre, tosiendo, estornudando y al tacto.—Dolores y sensacion de ardor en los hipocondrios.—**Presion en el abdómen como por una piedra*, ¯principalmente en el hipogastrio é ínglés.—*Timpanitis y tension del vientre, ¯principalmente en los hipocondrios.—**Dolores calambroideos contractivos* y *constrictivos*, y pinchazos *en el vientre*, principalmente alrededor del ombligo é hipogastrio, con sensacion como si cualquiera de las partes se le *apretase* ó *pellizcase*; *los dolores obligan á plegarse*, á encogerse, y van á veces acompañados de vómitos °ó de timpanitis y salida del cólon en forma de rodete.—°Sensacion como si escarbaran en el vientre.—Retortijones y punzadas como por cuchillos.—Calor y mucha angustia en el vientre.—Borborigmos en el vientre, con expulsion frecuente de gases sin olor.—**Endolorimiento del vientre como si todo él estuviera excoriado y en carne viva*, y sensibilidad dolorosa de los tegumentos al tacto.—Punzadas en las ínglés.—°Prurito en el vientre.

Deposiciones.—**Deposiciones suprimidas y constipacion*, ¯algunas veces con timpanitis, calor á la cabeza y sudores abundantes.—Deposiciones duras, insuficientes.—*Conato frecuente de deponer, con tenesmo y sin resultado.*—*Pequeñas deposiciones frecuentes*, generalmente con tenesmo.—Deposiciones blancas, como de creta *ó verdosas*; deposiciones acuosas *ó *mucosas*.—Deposiciones diarréicas, con gana de vomitar, y dolores presivos en el estómago.—**Deposiciones involuntarias*, ¯por parálisis del esfínter del ano.

Orinas.—Gana frecuente de orinar.—**Emision frecuente de orinas abundantes*, pálidas y acuosas, ¯algunas veces *con* **sudores abundantes*, sed, apetito aumentado, diarrea y oscurecimiento de la vista.—**Incontinencia y emision involuntaria de orina*, ¯aun por la noche y durante el sueño.—Parálisis del cuello de la vejiga.—**Orinas turbias*, color amarillo ó *claras*, color de oro, ó de limon, ó raras y *color rojo oscuro*, ó *color de sangre*, ó rojo vivo.—Depósito rojo, blanco y espeso de las orinas.—Sensacion de movimiento en la vejiga como de una lombriz.—Presion nocturna en la vejiga.—°Dolores lancinantes, quemantes en la region renal.

Partes viriles.—°Dolor vivo y tractivo en los cordones espermáticos, principalmente orinando.—Retraccion del prepucio.—Nudosidad blanda y sin dolor en el glande. Punzadas en los testículos, que están retraidos.—Poluciones con flacidez del miembro.—Sudor nocturno de las partes genitales.—Poluciones de líquido prostático. —Apetito venéreo, disminuido con indiferencia completa á toda excitacion voluptuosa.

Menstruacion.—**Presion violenta hácia las partes genitales como si todo quisiese salir por la vulva*, ¯principalmente andando y estando en cuclillas.—*Punzadas en las partes genitales internas.—°Mucha sequedad de la vagina. —°Prolapsus é induracion de la matriz.—**Reglas muy fuertes y muy precoces*, ó muy tardías.—°Reglas muy pálidas.—Antes de las reglas, fatiga, cólicos, inapetencia y vista turbia.—Durante las reglas, sudor nocturno en el pecho, con bostezo y calofrios pasajeros, cólicos ó angustia de corazon, sed ardiente, dolores vivos y calambroídeos en el dorso y brazos, etc.—°Flujo de sangre fuera del tiempo de las reglas.—**Metrorragia* °de una sangre de color rojo claro, con expulsion de coágulos fétidos.—Flores blancas con cólicos.—°Loquios disminuidos.—*Galactorrea.

Laringe.—Catarro con tos, coriza, ronquera y mucosidades tenaces en el pecho.—**Voz ronca*, *débil* y sibilante; *voz nasal.—**Pérdida de la voz.*—°*Mucho endolorimiento de la laringe con peligro de sofocacion, en tocando la laringe*, así como en tosiendo, en hablando y respirando.—°*Accesos de constriccion espasmódica en la laringe.*—Tos como si se hubiera tragado polvo, ó como si hubiera un cuer-

po extraño en la laringe, ó en la boca del estómago que excita la tos, *principalmente por *la noche*, ó despues de medio dia, *por la noche en la cama*, y aun durante el sueño; *la tos es por lo general, *seca*, *corta*, °y algunas veces *convulsiva*, fatigante y temblorosa, *ó *profunda* é °imitando al ladrido. —*Antes de toser, lloros ó dolores en el estómago; **en tosiendo, punzadas en el vientre*, ó vomituricion, ó dolor de quebrantamiento en la nuca; despues del acceso, estornudo.—*El menor movimiento por la noche en la cama renueva la tos.—*Tos con estertor en el pecho, ó con catarro y punzadas en el esternon, ¯ó con dolor de cabeza y rubicundez de la cara.—*Expectoracion de mucosidades espesas y puriformes con la tos. —Tos con expectoracion de sangre.

Pecho.—°Ruido, *estertor y crepitacion en los bronquios.*—**Opresion en el pecho*, *respiracion dificil*, disnea é inspiracion corta, algunas veces con ansiedad, y principalmente por la noche en la cama, ó despues de haber bebido (café).—*Respiracion irregular, °unas veces *pequeña y rápida*, otras lenta y profunda.—**Respiracion corta, angustiosa y rápida.*—Por la mañana, despues de levantarse, falta de aire, mejorándose al aire libre.—En andando, opresion calambroídea en el pecho, con necesidad de respirar profundamente.—**Presion en el pecho*, ¯con dolor en los omóplatos y espiracion corta.—Tension en el pecho.—*Punzadas en el pecho, algunas veces como por cuchillos, y principalmente tosiendo y bostezando.—Mucha inquietud y *palpitaciones en el pecho.*—**Palpitaciones de corazon violentas*, que se sienten algunas veces hasta en la cabeza.—Palpitaciones del corazon en subiendo. —°Temblor del corazon, *con *angustia*, °y dolor presivo.

Tronco.—Vesículas dolorosas, llenas de agua, ó pequeñas manchas de color rojo oscuro en el pecho.—Dolor de luxacion, dolores reumáticos y tractivos, en el dorso y entre los omóplatos.—Forúnculo en la espalda.—Punzadas como por cuchillos en los huesos de la columna vertebral.—Corrosion en la espina dorsal con tos.—Rigidez dolorosa y dolores calambroídeos en los riñones y en el dorso.—**Hinchazon dolorosa y rigidez del cuello y de la nuca.*—¯Hinchazon dolorosa de las glándulas, del cuello y de la nuca.—Dolores vivos en las axilas.—Granos rojos y purulentos en el dorso y nuca.—Hinchazon de

Digitized by Google

las venas del cuello.—Sudor ácido solamente en el cuello.

Brazos.—Brazos adormecidos y dolorosos.—*Presion tractiva con sensacion de torpeza y dolores vivos en los brazos.—Deseo de extender los brazos.—Torpeza y pesadez de los brazos.—*Hinchazon y rubicundez de color escarlata en los brazos y manos.—*En la espalda, dolor tractivo y presivo, corriendo rápidamente todo el brazo de arriba á abajo, y manifestándose, sobre todo por la noche, disminuido por la presion exterior, provocado por el movimiento.—*Temblores dolorosos, calambres y convulsiones en los brazos y en las manos.—Temblor de las manos.—Presion con dolores vivos en los huesos del carpo y del metacarpo.—Rigidez artrítica de las articulaciones de la mano.—Luxacion frecuente de las articulaciones de los dedos.—Retraccion de los pulgares.

Piernas.—°Punzadas y dolores quemantes agravándose por accesos, en la articulacion coxo-femoral, mas insoportables por la noche y aumentados por el menor contacto.—Rigidez en la cabeza despues de estar sentado, con dificultad de levantarse.—Dolores en la cadera que obligan á cojear.—Temblor de las rodillas.—Dolores tractivos en las piernas, sobre todo en las rodillas.—*Pesadez y parálisis de las piernas y de los piés.—Flexion de las rodillas y de los piés andando.—Tension de los tendones de la corva,—Hinchazon de los piés.—Hormigueo de los piés.

33.—BENZOIS ACIDUM.

BENZ.—Acido benzóico.—Flores de benjuí.—Roth., *Mat. med.*, t. III, y *Transactions of the Nordamer. Inst. of Hom.* 1846.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeopática.

CLINICA.—Se ha empleado con mas ó menos éxito este medicamento contra:—Erupciones dartrosas; Nubes de la córnea; Fungus hematodes dentro del ojo; Cáncer superficial en la cara; Denticion difícil con convulsiones; Inflamacion de la lengua; Cistitis; Empeines en las partes genitales; Metritis; Paperas; Afecciones reumáticas de las articulaciones; Ciática; Gota en las articulaciones de los

Digitized by

tarsos; Mal de piedra; Enuresis de los niños; Afecciones rebeldes de la piel.

SINTOMAS.—Dolores quemantes, contusivos, calambroídeos, contractivos, con estremecimiento y excoriacion en las partes enfermas; parece que conviene mas particularmente á las mujeres y niños.—°Hinchazon reumática en las articulaciones, con tension, sensacion de frio y dolor paralítico.

Sueño profundo; al despertar, sensacion de sofocacion; se despierta despues de media noche ó hácia la mañana, con fuerte pulsacion en el cuerpo, sobre todo en el corazon y arterias de las sienes.

Cabeza con peso y aturdimiento, y sensacion como de frio ó aire dentro de la cabeza; aparicion de los dolores de cabeza en descubriéndose, por una corriente de aire, por la mañana al levantarse, y seguidos de una emocion; sufrimientos de cabeza, con dolores de estómago, náuseas, vómitos, frio en las manos, abatimiento con fatiga y pérdida del apetito; sudor frio en la cabeza.

Detrás de los **oidos**, hinchazon que parece estar atacado el periostio.

Nariz cubierta de manchas rojas; rubicundez en los ángulos; dolor en los huesos de la nariz; olor de polvo, de coles ó de fetidez delante de la nariz; olfato disminuido.

Cara con un calor abrasador, algunas veces de un lado solo; sudor frio en la misma.

Boca como excoriada, sobre todo en la parte posterior de la lengua y en el paladar; °inflamacion de la lengua; °ulceracion extendida por toda la lengua, con superficie fungosa; color azulado de la lengua; capa afelpada sobre la lengua; °tumor ulcerado del lado izquierdo de la boca, detrás de los últimos dientes molares.

Garganta como estrecha é hinchada; deglucion difícil.

Gusto amargo al tomar café y leche; gusto jabonoso del agua; Hipo; *Vómitos* de materias amargas ó saladas; náuseas durante el embarazo.

Deposiciones diarréicas, pútridas y sanguinolentas; deposiciones diarréicas en los niños, fétidas, blanquecinas, acuosas, muy copiosas y debilitantes, con orinas de un encarnado muy subido.

Digitized by Google

Orinas espesas, sanguinolentas; deseo frecuente de orinar, con grande inercia de la vejiga; olor aromático y gusto salado de las orinas; °Orina fuertemente encendida, color como de aguardiente, con un olor muy fuerte; °orinas de una gravedad específica aumentada, que desciende sin mezcla al fondo de una vasija en donde hay ya otras orinas; °Orinas ardientes, corrosivas, de un olor muy fuerte y de un color muy subido, causando un dolor insoportable á su salida.

Reglas seguidas de debilidad; Loquios ó purgacion de muy larga duracion.

°**Tos** corta y seca, fatigosa y casi constante; tos con expectoracion de mucosidades verdes.

Pecho como hinchado interiormente; acumulacion de mucosidades dentro de los bronquios; *palpitaciones* estando sentado ó despues de haber bebido; molestan los vestidos en el pecho; palpitaciones ondulatorias del corazon.

°**Dedos** cubiertos de manchas rojas; dolores paralíticos en las articulaciones.

Miembros inferiores como apretados por una venda; sensacion de sequedad en las articulaciones de las rodillas; °Afecciones gotosas de los tarsos; °Dolor en las articulaciones de los dedos pulgares, con hinchazon ligera y rubicundez.

34.—BERBERIS VULGARIS.

BERB.—Agracejo.—Hesse.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion:* muchas semanas.
Antídotos: Camph.

CLINICA.—Tomando por guía el *conjunto de síntomas*, se verá si se puede consultar este medicamento contra:—Afecciones reumáticas de las extremidades y de otras partes; Cefalalgia y oftalmía á consecuencia de desórden en las funciones abdominales, ó en relacion con afecciones artríticas y reumáticas; Padecimientos gástricos; Diarreas; Afecciones del hígado y padecimientos hemorroidales; Afecciones de las vías urinarias y de las partes geni-

tales, sobre todo cuando dependen de debilidad ó atonía; *Grippe*, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores tirantes*, *lancinantes* y corrosivos, ó dolores como de cansancio sumo en los miembros *agravados ó provocados por el movimiento.—Palpitaciones musculares.*—Debilidad paralítica en algunas partes.—*Hinchazones linfáticas.*—Excesiva laxitud que se aumenta andando, ó estando mucho tiempo de pié.—Decaimiento despues del mas pequeño esfuerzo.—Abatimiento hasta el punto de temblar.—Debilidad como por desvanecimiento, con vértigos andando ó estando de pié.—Despues de pasear accesos de desvanecimiento con ebullicion de sangre, sudor y calor en la parte superior del cuerpo, palidez de la cara, mejillas hundidas y opresion en el pecho antes de acostarse.—Desvanecimiento despues de haber andado en carruaje.

Piel.—Pequeñas pústulas rojas en toda la piel, quemantes, pruriginosas ó lancinantes y sensibles á la presion; convirtiéndose en manchas oscuras como de efélides.

Sueño.—Somnolencia por el dia, sobre todo por la mañana, ó despues de medio dia.—Sueño inquieto, turbado por comezon quemante en la piel ó por ensueños angustiosos.—Despierta por la mañana de 2 á 4, sin poder volverse á dormir, con tension y congestion á la cabeza y sed.—Sueño muy prolongado con dolor contusivo y presion á la cabeza, riñones y muslos.—Despierta frecuentemente y con fatiga, como si no hubiera dormido.

Fiebre.—Calofrios antes de comer y algunas veces despues, con los piés muy frios, boca seca y pastosa, y dolores en el lado izquierdo del epigastrio. Calofrios por la mañana, en el dorso, brazos y muslos, seguidos de calor quemante, con aturdimiento y dolores violentos, lancinantes en la cabeza y dolor á la garganta; al tercer dia sudor de un olor como el de la orina.—Calor en las manos y en la cabeza despues de medio dia, continuando durante muchos dias.—Disposicion á sudar al menor esfuerzo, sobre todo despues de medio dia, con ansiedad.—Sed con sequedad de la boca, sobre todo despues de medio dia.—Pulso lento y débil.

Digitized by Google

Moral.—Humor indiferente, apático.—Mal humor, disgusto de la vida.—Melancolía con aversion á la conversacion.—Ansiedad, mucho miedo y disposicion á asustarse.—En el crepúsculo todos los objetos aparecen mayores que lo que son en realidad.—Los trabajos intelectuales se hacen difícilmente, y fatigan sobre todo por la mañana.

Cabeza.—Vértigos con sensacion de desvanecimiento y mucha debilidad.—Vértigos bajándose y haciendo esfuerzos con los brazos.—Embriaguez y aturdimiento.—Turbacion y pesadez de la cabeza, muchas veces con presion, abatimiento, mal humor y calofrios, empezando por la mañana despues de despertar.—Pesadez en la cabeza como antes de un coriza.—Sensacion como si la cabeza hubiese aumentado de volúmen.—Sensacion de hinchazon en la cabeza.—Dolores presivos, tensivos en la frente, en las sienes y en los ojos.—Cefalalgia en la frente y en las sienes, como por una presion de dentro á fuera.—Dolores agudos, lancinantes en la frente y en las sienes.—Como tension é hinchazon en los tegumentos de la cabeza.—Calor en la cabeza despues de comer y por la mañana.—Sudor despues de los esfuerzos, bajándose ó permaneciendo en pié.—Pequeñas manchas rojas en la frente y en las mejillas.—Comezon ó latidos corrosivos en los tegumentos de la cabeza y de la cara.—Pústulas en los tegumentos de la cabeza y de la cara.

Ojos.—Ojos hundidos, con círculo azulado ó de un gris súcio.—*Presion y sensacion de quemadura en los ojos.—Sensibilidad dolorosa en los ojos, leyendo á la luz de las bujías.—Sensacion de rigidez con presion en los ojos.—Punzadas en los ojos, que provienen de otras partes (por ejemplo de la frente), y se propagan hasta los ojos y de estos á la frente.—Sensacion de ardor y sequedad en los ojos, los cuales están empañados.—Rubicundez de la conjuntiva con vista turbia, como si hubiera un velo delante de los ojos por la mañana despues de levantarse.—Vista confusa, vé mejor de cerca que de lejos.—Sensibilidad de los ojos á la claridad del sol.—Dolores vivos en el globo del ojo y en los párpados.—Pesadez en los párpados durante el movimiento.—Dolores quemantes ó corrosivos en los párpados.—Movimientos convulsivos de los párpados en leyendo á la luz de las bujías.

Digitized by

Oidos.—Comezon unas veces corrosiva, otras quemante, á veces lancinante, algunas veces con pequeñas pústulas en el conducto auditivo externo.—Pequeños tumores debajo y detrás de la oreja (glándulas subcutáneas)?. —Dolores agudos y lancinantes en el interior del oido y de otras partes.

Nariz.—Sequedad de la nariz.—Coriza con secrecion, al principio de serosidades amarillentas, despues de mucosidades purulentas, blanquecinas, amarillentas ó verdosas, sobre todo por la mañana.—Dolores hormigueantes ó corrosivos en la nariz.

Cara.—Color azulado en la parte interna del labio inferior.—Sequedad de los labios y desprendimiento de la epidérmis, con costra lisa y negruzca sobre los bordes. —Sensacion de quemadura al exterior de los labios.—Sensacion de hormigueo en los labios.—Pequeñas pústulas en los labios.—Dolores agudos presivos, ó agudos lancinantes en los pómulos y en la mandíbula.—Mucha palidez de la cara, color gris oscuro, con mejillas y ojos hundidos, rodeados de un círculo azulado ó negruzco Aspecto muy abatido por mucho tiempo.

Dientes.—Dolores tractivos agudos y punzadas en los dientes, con sensacion como si estos estuviesen embotados ó muy gruesos, ó con mucha sensibilidad al aire frio, sobre todo despues de medio dia y por la noche.—Ulcera en las encías.—Pequeñas nudosidades blancas en las encías, sin dolor.—Color de un rojo súcio en el borde de las encías.—Hemorragia de estas.

Boca.—Sensibilidad dolorosa de la lengua al tacto y al movimiento.—Rigidez y sensacion de hinchazon en la punta de la lengua.—Vesículas dolorosas, blanquecinas, en la punta de la lengua.—Sensacion de sequedad, gusto pastoso en la boca, mas desagradable por la mañana despues de levantarse, con aspereza de las membranas mucosas y lengua blanca.—Disminucion de la secrecion de la saliva, ó saliva viscosa, espumosa como algodon.

Apetito.—Gusto ácido, amargo, sobre todo despues de la comida.—Gusto quemante y ácre en la boca y en la garganta, como por pirosis.—Apetito excesivo casi como bulimia.—Falta de apetito con gusto amargo, bilioso.—Insipidez de los alimentos.

Estómago.—Náuseas y vomituricion antes de comer.—

Digitized by Google

Eructos alternando con bostezos.—Eructos biliosos.—Calofrios en el epigastrio.—Presion con dolores lancinantes en el epigastrio.—Dolores quemantes, lancinantes, en el estómago y á veces hasta en la faringe.

Vientre.—Dolores calambroídeos debajo del ombligo.—Dolores lancinantes presivos, en la region hepática, aumentados por la presion.—Dolores tractivos, agudos y lancinantes en la region del hipocon rio izquierdo.—Sensacion de tension en las ínglcs, como si quisiera declararse una hernia, sobre todo andando y estando en pié.—Dolores presivos en la region de las glándulas inguinales, que se hacen muy dolorosas al tacto, como si fueran á infartarse.—Dolor con punzadas y latidos en las ínglcs, sobre todo andando y estando en pié, que se oxtienden hasta los testículos, los muslos y los riñones.—Várices en las ínglcs.

Orinas.—Dolores incisivos en la uretra, aun fuera del tiempo de la miccion.—Dolores que producen escozor en la uretra, con sensacion de excoriacion, aun durante la eyaculacion del sémen en el cóito.—El movimiento excita y agrava los padecimientos de la uretra.—Dolores quemantes en la uretra durante y despues, pero sobre todo fuera del tiempo de la emision de la orina.—Dolores lancinantes en la uretra que se extienden hasta la vejiga.—Dolores presivos en la region de la vejiga, aun estando vacía y despues de haber orinado.—Dolores contractivos, tractivos, agudos, incisivos y calambroídeos en la vejiga.—Dolores lancinantes violentos en los riñones que se extienden hasta la vejiga.—Sensacion de quemadura en la vejiga.—Presion orinando.—Mucha necesidad de orinar, sobre todo por la mañana despues de levantarse.—Aumento de secrecion de las orinas, que son claras como agua.—Orinas pálidas, amarillentas, con sedimento mucoso, gelatinoso, farináceo, blanco, blanco pardusco ó rojizo.—Orinas espesas, amarillentas como de suero ó de agua arcillosa.—Orinas de un amarillo oscuro con mucho sedimento.—Orinas rojizas, como inflamadas con sedimento abundante.—Orinas rojizas, sanguinolentas, con sedimento mucoso y farináceo en abundancia, color rojo vivo.—*La emision de las orinas va generalmente acompañada de dolores en los músculos y en los riñones.*

Digitized by

Partes genitales.—Dolores quemantes, que causan escozor en el glande.—Sensacion de frio en el glande y en el prepucio, algunas veces con sensacion de torpeza.—Sensacion de debilidad y de insensibilidad en las partes genitales externas.—El miembro parece estar *encogido y retraido.*—Dolores presivos tractivos y contractivos en los testículos y cordones espermáticos, con contraccion del escroto que parece estar frio y arrugado.—Dolores de excoriacion en el escroto.—El movimiento excita ó agrava la mayor parte de los padecimientos de los órganos genitales.—Dolores picantes, quemantes, lancinantes, tractivos ó que aprietan en los cordones espermáticos, extendiéndose hácia los testículos.—Hinchazon del cordon espermático con dolores que se dirigen hácia los testículos.—Despues del cóito sensacion de excesiva debilidad en las partes genitales.—Disminucion del apetito venéreo.—Eyaculacion pronta en el cóito.

Reglas.—Goce tardío en las mujeres durante el cóito, y á veces acompañado de dolores incisivos ó lancinantes.—Sensacion de quemadura y de excoriacion en la vagina hasta en los labios.—Reglas pálidas, de una sangre serosa.—Durante las reglas, dolores en las partes genitales y en los riñones, ó dolores violentos en la cabeza, con sensacion de desvanecimiento.—Reglas poco abundantes, con dolores agudos, tractivos en todo el cuerpo, timpanitis dolorosa en el vientre, dolores en los riñones, latidos en el pecho, semblante abatido y dolores violentos en la cabeza, ó con mal humor, disgusto de la vida, abatimiento, dolores quemantes en la vagina, sensacion de quemadura y de excoriacion en el ano, y dolores en los brazos hasta las espaldas y la nuca.

Laringe y pecho.—Ronquera con endolorimiento ó inflamacion de las glándulas del cuello.—Sensacion de excoriacion en el pecho.—Opresion de pecho, sobre todo por la noche, con coriza fluente, violento.—Dolores lancinantes en el centro del pecho, que se aumentan respirando profundamente, con tos seca, corta.—Punzadas dolorosas en el costado izquierdo del pecho.—Apretamiento con punzadas en la region del corazon.—Palpitaciones del corazon.

Tronco.—Dolores lancinantes entre los omóplatos, aumentados por la respiracion.—Dolores tractivos, agudos

en la espina dorsal.—Pústulas en el dorso.—Sensacion de tension, de rigidez y entorpecimiento en los riñones, como si estuvieran hinchados ó adormecidos.—Dolores presivos, tensivos, tractivos, agudos ó lancinantes en los riñones.—Sensacion de presion tensiva en los riñones, frecuentemente con pesadez, calor ó entorpecimiento de estas partes, sobre todo por la mañana al despertarse, agravados estando sentado ó acostado, algunas veces disminuidos por las deposiciones ó emision de flatuosidades.—Dolores tractivos, agudos, reumáticos en la nuca.—Pústulas en la nuca en grupos, sobre todo cerca de la piel del cráneo.

Brazos.—Sensacion de laxitud, de parálisis y de rotura en los brazos, sobre todo durante el movimiento, provocada ó agravada por la presion.—Dolores agudos en los brazos.—Dolores en la espalda, como por ulceracion subcutánea.—Mancha jaspeada en los brazos, con comezon quemante.—Dolores calambroideos en el antebrazo.—Dolores tractivos, agudos en el antebrazo y en los huesos hasta en la mano y las articulaciones de los dedos, con pesadez y debilidad en los brazos.—Dolores quemantes ó picantes en los antebrazos, agravados por la friccion ó rascándose, y seguidos algunas veces de una mancha roja.—Pequeñas manchas pruritosas como de petequias en los antebrazos y en el dorso de la mano, cerca de la muñeca.—Hinchazon linfática del antebrazo, con manchas como de petequias y dolores quemantes en la piel.—Dolores tractivos, agudos en las articulaciones de las manos y de los dedos.—Dolores presivos, escarbantes, violentos en el dorso de la mano, con sensacion de pesadez.—Mancha urticaria en el dorso de la mano.—Pequeñas verrugas en la parte carnosa de la mano de bajo del pulgar.—Sensacion en la punta del dedo, como por ulceracion subcutánea.—Verruga plana en el dedo.—Rubicundez de las manos, con comezon como por sabañones.

Piernas.—Sensacion de laxitud y de cansancio sumo en las piernas, algunas veces con pesadez, rigidez y sensacion de parálisis, como despues de una marcha forzada, ó como por luxacion de las partes afectas, sobre todo en las partes blandas, así como tambien en los huesos, y fácilmente excitadas por el movimiento.—Mucha debilidad de las piernas durante el paseo.—Sensacion en las

piernas como si estuvieran demacradas.—En los muslos, en las pantorrillas y rodillas, dolores tensivos, como si los tendones estuvieran muy cortos.—Dolor tractivo, tensivo en las piernas.—Temblor de los músculos del muslo.—Sensacion de frio al lado exterior de los muslos, como si circulase mercurio debajo de la piel.—Sensacion de laxitud, de quebrantamiento y de parálisis en las rodillas, durante y despues de haber andado, así como levantándose despues de estar largo tiempo sentado.—Hinchazon linfática del tendon de Aquiles, con dolores levantando el pié y sensacion como si llevase un gran peso.—Hinchazon del pié despues del movimiento con sensacion de quemadura, hinchazon del talon y calambres en los piés.—Sensacion de luxacion en las articulaciones de los dedos.—Dolor quemante en la planta de los piés, sobre todo por la tarde.—Dolores tractivos, agudos ó quemantes en los dedos gordos.—Dolor de excoriacion en los dedos, con rubicundez, como por sabañones.

35.—BISMUTHUM.

BIS.—Bismuto.—(*Bismuthum nitricum*).—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: de 4 á 6 semanas.
ANTÍDOTOS: Calc. caps. (nuez vómica).

CLINICA.—Hasta el dia no se ha empleado este poderoso medicamento mas que contra algunos casos de *gastralgia* y de *prosopalgia*.

SINTOMAS GENERALES.—Contracciones calambroídeas de todos los músculos.—Dolores presivos, opresivos y tractivos á la vez.—Excesiva somnolencia por la mañana despues de levantarse.—Sueño con despertamiento, sobresaltado y con espanto.—Sueños voluptuosos.—Laxitud cuando despierta por la noche.—Escozor quemante en la piel.—Frio glacial de todo el cuerpo.—Mucho calor.—Pulso pequeño, intermitente.—Disgusto, humor moroso y lamentos.—Inconstancia.—Aversion á la soledad.—Delirio.—*Delirium tremens*.—Pérdida del conocimiento.—Apatía é insensibilidad moral.

Cabeza y ojos.—Aturdimiento por la mañana.—Vértigos como si el cerebro diera vueltas.—*Vértigos violentos, con presion en la frente, rubicundez de la conjuntiva, vista turbia, presion en el estómago, pulso espasmódico* y zumbido en los oidos.—Estupor con un velo delante de los ojos.—Cefalalgia, principalmente en el vértice, extendiéndose hasta los ojos.—Pesadez presiva en la cabeza, sobre todo en la frente ó debajo de la nariz y en las sienes.—Como si escarbaran contínuamente y terebracion en la frente, que se propaga hasta los ojos y la punta de la nariz.—Contraccion quemante en la cabeza, sobre todo en la frente y en los ojos.—Presion en las pupilas.—Legaña en los ángulos de los ojos.

Cara.—Cara térrea, enfermiza y descompuesta, con ojos hundidos.—*Dolor presivo en los pómulos.—Cara pálida, fria.

Dientes.—Odontalgia presiva, tractiva.—Encías hinchadas, con dolores de excoriacion.—Sensibilidad dolorosa en el interior de la boca como por excoriacion.—Secrecion contínua de una saliva oscura, espesa, de un gusto metálico.—Faringitis.—Dolor quemante en la garganta, algunas veces insoportable.—Por la mañana gusto de sangre en la boca, con expuicion de mucosidades sanguinolentas.—Por la tarde lengua blanca muy cargada.—Por la tarde mucha sed particularmente por bebidas frias.

Estómago y vientre.—Náuseas con gana de vomitar, sobre todo despues de haber comido.—Eructos violentos, de un ólor pútrido.—Vomituricion fuerte con vómito violento.—Vómito de materias oscuras.—Dolores calambroídeos y presivos en el estómago, sobre todo despues de haber comido.—Borborigmos y ruido sordo en el vientre.—Cólicos con punzadas, presion y gana de deponer.—Timpanitis muy considerable.—Sensibilidad dolorosa del vientre al tacto.

Deposiciones y orinas.—Por la tarde deseo inútil de deponer.—Diarrea acuosa de olor pútrido.—Emision frecuente y copiosa de orina acuosa.—Emision de orina enteramente suprimida.—Dolores presivos en los testículos.—Poluciones nocturnas sin ensueños.

Pecho.—Tos dia y noche, con expectoracion abundante.—Presion y apretamiento á través del pecho, en la re-

Digitized by Google

gion del diafragma.—Contraccion cálida y ardiente del pecho, con dificultad de la respiracion y de la palabra. —Sensacion de ardor y terebracion en el pecho y dorso. —Palpitaciones de corazon.

Miembros. —Dolor presivo y tractivo, con debilidad paralítica en los antebrazos y huesos del carpo.—Temblor de las manos despues de haber comido.—Dolores tractivos agudos debajo de las uñas.—Demacracion excesiva de la palma de las manos y de la planta de los piés.—Contraccion calambroídea de las manos y de los piés.—Dolores vivos y presivos en los huesos del pié.—Prurito y corrosion en la tibia y en el dorso del pié, aumentados rascándose.– Color azulado de los muslos y piés.

36.—BORAX VENETA.

BOR.—Sub-borato de sosa.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 4 semanas en algunas afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Cham. coff.

COMPÁRESE CON: Cham. coff. merc. natr. puls. sulf. etc.

CLINICA.—Hasta el dia no se ha empleado este poderoso medicamento mas que contra algunos casos de *estomacace*, de *Muguet* y de *aftas en la boca*; mas, siguiendo nuestra propia experiencia, se recomienda tambien con eficacia en los casos siguientes:—*Dolores reumáticos* con fiebre y tumefaccion; Hinchazon y abscesos linfáticos; Herpes fagedénicos; Enfermedades de las mujeres que están criando; *Oftalmias*; *Hemorróides mucosas;* Otitis; Otorrea purulenta; *Afecciones escrofulosas.*

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores lancinantes y tractivos.—*Aparicion y agravacion de los padecimientos por un mal tiempo y húmedo*, ó durante y despues de la comida. —Padecimientos por haber ido en carruaje ó por haber comido frutas.—Inquietud en todo el cuerpo, que no permite permanecer largo tiempo en el mismo sitio.—

Inquietud, temblor, náuseas, aturdimiento y vértigos despues de una conversacion animada ó durante la meditacion.—*Falta de fuerzas*, sobre todo en las articulaciones.—Accesos de desvanecimiento con hormigueo, temblor de los piés y náuseas.

Piel.—*Piel enfermiza*; *toda lesion tiende á ulcerarse.*—Inflamacion erisipelatosa, con hinchazon y tension de la parte afecta, y fiebre.—*Tendencia de las heridas antiguas á la supuracion.—Granos blanquecinos con aureola roja.—Erupciones herpéticas.—Vesículas purulentas y y fagedénicas.

Sueño.—*Gana de dormir mucho antes de la hora ordinaria, y sueño por la mañana muy prolongado.*—Sueño inquieto á causa de una ebullicion de sangre, de cólico y de diarrea.—Se despierta muy temprano, con dificultad de volverse á dormir, á causa del calor y mucha afluencia de ideas.—*Gritos angustiosos de los niños durante el sueño*, con movimientos convulsivos de las manos.

Fiebre.—*Despeluzamiento*, *horripilacion* y *frio con temblor*, *adormecimiento* y *debilidad*, ó con cefalalgia y dolores osteócopos en el fémur, seguidos de calor.—*Frio con mas frecuencia despues de medio dia*; *despues calor*, con cefalalgia, dolores en los hipocondrios, algunas veces seguidos de sudor.—*Sed antes ó durante el frio*, ó bien despues del sudor.—*Calor al principio de la noche en la cama*, con calofrios á poco que se descubra.—Sudor por la noche.

Moral.—*Mucha ansiedad*, sobre todo cuando se va en carruaje, ó cuando se baja una cuesta.—Miedo de ser infestado de una enfermedad contagiosa.—*Mucha propension á asustarse.*—Irritabilidad.—Disposicion á enfadarse, con mal humor y furia.—Horror al trabajo.

Cabeza.—Accesos de vértigos, con desvanecimiento.—Vértigo con plenitud en la cabeza, sobre todo en subiendo una escalera ó una elevacion cualquiera.—Cefalalgia con punzadas en los oidos.—*Dolor de cabeza con náuseas y deseo de vomitar*, con especialidad á las diez de la mañana.—*Plenitud en la cabeza, con presion debajo de los ojos.*—Dolores presivos y tractivos en la frente, en la raiz de la nariz y la nuca, aumentados en escribiendo, en leyendo y en bajándose.—Tirones sucesivos en la frente, con náuseas y dolores tractivos agudos en los ojos.—*Punzadas en la cabeza*, sobre todo debajo de los

Digitized by

ojos y en las sienes.—*Congestion á la cabeza*, en particular al occipucio, con *dolores pulsativos*.—Sensibilidad de los tegumentos de la cabeza al frio y al mal tiempo.—Cabellos enredados, como en la plica-polaca.

Ojos.—*Presion en los ojos*.—Escozor en los ojos.—Los ojos queman y se contraen cuando se pone los anteojos.—**Inflamacion de los ojos, sobre todo en los ángulos, con excoriacion de los bordes de los párpados*, triquiasis y *aglutinacion nocturna*.—Centelleo delante de los ojos escribiendo.—Gran sensibilidad de los ojos á la luz de las bujías.—*Encendimiento alrededor de los ojos despues de haber llorado*.

Oidos.—*Punzadas en los oidos*, con dolor de excoriacion.—*Inflamacion é hinchazon de los oidos, con *secrecion de pus* y cefalalgia lancinante.—Accesos de obturacion de los oidos y sordera.—*Zumbido y ruido* en los oidos, con dolores tractivos agudos en el vértice de la cabeza.

Nariz.—Comezon de la nariz con hormigueo.—**Ventanillas nasales ulceradas*, con hinchazon y dolor de excoriacion en la punta de la nariz.—Costras secas en la nariz.—Estrías sanguinolentas al sonarse.—Hemorragia nasal con dolores pulsativos en la cabeza.—Estornudo con punzadas violentas en el lado derecho del pecho.—Acumulacion de mucosidades espesas y verdosas en la nariz.

Cara.—Aspecto (en un niño de pecho) descompuesto, pálido y terroso.—Sensacion en el lado derecho de la cara, como si estuviera cubierta de una tela de araña.—Palpitaciones musculares en los conos de la boca.—*Inflamacion erisipelatosa* é *hinchazon de las mejillas*, con dolores tractivos agudos en los pómulos, agravados por la risa.—Erupcion granulosa en la cara, en la nariz y en los labios.—Escozor en los labios.—*Manchas herpéticas alrededor de la boca, y costras en el labio superior.—Hinchazon del labio inferior, con sensacion de ardor y dolor de excoriacion.

Dientes.—Dolor presivo y calambroídeo en los *dientes cariados*, en particular *por un tiempo húmedo*, algunas veces con *fluxion* de la mejilla por los dientes mellados, ó *hinchazon de las encias*.—Dolores tractivos agudos en los dientes cariados, correspondiendo hasta la cabeza cuando se los toca con la lengua ó se les aplica agua fria.—Hormigueo presivo en los dientes, inmediatamente despues de cenar ó de desayunarse, aliviado fumando ta-

Digitized by Google

baco.—Dolores lancinantes en los dientes cariados, con punzadas en los oidos y cefalalgia.—*Ulceras en las encias*, con fluxion de la mejilla.—Hemorragia de las encías.

Boca.—**Aftas en la boca y en la lengua*, que dan sangre fácilmente.—Rigidez espasmódica y torpeza de la lengua.—Membrana palatina arrugada y encogida.—Sequedad en la garganta.—*Mucosidades tenaces* en la garganta, con expectoracion difícil.

Apetito.—Gusto amargo en la boca, comiendo ó en tragando saliva.—Pérdida del gusto.—Sed por la mañana.—Deseo de bebidas ácidas.—*Hambre y apetito poco pronunciados*, sobre todo al cenar.—*Náuseas é inquietudes durante la comida.—Despues de cada comida, timpanitis* con *diarrea* y cólicos.—Plenitud y presion en el estómago, con malestar y mal humor, despues de haber comido frutas (peras y manzanas).—Cólico con disposicion á la diarrea, despues de haber fumado.

Estómago.—*Náuseas con gana de vomitar*, andando en carruaje.—*Vómitos de mucosidades ágrias* por la mañana en ayunas, ó despues de desayunarse.—*Presion en el estómago despues de cada comida.—Dolores contractivos en el estómago*, ó sensacion como por una derrengadura, con punzadas en la columna vertebral y en los riñones.

Vientre.—*Dolores en los hipocondrios*, frecuentemente presivos y en el lado izquierdo, y sobre todo durante un paseo en carruaje.—Presion y punzadas en la region de los riñones.—Dolores en los hipocondrios y en el bajo vientre, como si se moviesen cuerpos duros y cortantes.—*Pinchazos en el vientre*, con diarrea.—Acumulacion de flatuosidades en el vientre y expulsion frecuente de estas.

Deposiciones.—Deposiciones frecuentes, *blandas ó diarréicas*, con pinchazos y borborigmos en el vientre.—*Deposiciones verdosas (en los niños).—*Diarrea mucosa.—*Flujo abundante de materias viscosas*, pálidas, amarillentas ú oscuras, y de *sangre por el ano*, con dolores en los riñones.—Comezon con traccion y punzadas en el ano y en el recto.

Orinas.—Conato inútil de orinar, con dolores incisivos en la uretra y timpanitis en la region lumbar.—Conato urgente de orinar.—Emision frecuente de orinas, aun por la noche.—**Fetidez ácre* de la orina.—Escozor en la ure-

tra despues de haber orinado, sobre todo al tacto, aun fuera del tiempo de la emision de las orinas.

Partes viriles.—*Ausencia de apetito venéreo*.—Erecciones con tension dolorosa por la mañana, despertándose.

Reglas.—*Reglas muy precoces y muy fuertes*, de color rojo pálido.—Durante las reglas, dolores pulsativos en la cabeza, zumbido en los oidos, náuseas con dolores en el estómago y en los riñones, ó punzadas y presion en las ingles.—**Flores blancas*, *corrosivas* y espesas como el almidon.—**Esterilidad*, dolores en las mamas criando.—*Derrame* de leche cuajándose prontamente.

Laringe.—Dolores tractivos agudos en la laringe hasta en el pecho con deseo de toser.—Ronquera con punzadas tractivas, tosiendo y estornudando.—*Tos seca*, causada por un cosquilleo y arañamiento en la garganta, con presion en el pecho.—Tos seca, hética, con punzadas en el costado derecho del pecho y en las ingles, aliviada lavándose con agua fria, aumentada bebiendo vino.—Tos nocturna.—Tos con expectoracion de un olor y gusto de moho.—Al toser, *expectoracion de mucosidades con estrias de sangre*.

Pecho.—*Respiracion dificil* con *necesidad de respirar profundamente* y punzadas en el costado derecho.—Opresion constrictiva del pecho, sobre todo al subir una escalera.—Respiracion corta despues de subir una escalera, con punzadas en el pecho.—**Punzadas en el pecho* sobre todo en el *costado derecho*, y principalmente **en bostezando*, *en tosiendo*, *respirando profundamente*, corriendo y á cada esfuerzo corporal.—**Punzadas tractivas en los músculos intercostales* del costado derecho hasta en las ingles, aumentadas por el menor movimiento del pecho ó de los brazos, con imposibilidad de estar acostado del lado afecto.—Dolores en el pecho aliviados particularmente estando acostado tranquilamente sobre el dorso ó andando lentamente y apoyándose con la mano sobre la parte enferma.—Sensacion como si el corazon se hallara al lado derecho y que estuviera aplastado.

Tronco.—Comezon y hormigueo en el sacro.—*Dolores* presivos y quemantes *en los riñones*, sobre todo estando sentado y bajándose.—*Dolores vivos y tractivos entre los omóplatos sobre la espalda* y en la nuca, con imposibilidad de bajarse.—Divieso en la axila.

Digitized by Google

Brazos.—Sensacion en las manos como si estas estuvieran cubiertas de una tela de araña.—Dolores pulsativos en la punta del pulgar, por el dia y la noche, impidiendo dormir.—*Dolores quemantes, calor y rubicundez de los dedos*, como de sabañones.—Vejigas en los dedos con hinchazon y supuracion del miembro afecto.

Piernas.—Vesículas corrosivas con ulceracion subcutánea en las nalgas.—Dolor quemante en los muslos.—*Inflamacion erisipelatosa* é *hinchazon de la pierna* y *pié*, principalmente despues de haber bailado largo tiempo, y á veces con dolores tractivos, quemantes y tensivos, sobre todo al tacto.—Punzadas en la planta de los piés.—Dolor de excoriacion en el talon.—*Dolores quemantes, calor y rubicundez de los dedos* como por sabañones.—*Terebracion lancinante de los callos*, sobre todo por un tiempo lluvioso.

37.—BOUNAFA.

BOUN.—*Raiz de Bounafa*, *Radix ferulæ glaucæ.?*—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.

ANTÍDOTOS?

COMPÁRESE CON: Bell. bry. *puls.*

CLINICA.—Aunque este medicamento apenas ha comenzado á estudiarse, los síntomas conocidos contienen, sin embargo, indicaciones importantes, que justifican el empleo que se ha hecho hasta aquí en la práctica y por el cual se ha visto su eficacia contra:—Oftalmías crónicas; Inflamacion de las encías; Gastritis; Catarros bronquiales crónicos; vaginitis crónica.

SINTOMAS.—Ulceras indolentes crónicas.

Moral.—Tristeza, abatimiento; mucha disposicion á llorar; temor de la muerte; impaciencia y cólera; deseo de la soledad; gran instabilidad de ideas; repugnancia á todo trabajo.

Cabeza atontada; accesos frecuentes de vértigos; calor quemante en la cabeza, sobre todo en la frente; accesos de jaqueca; sensacion de frio glacial en el occipucio.

Ojos pegados por la mañana; °inflamacion de los ojos.
Nariz encarnada y sensible al tacto; úlceras en la nariz; costras ardientes y con prurito en las narices.
Cara cubierta de pequeñas pápulas de un color encendido con las puntas blancas en los carrillos y barba.
Dientes atacados de diferentes dolores, con exacerbacion nocturna; °inflamacion de las encías.
Boca llena de aftas; sensacion como de quemadura en la lengua; aliento fétido; saliva de un gusto amargo.
Digestion lenta con eructos amargos; mucha sed.
En el **Estómago** sensacion constante de calor con dolores cólicos; calambres de estómago.
Vientre tirante é hinchado; ardor quemante en el vientre; sensacion de calor y de peso en el hipogastrio.
Deposiciones diarréicas, dia y noche, pero mas fuertes durante esta última; evacuaciones amarillentas, líquidas, acuosas, con sensacion de ardor y corrosion en el ano; hemorróides con ardor, punzadas, corrosion y comezon; cólicos durante y despues de las deposiciones.
Reglas muy anticipadas y abundantes; *leucorrea* de un moco blanco ó amarillo, claro ó espeso, con sensacion de calor y corrosion en las partes; fuerte excitacion del apetito venéreo; °inflamacion tenaz de la vagina.
Tos seca ó húmeda, sobre todo por un aire frio ó húmedo; °catarro bronquial tenaz; tos fuerte, hueca, *expectoracion espesa*, abundante, blanquecina ó amarillenta.
Corazon con fuertes latidos; sensacion de calor y de constriccion en la region del mismo.
Cuello tirante.
Brazos y dedos envarados.
Miembros inferiores con rigidez, *forúnculos* en los muslos y en las nalgas; sensacion de frio á lo largo del nervio ciático.

38.—BOVISTA.

BOVIS.—Bovista.—Pedo de lobo de los vaqueros.—HARTLAUB Y TRINKS.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 50 dias en algunas afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph.

COMPÁRESE CON: Bell. bry. carb-a. carb-veg. kal. merc. puls. sep. sil. spig. stront. veratr.

CLINICA.—Este medicamento ha sido empleado contra los *herpes*, *úlceras en los labios y panadizos*; afecciones en las que ha sido de una gran eficacia cuando el conjunto de síntomas lo reclama.

SINTOMAS GENERALES.—Mucha laxitud y falta de fuerzas, sobre todo en las articulaciones. — Ebullicion de sangre.

Piel.—Piel floja; los instrumentos obtusos dejan una señal profunda.—Prurito, sobre todo cuando está caliente, hasta el punto de no experimentar alivio aun cuando se esté rascando.—Granos y erupciones miliares con comezon quemante.—Erupciones húmedas y de costra espesa.—Herpes húmedos.—Panadizos.—Verrugas.—Violentas punzadas en los callos.

Sueño.—Gran soñolencia por la mañana y en la tarde temprano.—Sueño nocturno, agitado por desvaríos, angustiosos y espantosos.

Fiebre.—Calofrio con sed, aun estando cerca del fuego, y por la noche en la cama.— Calor con sed, angustia, agitacion y opresion en el pecho.—Sudor por la mañana, sobre todo en el pecho.—Por la tarde, fiebre con calofrios y horripilacion en el dorso, con dolores de vientre tirantes.

Moral.—Abatimiento y tristeza cuando se está solo.—Melancolía apacible con inquietud y pensamientos sombríos.—Susceptibilidad suma.—Gran locuacidad y conversacion sin reserva.—Debilidad de la memoria.—Distracciones.—Torpeza; deja caer todo lo que tiene.—Se equivoca hablando y escribiendo.

Cabeza.—Embriaguez despues de haber bebido vino, por muy poco que sea.—Vértigo que atolondra, con pérdida de los sentidos.—Dolores en el centro del cerebro, con sensacion como si la cabeza aumentase de volúmen.—Dolor de cabeza al despertarse, como despues de un sueño muy prolongado. — Dolor de cabeza con aturdimiento y calor en los ojos.—Cefalalgia nocturna con dolores insoportables cuando se levanta la cabeza. —Dolores presivos en la cabeza, con latidos como en un acceso. —Cefalalgia compresiva.—Dolores vivos en la cabeza con pesadez y sensacion de contusion.—Sensibilidad ex-

cesiva de la piel del cráneo al tacto.—Alopecia.—Placas excoriadas en la piel del cráneo.

Ojos.—Movimiento doloroso de los ojos, con presion sensible en las órbitas.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—Ojos empañados, sin brillo y sin expresion.—Los objetos parecen estar mas próximos que lo que están realmente.

Oidos.—Ulceras en el oido con dolor al deglutir.—Erupcion costrosa y húmeda en las orejas.—Otorrea purulenta y fétida.—Disminucion y dureza del oido con equivocaciones frecuentes.

Nariz.—Excoriacion en las ventanillas nasales.—Costras en las narices con dolores quemantes.—Obturacion de la nariz que dificulta la respiracion.—Coriza fluente, con secrecion de mucosidades serosas y atontamiento en la cabeza.

Cara.—Calor en las mejillas como si estallasen.—Cara alternativamente pálida y roja.—Extrema palidez por la mañana al levantarse.—Terebracion y como si escarbaran en las mejillas.—Hinchazon muy pálida del labio superior, de la nariz y de las mejillas.—Labios hendidos.—Comisuras de la boca ulceradas.—Dolores reumáticos de la mandíbula inferior, con tumefaccion y dolores pulsativos en las glándulas submaxilares.

Dientes.—Dolores en los dientes incisivos superiores, seguidos de hinchazon del labio superior.—Odontalgia tractiva, sobre todo en los dientes cariados, por la tarde y la noche, aliviada por el calor y el paseo al aire libre.—Terebracion y como si escarbasen en los dientes.—Las encías sangran fácilmente por la noche y por la succion.

Boca.—Acumulacion de saliva en la boca.—Sensacion de entorpecimiento en la cavidad bucal.—Tartamudez.—Dolores incisivos en la lengua.—Ulceras en los bordes de la lengua con dolores de excoriacion.—Olor pútrido de la boca.—Afeccion de la garganta con sensacion de arañamiento y dolores quemantes.

Apetito.—Gusto pútrido en la boca.—Gusto de sangre.—Deseo de bebidas frias, sobre todo despues del medio dia y por la tarde.—Hambre vehemente y contínua, aun despues de la comida.—Mucha soñolencia despues de haber comido, sobre todo despues de comer y por la tarde.—Hipo antes y despues de la comida.

Estómago.—Náuseas con disposicion al frio desde la mañana hasta el medio dia.—Sensacion de frio en el estómago, como por una porcion de hielo.—Presion y plenitud en la region precordial con tension en las sienes y ansiedad.

Vientre.—Dolores en la region umbilical, despues de haber comido, como si el vientre estuviera cortado por cuchillos.—Violentos retortijones agravados por el reposo.—Sensibilidad dolorosa en el exterior é interior del vientre.—Cólicos violentos con frio, hasta hacer temblar y castañetear los dientes, sobre todo despues de las deposiciones.—Dolores de ulceracion y punzadas en el vientre.—Expulsion frecuente de gases fétidos.

Deposiciones. — Constipacion. — Deposiciones duras y compactas.—Diarrea con cólicos, retortijones y dolores de ulceracion en el vientre.

Orinas.—Gana frecuente de orinar.—Dolor de excoriacion en la uretra orinando.

Partes viriles.—Aumento del apetito venéreo.—Poluciones frecuentes.—Despues del cóito, vacilacion, peso en la cabeza y adormecimiento.—Nudosidad dura, dolorosa y supurante en el miembro.—Dolores quemantes en las partes genitales. —°Leucorrea corrosiva, con dolores cólicos violentos.

Reglas.—Reglas precoces y muy abundantes.—La menstruacion se efectúa por la noche.—Evacuacion de sangre fuera del tiempo de las reglas.—Leucorrea ácre y corrosiva.—Excoriacion en el pliegue de las ingles durante las reglas.

Laringe.—Ronquera por la mañana con gangueo, como por un coriza.—Arañamiento y excoriacion en la garganta, con acumulacion de mucosidades tenaces.—Tos seca producida por un cosquilleo en la garganta y en el pecho.

Pecho.—Respiracion difícil y corta durante un trabajo manual.—Opresion constrictiva en el pecho; todo parece estar muy comprimido.—Punzadas en el pecho.—Palpitaciones de corazon con inquietud, temblor, vértigos, náuseas y dolor de cabeza.

Tronco.—Sudor de un olor fuerte en las axilas.—Hinchazon de las glándulas del cuello con dolores tensivos y tractivos.—*Dolor en el dorso con rigidez despues de estar encorvado.

Digitized by Google

Brazos.—Debilidad paralítica y dolor de luxacion en las articulaciones de los brazos y de las manos.—Tension en las articulaciones escapulares, como si los tendones estuvieran muy cortos.—Sensacion de parálisis en las arterias del antebrazo.—Tiron calambroídeo en las articulaciones de las manos.—Dolores lancinantes de las articulaciones de las manos agarrando cualquiera cosa.—Falta de fuerzas en las manos, hasta dejar caer los objetos mas ligeros.—Herpes húmedos en el dorso de la mano.

Piernas.—Hormigueo y adormecimiento de las piernas con imposibilidad de tenerse en pié.—Punzadas en las articulaciones de las rodillas y de los piés.—Fuerte tension en las pantorrillas y piernas, como si los tendones estuvieran muy cortos.—Calambres en las pantorrillas, por la mañana en la cama.—Miliar en las piernas.

39.—BROMUM.

BROM.—Bromo.—Hering, Archivos de Stapf.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeopática.

Antídotos: *Gas amoníaco, amoníaco líquido, vapores alcohólicos*; contra las fuertes dósis alopáticas de esta sustancia: *Op. magn. camph.*

GENERALIDADES.—Los padecimientos aparecen mas marcados con el calor de la habitacion, así como estando acostado ó sentado, y con el reposo en general; el movimiento los hace menos perceptibles; el aire libre parece los mejora.—*Varios síntomas, sobre todo los del pulmon, parecen mas pronunciados del lado derecho*; otros atacan, por el contrario, antes el lado izquierdo.—Tirantez paralítica de los miembros superiores é inferiores.—Hormigueo en los dedos, con temblor convulsivo en los músculos del pié y alrededor de las rodillas.—*Debilidad, laxitud y mucha fatiga*, que continúan aun despues de cesar los otros síntomas.—Temblor general é imposibilidad de mantenerse en pié.

Piel.—Color amarillo de la piel.—La aplicacion exterior del bromo destruye con prontitud la piel, con sensacion de ardor violento é inflamacion despues; aplicado sobre

Digitized by Google

las úlceras, toman muy mal aspecto, y se rodean de putrefaccion verdosa de olor cadavérico.—Sensacion de alguna cosa viva en la piel, sobre todo en los brazos y piernas.—*Forúnculos en los brazos* y en la cara.—Aumento de robustez.—Infarto escrofuloso.

Sueño.—Bostezos todo el dia, con dificultad en la respiracion.—*Mucha gana de dormir por el dia*, sobre todo en la tarde, en leyendo ó escribiendo, y á veces con sensacion como si la cabeza estuviese comprimida en un círculo.—Dificultad de dormirse por la tarde.—Sueño agitado, con sobresalto y muchos ensueños.—Sueños de muertos, de sepulcros y mortandades, de querellas y viajes.—Boca abierta durante el sueño.—El sueño por la mañana es muy prolongado, no repara las fuerzas y adormece.

Fiebre.—*Calofrio tembloroso con bostezos*, *pandiculaciones y piés frios*, apareciendo cada dos dias.—Estirones en los miembros y cabeza pesada durante los calofrios.—Disposicion al frio, que disminuye por el calor exterior.—Calor de las manos y piés, con frio por todo el cuerpo.—*Sensacion de ardor quemante interior*, á veces como si estuviera entre la piel y la carne.—Disposicion á la traspiracion al menor ejercicio.

Moral.—*Humor triste*, *moroso*, con falta de apetito y vómitos.—Ganas de reñir.—Laconismo.—Gran actividad y deseo de hacer trabajos intelectuales.—Repugnancia para sus negocios, hasta el punto de creer que debe abandonarlos.—Debilidad de memoria, que hace olvidar con facilidad.—*Errores de los sentidos y visiones*; cree tener detrás de sí personas extrañas, ó parece que toda clase de cosas se mueven delante de los ojos.

Cabeza.—*Vértigos* por la tarde al acostarse, y sobre todo al *pasar sobre una corriente de agua.*—Agravacion de los vértigos en tiempo húmedo.—Cabeza turbada, como si estuviese rodeada de un círculo, *con vértigos.*—*Dolor gravativo en el sincipucio por el calor del sol, y disipándose á la sombra.*—*Dolor de cabeza despues de haber bebido leche*; siente una especie de pulsacion dura, que se mejora al acostarse sobre el lado derecho y apoyando los brazos sobre la cabeza.—Cefalalgia presiva, particularmente sobre los ojos.—Dolor expansivo, como si todo quisiera salir de la cabeza.—Congestion venosa y fuerte inyec-

cion en los vasos del cerebro y de la médula espinal en los animales.—Dolor en el fondo del cerebro, presivo por sacudidas sobre los ojos y la raiz de la nariz.—Cefalalgia frontal, alternando con dolores de riñones.—Cosquilleo en los tegumentos de la cabeza.—°Tiña maligna?

Ojos.—°*Punzadas en los ojos y en los párpados.*—°Punzadas pulsativas en el párpado superior izquierdo, esparciéndose hasta las cejas, la frente y sienes, aumentadas por la presion, el movimiento y estando encorvado, mejoradas por el reposo, y creyendo todo trabajo imposible.—Sensacion de ardor en los ojos, con contraccion espasmódica de los músculos orbiculares, lagrimeo, opresion, tos y cabeza como aturdida.—Frio y peso en los párpados, con gran dificultad de tener abiertos los ojos.—*Lagrimeo*, sobre todo en el ojo derecho.—*Inflamacion de los ojos*, con *reblandecimiento y ulceracion* de la conjuntiva.—Fotofobia.—Vivo resplandor delante de los ojos.—Al leer por la tarde, á veces pérdida momentánea de la vista.—*Pupilas dilatadas* (en los animales).

Oidos.—Sensacion de ardor, latidos, punzadas y zumbido en los oidos.—°Infarto caliente y duro de la parótida derecha, con hinchazon de la articulacion sub-maxilar; crujido en los oidos al andar; dolor en la garganta é hinchazon de las amigdalas.

Nariz.—Granos en la nariz y en el fondo de la lengua.—hinchazon dolorosa al lado izquierdo de la nariz, como si fuera á formarse una pústula.—*Costras y grietas en las ventanillas nasales*, con hinchazon de las alas de la nariz.—*Epistaxis*, con mejoría de los padecimientos del pecho y de los ojos.—Sensacion de llaga en las ventanillas nasales, como si le arrancasen pelos, y como si fuera á declararse un romadizo.—Estornudo conmovente seguido de obturacion de la nariz.—*Coriza fluente*, con *obturacion y excoriacion, sobre todo de la ventanilla de la nariz derecha*, y estornudo frecuente.—*Coriza tenaz, con excoriacion de los bordes de las ventanillas nasales y de la piel debajo de la nariz.*—Evacuacion de mucosidades amarillentas tenaces.

Cara.—*Sensacion de calor*, sobre todo debajo de la nariz, con *cosquilleo como si una tela de araña cubriera esta parte.*—Color pálido de la cara.—Estremecimientos convulsi-

Digitized by Google

vos en la cara, á consecuencia del picor y de quemadura en la garganta.—Cosquilleo y hormigueo en las mejillas y en los pómulos.—Sensacion de ardor en el labio superior, y al mismo tiempo parece estar muy lisa esta parte.—Descamacion del labio excoriado.

Dientes.—Latidos en los dientes.—Dolores en los dientes cariados, con sensacion al cerrar la boca como si fuesen muy largos.

Boca.—Granos en la parte posterior de la lengua.—*Secrecion salival aumentada.*—Salivacion.—Inflamacion de las glándulas salivales (en los animales).

Garganta.—Sensacion de ardor y *dolor de excoriacion* en la garganta; sensacion de ardor hasta dentro del esófago y el estómago.—Estado inflamatorio crónico de la cámara posterior.—*Inflamacion de las membranas de la garganta, con exudacion de linfa plástica.*—°Dolor en la garganta, con hinchazon y de un color rojo rosado de las amígdalas, infarto duro y caliente de la parótida derecha; ruido contínuo estrepitoso de mucosidades; punzadas y presion en la garganta durante y fuera del tiempo de la deglucion; deglucion difícil y aumento de los dolores al tragar los líquidos.—Rubicundez tenaz de la membrana mucosa de la garganta, con numerosas excoriaciones.

Apetito y gusto.—Gusto ácre ó ácido en la boca.—El agua produce un sabor salado por la mañana en ayunas.—Repugnancia al agua fria.—Apetito aumentado y buena digestion.—Deseo de cosas ácidas despues de la ingestion, durante la cual los síntomas se agravan, seguidos de diarrea.—Repugnancia á fumar tabaco, el cual produce náuseas y vértigos.

Estómago.—Náuseas y ganas de vomitar, á veces con sensacion de ardor en la garganta, desde la lengua hasta el estómago.—*Eructos frecuentes*, con vomituricion repetida, que hace subir muchas flemas.—Aumento de secrecion mucosa, con mal gusto y eructos frecuentes.—Eructos de un gusto á huevos podridos.—Vómitos de mucosidades sanguinolentas ó de materias ácidas.—(Vómitos muy fétidos y vomituricion que aniquila las fuerzas hasta poner al indivíduo á las puertas de la muerte, como se dice vulgarmente).—Sensacion de vacuidad en el estómago.—*Presion en el estómago*, como por una pie-

dra, ó con ganas de vomitar, eructos, cólicos y borborigmos.—Calor y sensacion de ardor en el estómago.—Inflamacion del estómago.—Sugilaciones (*), como de pequeñas úlceras en el estómago.—Despues de la muerte, la membrana mucosa del estómago es de un color rojo retiforme, está *reblandecida* ó engrosada, y cubierta de manchas negras y de úlceras gangrenosas.

Vientre.—Inflamacion del diafragma, del bazo y del hígado.—*Dolores en el hipocondrio izquierdo* durante muchos dias, y sensacion como si tuviera una bola.—Infarto ó induracion del bazo á consecuencia de una gonorrea mal tratada.—Despues de haber fumado, pellizcos violentos en el vientre, mejorados apretando sobre la parte y que se agravan por movimientos rápidos.—*Cólicos y borborigmos.*—Inflamacion de los intestinos, con venas inyectadas, rubicundez retiforme, engrosamiento de la membrana mucosa é hinchazon de las glándulas del mesenterio.—Adherencias manifiestas entre los intestinos.—Inflamacion del peritoneo, con exudacion de agua y de linfa plástica.—Excesiva extravasacion de sangre en la cavidad del bacinete y á lo largo de los músculos psoas.

Ano y deposiciones.—Salida frecuente de flatuosidades inodoras.—*Deposiciones como el excremento de las cabras*, duras, tenaces, morenas y lustrosas.—Deposiciones raras los primeros dias, despues dos veces por dia, mas líquidas y mas abundantes.—*Deposiciones diarréicas en forma de papilla.—Diarrea estercorácea*, *amarillenta*, precedida de retortijones y borborigmos.—*Deposiciones líquidas por la noche.*—A veces muchas mucosidades con las deposiciones diarréicas.—Deposiciones líquidas con estrías sanguinolentas.—Deposiciones verdosas ó negruzcas.—Diarrea fétida.—Deposiciones semejantes á la brea y de un olor cadavérico.—*Tenesmo* durante y fuera del tiempo de las deposiciones.—Diarrea estercorácea negruzca, con granos hemorroidales muy dolorosos (aliviados por *caps.*, y mojándolos con saliva).—Dolores en el vientre y en los riñones, como durante las reglas, con frecuente emision de ventosidades.

(*) Esta palabra se suele emplear como sinónima de equímosis; y tambien se da el nombre de *sugilaciones* á las manchas escorbúticas y coloraciones de la piel, que aparecen en el curso de ciertas afecciones cutáneas. (*N. del T.*).

Digitized by Google

Orinas. —Secrecion ordinaria disminuida.—Emision de algunas gotas despues de haber orinado.—Sensacion de ardor en la uretra despues de orinar.

Partes viriles.—Pellizcos presivos en el miembro, mas bien hácia el lado derecho.—Actividad de los testículos aumentada.—Sensacion de frio en el testículo derecho. °*Hinchazon de los testículos*, °con gonorrea crónica ó del lado izquierdo solamente y con dolor de excoriacion.—Erecciones por la mañana.—Poluciones.—Eyaculacion pronta durante el cóito.

Reglas, etc.—Salida estrepitosa de gases por la vagina.—Dolor de excoriacion en la vulva.—La sangre de las reglas es de un rojo vivo.—°Metrorragia pasiva.—Reglas muy anticipadas y abundantes.—°Supresion de las reglas.—Antes de la época, dolores de riñones, sensacion de debilidad y falta de apetito, ó bien punzadas en el bajo vientre, mejorándose estando en la cama ó encorvada.—*Al empezar las reglas*, *cefalalgia*, particularmente en la frente, con sensacion al bajarse, como si los ojos quisieran salir de la cabeza.—°Dolores espasmódicos contractivos á cada época, seguidos de dolores de excoriacion en el vientre.—Infarto de las mamas.

Laringe y tos.—*Inflamacion de la laringe, de la tráquea-arteria y de los bronquios*, con estrías rojizas ó de un encarnado subido, sobre todo en el punto en que la membrana de la laringe cubre la glotis.—Exudacion de linfa plástica en la laringe y la tráquea-arteria.—*Ronquera y afonia* con *fuerte sensacion de excoriacion* y de aspereza en la garganta.—Sensacion de frio en la laringe, sobre todo en suspirando, despues de desayunarse, y mejoría despues de afeitarse.—Sensacion de contraccion en la laringe, alrededor del hoyito, como si se comprimiese.—Cosquilleo en la laringe, excitado por la tos.—Tos ronca, seca y hueca.—Tos fatigante, no permitiendo hablar una palabra.—Tos excitada por un cosquilleo contínuo en la laringe, ó bien al inspirar profundamente.—*Tos con accesos de sofocacion*, como por vapores de azufre, con cefalalgia sorda, presiva.—*Tos espasmódica de un ruido crupal, sibilante, ronca*, con disnea y estornudos.—Tos con vomituricion.—En las experimentaciones hechas en los mamíferos roedores, la tos no se ha manifestado jamás; el doctor *Hering* deduce de esto, que

Digitized by Google

no se debe administrar el bromo ni contra el croup, ni contra la tos *de las personas en que la posicion de los dientes guarde semejanza con la de los mamíferos roedores.*

Pecho y respiracion.—*Opresion violenta del pecho*, á veces con tos, dolor de cabeza y vértigos.—Respiracion difícil, con necesidad contínua de respirar, mas fuerte por la mañana, mejorada al andar, así como por la tarde y por la noche.—Bostezos contínuos durante la respiracion angustiosa.—Sensacion como si la respiracion fuera suprimida por un obstáculo en medio del pecho.—Sensacion de plenitud en el pecho y garganta, como si un cuerpo blando estuviera entre los pulmones y el esternon.—°Fatiga asmática como á consecuencia del sarampion en una niña, no permitiéndola ni andar ligera, ni subir una escalera, sin producir una fuerte extenuacion.—*Respiracion muy difícil con boca y nariz llenas de saliva y de espuma*, *lagrimeo*, *tos*, *gana de vomitar*, *vomituricion* y vómitos espumosos, aullido ronco (en los perros), palpitaciones de corazon irregulares, *gran debilidad hasta la postracion*, *temblor y frio por todo el cuerpo*, *deposiciones líquidas*, *pulso muy frecuente.*—Sensacion de debilidad y de fatiga en el pecho.—*Dolores* (tensivos ó contractivos) *en el pecho*, *sobre todo en el costado derecho.*—Pecho como contraido, con fatiga en la respiracion y tos seca excitada por un cosquilleo.—*Punzadas en el pecho*, *sobre todo en el costado derecho*, y á veces mas fuerte andando de prisa.—*Inflamacion de los pulmones hasta la hepatizacion*, ó trasformacion de los pulmones en una sustancia tuberculosa purulenta.—Congestion en el pecho.—*Palpitaciones frecuentes*, á veces con opresion en la region del corazon, necesidad de bostezar y sensacion como si el aire inspirado fuese muy frio.—Las palpitaciones no permiten estar echado sobre el lado izquierdo.—*Inflamacion del corazon*, con dureza, color rojo subido, *acumulacion de una sangre coagulada negra, y las venas del pecho muy llenas*, sangre descolorida y líquida.—°Hipertrofia del corazon.—En el exterior del pecho, cosquilleo ó sensacion al tocarle, como si la carne se desprendiese de los huesos por un golpe.

Tronco.—°Paperas?—°Infarto escrofuloso de los dos lados del cuello?—Tirantez del cuello, impidiendo volver la cabeza, lo que es muy doloroso.—Cosquilleo con sen-

Digitized by Google

sacion de picoteo en la espina dorsal; estirones frios descendiendo á lo largo del dorso.—Dolor de excoriacion en los riñones.

Extremidades superiores. —Sensacion de constriccion en los miembros superiores.—Dolores paralíticos en la espalda y los brazos.—*Debilidad en el brazo izquierdo que está como paralítico.*—Laxitud y falta de fuerzas en los brazos.—Estallido en la articulacion del codo derecho.—Dolor violento en la mano derecha, el dolor atraviesa con rapidez el dedo de enmedio, con punzadas.—La mano derecha caliente y como hinchada.—Calor en ambas manos.—Dolor dislacerante y punzadas en los dedos.—Dolor sordo en todas las articulaciones de la mano izquierda, propagándose hasta el codo y la espalda.—Dolor dislacerante en las articulaciones centrales del dedo de enmedio, que le obligan á estirarse.—Nudosidades en el dedo anular derecho.—Rigidez de los dedos de la mano derecha, con temor de dejar caer lo que se tiene en ella.—°*Artritis crónica*, con hinchazon, inmovilidad y deformidad de las articulaciones.

Extremidades inferiores. — Latidos en las extremidades inferiores, mas fuertes en la derecha, con rigidez hasta los piés y dedos gordos, estos últimos están hasta doloridos, por la tarde durante el paseo.—Sensacion de parálisis en la extremidad inferior derecha, debilidad en la izquierda.—Dolor en la rodilla y la cadera del lado derecho, mas sensible durante el movimiento.—Sensacion de ardor y dolor reumático en la rodilla izquierda.—Cosquilleo en las extremidades inferiores. — Por la tarde, apoyando el pié; dolor violento en la parte carnosa de la planta del pié izquierdo, con sensacion de parálisis en la rodilla y en la cadera, y seguida inmediatamente de dolor de garganta presivo al lado del cartílago tiróides.—Calor en los piés. — *Sensacion de frio en el dedo grueso izquierdo*, por la noche, al despertar, con hormigueo.—Dolores en los dedos gruesos del pié derecho.—Los callos del dedo pequeño del pié izquierdo se hacen dolorosos y crecen rápidamente.

40.—BRUCEA ANTI-DYSENTERICA.

BRUC.—Falsa angustura???—Hering.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—Medicamento poco conocido.

SINTOMAS GENERALES.—Sensacion de cansancio sumo en las extremidades.—Pinchazos en muchos puntos de los miembros.—Por la tarde, tirantez en las articulaciones y dolores tractivos agudos en los miembros con punzadas en la cabeza, en los oidos y en el pecho.—Abatimiento.—Pandiculaciones y bostezos.—Gran laxitud andando.—Por la tarde, sobreexcitacion nerviosa, temblor y vacilacion al andar.—Irritabilidad aumentada por la tarde.

Fiebre.—Disposicion al frio y aversion al aire fresco.—Calofrios y frio excesivo.—Sudor al andar, no obstante los calofrios que aparecen principalmente durante el reposo.

Sueño—Soñolencia todo el dia, en particular estando sentado, por la mañana, despues de comer y en mas alto grado, despues de medio dia.—Soñolencia por la tarde temprano.—Sueño lleno de ensueños con ebullicion de sangre.—Sueño turbado por ensueños confusos ú horribles, espantosos.—Soñolencia alternando con falta de apetito.

Moral.—Espíritu abatido con necesidad de dormir.—Taciturnidad é hipocondría.—Humor sombrío, melancólico, con pereza y laxitud.—Humor triste y sombrío al despertarse por la mañana.

Cabeza y ojos.—Pesadez y turbacion en la cabeza, con soñolencia, desapareciendo por la tarde.—Vértigos por la tarde que hacen caer.—Hormigueo como si escarbaran en el vértice.—*Por la tarde, dolor de cabeza despues de haber andado mucho tiempo al sol.*—Cefalalgia detrás de las cejas, las que parecen estar hinchadas.—Punzadas en la cabeza, agravadas andando, sobre todo al sol.—Dolor de cabeza, que se agrava estando sentado, así como despues de haber comido.—Ojos empañados, hinchados.—Rubicundez de los ojos en sus ángulos, por la tarde.—Comezon en los párpados.—Por la mañana ojos rojos,

Digitized by

quemantes.—Sensacion dolorosa en los ojos, como por arena, obligando á frotarlos.

Cara y boca.—Herpes farináceos, prurítosos en la cara, seguidos de descamacion de la piel.—Palidez de la cara. —Pequeños movimientos convulsivos, rápidos en los labios.—Dolores agudos en los dientes y encias, sobre todo bebiendo agua fria.—Acumulacion de saliva en la boca, obligando á escupir contínuamente.—Sequedad y dolor quemante en la garganta, como por grasa rancia.

Estómago.—Poco apetito con insipidez de los alimentos; al comer y al desayunarse.—Gusto pastoso.—Eructos vacíos.—Sensacion en el estómago, como si no hubiera comido nada despues de largo tiempo.—Sensacion de ardor y calor en la boca del estómago.—*Pulsaciones en el estómago y en todo el vientre*.—Presion en el estómago inmediatamente despues de haber bebido ó comido.—Despues de la comida, palpitaciones violentas de corazon, agravacion de los dolores de cabeza, meteorismo y necesidad de deponer.—Por la tarde, accesos de náuseas con dolores calambroídeos en el vientre, vómito de los alimentos, y deposiciones diarréicas con gran abatimiento.

Vientre.—Punzadas dolorosas como si pellizcaran en el vientre.—Apretamiento como por gárfios en el vientre, seguidos de pequeñas deposiciones mucosas, frecuentes.—Borborigmos.—Los dolores de vientre cesan despues de la primera deposicion.—Deposiciones muy blandas, en muy corta cantidad y de color muy claro.—Punzadas en el ombligo despues de deponer.—Deposiciones diarréicas, seguidas de accesos de desvanecimiento que obligan á acostarse.—Mucha disposicion á las deposiciones diarréicas, con cólicos y flatuosidades.—Por la mañana y la tarde deposiciones diarréicas.—Por la tarde, picazon en el ano.

Pecho.—Respirando, sensacion de un gran peso, sobre todo en el pecho.—Opresion de pecho con disposicion al frio y gran sensibilidad al aire libre.—Por la mañana al despertarse, dolor de contusion al exterior del pecho, con dolores tensivos, respirando profundamente.—Dolores de excoriacion en el interior del pecho, sobre todo por la noche en la cama, y mas fuertes estando echado de lado.

Miembros.—Sensacion de apretamiento en el dorso.—

Digitized by

Dolores de laxitud en los muslos y riñones.—Dolor calambroídeo en el dorso de la mano.—Miliar roja, elevada, picante en el dorso de la mano y en el cuerpo.—Por la tarde sensacion de parálisis en el muslo.—Laxitud en las rodillas.—Corvadura en la articulacion del pié, de suerte que se anda casi sobre la punta de este.—Sensacion de quemadura en los callos.

41.—BRYONIA ALBA.

BRY.—Brionia.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: de 4 á 5 dias en las afecciones agudas; 30 dias en algunas enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Acon. cham. ign. n-vom.—*La brionia* es el antídoto de: Alum. clem. rhus. mur-ac. seneg.

COMPÁRESE CON: Acon. alum. arn. ars. cham. chin. clem. ign. led. lyc. merc. mur-ac. nux-vom. op. phos. puls. rhus. squil. sen.—La brionia hará buen efecto siempre que se halle indicada, sobre todo despues de *acon. nux-vom. op.* y *rhus.*—Despues de brionia será algunas veces conveniente administrar: *Alum. rhus.*

CLINICA.—Dejándonos guiar por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos particulares en los que se puede *consultar* este medicamento contra:—Afecciones, principalmente de hombres adultos de una *constitucion nerviosa*, ó *seca*, *delgada y biliosa*, *de temperamento colérico*, colormoreno, cabellos y ojos negros ó castañ os, carácter irrita ble, con disposicion á *inflamaciones membranosas*, etc., etc. —Afecciones reumáticas y artríticas, con ó sin fiebre inflamatoria é hinchazon; Nudosidades artríticas; Afecciones hidrópicas; Inflamaciones locales agudas (y crónicas); Padecimientos *causados por un enfriamiento* ó un frio seco (viento de Este); Malas resultas de un acceso de cólera, de esfuerzos físicos (de una relajacion en los riñones, etc.). y de una vida sedentaria; Luxaciones espontáneas; Convulsiones y espasmos histéricos?; Tétanos y trismus?; Congestiones activas; Parálisis; Tumores inflamatorios; Afecciones escrofulosas; Obstruccion é induracion de las glándulas?; Ictericia; Afecciones hidrópicas; Erupciones flictenóides; Herpes furfuráceos; Petequias (morb. máculos.); Sarampion y afecciones á consecuencia de esta enfermedad; Síntomas precursores de la viruela y de la variolóide; Malas resultas de la supresion de la escarlatina; Inflama-

ciones erisipelatosas en las articulaciones; Erupciones miliares de los niños y de las recien paridas; Somnambulismo; *Fiebres inflamatorias* con afecciones nerviosas, gástricas ó biliosas, y *fuerte excitacion de los sistemas sanguíneo y nervioso*; Fiebres intermitentes; Fiebres tifoídeas, período inflamatorio; Cefalalgia, á consecuencia de emociones morales, ó despues de un enfriamiento; Hemicránea; Encefalitis (y meningitis?), aun cuando provengan de congelacion; Afeccion cerebral á consecuencia de un arrebato de cólera; *Hidrocéfalo agudo*; Coriza y obturacion crónica de la nariz; Epistaxis aun la ocasionada por menostasia; Prosopalgia inflamatoria; Fluxion en la mejilla; Hinchazon escrofulosa de los labios; Hipo convulsivo; Anorexia y dispepsia crónicas, con ó sin vómitos; Pituitas; Gastralgia; Gastritis?; Estrechez del cardias?; Afecciones gástricas y biliosas, con fiebre; Hepatitis; Enteritis; Peritonitis; Afecciones abdominales, debidas á una vida sedentaria; Ascitis; Diarreas, principalmente las que provienen de un enfriamiento; Estreñimiento tenaz; Diarreas que alternan con estreñimiento; Amenorrea; Metrorragia, Espasmos histéricos abdominales; Cólicos de las mujeres que están embarazadas y de las parturientas; *Fiebre puerperal*; Flemon de las mamas; Induracion de las mamas; Fiebre láctea; Galactorrea y otros padecimientos á consecuencia del destete; Estreñimiento, oftalmía y miliar de los recien nacidos; Catarro de las vías aéreas, aun á consecuencia del sarampion ó de un enfriamiento; Grippe; Tos catarral, nerviosa ó convulsiva, etc.; Hemoptísis; *Bronquitis agudas y crónicas*; *Neumonía parenquimatosa*, aguda ó crónica; *Pleuresía*, principalmente en las personas de edad y despues del uso del acónito; *Pleurodinia*; Hidrotorax; Padecimientos asmáticos; Carditis; Lumbago?; Inflamacion flemonosa de los piés; Psoitis; Coxalgia; Luxacion espontánea; Inflamacion reumática de la rodilla; Gota, etc., etc.

Véase la nota, pag. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Tension*, *dolores tractivos*, *tirones agudos y punzadas*, *sobre todo en los miembros*, y principalmente durante el *movimiento*, con *dolores insoportables al tacto*, sudor de la parte afecta y temblor de esta parte cuando los dolores disminuyen.—*Tirantez y

Digitized by

punzadas en las articulaciones, al tacto y durante el movimiento.—Por la tarde excesivo cansancio en los miembros, con debilidad paralítica.—*Torpeza y adormecimiento de los miembros, con rigidez y mucho cansancio de estos.—°*Hinchazon pálida*, *tirante*, *caliente*.—**Hinchazon roja*, *lustrosa* de algunas partes del cuerpo, con *punzadas*, durante el movimiento.—*Dolores de contusion ó de *ulceracion subcutánea*, ó como si *la carne* se hubiese *desprendido de los huesos*.—Presion tractiva en el periostio.—°Hinchazon é induracion de las glándulas.—°Nudosidades duras, en muchas partes de la piel, como de pequeñas glándulas endurecidas.—**Dolores con calofrios y frio en el cuerpo*.—Estremecimientos de los músculos y de los miembros.—Convulsiones.—*Agravacion de los dolores y de los padecimientos por la noche, por la mañana al despertar, ó por la tarde hácia las nueve de la noche, así como despues de comer, y por el *movimiento*; mejoría durante el reposo.—Malestar general, sensacion de compresion, con calofrios causados por la presion de los vestidos.—Tirantez por todo el cuerpo.—Temblor de los miembros al levantarse despues de haber estado acostado.—Falta de solidez en los miembros al andar, despues de haber estado sentado.—*Gran laxitud y debilidad, sobre todo por la mañana ó paseando al aire libre.—*Necesidad de estar acostado.—Accesos de desvanecimiento.—Sensacion de debilidad, sobre todo paseando al aire.

Piel.—*Color amarillo de la piel.—Piel húmeda, viscosa.—Sensacion de ardor y picoteo por todo el cuerpo, como por ortigas, despues de ligeras emociones.—Inflamaciones *erisipelatosas, sobre todo en las articulaciones.—*Erupciones urticarias.—°*Miliar*, sobre todo en *los niños* y en las mujeres recien paridas.—Nudosidades duras en la piel.—**Erupciones flictenóides* con *comezon corrosiva* ó *quemante*.—°Herpes furfuráceos, con comezon quemante.—**Petequias*.—Ulceras con sensacion de frio, ó con dolores pulsativos ó que causan escozor.—Sabañones.—Callos, con presion ó punzadas quemantes, ó dolores de excoriacion al tacto.

Sueño.—Gran necesidad de bostezar.—Mucha soñolencia por el dia, sobre todo despues de comer.—°Soñolencia comatosa, interrumpida por delirios angustiosos.—*In-

Digitized by Google

somnio, sobre todo antes de media noche, causado por el calor, ebullicion de sangre y ansiedad, sobre todo en el pecho.—*Sueño turbado por la sed, con gusto amargo en la boca, al despertar.—Imposibilidad de estar echado sobre el lado derecho.—Sobresaltos con espanto al dormirse y durante el sueño.—Sueño inquieto con ensueños confusos y afluencia de ideas.—°Al dormirse, gritos y delirios desde que se han cerrado los ojos.—**Ensueños desagradables, pesarosos.*—Sueños vivos de las ocupaciones del dia.—**Delirios nocturnos* y desvarios con los ojos abiertos.—Gemidos, sobre todo hácia media noche.—**Somnambulismo.*—Pesadilla.

Fiebre.—**Frio y calofrios* en el cuerpo, aun *en la cama*, por la tarde, ó acompañados de dolores en todos los miembros y sudor frio en la frente.—**Calofrios con temblor*, seguidos frecuentemente de calor *en la cabeza, rubicundez de la cara y sed*, ó seguidos de calor, con sudor y sed.—°*Antes de los calofrios, vértigos y cefalalgia*; despues horripilacion con tension y traccion de los miembros.—°Disgusto por los alimentos y las bebidas durante los calofrios.—°Calor al principio alternando con calofrios, despues calor quemante y sed, en seguida fuerte sudor.—**Calor general, seco*, exterior é *interior*, casi siempre con gran deseo de bebidas frias.—°Durante el calor, vértigos y cefalalgia.—Accesos febriles con frio y calofrios, predominando el tipo terciano, náuseas y necesidad de estar acostado, ó con dolores lancinantes en el costado y en el vientre, y sed durante los calofrios y el calor.—Al principio de la fiebre, tos seca con vómitos, punzadas y opresion en el pecho.—Sudor frio en la frente y en la cabeza.—Sudor abundante mientras se pasea al aire frio.—Sudor grasiento dia y noche.—°Sudor con ansiedad é inquietud, respiracion suspirosa, tos corta y presion en el pecho.—**Sudores* abundantes *por la noche y por la mañana*, algunas veces de un olor ágrio.

Moral.—Ansiedad e *inquietud*, con *temor del porvenir.*—*Llantos frecuentes.*—°Pierde las esperanzas de curarse, y teme la muerte.—Miedo con deseo de escaparse.—°*Desaliento.*—°Aversion á la conversacion.—**Irascibilidad y arrebatos.*—Falta de memoria.—Ausencia de ánimo momentánea.—Aturdimiento.—°Deseo de cosas que no tiene y que desecha en cuanto las logra.—

Digitized by Google

*Delirios y tonterías acerca de sus negocios del dia.

Cabeza.—*Confusion, aturdimiento y obnubilacion de la cabeza.—Vacilacion y embriaguez, como por congestion á la cabeza.—Aturdimiento de esta.—Vértigos semejantes á vaivenes.—°Vértigos solamente cuando se baja.—**Vértigos rotatorios*, sobre todo al levantarse del asiento, ó al levantarse despues de haber estado acostado.—Cefalalgia como despues de haber pasado toda la noche en diversiones.—*Dolor de cabeza, despues de cada comida.—*Accesos de dolores de cabeza, con vómitos, náuseas y necesidad de acostarse.—*Dolor de cabeza por la mañana, desde que se abren los ojos.—**Mucha plenitud y pesadez de cabeza*, con *presion* como si *escarbaran hácia la frente*, y cuando se baja, sensacion como si todo quisiera salir por la frente.—**Presion expansiva ó compresion* en el cerebro.—*Punzadas en la cabeza, á veces de un solo lado.—*Dolores pulsativos*, con estremecimiento, aumentados por el movimiento, con presion en los ojos.—Congestion á la cabeza, con calor en el cerebro.—°Dolores quemantes en la frente.—**Los dolores de cabeza se agravan por el movimiento* y una marcha rápida, ó cuando se abren los ojos.—Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo, como por excoriacion.— Dolores tractivos y estremecientes en la cabeza, desde el pómulo hasta la sien, aumentados por el contacto.—Calor quemante de la cabeza en el exterior.—Sudor frio en la frente.—Cabellos muy engrasados.

Ojos.—Dolores en los ojos moviéndolos.—Presion en los ojos como si fueran á salirse de las órbitas.—*Presion en los ojos como por arena, sobre todo por la mañana y por la tarde.—Dolores lancinantes y tractivos en los ojos.—Dolores quemantes en los ojos.—*Inflamacion de los ojos y de los párpados con rubicundez.—Hinchazon dolorosa de los ojos con supuracion, y conjuntiva hinchada y roja.—Hinchazon roja de los párpados, sobre todo de los superiores, con dolores presivos.—°Herpes furfuráceos en los párpados con comezon ardiente.—Orzuelo en el párpado.—Abscesos en el ángulo interno del ojo.—*Aglutinacion* nocturna de los párpados, con lagrimeo por el dia, sobre todo al sol, y con vista turbia.—°Ojos empañados, vidriosos, turbios ó centelleantes, y como anegados en lágrimas.—Presbiopia.—Confusion de las le-

tras al leer.—°Negrura ó llamas delante de los ojos.—°Fotofobia.

Oidos.—Dolores contractivos en los oidos, con disminucion de la audicion.—Punzadas en los oidos durante y despues de pasear al aire libre.—Tumor como un chichon delante y detrás de la oreja.—Flujo de sangre por los oidos.—Sensacion en los oidos, como si estuviesen tapados.—**Zumbido de oidos.*—°*Todo ruido es insoportable al oido.*

Nariz.—**Hinchazon de la nariz* con *sensibilidad dolorosa* al tacto y obturacion de la misma.—*Inflamacion y ulceracion de las ventanillas de la nariz.—Ulcera en las ventanillas nasales, con dolores corrosivos.—**Epistaxis frecuente*, algunas veces por la mañana, ó cuando están suprimidas las reglas, ó tambien cuando se está durmiendo.—*Sequedad y obturacion de la nariz, á veces tenaces.—Coriza fluente, con presion lancinante en la frente.—*Coriza seco, á veces tenaz.—Mucosidades duras, que se secan y convierten en costras.

Cara.—*Color pálido de la cara, amarillo, térreo.—**Cara roja, ardiente.*—Manchas rojas en la cara.—°*Hinchazon* caliente, azulada y pardusca de la cara.—Dolores en la cara, generalmente presivos, aliviados por la presion exterior.—**Hinchazon de la cara*, á veces de un solo lado, ó por debajo de los ojos y de la raiz de la nariz.—Hinchazon de la mejilla muy cerca de la oreja.—Pequeñas nudosidades é induracion de la cara, como glándulas, subcutáneas.—**Labios hinchados y agrietados*, que dan sangre fácilmente y sensacion de quemadura al tacto.—**Labios secos.*—Erupcion en los labios con escozor quemante.

Dientes.—*Odontalgia con necesidad de acostarse*, aumentada por la noche, con el uso de cosas calientes; agravada estando echado sobre el lado sano, y aliviada echándose sobre la parte afecta.—*Odontalgia estremeciente y tirante*, con sensacion como *si los dientes fuesen muy largos*, ó vacilasen, sobre todo durante y despues de la comida.—Dolores de excoriacion en las encías, con los dientes que vacilan.—Encías fungosas.

Boca.—**Sequedad de la boca*, con sed ardiente.—Acumulacion de una saliva jabonosa y espumosa en la boca.—Salivacion.—Olor pútrido de la boca.—*Lengua °seca*, *cu-

Digitized by Google

bierta de una costra blanca, ó súcia, ó °*amarilla*.—°Color oscuro y rugosidad de la lengua.—Vesículas ardientes en el borde de la lengua.—°Palabra imperceptible por sequedad de la garganta.

Garganta.—Dolor de garganta con ronquera y deglucion difícil.—Dolores de excoriacion en la garganta, tragando en seco.—**Sensacion de sequedad y mucha sequedad* en la garganta.—Presion en la faringe, como por un cuerpo duro y puntiagudo.—**Punzadas en la garganta al contacto*, como tambien volviendo la cabeza y tragando.—Mucosidades tenaces en la garganta, que solo se desprenden con muchos esfuerzos.

Apetito.—*Pérdida del gusto.—**Gusto soso*, *pastoso*, ¯*pútrido*.—*Insipidez de los alimentos.—Gusto de un dulce insípido.—*Gusto amargo* de todos los alimentos, ó solamente despues ó fuera del tiempo de la comida, como tambien *por la mañana*.—*Sed ardiente, á veces despues de la comida, aumentada bebiendo cerveza.—No se bebe á menudo, pero sí mucho de cada vez.—Gran deseo de vino, de bebidas ácidas, de café y *aun de cosas que no se comen.—*Hambre morbosa que hace comer á menudo y poco de cada vez.—Bulimia, muchas veces sin apetito, ó con sed y calor pasajero, á veces tambien por la noche.—Pérdida del apetito al primer bocado.—**Repugnancia y disgusto á todos los alimentos*.—*Despues de cada comida*, eructos con *presion en el estómago y en el epigastrio*, cólicos ó *vómitos*, principalmente despues de haber comido pan.

Estómago.—*Eructos*, *sobre todo despues de haber comido*, lo mas frecuentemente *amargos ó ágrios*, ó con gusto á los alimentos.—*Eructos vacíos.—**Regurgitacion de los alimentos*, despues de cada comida.—**Hipo*.—**Náuseas y ganas de vomitar*, *sobre todo despues de haber comido alimentos que han sabido bien*, ó cuando se levanta, despues de haber estado acostado.—*Náuseas con gana de vomitar y ansiedad, cuando se sienta, ó cuando se esfuerza á beber.—Náuseas por la mañana.—**Vomituricion*, con flujo pituitoso.—*Vómito despues de haber bebido, sobre todo cuando se ha bebido despues de la comida.—Por la tarde vómito de viscosidades.—**Vómito de los alimentos*, ¯con hipo y vomituricion ó vómito de agua amarga, ó de bilis aun por la noche.—°Vómito de sangre.—Punzadas en

Digitized by Google

el lado izquierdo del vientre durante los vómitos.—*Presion como por una piedra en el estómago, sobre todo despues de la comida, ó andando, algunas veces acompañada de mal humor.—Dolores incisivos en la boca del estómago como por cuchillos.—°Dolores contractivos en el estómago, algunas veces con vómito de los alimentos. —Constriccion de la boca del estómago, y tension dolorosa al tacto, con sensacion de calor.—**Punzadas en el estómago* estando echado de lado, como tambien en la *boca del estómago durante el movimiento, cuando se anda ó da un paso en falso.*—°Dolor de excoriacion en la boca del estómago, sensible al tacto ó al toser.—°La menor presion en la boca del estómago se hace insoportable.—°*Sensacion de quemadura en la boca del estómago y en el estómago*, sobre todo durante el movimiento.—Sensacion de hinchazon en la region epigástrica.—°Incomodidad de los vestidos encima del estómago y de los hipocondrios.

Vientre.—°*Dolores en el higado, regularmente lancinantes,* tensivos ó quemantes, sobre todo al tacto, al respirar ó al toser.—°Dolores tractivos en el hipocondrio, hasta en el estómago y en el dorso, por la mañana y despues de comer, y á veces con vómitos.—Hinchazon dura en las regiones hipocondríaca y umbilical.—Punzadas en la region esplénica.—*Cólicos con tension de vientre y salida de agua como de pituitas.—*Meteorismo con presion en el hipogastrio, sobre todo despues de comer.—°Dislaceracion en el vientre desde las caderas hasta la boca del estómago.—*Dolores calambroídeos, pellizcos, ó *retortijones y punzadas en el vientre*, principalmente despues de haber comido ó bebido (sobre todo leche caliente), algunas veces con deposiciones diarréicas.—Hinchazon dura alrededor del ombligo.—*Ascitis.—*Ruido como de agua y borborigmos*, con expulsion de gases algunas veces solamente al anochecer en la cama.

Deposiciones.—**Estreñimiento tenaz.*—*Excrementos gruesos con expulsion difícil.—*Deposiciones poco abundantes, pero duras y como tostadas.—**Diarreas con cólicos* alternando algunas veces con constipacion y gastralgia.—Deposiciones diarréicas de un olor pútrido, como de queso muy rancio, ó con evacuacion de materias no digeridas.—**Diarrea por la mañana.*—Diarreas nocturnas,

Digitized by

amarillentas, con dolor quemante en el ano.—Diarreas colicuativas.—Cólico constrictivo durante las deposiciones.—Deposiciones diarréicas frecuentes, de color oscuro (en los niños de pecho).

Orinas.—°Orinas raras, rojizas, parduscas y *calientes.—Conato urgente de orinar, con incontinencia.—Emision frecuente de orinas acuosas.—Gana de orinar, con suspension de la respiracion, levantando cosas pesadas.—Necesidad de orinar por la noche.—Emision involuntaria de orinas calientes, cuando se hacen movimientos.—Sensacion de quemadura y dolores incisivos en la uretra, antes de orinar.—Sensacion de estrechez de la uretra.—Punzadas y dolores quemantes en la uretra.

Partes viriles.—Miliar roja, pruritosa en el glande.—Punzadas en los testículos.

Reglas.—°*Reglas suprimidas.*—*Reglas muy anticipadas.*—°Dolores tractivos agudos en los miembros durante las reglas.—Flujo de sangre fuera del tiempo de las reglas. °*Metrorragia* de una sangre roja oscura, con dolor de riñones y de cabeza.—°Dolores quemantes en el fondo de la matriz durante el embarazo, aumentados por el movimiento, disminuidos por la presion y el reposo.—Hinchazon de los labios, con pústulas negras y duras.

Laringe.—*Ronquera con disposicion á traspirar, tos y estertor en el pecho.—Conato á toser, como por viscosidades; despues, dolores de excoriacion en la laringe, aumentados en hablando ó fumando.—**Tos* generalmente *seca*, *excitada por un cosquilleo en la garganta*, ó como causada por el vaho en la laringe, con necesidad de respirar á menudo.—Tos como por irritacion del estómago.—**Tos calambroidea sofocante*, sobre todo despues de media noche ó *despues de haber bebido ó comido*, y frecuentemente *con vómitos de los alimentos*.—Tos por la mañana, con flujo de agua como pituitas.—*Tos que parece se abre el pecho.—**Tos con punzadas en los costados del pecho, ó con dolores presivos en la cabeza*, como si fuera á abrirse, y tambien con dolores lancinantes en la boca del estómago ó en los hipocondrios.—°Tos con expectoracion de mucosidades de color súcio rojizo.—**Tos con espectoracion amarillenta.*—°*Tos con expectoracion de una sangre pura*, coagulada ó morenuzca, ó de viscosidades con estrías de sangre.—Al toser, dolor de excoriacion en

la boca del estómago.—Accesos de sofocacion, seguidos de ataques de tos nocturna.

Pecho.—°*Respiracion dificil* ó corta, rápida y ansiosa, ó *suspirosa*.—Opresion, con accesos de sofocacion.—°*Respiracion impedida por punzadas en el pecho*.—Respiracion profunda y lenta, sobre todo cuando se hacen esfuerzos —Necesidad contínua de respirar profundamente.—*Dificultad de respirar*, aun por la noche, algunas veces con cólico lancinante y gana de deponer.—Presion en el pecho, como por un peso, con opresion.—Dolor contractivo en el pecho, provocado por el aire frio.—Tension en el pecho, andando.—°*Punzadas en el pecho y los costados*, como por una úlcera, sobre todo tosiendo ó *respirando profundamente*, que obligan á estar sentado *y no permitiendo estar acostado mas que sobre el dorso, y aumentadas por un movimiento cualquiera*.—°Calor y dolor quemante en el pecho, con ansiedad y constriccion.—Sensacion en el pecho como si todo estuviera desprendido y cayese en el vientre.—°*Palpitaciones de corazon*, °frecuentemente muy fuertes, y aun con opresion.

Tronco.—*Dolor de riñones, como una tirantez dolorosa* que no permite andar derecho.—Durante el reposo, dolor de contusion en los riñones.—Dolor contractivo, calambroídeo por todo el dorso.—Sensacion de ardor y dolores tractivos en el dorso.—°*Punzadas en los riñones y en el dorso*.—Punzadas debajo del omóplato izquierdo, hasta el corazon, fuertemente aumentadas por la tos y la respiracion.—Presion sobre la espalda, con punzadas respirando profundamente.—°*Rigidez reumática y tension en la nuca y en el cuello*.—Manchas rojas á los lados del cuello.—Miliar roja en el cuello con mucha comezon.—Sudor en los sobacos.

Brazos.—°*Dolores tractivos en las articulaciones de la espalda y de los brazos, con tension y punzadas*, é hinchazon de un rojo lustroso.—Dolores tractivos en todo el brazo y hasta la punta de los dedos.—°Movimientos convulsivos, estremecimientos y temblor de los brazos.—°Dolores ardientes y laxitud en los brazos.—Temblor contínuo de los brazos y de los dedos.—*Hinchazon del brazo* alrededor del codo.—Punzadas en las articulaciones del codo y de la mano, con pesadez de estas.—Miliar roja en el antebrazo.—°*Dolor de luxacion en la articulacion de las manos al*

Digitized by Google

moverlas.—Por la noche, inflamacion del dorso de la mano, con dolor quemante.—*Hinchazon de las manos.*—Sensacion de torpeza en la palma de las manos,—Dolores lancinantes en los dedos, escribiendo.—Hinchazon caliente y pálida de las articulaciones de los dedos.—Estremecimiento de los dedos moviendo las manos.

Piernas.—°Crujido y dislocacion del cuello del fémur al andar.—*Dolores tractivos en los muslos.*—°*Punzadas en el muslo*, desde la nalga hasta el tobillo, con *dolores insoportables* al tacto y durante el movimiento, y tambien sudor por todo el cuerpo.—*Laxitud y falta de firmeza en las piernas*, sobre todo subiendo una escalera.—Parálisis de las piernas.—*Rigidez tensiva y dolorosa de las rodillas.—Hinchazon roja y lustrosa de las rodillas, con punzadas violentas, sobre todo al andar.—Vacilacion y genuflexion de las rodillas andando.—°Punzadas tensivas y dolorosas calambroídeas en las rodillas, con *tension hasta las pantorrillas.—°Dolores vivos en las rodillas, extendiéndose hasta las tibias.—°*Punzadas tensivas y tractivas en las pantorrillas, hasta los tobillos*, con hinchazon roja lustrosa de las partes afectas.—Calambres en las pantorrillas, por la noche y por la mañana.—Laxitud en las piernas, andando ó estando en pié.—**Hinchazon de las piernas*, que se extiende hasta los piés.—°Ulceras pútridas en las piernas.—*Dolor de luxacion en la articulacion del pié al andar.—*Hinchazon de los piés con rubicundez y calor,* dolor de contusion al extender los piés, *tension al moverlos* y dolores de ulceracion por el contacto.—Punzadas en los piés, en la planta de estos y en los dedos, sobre todo apoyando el pié.—Callos con presion, ó con punzadas quemantes, ó con dolor de excoriacion al tacto.

42.—CACTUS GRANDIFLORUS.

CAC.—Cactus.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Este remedio se ha empleado con buen éxito contra las afecciones siguientes;—*Prosopalgia* del costado derecho, empeorada por el menor movimiento, soportable tan solo

Digitized by Google

por el tranquilo recogimiento en la cama, y renovada por el vino, la música, una fuerte luz, y por el retardo de la hora habitual de comer.—*Hemicránea*, en las mismas circunstancias, empezando por la mañana y elevándose, en el curso del dia, á un grado insoportable.—*Pericarditis* con sensacion de constriccion en el corazon como por una mano de hierro, respiracion difícil, accesos de sofocacion con desfallecimiento, sudor frio en la cara y pulso insensible.—*Palpitaciones del corazon*, al andar, ó por la noche, estando acostado sobre el costado izquierdo.—*Dismenorrea*, con dolores constrictivos en el corazon, cólicos violentos, que se presentan principalmente por la noche, y obligan á gritar y á llorar; reglas escasas y que se detienen en la posicion horizontal.—*Reumatismo muscular*, con metástasis al corazon.—*Fiebre intermitente*, que empieza á las once de la noche, ó de la mañana, con frio seguido de calor quemante y dolor de cabeza, aturdimiento, coma, insensibilidad, sed, respiracion corta, imposibilidad de permanecer acostado; despues sudor abundante, con sed inextinguible; en fin, apirexia completa.

43.—CALADIUM SEGUINUM.

CALAD.—Pié de buey venenoso.—HERING.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop —*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion*: hasta 50 dias.
ANTÍDOTOS: Los mismos?
COMPÁRESE CON: Caps. carb.-veg. chin. graph. ign. merc. nitr-ac. phos.

SINTOMAS GENERALES.—Aversion á todo movimiento con deseo contínuo de estar acostado.—Ligeros ataques de desvanecimiento despues de haber escrito ó meditado, así como tambien levantándose cuando se está acostado.—Disminucion de todos los síntomas despues de un corto sueño de dia, y desaparicion del mal durante la transpiracion.—Calor quemante en pequeños puntos de la piel, con necesidad de tocarlas con el dedo.—Sensibilidad dolorosa de las picaduras de los mosquitos.—En el antebrazo y en el pecho, miliar de granos muy gruesos con prurito y calor que alternan con opresion.—Fre-

Digitized by Google

cuentemente sensacion como si corretearan moscas por la piel, sobre todo en la cara.

Sueño.—Deseo de dormir, con necesidad de echarse por el dia sin poder dormir, y con horripilacion y embarazo de la cabeza.—Sopor y sueño, durante el cual recuerda cuanto habia olvidado despierto.—Sueño muy ligero en la noche.—Gemidos y suspiros angustiosos durante el sueño, con violentos movimientos convulsivos de los miembros.

Fiebre.—Fiebre con dolor en los oidos ó hinchazon de las glándulas sub-maxilares.—Fiebre con frio y sed, respiracion estertorosa, coriza y pulsacion en el pecho.—*Por la tarde fiebre con sueño, que cesa regularmente á la desaparicion de la fiebre.*—Despues del calor sudor que atrae mucho las moscas.

Moral.—Temores é inquietudes, sobre todo por su salud.—Angustia antes de coger el sueño por la tarde.—En afeitándose, angustia y miedo de cortarse.—Gritos y lloros como los de un niño.

Cabeza, ojos, etc.—Pesadez de cabeza con mareo y náuseas.—Cuando se acuesta ó se cierran los ojos, vértigo como si todo estuviera horadado.—Despues de acostarse, cefalalgia en el lado sobre que reposa.—Calor en la cabeza, que asciende desde el brazo hácia arriba.—Escozor quemante en los ojos.—Oido extremadamente sensible, sobre todo cuando se duerme.—Accesos de sordera ligera y pasajera.—Zumbido en los oidos.—Coriza por la tarde, con dolor quemante en la nariz y estornudo.—Odontalgia terebrante, con punzadas hasta los oidos.

Apetito.—Gusto pastoso, herbáceo en la boca.—Mucho deseo de fumar.—Falta de sed, con aversion al agua fria y sequedad de la faringe y esófago.—Sensacion de vacío en el estómago, sin hambre, pero que obliga á comer aprisa.—Despues de desayunarse, humor desapacible y cabeza turbada.

Estómago.—Eructos vacíos.—*En fumando, gana de vomitar y de deponer*, ó bien vómitos ágrios, ó embotamiento de los dientes como si estuvieran muy largos.—Eructos impedidos por dolores en el estómago.—Náuseas por la mañana, con vértigo y punzadas en la boca del estómago.—Sensacion de vacuidad en el estómago.—Escozor quemante en el estómago.—Presion y como corrosion

Digitized by

en el cardias.—Dolores cólicos que atraviesan por el epigastrio.—Punzadas en el epigastrio y retraccion de la boca del estómago, con debilidad y náuseas.—Dolores pulsativos y fatigantes en el epigastrio, despues de haber andado.

Vientre.—Orinas.—Dolores cólicos calambroídeos en la region umbilical.—Latido y pulsaciones, ó *dolores quemantes* en el epigastrio.—Salida de pequeñas flatuosidades de olor pútrido.—Deposiciones de consistencia de papilla y poco abundantes.—Despues de la deposicion, salida de mucosidades y evacuacion de un humor seroso por el ano.—Despues de la deposicion, punzadas en el recto.—Frecuentemente ganas de deponer; las deposiciones son amarillentas y en forma de papilla.—Terebracion y dolores desgarradores en el ano y sacro.—Despues de las deposiciones, salida de sangre por el ano.—Sensacion dolorosa de plenitud en la vejiga, sin gana de orinar.

Partes viriles.—Debilidad de las funciones genitales.—Mucho sudor en el sacro.—Impotencia con lascivia.—Partes genitales hinchadas, lácias y con exudacion.—Hinchazon y excoriacion del prepucio, con retraccion despues del cóito.—Sequedad y rubicundez del glande, que está como sembrado de pequeños puntos rojos.—Falta de placer y de eyaculacion en el cóito, ó *eyaculacion muy pronta* y sin ereccion.—Erecciones nocturnas.—Granos en el monte de Venus y en el oido.

Laringe.—Tráquea-arteria y laringe, como contraidas con silbido al respirar profundamente.—Tos que parece tener su asiento encima de la laringe.—Tos con respiracion embarazosa, causada por una presion en el epigastrio ó impedida por una sensacion de peso en esta parte.—Tos nocturna, sorda y débil, que impide dormir aun por la mañana.

Pecho.—Opresion, sobre todo durante los dolores quemantes del estómago.—Pecho *como vacio*, sobre todo despues de la expectoracion de las viscosidades.—Pulsacion debajo del corazon.—Por la mañana al levantarse, dolor de quebrantamiento en los costados y en los riñones.

Dorso y extremidades.—Dolores de riñones, como por debilidad.—Punzadas en los callos.

44.—CALCAREA CARBONICA.

CALC.—Cal carbonatada, subcarbonato de cal que proviene de las conchas de las ostras.—HAHNEMANN.—*His. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Duracion de accion*: 50 dias en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. nitr-ac. *nitr. spir.* sulph.—A su vez la calcárea es antídoto de: *Bis. chin. chin-sulf.* y *nitr-ac.*

COMPÁRESE CON: Anac. alum. *arn.* ars. bar. bell. bis. chin. cupr. graph. kal. lyc. magn. merc. nitr.-ac. *nux-vom.* phos. puls. sep. sil. sulf. veratr.—La calcárea hará buen efecto siempre que se halle indicada, sobre todo despues de *chin. cupr. nitr-ac.* y *sulf.* Despues de calcárea convendrá muchas veces: *Lyc. nitr-ac. phos.* y *sil.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de sintomas* se verá los casos particulares en los cuales se podrá consultar este medicamento contra:—Afecciones de personas de constitucion pletórica ó linfática, con predisposicion á las blenorragias, corizas y diarreas, ó bien de indivíduos de constitucion débil y nutricion morbosa.—Padecimientos á consecuencia de un enfriamiento en el agua; Diferentes afecciones de los niños y de las mujeres que menstruan mucho; Malas consecuencias de un derrengamiento; Padecimientos por el abuso de la quina; *Padecimientos de los borrachos*; Nudosidades gotosas y otras afecciones artríticas; Baile de San Vito?; *Convulsiones epilépticas* (despues de la accion de cuprum); Espasmos histéricos; Obesidad de las personas jóvenes; Debilidad física y nerviosa, producida por la masturbacion; Debilidad muscular, dificultad de aprender á andar, *atrofia* y otros *padecimientos de los niños escrofulosos*; Infarto y supuracion de las glándulas; Cários, reblandecimiento, desviacion y *otras afecciones de los huesos*; *Afecciones raquíticas;* Luxaciones espontáneas; Artrocace?; *Pólipos;* Tumores enquistados; Erupciones crónicas; *Herpes costrosos y húmedos*; Erupciones escrofulosas; *Ulceras fistulosas*; Verrugas; *Ragades*, aun las de los obreros que trabajan en el agua; Várices; *Erupciones urticarias crónicas*; Fiebres intermitentes y malas resultas de la supresion de estas fiebres por la quina; Fiebres lentas; Melancolía; Hipocondría é histeria; *Delirium tremens*; Embriaguez; Jaqueca; Cefalalgia por enfriamiento ó á consecuencia de una derrengadura; Fatiga de la cabeza debida á trabajos intelectuales; Tiña; Caida de los cabellos, aun en las re-

cien paridas, ó á consecuencia de graves enfermedades agudas; Fontanela en los niños mucho tiempo abierta; *Oftalmias*, aun las causadas por la introduccion de un cuerpo extraño, ó en personas escrofulosas ó en los recien nacidos; Blefaroftalmía; Manchas, úlceras y oscurecimiento de la córnea?; Fungus, hematodes en el ojo?; Ambliopia amaurótica; Fístula lagrimal; Hemorragia de los ojos?; Otitis?; Otorrea purulenta, aun la que proviene de cáries del aparato auditivo; Pólipo en el oido; Dureza de oido, aun la ocasionada por la supresion de una fiebre intermitente con la quina; Parotitis; Hinchazon escrofulosa de la nariz; Pólipo nasal; Anosmia; Cáncer de la nariz?; *Coriza con establecimiento tardío de flujo catarral*; Coriza y obturacion crónica de la nariz; Prosopalgia; Herpes y otras erupciones de la cara; Costra láctea; Odontalgias, aun la de las mujeres embarazadas ó que tienen las reglas muy copiosas; *Denticion difícil de los niños* con ó sin convulsiones; Ulceras fistulosas en las encías?; Rínulas; Amigdalitis y otras anginas flegmonosas; Bócio; Anorexia; Dispépsia, vómitos *ágrios*, pirosis y otras afecciones gástricas; Induracion y otras afecciones del hígado; Afecciones abdominales crónicas; *Tabes mesentérica*; Ténia; Cólicos; Espasmos abdominales; Bubones escrofulosos; Estreñimiento tenaz; Diarreas de los niños escrofulosos, ó bien durante la denticion; Diarrea de los tísicos; Disposicion crónica á hacer muchas deposiciones por dia; Afecciones verminosas; Padecimientos hemorroidales y malos resultados de la supresion del flujo hemorroidal; Catarro de la vejiga; Hematuria?; Pólipo de la vejiga; Cálculos urinarios; Debilidad de las funciones genitales, dismenorrea y amenorrea de las personas pletóricas; *Flores blancas*; Metrorragia; Clorosis; Esterilidad; Aborto; Dolores cólicos muy prolongados de las parturientas despues del parto; Debilidad, caida de los cabellos y otros padecimientos de las recien paridas; Odontalgia de las embarazadas; Fiebre láctea; Excoriacion de las mamas; Galactorrea ó agalactia; Oftalmía; Debilidad muscular y acedías de los niños de pecho; Laringitis crónica con ulceracion; Catarro crónico y blenorrea de los pulmones; *Síntomas tísicos* (tisis tuberculosa); Desviacion de la columna vertebral; Coxalgia; Luxacion espontánea; Gota de las manos y de los piés, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—*Calambres y contracciones de los miembros, sobre todo de los dedos de las manos y de los piés.—Dolores de luxacion.—Dolores pulsativos. *Punzadas y *dolores tractivos en los miembros*, principalmente por la noche ó en Estío, y al cambio de tiempo. —Accesos de torpeza y palidez de algunas partes del cuerpo que parecen como muertas.—Gran facilidad á derrengarse y á contraer males de garganta, ó rigidez é hinchazon de la nuca con dolor de cabeza.—Facilidad de los miembros á adormecerse.—*Ebullicion de sangre*, principalmente *en individuos pletóricos*, y frecuentemente con congestion á la cabeza y al pecho.—Estremecimientos en diferentes miembros.—**Convulsiones epilépticas*, aun por la noche, con gritos.—°Tétanos parcial, precedido de una especie de *aura tetánica*.—*Los síntomas se agravan ó se renuevan por el trabajo en el agua, como tambien por la tarde, la noche, por la mañana, despues de comer y cada dos dias.—Padecimientos periódicos é intermitentes.—*Mucha agitacion que obliga á moverse constantemente y á andar mucho.—Temblor frecuente de todo el cuerpo, aumentado al aire libre.—**Dolor de contusion en los brazos y en las piernas*, así como en los riñones, sobre todo moviéndose ó subiendo una escalera.—Malestar general por la tarde como precursor de un acceso de fiebre intermitente.—**Falta de fuerzas, abatimiento*, principalmente por la mañana muy temprano. —Fatiga y debilidad nerviosa, frecuentemente con palidez del rostro, latidos del corazon, vértigos, calofrios, dolor de riñones, etc.—*Desvanecimiento, sobre todo por la tarde*, con *oscurecimiento de los ojos*, sudor de la cara y frio del cuerpo.—*Mucha fatiga despues de haber hablado ó haber caminado moderadamente al aire libre, como tambien, despues del menor esfuerzo, y frecuentemente con traspiracion fácil y abundante.—Vivo deseo de hacerse magnetizar.—*Abatimiento excesivo*, algunas veces con violentos accesos de risa espasmódica.—°Abotagamiento del cuerpo y de la cara, con vientre abultado en los niños.—*Enflaquecimiento*, aunque se coma con buen apetito.—°Mucha gordura y extremada obesidad. —**Disposicion á resfriarse y gran sensibilidad al aire frio y húmedo.*—Paseándose al aire libre, tristeza con llantos, dolor de cabeza, meteorismo, palpitaciones de cora-

zon, sudor, mucha fatiga y otros muchos sufrimientos.

Piel.—Estremecimiento visible de la piel desde los piés hasta la cabeza, seguido de aturdimiento.—Comezon quemante mordicante.—Efélides.—*Erupcion urticaria*, que frecuentemente desaparece al aire fresco.—Erupcion de manchas lenticulares, rojas y elevadas, con excesivo calor, mucha sed y falta de apetito.—Piel caliente y seca durante el movimiento.—°Piel del cuerpo áspera, *seca y como cubierta de una especie de miliar.—°Costra furfurácea de la piel.—**Erupciones y herpes húmedos, costrosos*, ó en forma de racimos, con dolores de quemadura.—Pénfigo pruritoso por todo el cuerpo.—Piel excoriada en diversos sitios.—*Piel enfermiza; toda lesion tiende á ulcerarse.—Inflamaciones erisipelatosas.—*Forúnculos.—**Verrugas.—Callos*, con dolores de excoriacion y sensacion de ardor.—°*Tumores enquistados* que se renuevan y supuran todos los meses.—*Hinchazon é *induracion de las glándulas*, con ó sin dolor.—**Várices.—**Nudosidades artríticas.*—°Hinchazon y desviacion de los huesos.—Ulceracion de los huesos.—Panadizos.—Padrastros en los dedos.

Sueño.—**Gana de dormir entre el dia y por la tarde muy temprano.—Sueño tardío* é *insomnio por *afluencia de ideas ó á causa de imágenes* voluptuosas ó *espantosas* que aparecen en cuanto se han cerrado los ojos.—*Durante el sueño, palabras, gemidos, gritos y sobresaltos, ansiedad que dura despues de despertarse, ó movimientos de la boca, como si se mascara y tragase.—Ronquido durante el sueño.—**Ensueños frecuentes, vivos, ansiosos, fantásticos*, confusos, *espantosos* y horribles, ó ensueños de enfermos y de muertos.—*Sueño agitado con anhelacion, del que se despierta con frecuencia.—*Sueño de muy corta duracion*, desde las once de la noche hasta las dos ó tres de la mañana solamente.—Se despierta muy temprano, algunas veces á media noche.—*Por la noche, agitacion, padecimientos asmáticos, ansiedad, calor*, dolores en el estómago y en la region precordial, *sed, palpitaciones de corazon*, odontalgia, vértigos, dolor de cabeza, *ebullicion de sangre*, miedo de perder la razon, dolores en los miembros y otros muchos padecimientos.—*Al despertarse, laxitud, postracion y gana de dormir*, como si no hubiera dormido bastante.

Fiebre.—*Frio interior excesivo.*—*Calofrios y horripilacion*, principalmente *por la tarde*, ó *por la mañana despues de levantarse.—Calor con sed.—*Accesos frecuentes de calor pasajero*, con angustia y palpitaciones de corazon.—*Calor por la tarde ó por la noche en la cama.*—°Fiebre cotidiana hácia las dos de la tarde, con bostezos y tos, seguida de calor general, con necesidad de acostarse, al menos por tres horas, despues de lo cual las manos se ponen frias; y sin sed durante el acceso.—*Fiebre terciana por la tarde, que principia por calor de la cara, seguido de calofrios.—°*Excesivo sudor* de dia *despues de un ejercicio corporal, moderado.*—*Sudor con ansiedad.—*Sudor nocturno*, principalmente en el pecho.—*Sudor por la mañana.*

Moral.—*Melancolía, abatimiento y tristeza.—*Disposicion á llorar*, aun por bagatelas.—Disgusto y lamentos por ofensas antiguas.—**Ansiedad y angustia*, excitadas por ideas ó historias horribles, ó bien con horripilacion y espanto durante el crepúsculo ó en la noche.—**Angustia excesiva* con palpitaciones de corazon, ebullicion de sangre y sacudidas al epigastrio.—Agitacion ansiosa que no deja permanecer en parte alguna.—**Propension á espantarse.*—*Tristeza con pesadez en las piernas.—**Aprensiones.*—*Desesperacion á causa del menoscabo de su salud, ó *humor hipocondriaco*, con temor de estar enfermo, ó ser desgraciado, de experimentar acontecimientos desagradables, de perder la razon, ó de infestarse de enfermedades contagiosas.—*Desanimacion y temor de la muerte.—*Impaciencia, sobreexcitabilidad y mucha impresionabilidad nerviosas; el menor ruido le fatiga.—Mal humor excesivo y malicia, con *encaprichamiento y tendencia á tomar todo en mal sentido.*—*Indiferencia, apatía y repugnancia por la conversacion.—Repulsion y aversion hácia las demás personas.—La soledad le es insoportable.—*Disgusto y aversion á cualquier trabajo.*—Falta de voluntad.—Gran debilidad de memoria, y de penetracion con dificultad de meditar.—Disposicion á equivocarse hablando, y á tomar una palabra por otra.—°Pérdida de los sentidos y errores de imaginacion.—°Delirio con visiones de incendios, de homicidios de ratas y de ratones.—Enajenacion mental con visiones horribles, desesperacion de la felicidad eterna, y tendencia á destruirse.

Cabeza.—*Cabeza atontada* y como apretada por una ligadura.—*Aturdimiento* despues de haberse rascado detrás de la oreja, ó bien *antes de desayunarse*; *con temblor*.—**Vértigos*, ¯á veces con oscurecimiento de la vista, **en subiendo á una grande elevacion*, ó solamente una escalera ¯andando al aire libre, volviendo de pronto la cabeza, ó despues de haberse enfadado.—Vértigos por la noche, por la tarde ó por la mañana.—**Dolor de cabeza despues de una derrengadura*, ¯ó por habérsela envuelto en un pañuelo, ó *á consecuencia de un enfriamiento.—Dolores de cabeza todas las mañanas al despertarse.—*Accesos de *cefalalgia semilateral, con eructos y náuseas*.—*Dolores de cabeza con atolondramiento, ¯*presivos ó *pulsativos*, agravados especialmente leyendo, escribiendo ó por cualquiera otro trabajo intelectual, así como tambien por las bebidas espirituosas ó bajándose.—Plenitud y pesadez *de la cabeza*, sobre todo, *de la frente*, con oclusion de los ojos, agravados por el movimiento y los esfuerzos corporales.—Dolor presivo en el vértice, que aparece al aire libre.—Dolor tensivo y calambroídeo con presion hácia afuera, partiendo de las sienes y extendiéndose hasta el vértice.—Dolores tractivos en el lado derecho de la frente, la parte está dolorida al tacto.—Dolores lancinantes en la cabeza.—*Terebracion en la frente como si la cabeza fuese á estallar.—°Dolores como de martilleo en la cabeza, que obligan á echarse y que aparecen sobre todo despues del paseo al aire libre.—**Frio glacial en la cabeza*, sobre todo en el lado derecho.—**Congestion á la cabeza*.—Ruido y dolores en la cabeza, con calor en esta y en las mejillas.—*Movimiento del cerebro al andar*.—°Cabeza muy voluminosa con fontanela abierta en los niños.—°*Sudor en la cabeza por la tarde*.—Mucha disposicion á resfriarse la cabeza.—*Costras en la piel del cráneo*.—Descamacion de la piel del cráneo.—Sensibilidad dolorosa de la raiz de los cabellos.—*Caida de los cabellos*.—**Tumores en la piel del cráneo*, °próximos á la supuracion.

Ojos.—**Presion en los ojos*.—*Prurito y *punzadas en los ojos*.—*Escozor, sensacion de ardor y dolores incisivos en los ojos y en los párpados, sobre todo en *leyendo* de dia ó *á la luz de las bujías*.—Sensacion de frio en los ojos.—Ojos inflamados con rubicundez de la esclerótica, y secrecion

abundante de mucosidad.—Ulceras, manchas y oscurecimiento de la córnea.—*Córnea turbia y azulada.—Resudacion de sangre por los ojos.—Inflamacion é hinchazon de los ángulos de los ojos.—°Fístula lagrimal, supurante.—Los ojos lloran, sobre todo al aire libre, ó muy de mañana.—*Estremecimiento de los párpados.—**Hinchazon roja y densa de los párpados* con secrecion abundante de legaña y *aglutinacion nocturna*.—Oclusion de los párpados por la mañana.—**Pupilas muy dilatadas*.—**Vista turbia como si hubiese una niebla*, ó un velo, ó pelusa delante de los ojos, principalmente leyendo ó en fijando atentamente la vista sobre un objeto.—Oscurecimiento de la vista leyendo ó despues de comer.—En leyendo se ve un punto negro que parece acompaña á los caractéres.—*Excesiva fotofobia y alucinamiento por una luz muy viva.—**Presbiopia*.

Oidos.—Punzadas en los oidos.—*Pulsacion, *latidos* y calor en *los oidos*.—Inflamacion é hinchazon del oido interno y externo.—°*Flujo purulento por los oidos*.—Erupcion húmeda en las orejas y detrás de estas.—°*Pólipo del oido*.—*Ruido confuso, zumbido, tintineo ó ruido como de carruaje, algunas veces alternando con música en los oidos.—*Crujido y °detonacion en los oidos al tragar y al masticar.—Accesos de sensacion de oclusion y de *dureza del oido*.—**Hinchazon* inflamatoria *de las parótidas*.

Nariz.—Inflamacion de la nariz con rubicundez y abultamiento, principalmente en la punta.—**Ventanillas de la nariz ulceradas y costrosas*.—°*Epistaxis*, principalmente por la mañana y por la noche, y algunas veces hasta el desfallecimiento.—*Olor fétido de la nariz.—*Olfato embotado ó excesivamente sensible.—**Sequedad penosa en la nariz*.—**Obturacion de la nariz* por un pus amarillento y fétido.—*Coriza seco, aun por la mañana, con estornudos frecuentes.—Coriza fluente excesivo.—Coriza, alternando con dolores cólicos.—Olor fétido de la nariz, como de estiércol, de huevos podridos ó de pólvora.

Cara.—*Color amarillo de la cara*.—*Cara pálida, hundida, con ojos sumidos y ojeras.—Placas rojas en las mejillas.—Calor, rubicundez y abotagamiento de la cara.—Erisipela en la mejilla.—Efélides en las mejillas.—*Prurito y erupcion en la cara, principalmente en la frente, en las mejillas y en el sitio de las patillas, algunas veces hú-

meda y costrosa con calor quemante.—°Costra láctea.—*Dolores agudos en la cara* y en los huesos de la misma.—Hinchazon de la cara sin calor.—Erupcion y costras en los labios y alrededor de la boca.—Labios agrietados.—°*Hinchazon del labio superior.*—Comisuras de los labios ulceradas.—Accesos de entorpecimiento y de palidez de los labios, que parece están como muertos.—°*Hinchazon dolorosa de las glándulas submaxilares.*

Dientes.—°*Odontalgia agrava la ó excita la por una corriente de aire* ó *por el aire frio*, ó *tomando algo* caliente ó *frio*, ó por el ruido, ó bien durante ó despues de las reglas; los dolores son por lo general lancinantes, terebrantes, contractivos, pulsativos, ó roedores y como si escarbaran con sensacion de excoriacion.—Dolor de dientes por la noche, como por congestion de sangre.—Sensacion de prolongacion y de vacilacion de los dientes.—Olor fétido de los dientes.—°Sensibilidad dolorosa de las encías, con punzadas.—*Las encias se hinchan* y sangran fácilmente con latidos y pulsaciones.—Ulceras fistulosas en las encías de la mandíbula inferior.

Boca.—Acumulacion de mucosidades en la boca.—Gargajeo contínuo de una saliva ácida.—Vesículas en la boca y sobre la lengua.—Contraccion calambroídea de la boca.—°*Sequedad de la lengua* y de la boca, principalmente por la noche y por la mañana al despertarse.—Hinchazon de la lengua, algunas veces de un solo lado.—Lengua cubierta de una costra blanca.—Sensacion de ardor y dolor de excoriacion en la lengua y en la boca.—Dificultad de la lengua al movimiento, con palabra confusa y difícil.—°Ránula debajo de la lengua.

Garganta.—Dolores en la garganta como por un tapon, ó una hinchazon en el esófago.—Constriccion en la garganta y *estrechez calambroídea del esófago.*—Excoriacion del gaznate, con dolor lancinante y presion al tragar.—*Hinchazon* inflamatoria de la garganta y de la *úvula*, que están de un rojo oscuro y cubiertas de vesículas.—Hinchazon de las amígdalas, con sensacion de estrechez en la garganta al deglutir.—Ligera inflamacion de la garganta despues de una derrengadura.—°Ruido estrepitoso de mucosidades.

Apetito.—°*Mal gusto en la boca, por lo regular amargo*, ó *agrio*, ó *metálico*, sobre todo *por la mañana.*—Insipidez

Digitized by Google

ó sabor insulso ó ágrio de los alimentos.—Sed ardiente ó contínua, sobre todo de bebidas frias, y frecuentemente con *ausencia total del apetito.*—*Hambre poco despues de haber comido.—*Bulimia*, generalmente por la mañana.—*Disgusto* prolongado *de la carne* y de los alimentos calientes.—*Repugnancia por el humo del tabaco; deseo de cosas saladas, de vino y golosinas.—*Debilidad de la digestion.—Despues de haber tomado leche*, *náuseas* ó regurgitaciones ácidas.—*Despues de la comida*, *calor ó meteorismo*, con náuseas ó dolor de cabeza, de vientre y de estómago, ó bien eructos ó flujo de agua como de pituitas, ó abatimiento y gana de dormir.—Eructos con el sabor de los alimentos ingeridos, ó amargos, ó *ácidos.*

Estómago.—*Pirosis despues de cada comida*, y eructos ruidosos y contínuos.—*Regurgitacion de materias ágrias.*—**Náuseas frecuentes*, sobre todo *por la mañana*, por la tarde ó por la noche, algunas veces con horripilacion, oscurecimiento de la vista y desfallecimiento.—*Vómitos ácidos.*—**Vómito de los alimentos* ó de mucosidades amargas; frecuentemente con dolores cólicos y calambroídeos en el vientre.—Vómito negro ó de sangre.—*Evacuacion de pituitas del estómago, aun despues de la comida.—Los vómitos se presentan principalmente por la mañana, por la noche ó despues de la comida.—**Dolor* presivo ó pellizcos en el estómago, ó *dolores calambroideos* y contractivos, principalmente *despues de comer, y frecuentemente con vómito de los alimentos.*—Calambres de estómago por la noche.—*Presion en el estómago, aun estando vacío, ó tosiendo, ó con presion de los hipocondrios, ó bien por apretamiento como por un garfio al andar.—Pellizcos, retortijones y presion nocturna en el epigastrio.—Timpanitis é *hinchazon del epigastrio* y de la region del estómago, con sensibilidad dolorosa de estas partes al tacto.—Dolor de excoriacion y de sensacion de ardor en el estómago.

Vientre.—Dolores generalmente *lancinantes*, ó tensivos, ó presivos, con hinchazon é induracion de la region *hepática.*—Estiron doloroso desde los hipocondrios hasta el dorso, con vértigo y oscurecimiento de la vista.—*Tension en los dos hipocondrios.—Imposibilidad de soportar los vestidos apretados alrededor de los hipocondrios.*—Tension y meteorismo.—°Dolores cólicos frecuentes y punzadas en los

Digitized by Google

costados del vientre, en los niños.—Cólicos con *dolores calambroideos* y contractivos, sobre todo despues de medio dia, y algunas veces con vómito de los alimentos.—*Accesos frecuentes de dolores cólicos, principalmente en el epigastrio.—*Punzadas ó pellizcos y *presion en el vientre*, aun sin diarrea.—Los dolores de vientre se manifiestan principalmente por la mañana, por la tarde ó por la noche, así como tambien despues de la comida.—°Sensacion de frio en el vientre.—Dolor de excoriacion y sensacion de ardor en el vientre.—°*Hinchazon é induracion de las glándulas del mesenterio.*—**Abultamiento y dureza del vientre.*—**Encarcelacion de flatuosidades.*—*Presion por los gases hácia el anillo inguinal, como si quisiera formarse una hernia, con ruido y borborigmos.—Presion dolorosa, estremecimientos, dolores cólicos y punzadas, ó pesadez y traccion en las ingles.—*Hinchazon y sensibilidad dolorosa de las glándulas inguinales.*

Deposiciones.—**Constipacion.*—**Deposiciones tardías*, duras, en pequeña cantidad, y frecuentemente con materias no digeridas.—Conato inútil de deponer, á veces con dolor.—Deposiciones difíciles y solamente cada dos dias.—*Relajacion* frecuente y continua *de vientre*; dos deposiciones por dia.—Deposiciones arcillosas, poco abundantes, nudosas ó serosas, ó en forma de papilla.—*Deposiciones blancas*, algunas veces con estrías de sangre y dolores hepáticos, al tacto y respirando.—°Diarrea durante la dentición.—°Deposiciones involuntarias y espumosas.—°*Diarrea* de olor *ágrio* ó fétido, y amarillenta en los niños; salida de ascárides y de ténia.—Prolapsus del ano durante la defecacion.—Antes de la deposicion, gran irascibilidad.—Despues de la deposicion, abatimiento y cansancio sumo de los miembros.—Evacuacion de sangre por el ano mientras y fuera del tiempo de las deposiciones. Hinchazon y **salida frecuente de los granos hemorroidales*, sobre todo durante las deposiciones, con dolor quemante.—Calambres, tenesmo y contraccion del recto.—Sensacion de ardor en el recto y en el ano, con picazon y °hormigueo.—Erupcion quemante en el ano en forma de racimo.—Excoriacion en el ano, entre las nalgas y los muslos.—°Prolapsus del recto con dolor quemante.

Orinas.—Tenesmo de la vejiga.—*Emision de orinas muy frecuente*, aun por la noche.—Se orina en la cama.—Ori-

Digitized by

nas oscuras sin sedimento.—Orina de color de sangre ó rojo oscuro, ó de un olor ácre, mordicante, fétido, con sedimento blanco y harinoso.—°*Hematuria*.—Derrame de sangre por la uretra.—Salida abundante de mucosidades con la orina.—°Pólipo de la vejiga.—**Sensacion de ardor en la uretra*, durante y fuera del tiempo de la emision de las orinas.

Partes viriles.—Inflamacion del prepucio, con rubicundez y dolor quemante,—Presion y dolor de magulladura en los testículos.—**Debilidad de las funciones genitales* y ausencia del apetito venéreo.—*Exaltacion del apetito venéreo con ideas *voluptuosas y lascivas*.—°Falta ó *excesiva frecuencia de poluciones.—*Ereccion de muy corta duracion, y emision de esperma muy tardía y muy débil durante el cóito.—°Punzadas y sensacion de ardor en las partes genitales durante la emision de esperma en el cóito.—Despues del cóito turbacion de cabeza y debilidad.—Flujo de licor prostático despues de las deposiciones y de la emision de las orinas.

Reglas.—**Reglas muy activas y muy abundantes*.—°Antes de las reglas, pechos abultados y doloridos, fatiga, dolor de cabeza, propension á asustarse, cólicos y calofrios.—*Durante las reglas, congestion á la cabeza, con calor dentro de ella, ó dolores cólicos en el vientre y calambroídeos en los riñones, ó bien vértigos, dolores de cabeza, *odontalgia*, náuseas, cólicos y otras incomodidades.—*Aborto.—Sensacion voluptuosa en las partes genitales con eyaculacion.—*Flujo de sangre fuera del tiempo de las reglas.—*Metrorragia.—°Punzadas en el orificio de la matriz, y dolor presivo en la vagina.—°Prolapsus del útero con presion sobre las partes.—°*Pólipo en la matriz*.—*Prurito en la vulva.—Inflamacion é hinchazon de la vulva, con rubicundez, flujo purulento y dolor ardiente.—°Várices en los grandes labios.—°*Leucorrea antes de las reglas*.—**Leucorrea con comezon quemante*, ó *bien como leche*, que corre por accesos y durante la emision de las orinas.—Dolor de excoriacion y de ulceracion en los pezones.—Hinchazon inflamatoria de las mamas y de los pezones.—Hinchazon de las glándulas de los pechos.

Laringe.—°Ulceracion de la laringe.—Sequedad de la laringe.—**Ronquera frecuente ó de larga duracion*.—*Acu-

Digitized by Google

mulacion abundante de mucosidades en la laringe y en los bronquios.—*Tos sin expectoracion*, excitada por un cosquilleo en la garganta y frecuentemente acompañada de vómitos.—**Tos* corta entre el dia, *como si hubiese pelusa en la garganta.*—Tos provocada tocando el piano ó comiendo.—**Tos por la tarde* en la cama, ó en la *noche* durante el sueño, ó por la mañana, y generalmente *violenta *y seca*, algunas veces tambien espasmódica.—*Tos*, con expectoracion de mucosidades espesas ó *amarillentas* y *fétidas*, generalmente por la noche ó *por la mañana.*—**Expectoracion de materias purulentas* en tosiendo.—**Tos con expectoracion de sangre*, dolor de excoriacion en el pecho, vértigos y pasos poco seguros al andar.—*Tosiendo, presion en el estómago, punzadas y sacudidas en la cabeza ó dolores en el pecho.

Pecho.—Sofocacion al bajarse, en paseándose al aire ó al acostarse.—*Necesidad de respirar profundamente.—Sensacion como si la respiracion se detuviera entre los omóplatos.—*Opresion de pecho, como por congestion de sangre, con tension, ó que se alivia aproximando los omóplatos.—Respiracion sibilante.—**Aliento corto*, principalmente andando cuesta arriba.—Opresion angustiosa en el pecho, como si fuese demasiado estrecho y no pudiera dilatarse lo suficiente.—*Gran dificultad de la respiracion.—Sensacion de fatiga en el pecho despues de haber hablado.—Ansiedad en el pecho.—Presion en el pecho.—**Punzadas en el pecho y las costillas*, sobre todo durante el movimiento, al respirar profundamente, y al acostarse sobre el lado afecto.—Golpes en el pecho.—Sensibilidad y *dolor de excoriacion en el pecho, sobre todo al inspirar y por el tacto.*—*Sensacion de ardor en el pecho.—**Palpitaciones de corazon* aun por la noche, ó *despues de comer*, algunas veces con ansiedad y movimientos temblorosos del corazon.—Punzadas, presion y contraccion en la region del corazon.—Punzadas á manera de picotazos en los músculos del pecho.

Tronco.—**Dolores de luxacion en los riñones, en el dorso y en la nuca, como despues de una derrengadura.*—Dolores lancinantes en los riñones, el dorso y los omóplatos.—Dolores nocturnos en el dorso.—Dolores en la region de los riñones andando en carruaje.—Traccion entre los omóplatos y dolor presivo con sofocacion.—*°Hinchazon* y des-

viacion de la *columna vertebral*.—*Rigidez de la nuca.—*Hinchazon dura y estrumosa de la glándula tiróides.—**Hinchazon dura y dolorosa de las glándulas del cuello*.—Tumor entre los omóplatos.—°Supuracion de las glándulas axilares.

Brazos.—**Dolores tractivos en los brazos*, aun por la *noche*.—*Calambres* y dolores calambroídeos en los *brazos*, en las *manos* y en los *dedos*.—*Accesos repentinos de debilidad paralítica en los brazos*.—Dolores calambroídeos agudos en el antebrazo.—*Forúnculos en el antebrazo.—Dolor de luxacion en la muñeca.—*Hinchazon de las manos.—°Nudosidades artríticas ó hinchazon de las muñecas y de las articulaciones de los dedos.—Hinchazon de las venas de las manos.—Temblor de las manos.—*Sudor de las manos*.—**Manos y dedos muertos*, aun al calor y sobre todo al agarrar algun objeto.—Verrugas en los brazos y en las manos.—*Forúnculos en las manos y en los dedos.—Hormigueo en los dedos como cuando se duermen.—*Debilidad paralítica y frecuente en los dedos.—°Movimiento torpe de los dedos.—Contraccion de los dedos.—Panadizos.—Hinchazon voluminosa de la punta de los dedos.

Piernas.—*Lancinaciones tractivas y dolores incisivos, agudos en las caderas y en los muslos, principalmente apoyándose sobre estas partes.—Claudicacion resultante de que al andar se apoya sobre los dedos.—*Rigidez y *pesadez de las piernas*.—**Calambres en las piernas*.—Dolor de luxacion en las articulaciones de las caderas, de las rodillas y de los piés.—Las piernas se duermen aunque se esté sentado.—Comezon en los muslos y en los piés.—*Várices en las piernas.—Tracciones, **punzadas* y dolores agudos *en las rodillas*, sobre todo estando en pié ó sentado ó al andar.—**Hinchazon de las rodillas*.—Tension en la corva al ponerse en cuclillas.—**Calambres en las corvas, las pantorrillas, la planta de los piés y en los dedos de estos*, principalmente extendiendo las piernas, ó poniéndose las botas, ó durante la noche.—*Manchas rojas en las piernas.—*Inflamacion erisipelatosa* é hinchazon de *las piernas*.—*Ulceras en las piernas.—*Hinchazon de los maléolos y de la planta de los piés.—Hinchazon inflamatoria del empeine.—Forúnculos en los piés y en las piernas.—**Sensacion de ardor en la planta de los piés*.—**Su-*

dor de los piés.—°*Por la tarde frio y adormecimiento de los piés.*—°Sensibilidad dolorosa del dedo grueso.—°*Callos en los piés* con dolor quemante de excoriacion.—Contraccion de los dedos gruesos.

45.—CALCAREA PHOSPHORICA.

CALC-PH.—Fosfato de cal.—HERING.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.

NOTA. La preparacion que ha producido los siguientes síntomas, se ha obtenido echando algunas gotas de *ácido fosfórico* en *agua de cal*, hasta la formacion de un precipitado que en seguida se ha lavado, secado y triturado.—IMPORTA, PUES, QUE TODOS LOS QUE QUIERAN BASARSE EN LOS SÍNTOMAS SIGUIENTES, SE PROCUREN EL MEDICAMENTO PREPARADO DEL MISMO MODO.

SINTOMAS GENERALES.—Vértigos y traccion en la nuca, en paseándose al aire libre, durante un tiempo ventoso.—°Padecimientos reumáticos de toda clase.—Dolores en diversas partes del cuerpo, que atraviesan los músculos hasta en las articulaciones.—Los riñones, las rodillas y los pulgares son atacados con preferencia.—Sueño por la tarde muy temprano, con desvelo frecuente por la noche.—Insomnio hasta las dos ó las tres de la mañana.—Despierta temprano con erecciones.—*Sueños de viajes.*—Ensueños frecuentes, algunas veces con reflexiones; ensueños de peligros y de incendios.—Horripilacion pasajera, frecuente.—Venas hinchadas.—El calor de la habitacion parece insoportable.—Prurito ardiente por todo el cuerpo.—Despues de un baño frio en el rio, el cuerpo se pone todo rojo como el de un cangrejo, con prurito y sensacion de ardor como por ortigas.—Hormigueo por todo el cuerpo.—°Ulceras.—°Cáries.—Estado afectuoso ó sentimental que hace que el sujeto sea conmovido fácilmente.—Mal humor, y aversion al trabajo.—Violencia con disposicion á hacer infamias.—Irascible, pronto á encolerizarse y á indignarse fácilmente en oyendo hablar de las injusticias que han cometido otros.—Excesiva violencia á la menor contradiccion.—Una noticia triste le pone fuera de sí.—Mal humor, repugnancia á la conversacion y necesidad de estar tranquilo, despues de una noticia desagradable.

Cabeza.—Garganta.—Vértigos con náuseas.—Dolor de

cabeza, con flatuosidades en el vientre.—Cabeza atontada, pesada y dolorosa por la mañana al despertarse.—Sensacion dolorosa de plenitud en la cabeza, como si el cerebro estuviese oprimido contra el cráneo, aumentada por el movimiento, y mudando de posicion, aliviada permaneciendo acostado tranquilamente.—Durante los dolores de cabeza, esta y la cara están calientes con pereza y mal humor.—Los dolores de cabeza se agravan al aire libre ó bajándose.—Prurito en la piel del cráneo todas las tardes.—Mas miopia que otras veces, con vista turbia por pequeñas manchas de figura circular, parduscas.—Prurito en los ojos, como si tuvieran arena ó un pelo dentro.—Ojos muy afectados cuando se ha pensado mucho ó escrito á la luz de la bujía.—Dolor en el ojo, como si le hubiera dado un golpe.—°Acné rosa en la cara, granos rojos, llenos de un pus amarillento con dolores lancinantes al tacto.—Dolor en los ojos y en la nariz, como si se hubiera introducido un cuerpo extraño.—Acumulacion de costras amarillas, secas, en la nariz.—Coriza fluente en la habitacion estando esta fria, obturacion de la nariz al aire libre.—Coriza fluente, violento, con excoriacion de las ventanillas de la nariz.—Pequeña úlcera en el tabique de la nariz, con dolor de excoriacion.—Estornudos frecuentes, con flujo de mucosidades por la nariz y salivacion.—Moco de sangre al sonarse.—Sensacion de un diente cariado, como si tuviera dentro alguna cosa, con sensibilidad dolorosa al contacto de la lengua.—Acumulacion de una saliva ácida en la boca.—Sensacion de contraccion en la garganta.—Ligera irritacion en la garganta, por la mañana al despertarse, que se agrava deglutiendo.—*Lengua cubierta de una capa blanca*, sobre todo por la mañana, con hendiduras como de grietas, y gusto soso despues de haber tomado helados.—Contraccion en el lado izquierdo de la boca y de las encías, como por una cosa dura, ó como si un aire frio saliese de los dientes cariados.—Dolor de excoriacion en la garganta con infarto de la amígdala derecha, mejorado en humedeciéndola con fruta.—Mucha acumulacion de flemas en la garganta, con ruido frecuente, estrepitoso y dolor de excoriacion.

Estómago.—Orinas.—Despues de haber tomado helados, dolores cólicos alrededor del ombligo, y lengua

blanca y áspera.—Mucho deseo de café y de vino.—Náuseas con vértigos, pesadez de cabeza y confusion de ideas.—Despues de tomar café, náuseas, pirosis, cabeza atontada y dolorida, y excesivo mal humor.—*Dolores agudos en el estómago con mucha debilidad*, dolor de cabeza y diarrea, el menor bocado que se tome renueva los dolores del estómago.—Antes de comer, calambre violento en el estómago, como despues de haber comido alguna cosa dura, con sensacion de desconsuelo y de incomodidad del corazon.—Cólicos violentos con meteorismo de vientre y mucha acumulacion de flatuosidades ó con dolor de cabeza.—Retortijones alrededor del ombligo, como un cólico flatulento, renovándose despues de haber bebido agua fria.—Salida difícil de ventosidades sin alivio.—**Deposiciones con flatuosidades abundantes*.—Diarrea con evacuacion de materias purulentas.—Diarrea muy fétida.—Deposiciones blandas, mezcladas de sangre negruzca.—Mucosidades de color amarillo de azafran, despues de una deposicion amarilla clara, mas bien trabada.—Salida de las hemorróides con pulsacion y dolor de excoriacion.—Emision frecuente de orinas abundantes con laxitud y fatiga.—Orinas oscuras y algunas veces calientes.—Necesidad de orinar por la noche, seguido por la mañana de un mal gusto en la boca.—Punzadas en la uretra fuera del tiempo de la emision de las orinas.—Salida de las orinas esparramadas, con dolor incisivo al orinar.—Orificio de la uretra, como pegajoso é inflamado con emision entrecortada.—Gana frecuente de orinar, con retencion de una parte de las orinas.—Por la tarde, despues de haberse acostado, necesidad frecuente de orinar.—Despues de la evacuacion de las deposiciones y orinas, las partes genitales están como fatigadas.—Por la mañana exaltacion del apetito venéreo con placer extraordinario en el cóito.—Pequeños granos en el escroto, con dolor de excoriacion al tacto.—Fuertes erecciones yendo en carruaje.—Despues del cóito, debilidad en las piernas.

Pecho.—Miembros.—Respiracion profunda, suspirosa.—Crujido en el esternon.—Dolor en los riñones al menor esfuerzo corporal, algunas veces tan violento que obliga á gritar.—**Dolores reumáticos en la espalda y en el brazo* (izquierdo), á veces con hinchazon de la parte en-

ferma, y calor febril.—Renovacion del dolor, torpeza y **parálisis del brazo* (izquierdo).—Parálisis de las articulaciones de las manos y de los dedos.—Dolores en las articulaciones de las manos y dedos, *sobre todo en los pulgares*, °algunas veces con enfriamiento.—*Dolores violentos en las rodillas*, en las caderas y los riñones, agravados por el movimiento, y sobre todo al andar.—Dolores osteócopos en los brazos y en las piernas.—Tension en la corva, como si los tendones fueran mas cortos al extender la pierna, y mejorándose al andar.—Fácil adormecimiento de los músculos de la nalga, con inquietud de las piernas que obliga á moverlas constantemente.

46.—CAMPHORA.

CAMPH.—Alcanfor.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y pr p.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 0, 6, 12.—*Duracion de accion*: solamente algunos minutos.
ANTÍDOTOS: Op. nitr-spir.
COMPÁRESE CON: *Canth.* cham. *cocc.* hyos. kal. laur. *op.* puls. rhus. stram. veratr.

CLINICA.—No se ha empleado todavía este medicamento mas que contra enfermedades, tales como el *Cólera*, la *Grippe*, algunos casos de *Epilepsia*, de afecciones *hidrópicas*, de *Fiebres tifoideas* (despues de rhus), Encefalitis (por insolacion?), y como antídoto paliativo de muchas sustancias vegetales. Contra los efectos tóxicos del *opium*, *cocculus*, *cantharis* y *moschus*, así como contra los efectos de *spongia* parece tener una virtud específica.—Los efectos de *nitrum* parecen aumentarse por el uso de *camphora*.—Se ha aconsejado el alcanfor contra los *calambres de pecho causados por los vapores del arsénico y los del cobre*, así como tambien contra algunas especies de *pneumonias por enfriamiento*, etc.
Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Convulsiones y calambres* de diferente naturaleza.—**Tétanos*, con pérdida del conocimiento y vómitos.—°Ataques de epilepsia, con estertor, cara roja y abotagada, movimientos convulsivos de los miembros y aun de la lengua, de los ojos y de los mús-

culos de la cara, transpiracion caliente y viscosa de la piel del cráneo y de la frente: despues del acceso, soñolencia comatosa.—Malestar, relajacion y torpeza de todo el cuerpo.—Decaimiento de todas las fuerzas. —Accesos de desvanecimiento.—Crujido de las articulaciones.—Punzadas reumáticas en los músculos.—Dificultad de mover los miembros.—Sensibilidad dolorosa del periostio de todos los huesos.—Padecimientos á consecuencia de un enfriamiento.—La mayor parte de los *síntomas aparecen durante el movimiento* ó por la noche, y se *agravan por el frio*, al aire libre y al contacto.—Frecuentemente los síntomas desaparecen en el momento que se fija la atencion en ellos.—Mucho horror al aire libre, con necesidad de abrigarse mucho.

Piel.—Piel dolorosamente sensible, aun al mas ligero contacto.—*Inflamaciones erisipelatosas*.—*Piel azulada y fria, con frio del cuerpo.—Sequedad en la piel.

Sueño.—Excesivo deseo de dormir por el dia.—*Soñolencia comatosa*, con palabras incoherentes.—**Insomnio nocturno* por sobreexcitacion nerviosa.—Ronquido y agitacion durante el sueño.—Sueños ansiosos llenos de celos.

Fiebre.—*Sensibilidad excesiva al aire frio*, y con facilidad á resfriarse.—*Frio por todo el cuerpo, con palidez mortal de la cara, calosfrios y castañeteo de dientes.—Calor del cuerpo, con rubicundez del rostro, sobre todo en las mejillas y en el lóbulo de la oreja.—Calor general que andando, se hace excesivo.—*Pulso notablemente pequeño y lento, ó excesivamente acelerado y lleno.—Sensacion de sequedad de toda la piel.—La sangre circula difícilmente en las partes distantes al corazon.

Moral.—Ansiedad con humor lloroso.—Humor querelloso y contrariante.—Embotamiento de los sentidos.—*Pérdida del conocimiento.—Delirios.*—Furor.—Pérdida de la memoria.—Pensamientos celosos. —Decaimiento desesperado.—Mucha precipitacion.

Cabeza.—*Aturdimiento como por embriaguez*, sobre todo andando.—*Vértigo y pesadez de la cabeza que obliga á inclinarla hácia atrás.—Dolor de cabeza, como si el cerebro estuviera magullado ó llagado.—Dolor de cabeza sordo encima del hueso frontal, con gana de vomitar.—*Cefalalgia constrictiva*, sobre todo en el occipucio y encima de la raiz de la nariz, que se agrava mucho en

bajándose, estando acostado, ó por el tacto, y se disipa *cuando se piensa en él.*—Golpes incisivos en la cabeza despues de haberse echado.—*Dolor terebrante en las sienes.*—Dolor de cabeza pulsativo por la noche, con punzadas en la frente y calor del cuerpo.—*Congestion á la cabeza.—Inflamacion del cerebro.—Espasmos que tiran la cabeza hácia un lado ó hácia atrás.*

Ojos.—Inflamacion de los ojos.—Manchas rojas en los párpados.—Temblor de los párpados.—*Ojos huraños y convulsos hácia arriba ó hundidos.*—Contraccion de las pupilas.—Oscurecimiento de la vista.—Vision de objetos extraños.—*Fotofobia.*—Todo parece estar muy claro y brillante.—Las letras se confunden leyendo; en seguida, se forma un círculo luminoso delante de los ojos.

Oidos.—Calor y rubicundez de las orejas, sobre todo en los lóbulos.—*Abscesos en el conducto auditivo*, de un rojo oscuro y con dolor presivo lancinante.

Cara.—*Palidez mortal de la cara ó de color rojo oscuro.—Erisipela en la cara.*—Distorsion convulsiva de las facciones.—*Apretamiento convulsivo de las mandíbulas.*—°Cara fria y azulada.

Dientes.—*Odontalgia, como por hinchazon de las glándulas submaxilares*, con sensacion de prolongacion de los dientes.—Golpes agudos en las raices de los dientes incisivos.—Vacilacion dolorosa de los dientes.—Dolor de dientes contínuo, con removimiento y terebracion en los molares, agravados por el vino y el café, el agua fria y el aire libre.—Los dolores de dientes cesan durante el cóito.—Exponiéndose al aire libre durante los dolores de dientes, las punzadas suben desde estos al ojo.

Boca.—Aliento fétido por la mañana.—*Espuma en la boca.* Acumulacion abundante de una saliva viscosa y mucosa.

Garganta.—Dolor de garganta al tragar, como por excoriacion de la misma, haciéndose sentir aun por la noche.—*Calor quemante en la garganta, desde el paladar hasta el estómago.*—Sabor mas pronunciado de todos los alimentos y sobre todo del caldo.—*Amargor del tabaco y de los alimentos*, principalmente de la carne.—Disgusto y repugnancia por el humo del tabaco.—°Sed excesiva.

Estómago.—Ganas de vomitar, seguidas de accesos de vértigo.—*Vómito* de bílis ó de sangre.—Al principio de los vómitos, sudor frio, principalmente en la cara.—

Digitized by Google

Sensacion *de quemadura y de calor en el estómago.*—Dolor de contusion en el epigastrio.—°Fuerte presion en el epigastrio.—°Vómitos matutinos de mucosidades ágrias. —°Excesiva sensibilidad en la boca del estómago al tacto.

Vientre.—Calambres en el vientre.—Dolor tractivo de magulladura en todo el lado derecho del vientre.—Sensasacion de plenitud en el bajo vientre.—Sensacion de frio ó de *calor quemante en el epigastrio y en el bajo vientre.*

Deposiciones. — *Estreñimiento.* — Deposiciones difíciles, como por inactividad de los intestinos ó por *estrechez del recto.*—Deposiciones negruzcas.

Orinas.—*Retencion de orinas.*—Orinas que fluyen lentamente y á chorro muy delgado.—Orina de un verde amarillento, turbia y que huele á moho.—*Hematuria.*—Dolor quemante durante la emision de las orinas.—°Orina espesa y roja, con sedimento turbio y espeso. —*Tenesmo de la vejiga con iscuria convulsiva.*

Partes viriles.—*Falta del apetito venéreo é impotencia.*

Pecho.—Respiracion profunda y lenta.—°Opresion de pecho sofocante y constriccion de la laringe, como por el vapor del azufre.—Excesiva acumulacion de mucosidades en las vías aéreas.—°Calambres de pecho.—Palpitaciones de corazon que se puede oir golpear hasta en las costillas, sobre todo despues de comer.—*Temblor del corazon.*

Tronco y miembros.—Tension y rigidez en la nuca moviendo el cuello.—Lancinaciones tractivas entre los omóplatos, durante el movimiento de los brazos.—Movimientos convulsivos de los brazos, que describen círculos.—Presion y estirones agudos en el brazo y en el antebrazo.—*Frio glacial de las manos.*—Dolores de rotura en los muslos y en las rodillas.—Dolores calambroideos y estirones agudos en las piernas y el empeine.—*°Calambres en las pantorrillas.*—Tirones agudos en las extremidades de los dedos y debajo de las uñas, andando.—*Gran debilidad de las piernas.*

47.—CANNABIS SATIVA.

CANN.—Cáñamo cultivado.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. —*Dósis usadas*: 0, 3, 12, 30.—*Duracion de accion*: 2, 3 dias en las enfermedades agudas: 2, 3 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS: Camph.
COMPÁRESE CON: Arn. bry. canth. nux-vom. op. petrol. puls. stann.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de sintomas* se verá los casos en que se puede consultar este medicamento, contra:—Padecimientos histéricos?; Convulsiones?; Padecimientos á consecuencia de fatiga y de esfuerzos físicos?: Manía y otras afecciones morales?; Oftalmías escrofulosas?; Catarata; Oscurecimiento y manchas de la córnea; Afecciones gástricas y biliosas?; Gastralgia?; Induracion del hígado; Cólicos; Ascitis enquistada?; Estreñimiento tenaz; Cistitis, nefritis, disuria, hematuria y otras *afecciones de las vias urinarias*; Cálculos urinarios; *Gonorrea aguda*; Flores blancas?; Esterilidad; Aborto; Afecciones catarrales de las vías aéreas; *Pneumonia;* Padecimientos asmáticos; Carditis, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores tractivos, agudos y contractivos, presivos, *con sensacion de parálisis*, ó golpes y *punzadas profundas* en diversas partes, ó bien sensacion como si fuese pellizcado con los dedos.—Tirones reumáticos durante el movimiento, como si estos fuesen en el periostio.—*Abatimiento general con vacilacion y endolorimiento de las rodillas.—Mucha fatiga por haber hablado ó escrito.*—Tétanos, pricipalmente de los miembros superiores y del tronco.—Muchos síntomas se agravan ó se provocan por el tacto, el aire libre y el calor, así como por la noche y despues de media noche.

Piel.—Sensacion de ardor violenta en toda la piel, sobre todo en los piés, en las manos y vientre, seguida de prurito que obliga á rascarse toda la noche.

Sueño.—*Gana invencible de dormir entre el dia.*—Por la mañana al despertarse, se siente mas fatigado que por la

Digitized by Google

tarde antes de acostarse.—*Insomnio por la noche.*—*Mucha ansiedad de corazon*, por la noche con picazon y sensacion de quemadura en toda la piel, como por agua hirviendo.—Por la noche excesivo calor y sudor.

Fiebre.—*Horripilacion y despeluzamiento con sed.*—*Frio exterior* y desazon.—Frio en el cuerpo con calor en la cara.—Pulso lento y apenas sensible.—Calor quemante en todo el cuerpo por la noche.

Moral.—Tristeza é indiferencia.—Se muestra muy ofendido por la menor palabra.—Disposicion á asustarse fácilmente.—*Mania*, unas veces alegre, otras séria ó furiosa.—Irresolucion é incertidumbre á causa de una imaginacion muy voluble.—Por la tarde y por la mañana las ideas se confunden hasta el punto de no poder distinguir lo que es verdadero ó ficticio.—Mucha distraccion hasta el punto de no saber lo que se hace.—Se equivoca fácilmente al escribir.—*Las ideas se pierden.*—Faltan las palabras.

Cabeza.—Accesos de vértigo en andando y estando en pié que llegan hasta hacer caer de costado.—Atontamiento continuo de la cabeza, como si se moviera constantemente.—Ebullicion en la cabeza cuando escribe.—Dolor de cabeza, como si hubiera una piedra que oprimiese encima.—Presion y tension en las sienes.—Compresion en el sincipucio, desde los bordes de la órbita hasta las sienes.—*Congestion de la cabeza con latidos en el cerebro*, mejillas rojas y calientes.—Sensacion en la piel del cráneo, como si le faltara alguna cosa, y sensacion frecuente como si estuvieran cayendo sobre la cabeza gotas de agua fria.—Granos dolorosos en la piel del cráneo, en la nuca y detrás de las orejas, con dolor en los ojos y ligera irritacion en la garganta.

Ojos.—Dolor presivo en los globos de los ojos.—Presion sobre los párpados, con dificultad para levantarlos.—Tirones calambroídeos en los ojos.—Debilidad y turbacion de la vista que impide distinguir bien los objetos, ya estén cercanos, ya apartados.—Manchas y oscurecimiento de la córnea.—Vision como de un círculo dentellado de llamas blanquizcas.—Puntos luminosos y movimientos verticales delante de los ojos.

Oidos.—*Latidos y presion en los oidos.*—Ruido en los oídos y sensacion como si estuviesen cubiertos de una piel.—

Digitized by Google

Granos inflamados é hinchados, purulentos en las orejas.

Nariz.—Hinchazon de la nariz con rubicundez cobriza.—*Calor y sequedad de la nariz.*—*Epistaxis*, precedida de una sensacion de calor en la nariz.

Cara.—Palidez del rostro.—Rubicundez en la mejilla izquierda, con palidez de la otra durante la odontalgia.—Hormigueo, picazon y escozor en la cara, como si tuviera sal.—Palpitaciones de los músculos de la cara.—Calor de la cara y rubicundez de las mejillas.—Las encías de un diente cariado, hinchadas, inflamadas y dolorosas.—Dientes embotados.

Boca.—Sequedad de la boca, con saliva viscosa y falta de sed.—*Palabra confusa*, unas veces porque faltan las palabras, otras porque falta la voz.—En hablando fuerte, ansiedad producida por dolores en el dorso.—Ligera irritacion en la garganta, con punzadas en los oidos.—Dolor de excoriacion en la garganta, con sensacion de sequedad.

Estómago.—Eructos vacíos.—*Regurgitacion de materias ácres y de un ácido amargo.*—Náuseas con apetito.—Vomituricion con estrangulacion desde el epigastrio hasta la garganta.—*Vómitos de bilis verde.*—Vómitos de mucosidades ágrias despues de haber tomado café.—Apetito aumentado por la tarde.—Por la mañana en la cama, gana de vomitar, sobre todo estando acostado del lado derecho.—El dolor de corazon interrumpe el sueño.—Pirosis.—*Al tacto, dolor en el estómago*, como si estuviera ulcerado.—Accesos de violentos calambres de estómago con palidez y sudor del rostro, pulso casi apagado y respiracion estertorosa.—Presion, pellizcos y dolores cólicos en el epigastrio y por encima del estómago.

Vientre.—Dolor de contusion en los intestinos.—Hinchazon dura y dolorosa de la region hepática.—Dolores calambroídeos en el epigastrio.—*Pulsacion en el vientre*, como de dentro á fuera.—Sacudimientos dolorosos en el vientre, como si encerrase algun objeto vivo.—Fluctuacion de los intestinos, como si estuvieran desprendidos, cuando se mueve el brazo.—Tumefaccion parcial del vientre, como por una ascitis enquistada.—Golpes y presion hácia el exterior, en la region de las ingles.—Dolores de vientre, mejorados en bebiendo agua fria.

Deposiciones.—*Diarrea acompañada de dolores de vientre*

calambroideos.—Presion hácia afuera en el recto.—Sensacion en el ano como si resudara agua fria.—*Estreñimiento y deposiciones duras.—Deposiciones blandas con tenesmo y flatuosidades.—Deposiciones líquidas, amarillentas, saliendo como si no fuera mas que aire.

Orinas.—*Conato urgente de orinar*, con dolor presivo.—*Dificultad de orinar, como por parálisis de la vejiga, y estranguria nocturna.—°Retencion tenaz de orina.—Obturacion de las vías urinarias por mucosidades y pus.—*Orina turbia*, blanca ó rojiza, y como mezclada de sangre ó de pus.—Incontinencia de orina.—*Chorro de la orina desparramado.—°Emision gota á gota de una orina rara y sanguinolenta.—**Dolor quemante en la uretra y en la vejiga, antes y durante la emision de las orinas*.—*Uretra inflamada y dolorosa al tacto.—*Flujo amarillo y mucoso por la uretra.—°Salida de una piedra al orinar.

Partes viriles.—Partes genitales frias.—*Prurito é *hinchazon inflamatoria del prepucio*, del glande y del miembro, con rubicundez oscura y °fimosis.—Presion en los testículos y tension en el cordon espermático, estando de pié.—Hinchazon de la próstata.—*Erecciones con dolores tensivos.—Repugnancia por el cóito, ó mucha excitacion del apetito venéreo.—Fuertes erecciones despues del cóito.—Erecciones sin apetito venéreo.—Sensacion de estrangulacion del testículo derecho, con hinchazon del testículo y del cordon espermático; el escroto parece que en su parte superior está cubierto de pequeñas mucosidades.

Reglas.—Esterilidad.—*Aborto* con convulsiones.

Laringe.—Extincion de la voz.—Acumulacion de mucosidades tenaces en la laringe, con arañamiento y dificultad de la respiracion.—Tos violenta y seca.—°*Tos con expectoracion verdosa y viscosa*.

Pecho.—*Opresion de la respiracion*, como si hubiera un peso sobre el pecho, con silbido en los bronquios.—Respiracion corta y oprimida.—*Respiracion difícil y que se hace imposible no estando en pié.—*Dificultad de la respiracion*, y opresion de pecho con inquietud en la garganta.—Respiracion estertorosa.—Dificultad ansiosa de la respiracion, con punzadas entre los omóplatos.—**Punzadas* en el fondo *del pecho*, sobre todo al respirar, al hablar ó durante el movimiento.—*Inflamacion de los pul-

mones, con vómitos verdosos y delirio.—Golpes dolorosos en la region del corazon, con *palpitaciones de corazon* y ansiedad.—Palpitaciones de corazon, que se sienten mas abajo del sitio ordinario.—Inflamacion y prurito del pezon en el hombre.

Tronco.—*Dolores en el dorso que impiden hablar y suspenden la respiracion*.—Dolor lancinante entre los omóplatos.—Presion hácia afuera en los riñones y en el coxis.

Brazos.—Dolores de contusion en la espalda y en el brazo durante el movimiento.—*Calambres en las manos y en los dedos*.—Debilidad paralítica repentina de la mano, con temblor al agarrar alguna cosa é imposibilidad de tenerla con firmeza.

Piernas.—*Calambres en los muslos, en las pantorrillas y en las corvas*.—Debilidad, vacilacion y dolores en las rodillas.—Dislocacion de la rótula en subiendo una escalera.—Pulsacion y dolor extensivo en *los piés* y *las articulaciones del pié*, como *despues de una marcha forzada*.—°Contraccion espasmódica del tendon de Aquiles, con dolores violentos.

48.—CANTHARIS.

CANTH.—Cantárida.—Cantarida oficinal.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dó is usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 20 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph.

COMPÁRESE CON: Acon. bell. *camph*. cann. caps. chin. *coff*. coloc. laur. led. lyc. puls. rhus. sceneg.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—Afecciones hidrópicas; Convulsiones; Ictericia?; Rabia, hidrofobia, manías y otras afecciones morales; Encefalitis, gastritis, hepatitis y otras inflamaciones locales?; Amigdalitis y otras anginas flegmonosas?: *Nefritis, cistitis, uretritis, hematuria y otras afecciones de las vias urinarias;* Gonorrea suprimida; Satiriasis?; Priapismo; Coxalgia; Fiebres intermitentes, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES. — *Dolores quemantes como por excoriacion* en todas las cavidades del cuerpo.—Punzadas agudas hácia lo interior en diferentes partes.—*Dolores tractivos, artríticos en los miembros, con afeccion de las vías urinarias, y mejorados por la frotacion.—Dolores violentos con gemidos y lamentos.—Sensacion de sequedad en las articulaciones.—Falta de flexibilidad en todo el cuerpo.—Abatimiento y debilidad, con sensibilidad excesiva de todas las partes del cuerpo, temblor y necesidad de acostarse.—Postracion de fuerzas, que llega hasta la parálisis.—Convulsiones, tétanos.—Los padecimientos se manifiestan principalmente en el lado derecho y se mejoran estando acostado.—Los síntomas se renuevan cada siete dias.

Piel.—Vesículas pruritosas, con dolor quemante al tacto. —Inflamaciones erisipelatosas.—Dolores tractivos, agudos en las úlceras, con supuracion mas abundante.

Sueño.—Excesiva gana de dormir, sobre todo despues de medio dia, con bostezos y pandiculaciones.—Insomnio sin causa aparente.—Por la noche, sueño ligero, despertando con frecuencia.

Fiebre.—Fiebre que se manifiesta por frio.—Frio y despeluzamiento, con carne como de gallina y palidez de la cara.—Sed solamente despues de los calofrios.—Sudor de olor á orina.

Moral.—Abatimiento y humor lloroso.—Inquietud angustiosa, con agitacion que obliga á moverse constantemente.—Falta de confianza en sí mismo.—Pusilanimidad y timidez.—Disposicion á enfadarse y á encolerizarse.—Accesos de rabia, con golpes, gritos y aullidos, renovados tocándose en el gaznate y en viendo el agua. —Delirios.—Vesania.—Manía con actos y gestos extravagantes.

Cabeza.—Vértigo con pérdida del conocimiento y niebla delante de la vista, principalmente al aire libre.—Dolores de cabeza que interrumpen el sueño de la noche.—Lancinaciones presivas en la cabeza, que desaparecen andando.—Dolores tractivos agudos en la cabeza, con vértigos.—Congestion á la cabeza.—Palpitacion al cerebro y calor que sube á la cabeza.—Sensacion de quemadura en la cabeza, como si todo el interior estuviera llagado, con inflamacion del cerebro.—Estirones, sacu-

Digitized by Google

didas y corrosion de los huesos de la cabeza.—Dolores de cabeza como si tiraran de los cabellos.—Se erizan los cabellos.—Dolores de cabeza procedentes de la nuca y que llegan hasta la frente.

Ojos.—Dolores en los ojos, con sensacion como si los párpados estuvieran escoriados, principalmente al tiempo de abrirlos.—Inflamacion de los ojos con escozor quemante.—Color amarillento de los ojos.—Los objetos parecen estar teñidos de amarillo.

Oidos.—Inflamacion de los oidos con ardor.

Nariz.—Hinchazon de la nariz, aun en el interior, con rubicundez y calor quemante.—Olor fétido y nauseabundo en la nariz.—Coriza de larga duracion, y catarro con mucha evacuacion de mucosidades viscosas por la nariz.

Cara.—Palidez de la cara.—Cara hundida, hipocrática con facciones que expresan la angustia y la desesperacion.—Color amarillento de la cara.—Inflamacion erisipelatosa y descamacion de las mejillas.—Rubicundez quemante é hinchazon de la cara.—Hinchazon de un solo lado de la cara (el derecho), con tension.—Hinchazon é inflamacion de los labios.—Grietas y excoriacion de los labios.—Trismus.

Dientes.—Odontalgia, generalmente tractiva, la que se agrava comiendo.—Fístula en las encías.—Ulceracion de las encías.

Boca.—Gusto en la boca á pez de cedro.—Inflamacion de la membrana mucosa de la boca.—Inflamacion flegmonosa en el interior de la mejilla.—Aftas en la boca.—Salivacion espumosa con estrías de sangre.—Espuma en la boca.—Sangre coagulada que viene á la boca.—Hinchazon inflamatoria y supuracion de la lengua.—Debilidad de los órganos de la palabra, y palabra lánguida.

Garganta.—Dolor de garganta al tragar.—Deglucion difícil con estrangulacion de la garganta, y regurgitacion nocturna de los alimentos.—Deglucion impedida, sobre todo para los líquidos.—Sensacion de ardor en la garganta al tragar.—Inflamacion y ulceracion de las amígdalas y de la garganta.—Dolor quemante en la garganta, agravado en bebiendo agua.

Apetito.—Pérdida del gusto.—Gusto de pez en la boca y en la garganta.—Sed por sequedad de los labios, con

repugnancia á todas las bebidas.—Falta de apetito con disgusto y repugnancia á toda clase de alimentos.

Estómago.—Eructos con sensacion quemante, como de pirosis, agravada bebiendo.—Eructos sollozantes, que parece toman una direccion inversa y vuelven hácia el estómago.—Vómito de los alimentos ingeridos.—Vómito de materias biliosas y mucosas ó de sangre.—Gran sensibilidad en la region precordial.—Plenitud presiva con ansiedad é inquietud en el estómago.—Dolores penetrantes y quemantes en el estómago.—Inflamacion del estómago.

Vientre.—Inflamacion del hígado.—Punzadas y contraccion en el hipocondrio derecho.—Mucha sensibilidad en el abdómen al tacto.—Dolor ardiente en el vientre, desde la garganta hasta el recto.—Dolor quemante por encima del ombligo, en tosiendo y al estornudar, y al sonarse, con manchas amarillentas en la parte afecta.—Inflamacion de los intestinos.—Hinchazon hidrópica del vientre.—Encarcelacion de flatuosidades en los hipocondrios.

Deposiciones.—Estreñimiento y deposiciones duras.—Diarrea con evacuacion de materias espumosas ó de mucosidades verdosas, con dolores cólicos despues de las deposiciones y dolor quemante en el recto.—Diarreas disentéricas, con evacuacion nocturna de mucosidades blanquecinas y de trozos sólidos, como de falsas membranas, con estrias de sangre.—Deposiciones sanguinolentas.

Orinas.—Retencion de la orina con dolores calambroídeos en la vejiga.—*Conato urgente é inútil de orinar, con emision dolorosa y gota á gota.—*Emision difícil de las orinas, en chorro delgado y esparcido.—Aumento de la secrecion de las orinas.—Orina amarilla, pálida ó *de color oscuro y rojo.—Evacuacion de mucosidades sanguinolentas de la vejiga.—*Estranguria.—Orinas purulentas.—*Escozor quemante al orinar.—*Dolores incisivos en la uretra, antes, durante y despues de la emision de las orinas.—*Dolores vivos, lancinantes é incisivos, *estirones sucesivos y pulsaciones en las vías urinarias.—*Inflamacion y *ulceracion de los riñones, de la vejiga, y de la uretra.—*Escesiva sensibilidad dolorosa en la region de la vejiga al tacto.

Partes viriles.—Dilatacion en el cordon espermático al orinar.—Inflamacion y gangrena de las partes genitales. —Hinchazon dolorosa de los testículos.—Apetito venéreo considerablemente exaltado con erecciones dolorosas frecuentes y de larga duracion, como por priapismo. —Eyaculacion fácil durante las caricias amorosas.—Espermatorrea.—Despues del cóito, dolor quemante en la uretra.

Reglas.—Reglas muy anticipadas y muy abundantes, con sangre negra y dolores durante el flujo.—Salida de molas, de feto y de placenta.—*Hinchazon del cuello de la matriz.—**Flores blancas corrosivas, con sensacion quemante orinando*, y excitacion del apetito venéreo.—Inflamacion de los ovarios.

Laringe.—Ronquera con estertor doloroso de mucosidades viscosas, abundantes, que vienen del pecho, y con punzadas incisivas en la tráquea-arteria.—Inflamacion de la laringe.—Sensacion de debilidad excesiva en los órganos de la respiracion, en hablando y al respirar profundamente.--Voz débil, tímida y temblorosa.

Pecho.—Respiracion difícil y oprimida por constriccion de la garganta y sequedad de la nariz.—Suspension de la respiracion subiendo una cuesta, con estertor en el pecho y náuseas.—Punzadas en el pecho y los costados. —Dolores quemantes en el pecho, de donde se desprenden á veces pequeños coágulos de sangre.—Palpitaciones de corazon.

Tronco y miembros.—Dolores tractivos agudos en el dorso.—Sensacion de constriccion en la columna vertebral.—Emprostótonos y opistótonos.—Dolores tractivos agudos en los brazos.—Falta de fuerza en las manos.—*Dolores en las caderas, con padecimientos espasmódicos en las vías urinarias.—Dolores tractivos agudos, terebrantes en las piernas, desde los piés hasta las caderas.—Temblor de las piernas.

49.—CAPSICUM ANNUUM.

CAPS.—Pimienta larga ó pimienta de Cayena.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 9, 30.—*Duracion de accion*: hasta 20 dia, en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph.—El capsicum es antídoto de: *Calad*, y *chin.*
COMPÁRESE CON: *Arn.* bell. *calad. chin. cin.* i. n. n-vom. puls. veratr.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en los que se podrá consultar este medicamento contra:—Afecciones de personas de un *temperamento flemático*; Nostalgia; Jaqueca y cefalalgia histérica?; Ambliopia amaurótica?; Neuralgia facial?; Estomacace; Disentería; Diarrea; Tos catarral; *Fiebres intermitentes*, aun despues del abuso de la quina, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES. — *Dolores presivos.* — Dolores tractivos en los miembros, excitados por el movimiento. —*Dolor de luxacion y rigidez en todas las articulaciones* con crujido, sobre todo al comenzar á andar.—*Calambres en el cuerpo con rigidez de los brazos y de las piernas*, hormigueo y sensacion de adormecimiento.—*Repugnancia al movimiento.* — Los síntomas se manifiestan principalmente *por la tarde* y por la noche, y se agravan al aire libre, *al contacto y al frio*, *así como tambien al empezar el movimiento*, y despues de haber bebido ó comido.—Mucha sensibilidad al aire frio y á las corrientes de aire.—Insomnio sin causa aparente.—Sueño lleno de ensueños.

Fiebre.—*Calofrios febriles y frio por todo el cuerpo* con mal humor que se aumenta con el frio, ó bien con ansiedad, aturdimiento y entorpecimiento de la cabeza.—Calofrios que provienen del dorso.—*Frio y despeluzamiento despues de haber bebido.—*Friebre con predominio de frio* y con sed, calor quemante y padecimientos mucosos.—°*Calofrios con mucha sed, y despues calor, con* ó sin sed y con sudor.

Moral.—*Disposicion á asustarse.*—Descontento.—**Resistencia tenaz.*—*Mucha disposicion á tomarlo todo en mal sentido, á encolerizarse aun por chanza y á poner faltas.—Humor caprichoso y excesivamente variable.—Embotamiento de todos los sentidos.—Irreflexion y torpeza.—°*Nostalgia con rubicundez de las mejillas é insomnio.* —Disposicion á chancearse y á decir chistes.

Cabeza.—Cabeza atontada.—*Embriaguez* como por bebidas espirituosas.—*Dolores de cabeza como si el cráneo fuere á estallar*, andando ó moviendo la cabeza.—*Accesos de do-*

Digitized by Google

lores de cabeza semi-laterales, *presivos* y lancinantes con náuseas, vómitos y pérdida de la memoria, agravados por el movimiento de los ojos.—Dolores lancinantes ó tractivos agudos, sobre todo en los lados de la cabeza.—Dolor presivo en el cerebro, como por separacion y plenitud.—*Dolores de cabeza pulsativos*.—Prurito corrosivo en la piel del cráneo, con dolor en esta y en la raiz de los cabellos, despues de rascarse.

Ojos.—Presion en los ojos, como si un cuerpo extraño se hubiese introducido en ellos.—Inflamacion de los ojos con rubicundez, dolor quemante y lagrimeo.—*Ojos prominentes*.—*Turbacion de la vista*, sobre todo por la mañana, como si alguna cosa fluctuase sobre la córnea, mejorándose por algunos instantes con la frotacion.—Vista enteramente extinguida como por la amaurosis.

Oidos.—Dolores tractivos agudos en los oidos.—Picazon y presion en el fondo del conducto auditivo.—Hinchazon dolorosa detrás de la oreja.—Disminucion de la audicion.

Nariz.—*Epistaxis*, sobre todo por la mañana en la cama.—Granos dolorosos debajo de las ventanillas nasales.—Coriza seco, con hormigueo y cosquilleo en las ventanillas de la nariz.

Cara.—*Rubicundez de la cara* alternando á veces con palidez.—Muchos puntitos rojos en la cara.—Herpe corrosivo, prurito en la frente.—*Dolores en la cama*, en los huesos, los que se agravan por el tacto, ó en los nervios, agravándose cuando se duerme.—*Presion sorda en el pómulo*.—Erupciones ulceradas y *grietas en los labios*.—Hinchazon de los labios.

Dientes.—Dolor en los dientes como por dentera ó prolongacion.—Tirones en los dientes y en las encías.—Hinchazon de las encías.

Garganta.—Vesículas quemantes en la boca y sobre la lengua.—Saliva viscosa en la boca.—Ligera inflamacion de garganta con deglucion dolorosa y tirones en la faringe.—Contraccion calambroídea de la garganta.

Apetito.—Gusto acuoso, insulso.—*Gusto ágrio de la boca* y tambien del caldo.—Falta de apetito.—Deseo de tomar café, con gana de vomitar despues de haberlo tomado.—*Pirosis*.—*Gana de vomitar* sentida generalmente en el epigastrio, con presion de la parte.

Estómago.—Dolor en el estómago el que está meteorizado.—Sensacion de frio en el estómago.—*Dolor quemante en el estómago y en el epigastrio*, sobre todo inmediatamente *despues de la comida*.—Punzadas en el epigastrio, respirando aprisa y profundamente, en hablando ó por el tacto.—Hinchazon en la boca del estómago.

Vientre.—*Vientre timpanitico como si fuera á estallar, con tension presiva* y suspension de la respiracion.—Tirones y movimientos en el vientre.—Fuertes pulsaciones en el bajo vientre.—*Cólicos gaseosos*.—Salida de una hernia ventosa por el anillo inguinal.

Deposiciones.—*Tenesmo.—Pequeñas deposiciones disentéricas*, con evacuacion de materias mucosas y sanguinolentas, precedidas de cólicos flatulentos.—*Diarreas nocturnas, con dolores quemantes al ano.—Hemorróides ciegas, con dolor durante la deposicion.

Orinas.—*Tenesmo de la vejiga*.—Conato frecuente, *urgente y casi inútil de orinar.—*Dolores quemantes al orinar*.—Contracciones calambroídeas é incisivas en el cuello de la vejiga.—Dolores incisivos y lancinantes en la uretra, fuera del tiempo de la emision de las orinas.—*Evacuacion purulenta por la uretra, como una gonorrea.—*Flujo de sangre por la uretra*.

Partes viriles.—*Impotencia, y partes genitales frias*.—Erecciones matutinas muy violentas.—Durante las caricias amorosas, temblor de todo el cuerpo.

Laringe.—*Ronquera.—*Tos mas violenta por la tarde y la noche, *con dolores* en otras partes del cuerpo, sobre todo en la cabeza y en la vejiga, como si fuesen á estallar, ó *con presion en la garganta y en los oidos*, como si un absceso fuera á abrirse.—Tos despues de haber tomado café. Tos con aliento fétido y gusto desagradable en la boca.

Pecho.—*Necesidad de respirar profundamente.—Dificultad en la respiracion*, que á veces parece proviene del estómago. Dolor constrictivo en el pecho.—Punzadas en el pecho respirando.—Dolor pulsativo en el pecho, que suspende la respiracion y que se aumenta por el movimiento.

Tronco y miembros.—*Dolores traxtivos agudos en el dorso*. Rigidez de la nuca.—Tension en las rodillas y rigidez en las pantorrillas al andar.—Tirantez en los brazos y en las piernas con hormigueo, como cuando se duermen.

Digitized by Google

50.—CARBO ANIMALIS.

CARB-AN.—Carbon animal.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Dósis usadas:* 24, 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. (*véase* carb-veg.).

COMPÁRESE CON: Carb-veg., y los medicamentos que se hallan inscritos con este nombre.

CLINICA.—Hasta el dia no se ha empleado este medicamento mas que contra algunos casos de *Gastralgia*, *Induracion de las glándulas*, *Metrorragias*, *Nudosidades artríticas*, *Aftas de los niños*, *Induracion de la lengua*, *Bubones sifilíticos*, etc.

SÍNTOMAS GENERALES.—*Dolores presivos en las articulaciones* y en los músculos de los miembros.—Dolores quemantes.—*Dolores nocturnos* en las articulaciones.—Quebrantamiento, falta de fuerzas y crujido en las articulaciones, que se doblan fácilmente.—°*Rigidez artrítica* y nudosidades gotosas en las articulaciones.—Tension en algunos miembros, como por acortamiento de los tendones.—Contraccion espasmódica de muchas partes.—**Disposicion á lastimarse de los riñones.*—Torpeza de todos los miembros, sobre todo de la cabeza.—*Mucha fatiga y debilidad, producidas sobre todo al andar, con traspiracion fácil, principalmente comiendo ó paseando al aire libre.—°*Sensibilidad excesiva al aire libre*, y sobre todo al aire frio del invierno.—Ebullicion de sangre y disposicion á acalorarse fácilmente.

Piel.—Prurito por toda la piel, sobre todo por la tarde en la cama.—Inflamaciones erisipelatosas.—°*Sabañones.*—**Hinchazon dura y dolorosa de las glándulas.*—Hinchazon de las partes exteriores, con dolor quemante.

Sueño.—*Sueño tardío*, é insomnio nocturno causado por *inquietud*, *angustia*, ebullicion de sangre y temor de ahogarse.—Visiones espantosas antes de conciliar el sueño. *Sueño con desvarios*, llantos, agitacion y gemidos sordos.

Fiebre.—*Calofrios*, sobre todo por la noche en la cama, con transpiracion durante el sueño.—*Frio excesivo en los piés* y en las manos por la tarde.—Calor nocturno.—

*Traspiracion *fácil* por el dia, sobre todo durante la comida ó *paseándose*.—*Sudor debilitante* y fétido, sobre todo por la noche y por la mañana, principalmente en los muslos.—Sudor que tiñe el lienzo de amarillo.

Moral.—*Nostalgia* y sensacion de abandono, con tristeza y *lágrimas*.—Miedo y espanto, sobre todo por la tarde.—*Decaimiento y desesperacion.—**Propension á asustarse*. Alternativa de alegría y de tristeza, ó de irascibilidad y de mal humor taciturno.—Confusion de ideas y torpeza, sobre todo por la mañana.

Cabeza.—**Vértigo*, *sobre todo por la tarde ó por la mañana*, y á veces con náuseas al levantarse despues de haber estado mucho tiempo acostado, ó bien con oscurecimiento de la vista al mover la cabeza.—Dolores de cabeza por la mañana, como despues de haber pasado toda la noche cometiendo excesos.—*Dolores de cabeza al aire frio, y agravados* por un tiempo húmedo.—*Pesadez*, sobre todo en el *occipucio*, con la cabeza turbada.—**Dolores de cabeza presivos*, aun despues de comer, *y que obligan á cerrar los párpados.—*Congestion y calor interior en la cabeza.—Sensacion de vacilacion del cerebro á cada movimiento.—Sensacion de torpeza en la cabeza.—Dolores tractivos agudos en los tegumentos del lado derecho de la cabeza.—Tension de la piel de la frente y del vértice.—Sensibilidad de la piel del cráneo á la presion del sombrero.——**Costras y erupcion en la cabeza*.

Ojos.—Sensacion como si el globo del ojo estuviera desprendido de la órbita, con debilidad de la vista.—*Presbiopia con dilatacion de las pupilas*.—°Fungus hematodes en la órbita.

Oidos.—°*Flujo por los oidos*.—Confusion del oido; los sonidos llegan confusos.—**Quebrantamiento en los oidos*.—Hinchazon del periostio detrás de la oreja.—Hinchazon de las parótidas.

Nariz.—La punta de la nariz está roja y agrietada, con dolor quemante.—Nariz abultada, con granos costrosos (como al principio de un cáncer?).—Descamacion de la piel de la nariz.—Sensibilidad dolorosa de los huesos de la nariz.—Epistaxis, precedida de vértigo, ó de dolor de cabeza presivo.—**Obturacion de la nariz*.—**Coriza seco*.—Coriza fluente con pérdida del olfato, estornudos y bostezos frecuentes.

Digitized by Google

Cara.—Manchas en la cara, lisas, espesas al tacto y de color de rosa.—Punzadas en los pómulos, en las mandíbulas y en los dientes.—Erupcion sin dolor y *acné rosa* en la cara.—°*Erisipela en la cara*.—Hinchazon de la boca y de los labios, con dolor quemante.—Ampollas en los labios.—Labios agrietados y que sangran fácilmente.

Dientes.—Odontalgia con tirantez en comiendo pan, ó con pulsaciones sordas despues de haber bebido cosa fria.—Vacilacion excesiva de los dientes.—*Dolores tractivos en las encías.—Hinchazon roja y dolorosa, y °facilidad de sangrar las encías.—Vesículas *purulentas en las encias*.

Boca y garganta.—Fetidez de la boca.—Vesículas quemantes en la boca y sobre la lengua.—*Sequedad de la lengua y del paladar.—Dolor de garganta como por excoriacion, con arañamiento y punzadas desde la faringe hasta el estómago.—Acumulacion de mucosidades en la garganta, con tosecilla y estertor mucoso.—°Induracion parcial de la lengua.

Apetito.—**Amargor de boca*, ¯sobre todo *por la mañana*.—Gusto ácido y mucoso.—Repugnancia á la grasa y al humo del tabaco, los que causan náuseas.—**Excesiva debilidad de la digestion, hasta el punto de causar incomodidad casi todos los alimentos*.

Estómago.—Erutos con sabor á los alimentos, ó bien *ácidos.—°*Erutos abortados con dolor*.—Pirosis con picor en la garganta.—*Hipo despues de la comida.—*Evacuacion de un agua ágria por la boca.—**Náuseas, sobre todo por la noche*.—*Estómago, desabrido, como si fuese á caer en debilidad.—Pituitas de estómago.—**Presion en el estómago* ¯como por un peso, estando en ayunas, y por la noche despues de acostarse.—**Dolores calambroideos y contractivos en el estómago*.—*Dolor quemante en el estómago.—°*Apretamiento en el estómago como por gárfios*.—Ruido como de agua, estrepitoso, en el estómago.

Vientre.—Dolor en el hígado al tacto, como por excoriacion.—*Presion y dolores cólicos en la region hepática.—Vientre timpanítico y tirante.—Constriccion y apretamiento como por garfios en el vientre.—Dolores cólicos y punzadas en las ingles.—*Hernia inguinal*.—**Ruido estrepitoso como de agua en el vientre*.—**Encarcelacion de flatuosidades*.—Ventosidades fétidas.—°Bubones sifilíticos.

Deposiciones.—*Conato inútil de deponer*, no saliendo mas que gases.—Deposiciones duras, nudosas.—*Deposiciones frecuentes por el dia.—Antes de la deposicion, traccion desde el ano hasta la vulva.—Durante las deposiciones, dolores de los riñones.—Granos hemorroidales, quemantes.—Dolores quemantes y *punzadas en el ano* y en el recto.—Excoriacion y humedad en el ano.—Salida de ténia.—Humedad viscosa en el periné.—El ano se excoria fácilmente montando á caballo.

Orinas.—Conato urgente de orinar, con emision muy abundante.—Emision de orinas por la noche.—Emision de orina involuntaria.—*Orinas fétidas.—Orinas quemantes.

Partes viriles.—Ausencia del apetito venéreo.—Poluciones frecuentes, seguidas de debilidad y de inquietud angustiosa.

Reglas.—*Reglas muy anticipadas.—*Leucorrea* quemante, con escozor, ó que tiñe el lienzo de amarillo.—*Loquios serosos y fétidos.—*Nudosidades é induraciones dolorosas en las glándulas mamarias.—*Inflamacion erisipelatosa de las mamas.

Laringe.—Opresion de pecho, sobre todo por la tarde y por la noche.—Extincion de la voz por la noche.—Ronquera por la mañana muy temprano.—Tos bronca, con dolor de excoriacion en la garganta.—*Tos nocturna, seca.—Tos sofocante*, sobre todo por la tarde despues de haberse dormido.—Tos matutina con expectoracion, excitada por una sensacion de sequedad en la garganta.—Tos con expectoracion purulenta y punzadas en el costado derecho del pecho.

Pecho.—Respiracion anhelosa.—Estertor en el pecho por la noche en la cama.—Opresion de la respiracion, sobre todo por la mañana y despues de comer.—Constriccion sofocante del pecho, sobre todo por la mañana en la cama.—Punzadas en el pecho como por un absceso, sobre todo al inspirar.—Sensacion de frio en el pecho.—*Palpitacion de corazon* por la mañana, por la tarde y en cantando.

Tronco.—Dolores nocturnos en el dorso.—Presion y *punzadas en los riñones*, sobre todo respirando profundamente.—Dolor quemante en el coxis al tacto.—Dolor quemante en el dorso.—*Induracion de las glándulas del cuello*,

con dolor lancinante.—°Herpes en los sobacos.—Exudacion de los sobacos.—°*Induracion de las glándulas axilares.*

Brazos.—Dolores osteócopos desgarradores en los brazos.—Presion sobre las espaldas.—Dolor de luxacion en la muñeca.—Torpeza y adormecimiento de las manos y de los dedos.—Tension dolorosa y °*rigidez artrítica de las articulaciones de los dedos.*—Punzadas en los dedos.

Piernas.—°*Dolor lancinante en la cadera*, que obliga á cojear, con punzadas.—Tension y encogimiento de las ingles, que no permite extender las piernas.—Tension en las corvas y en el empeine, con contraccion de estas partes.—Dolor de excoriacion en las rodillas.—Calambres en las pantorrillas, en las piernas y en los dedos.—°Tirones y punzadas en las piernas.—Genuflexion fácil de los piés y de los dedos, andando.—Frio en los piés.—*Hinchazon inflamatoria de los piés y de los dedos*, como si hubieran estado helados, con calor y dolor.—Dolor quemante en los dedos.

51.—CARBO VEGETABILIS.

CARB.-VEG.—Carbon vegetal.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Dósis usadas:* 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Arsen. cham. coff. lach.—*Este medicamento es antídoto de:* chin. lach. merc. vinum.

COMPÁRESE CON: Ant. *ars.* calc. *carb-an. chin.* coff. fer. *graph.* kal. lach. lyc. *merc. natr. n-vom.* puls. rhod. sep. stram. zinc.—El carbon será de grande utilidad, si se halla indicado, sobre todo despues de: *Kal. lach. n-vom.* sep.—Despues de carbon será algunas veces conveniente: *Ars. kal. merc.*

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas* se verá los casos en que podrá consultarse este medicamento contra:—Malas consecuencias por el abuso del mercurio y de la quina; Afecciones escorbúticas; Debilidad por pérdida de humores, ó sea debida á graves enfermedades agudas; Torpeza nerviosa con falta de reaccion vital (contra los medicamentos); Parálisis; Malas consecuencias de una derrengadura ó de un paseo en carruaje; *Padecimientos ocasionados por un tiempo caluroso* (y húmedo); *Extremada sensibilidad á las mutaciones de tiempo*; Afecciones reumáticas; Várices; Sabañones; Induracion de las

Digitized by

glándulas?; *Sarna miliar* ó húmeda; Erupciones urticarias; Ulceras pútridas; Abscesos linfáticos; Manchas de nacimiento; Aneurismas; Ictericia; Fiebre tifoídea, último período, con extincion casi completa de la fuerza vital; Fiebres intermitentes, particularmente las que el abuso de la quina ha hecho tenaces; Cefalalgias, sobre todo aquellas que reconocen por causa un exceso cualquiera, ó cuando son consecuencia de un acaloramiento; Jaqueca; Caida de los cabellos á causa de graves enfermedades agudas; Oftalmías por haber fatigado mucho la vista; Hemorragia de los ojos; Otorrea purulenta; Parotitis epidémica; Coriza fluente; Hemorragia nasal; Herpes húmedos en la cara; Granos en la cara, en los jóvenes; Afecciones escorbúticas de las encías; Estomacace; Anginas por resultado del sarampion; Embarazo gástrico á consecuencia de intemperancia; Gastralgia de las nodrizas; Gastralgia con acedías, ó la producida por estancacion de sangre en el sistema de la vena porta (despues del uso de n-vom.); Cólera asiático con ausencia total del pulso; Cólicos por el movimiento del carruaje; *Cólicos flatulentos ó hemorroidales*; Diarreas pútridas ó mucosas; Hemorróides ciegas ó fluentes; Los niños se orinan en la cama; Diabetes?; Cólicos menstruales; Flores blancas; Disposicion al aborto, con várices en las partes genitales; Inflamacion de los pechos; *Catarro y ronquera*, aun á consecuencia del sarampion; Grippe; *Laringitis* crónica (con ulceracion); Tos convulsiva; *Asma flatulento*; Ortopnea paralítica; Tísis tuberculosa (primer período); Pneumonía crónica?; Pneumonía asténica, con expectoracion rojo-oscura y espumosa, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores con ansiedad*, calor y decaimiento completo ó con postracion despues del acceso.—*Tirones agudos y dolores tractivos*, *artríticos*, con debilidad paralítica, principalmente *en los miembros*, y padecimientos por flatuosidad; ó con opresion de la respiracion, cuando es el pecho el atacado.—°Dolor de luxacion en los miembros ó sensacion como si se hubiese lastimado los riñones.—°*Dolores quemantes* en los miembros y en los huesos.—Pulsacion en diferentes partes

Digitized by Google

del cuerpo.—°Padecimientos *por haberse lastimado los riñones*, ó por haber ido en carruaje.—°Temblor y sacudimientos en los miembros, por el dia.—**Adormecimiento fácil de los miembros.*—La mayor parte de los síntomas aparecen durante la marcha y al aire libre.—°Demacracion, sobre todo en la cara.—*Quebrantamiento de todos los miembros, sobre todo por la mañana al acabarse de levantar.* —Mucha debilidad de los músculos flexores.—**Postracion excesiva* ¯que llega muchas veces hasta el desfallecimiento, aun por *la mañana* en la cama, ó bien al *principiar á andar.—Caida rápida de las fuerzas.* — Postracion general hácia el medio dia con necesidad de apoyar la cabeza y de reposar.—°*Parálisis y ausencia total del pulso.* —**Facilidad á resfriarse.*

Piel.—Sensacion de hormigueo por toda la piel.—Prurito general por la tarde, y con el calor de la cama.—*Sensacion quemante en diferentes partes de la piel.*—*Erupcion de pequeños granos semejantes á la sarna miliar.—**Erupciones urticarias.*—°Herpes.—Estrías de un pardo rojizo. —Ulceras sin dolor en la punta de los dedos de las manos y de los piés.—*Ulceras fétidas que sangran fácilmente con dolores quemantes y evacuacion de un pus corrosivo y sanioso.—°*Sabañones.*—°Várices.—°Redecillas venosas, formadas por una dilatacion de los vasos capilares, con hemorragia violenta despues de la mas ligera lesion.—°Hinchazones linfáticas con supuraciones y dolores quemantes.—°Endurecimiento de las glándulas.

Sueño.—**Mucha gana de dormir por el dia*, ¯disipándose por el movimiento.—*Sueño en la madrugada ó por la noche muy temprano.—Soñolencia comatosa con estertor.—*Sueño tardío* é **insomnio causado por una agitacion en el cuerpo.*—Por la noche ó al principio de esta en la cama, *dolor de cabeza*, angustia con opresion de pecho, *estremecimientos y dolores en los miembros*, frio en las manos y en los piés, etc.—*Ensueños frecuentes, fantásticos, angustiosos y terribles, con agitacion, ó con sobresaltos y espanto.

Fiebre.—**Despeluzamiento y frio en el cuerpo.*—Calofrio febril por la tarde y la noche, seguido de calor pasajero.— °Fiebre con *sed solamente durante el periodo del frio*, ó con sudores abundantes, seguidos de calofrios.—°Estado fe-

bril con soñolencia comatosa, estertor, sudor frio del rostro y de las extremidades, cara hipocrática, pulso pequeño y fugitivo.—°Falta de pulso.—Estado febril por la tarde, con calor general y calor quemante en las manos y en los piés.—°Accesos frecuentes de calor pasajero.—'*Sudor nocturno.*—*Sudor matutino* ácido.—°Sudor frio en los miembros y en la cara.

Moral.—*Inquietud y ansiedad*, sobre todo *por la tarde*.—°*Miedo de espectros*, sobre todo por la noche.—Timidez, irresolucion y cortedad estando en sociedad.—Desesperacion con humor lloroso y desaliento con deseo de la muerte, y tendencia al suicidio.—*Disposicion á asustarse.—***Irascibilidad y arrebato de cólera.*—Debilidad de la memoria súbita y periódica.—*Las ideas se confunden*.—Ideas fijas.—°Aversion al trabajo.

Cabeza.—*Vértigos* despues de un ligero movimiento de la cabeza, ó despues de haber dormido, como tambien bajándose y andando.—Vértigos con náuseas, oscurecimiento de la vista, temblor, zumbido de oidos, y aun pérdida del conocimiento.—°*Dolores de cabeza por acaloramiento.*—Cefalalgia con temblor de la mandíbula.—Dolores de cabeza nocturnos.—*Tension calambroidea en el cerebro*, ó sensacion como por contraccion de los tegumentos de la cabeza.—**Pesadez de la cabeza.—Cefalalgia presiva*, sobre todo por encima de los ojos, en las sienes y en el occipucio.—*Dolor tractivo en la cabeza*, que parte de la nuca, *con náuseas*.—Punzadas en el vértice.—*Latidos y pulsacion en la cabeza, sobre todo por la tarde ó despues de la comida, con *congestion de sangre* y calor, ó sensacion quemante en la cabeza.—Los dolores de cabeza se extienden frecuentemente desde la nuca hasta el cerebro, y se agravan algunas veces despues de comer.—*Dolores tractivos agudos en los tegumentos de la cabeza, sobre todo en el occipucio y en la frente*, partiendo frecuentemente de los miembros.—Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo á la presion exterior (por ejemplo, la del sombrero).—*Facilidad á resfriarse la cabeza.—Caida de los cabellos.

Ojos.—°*Dolores en los ojos despues de haberse fatigado la vista.*—Dolores en los músculos de los ojos mirando al aire.—Prurito, escozor, calor, **presion y dolor quemante en los ojos* y los ángulos de estos.—*Aglutinacion nocturna de los*

Digitized by Google

párpados.—°*Sangran los ojos*, frecuentemente con mucha congestion á la cabeza.—Estremecimiento y temblor de los párpados.—**Miopia.*—°Pupila insensible.

Oidos.—Otalgia por la tarde.—Por la tarde rubicundez y calor del oido al exterior.—*Falta de cerúmen.*—**Evacuacion de un pus fétido por los oidos.*—Obturacion de los oidos.—Retintin y zumbido sordo en los oidos.—Hinchazon de las parótidas.

Nariz.—**Picazon de la nariz*, con cosquilleo y hormigueo en las ventanillas nasales.—Costras y rubicundez en la punta de la nariz.—°*Obturacion de la nariz*, sobre todo hácia la tarde, ó evacuacion serosa sin coriza.—**Coriza violento*, con carraspera y ronquera de pecho, hormigueo y cosquilleo en la nariz, y conato inútil de estornudar.—**Epistaxis frecuente y continua* sobre todo por la noche y por la mañana, con palidez de la cara, ó bien despues de haberse bajado, ó haber hecho esfuerzos para defecar.

Cara.—**Palidez de la cara.*—Color amarillo, ¯gris, ó verdoso.—°Cara hipocrática.—Dolores tractivos, tirones agudos, terebrantes y dolores quemantes en los huesos de la cara.—Hinchazon de la cara y de los labios.—°Herpes en la cara.—Forúnculos delante de la oreja y debajo de la mandíbula.—°Granos rojos en la cara (en los jóvenes).—°*Labios agrietados.*—Vesículas purulentas en los labios.—Comisuras de los labios ulceradas.—Erupciones como herpes en la barba y en las comisuras de los labios.—Estremecimiento del labio superior.

Dientes.—**Dolores de dientes*, con tirones y dolores tractivos agudos ó **contractivos*, corrosivos ó pulsativos, **provocados tomando alguna cosa caliente ó fria, ¯así como tambien por alimentos muy salados.—°*Vacilacion tenaz de los dientes.*—**Con desprendimiento, retraccion, excoriacion y ulceracion de las encias.*—**Sangre* de los dientes y *de las encias.*

Boca.—Calor y **sequedad ó acumulacion de agua en la boca.*—Aspereza en la boca y en la lengua.—Excoriacion de la lengua, con dificultad de moverla.—°Inflamacion de la mucosa bucal.

Garganta.—Ligera inflamacion de garganta, como por hinchazon interior.—Sensacion de constriccion en la garganta con deglucion impedida.—Escozor, **araña-*

miento °*y dolor quemante en la garganta*, el paladar y el esófago.—Dolor de excoriacion en la garganta al toser, al sonarse y al tragar.—*Ruido estrepitoso de mucosidades abundantes, que se desprenden fácilmente.*

Apetito.—°*Gusto amargo.*—°*Gusto salado de la boca* y de *los alimentos.*—Falta de apetito; ó sed y *hambre inmoderadas.*—°*Disgusto habitual de la carne*, de la leche y de la grasa.—Deseo de alimentos salados ó azucarados.—°*Despues de comer*, °sobre todo despues de haber tomado leche, *fuerte meteorismo*, °*acedías en la boca* y erutos ágrios.—°Sudor durante la comida.—Gran acaloramiento despues de beber vino.—Despues de comer, peso en la cabeza y presion en el estómago, ó dolor de cabeza, pesadez en las piernas y ansiedad moral.

Estómago.—°Erutos vacíos ó amargos.—*Eruto de los alimentos, y sobre todo* de los *grasos.*—*Erutos agrios*, especialmente despues de comer.—Pirosis.—Hipo despues de cada movimiento.—°Náuseas, sobre todo por la mañana, despues de la comida ó por la noche.—°*Náuseas continuas.*—°*Evacuacion de agua del estómago, como pituitas*, aun por la noche.—°Vómito de sangre.—Pesadez, plenitud y tension en el estómago.—°*Calambres de estómago* contractivos, ó *presivos y quemantes*, con acumulacion de flatuosidades, y gran sensibilidad en el epigastrio.—Sensacion de arañamiento y de temblor en el estómago.—°Los dolores de estómago se agravan ó se renuevan por el miedo, las contrariedades ó *un resfriamiento*, así como *despues de la comida*, ó en la noche, y sobre todo despues de haber tomado alimentos flatulentos, °ó bien por dar de mamar.—°Presion en la boca del estómago, como si el corazon se comprimiera, °sobre todo en las nodrizas.

Vientre.—°*Dolor de contusion en los hipocondrios*, y sobre todo en la region hepática, principalmente al tacto.—°*Dolor lancinante debajo de las costillas.*—°Presion, tension y *punzadas en la region hepática.*—Punzadas en el bazo.—°Presion de los vestidos sobre los hipocondrios.—°Dolores en la region umbilical al tacto.—Pesadez, plenitud, °*meteorismo y tension de vientre*, °con calor en todo el cuerpo.—°Cólicos por el movimiento del carruaje.—Presion y calambres en el vientre.—*Dolores en el vientre como por una derrengadura ó por luxacion.*—Dolor.

Digitized by Google

quemante y mucha angustia en el vientre.—Pellizcos en el vientre que parten del costado izquierdo, y se dirigen al derecho, con sensacion de debilidad paralítica en el muslo.—*Abundante desarrollo de flatuosidades*, sobre todo despues de comer, y algunas veces con sensacion de torpeza en el vientre.—*Cólicos de ventosidad*, calambroídeos sobre todo por la noche.—°Borborigmos y movimientos en el vientre.—**Salida inmoderada de flatuosidades* ¯de olor pútrido.—°Por poco que se coma, agravacion de los padecimientos abdominales.—Los dolores de vientre por lo regular van acompañados de inquietud y de llantos.

Deposiciones.—**Estreñimiento.*—Deposiciones insuficientes.—*Deposiciones difíciles*, sin ser duras, *con necesidad urgente*, dolor quemante en el ano y dolores en el vientre semejantes á los del parto.—**Deposiciones líquidas*, *°pálidas ó *mucosas.*—Flujo de mucosidades y sangre en lugar de una deposicion, con gritos (en los niños).—°Evacuacion involuntaria de materias de un olor pútrido.—Flujo de sangre por el ano en todas las deposiciones.—Diarrea despues de haber comido fruta.—Despues de la deposicion dolor de vientre pasivo.—**Granos hemorroidales*, °doloridos, gruesos, y de color azul oscuro.—Hemorróides fluentes.—Punzadas, **comezon y dolores quemantes en el ano.*—Salida del ténia.—Flujo por el ano y el recto de una serosidad viscosa y corrosiva, sobre todo por la noche.—Excoriacion y ¯exudacion del periné.

Orinas.—*Disminucion de la secrecion de las orinas.—**Conato frecuente*, *ansioso y presivo de orinar*, dia y noche.—*°Se orina en la cama.*—Orinas rojas, como mezcladas de sangre y *excesivamente oscuras.*—°Orina roja, parda, con una nube de color oscuro.—Orinas abundantes de un amarillo claro, ó espesas, blanquecinas.—*Escozor al orinar.

Partes viriles.—*°Afluencia extraordinaria de pensamientos voluptuosos.*—°Poluciones muy frecuentes.—*Eyaculacion muy pronta en el cóito.—Manchas lisas, rojas y exudantes en el glande.—Evacuacion de licor prostático durante las deposiciones.—Prurito y exudacion cerca del escroto, en el muslo.—°Presion en los testículos.

Reglas.—**Reglas muy anticipadas y abundantes* ó muy débiles, con sangre pálida.—Antes de las reglas, calambres en el vientre y dolor de cabeza.—Durante las reglas

vómitos y dolores de muelas, de cabeza, de riñones y de vientre.—**Prurito, sensacion de ardor, excoriacion*, *aftas é °hinchazon en la *vulva*.—*Flujo por la vagina*, blanco, lechoso, espeso y amarillento, verdoso y corrosivo.—Leucorrea antes de las reglas.—°Inflamacion de las mamas.

Laringe.—**Ronquera prolongada* y aspereza de la voz, sobre todo hácia la tarde.—**Por la mañana y por la tarde ronquera*, agravada por una conversacion prolongada, y principalmente por un tiempo frio y húmedo.—Aspereza, cosquilleo y hormigueo en la laringe.—Tos excitada por un hormigueo en la garganta, ó con dolor quemante y sensacion de excoriacion en el pecho.—**Tos calambroidea* con ó sin vomituricion y vómitos, 3 ó 4 veces por dia, ó bien por la tarde mucho tiempo seguido.—*Tos por la tarde* antes de acostarse y despues en la cama.—Al toser, punzadas dolorosas en la cabeza.—*Tos con expectoracion de mucosidades verdosas ó de un pus amarillento.—Tos con esputos de sangre y dolor quemante en el pecho.—°Expectoracion rojiza, espumosa, en la neumonía asténica.

Pecho.—*Respiracion dificil y *corta* andando.—*Excesiva dificultad de la respiracion y *opresion de pecho*.—Accesos de sofocacion causados por flatuosidades.—Al respirar, latidos dolorosos en la cabeza.—°Calambres en el pecho, con color azulado de la cara.—Necesidad frecuente de respirar profundamente.—Falta de aliento, sobre todo por la noche en la cama.—**Dolor quemante*, punzadas y *presion en el pecho*.—*Compresion y constriccion calambroídea en el pecho, con cara azulada.—Afeccion de pecho, con sensacion de plenitud y ansiedad.—**Dolor de excoriacion en el pecho*.—Sensacion de fatiga en el pecho.—Dolor quemante en la region del corazon, con congestion en el pecho y violentos latidos de corazon.—Dolores reumáticos tractivos, tirantes, agudos y presion en el pecho.—°Manchas parduscas en el pecho.

Tronco.—*Dolores reumáticos, tractivos, tirones agudos y punzadas en el dorso, la nuca y los músculos del cuello*.—°Punzadas contínuas en los riñones, sobre todo dando un paso en falso.—°Rigidez de la espina dorsal.—Granos pruritosos en el dorso.—Prurito, excoriacion y exudacion en los sobacos.—*Rigidez de la nuca*.

Brazos.—*Dolores tractivos, agudos y quemantes en los músculos y en la articulacion del hombro.—**Tirones y dolores tractivos agudos en los antebrazos*, la muñeca y los dedos.—Relajacion de los músculos, de los brazos y de las manos, en riéndose.—Tension en las articulaciones de las manos, como si estas fuesen muy cortas.—Contraccion calambroídea de las manos.—*Calor de las manos.—*Debilidad paralítica de las muñecas y de los dedos*, sobre todo al coger un objeto.—Erupcion granulosa, fina y pruritosa de las manos.—Ulceras en la punta de los dedos.

Piernas.—Torpeza é insensibilidad de las piernas y de los piés.—*Dolor tractivo y paralítico en las piernas.—*Tirones agudos y dolores tractivos quemantes en la cadera y en las rodillas.—Fuerte tension y dolor calambroídeo en las articulaciones coxo-femorales, los muslos y las rodillas.—*Aneurisma en la corva, con dolor tensivo y pulsacion.—°Herpes en las rodillas.—*Calambres en las piernas y en la planta de los piés*, y *por la noche en las pantorrillas.—*Ulceras fétidas que sangran fácilmente, en las piernas.—Torpeza tenaz en los piés.—**Traspiracion de los piés.—°Rubicundez é hinchazon de los dedos* con dolor lancinante, como si estuvieran helados.—Ulceracion en la punta de los dedos.

52.—CASTOR EQUI.

CAST-EQ. — Castaña de los caballos. — Hering. — *Gazeta homeopática de Ausburgo.—Hist. na'. y prep.* Farmac. homeop.

SINTOMAS.—*Sueño* agitado, con muchos ensueños.—Sueños de que está su madre enferma, y de que los frutos están verdes en los árboles (en invierno).—°Síncope.—°Un caballo viejo parece tener veinte años menos.—*Risa* extraordinaria sin motivo.

Cabeza.—Oidos.—**Cefalalgia con vértigos y náuseas*, °acedía de estómago y anorexia; *Presion en las sienes de dentro á fuera;* Adormecimiento de la piel del cráneo en el occipucio, con sensacion como si esta parte estuviese metida en la nieve.—Detrás de las *orejas* erupcion de pústulas formando un cerco del tamaño de un duro.

Nariz.—Presion dolorosa en los huesos.—°*Coriza fluente*, con hambre contínua aun despues de comer.

Cara.—Alrededor de la boca, la piel está cubierta de una porcion de verrugas (en un caballo y curado con *thuya*).

Dientes.—*Dolor en los dientes del lado izquierdo.*

Boca.—Mamas.—Boca llena de saliva, inmediatamente despues de comer.—*Eructos de aire frecuentes*; *Deposiciones fáciles, precedidas de cólicos*, y acompañadas de emision de ventosidades fétidas.—*Pezones llenos de grietas durante la lactancia*; Pezones hinchados, doloridos al tacto y al bajar una escalera; Prurito violento en las mamas, hasta volverse loca, con *rubicundez de la aureola*, y pezones doloridos y mas secos que de ordinario.

Dorso.—°Debilidad en la columna vertebral; °*Dolor en el coxis* todas las tardes, estando sentado.—°*En el pecho*, dolores lancinantes.

Brazos.—Dolores erráticos en el brazo derecho; *Dolor de relajacion* en las articulaciones carpianas; las *uñas* se rompen á poco que se las toque.

Miembros inferiores.—*Dolores en las rodillas y la tibia*; Dolor en la corva derecha en doblando la rodilla; *Forúnculos* numerosos, pequeños en las piernas.—Las uñas de los dedos se rompen con facilidad y se renuevan prontamente.

53.—CASTOREUM.

CAST.—Castóreo.—Hartlaub et Trinks.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—Medicamento poco conocido aun.

CLINICA.—Este medicamento no se ha empleado hasta hoy mas que contra algunos casos de *vómitos de las mujeres embarazadas.*

SINTOMAS.—Sueño por la noche inquieto, con *agitacion ansiosa y sobresaltos con espanto.*—Sacudidas de los miembros despues de haberse dormido.—Sueños ansiosos y espantosos.—*Predominio de frio* y horripilacion.—Accesos de calofrios con frio glacial en el dorso.—Mucha tristeza y susceptibilidad excesiva con llanto fácil.

Digitized by

Cabeza.—*Dolor* en el vértice y *pulsacion en la cabeza, como si hubiera una úlcera en el cerebro, agravado por el contacto y la presion exterior.*—Plenitud y pesadez en la cabeza como si fuese á estallar.—Dolores tractivos agudos, en la frente y en las sienes.

Ojos.—Presion en los ojos, por la tarde con debilidad de la vista.—*Dolor quemante en los ojos*, fijándose en un objeto distante.—Lagrimeo y aglutinacion nocturna de los ojos.—Estrellas, nubes y niebla delante de la vista, fijando esta sobre un objeto distante.—Susceptibilidad de la vista á la luz del sol y á la de las bujías.

Oidos.—Estiron agudo en los oidos.—Retintin, zumbido y ruido como de agua en los oidos que se disipa cuando se escarba con el dedo.

Nariz.—Obturacion de la nariz.—Flujo de mucosidades acuosas, ácres y corrosivas por la nariz.

Dientes.—*Dolores de dientes* comiendo, *provocados por las cosas frias, y aliviados por las calientes.*—Odontalgia con dolores tractivos agudos, ó tirones sucesivos provocados ó agravados por el tacto.—Hinchazon de las encías por la noche, con estirones agudos en las sienes.

Boca.—Olor fétido de la boca, que él mismo lo percibe.—Tiron y estremecimiento de la lengua.—*Dolor quemante en la garganta*, como por pirosis.

Estómago.—*Sed ardiente.*—Erutos amargos.—Regurgitacion de un ágrio amargo.—Disgusto y náuseas contínuas.—Vómitos de mucosidades blancas, amargas.—*Sensacion de plenitud y de pesadez en el estómago.*—Sensacion de adormecimiento en el estómago.—Sensacion de contraccion y *dolor de ulceracion en el epigastrio.*

Vientre.—Dolores de vientre de los mas violentos, con rubicundez de la cara y bostezos aliviados por el calor exterior, y encogiéndose.—*Plenitud y meteorismo doloroso de vientre, sobre todo despues de la comida.*

Deposiciones.—Conato urgente de deponer.—*Diarreas* acompañadas de calofrios y de bostezos con *sensacion de ardor en el ano*, y precedidas de dolor de vientre con ruido sordo y borborigmos.—Deposiciones de mucosidades sanguinolentas.

Orinas.—*Emision frecuente de orina*, con sed ardiente dia y noche.—Despues de la emision de las orinas gana de vomitar y disgusto.

Reglas.—*Reglas muy anticipadas*, con dolor de cabeza y de riñones, y con el semblante pálido y enfermizo.—*Leucorrea quemante.*

Pecho.—*Respiracion difícil, profunda y lenta*, ó corta y oprimida.—Respiracion corta andando cuesta arriba.—Presion en el pecho.—*Sensacion de peso en el pecho*, sobre todo respirando profundamente.

Miembros.—Dolor como de excoriacion en los riñones y en el dorso.—Dolores tractivos en la nuca.—*Tirones nocturnos* en la espalda y en los brazos.—Manos calientes, con hinchazon de las venas.—Debilidad de los miembros inferiores.

54.—CAUSTICUM.

CAUS.—Cáustico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 50 dias en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Coff. coloc. n-vom. nitr.-spir.—*Este medicamento es antídoto de:* Asa. coloc.—El *coffea tosta* y el *phos.* agravan los padecimientos.

COMPÁRESE CON: Amm. *asa. bell.* calc. cham. *coff. coloc. ign.* lyc. merc. natr. *n-vom.* phos. phos-ac. *rhus. sep.* sulf. veratr.—Sobre todo despues de: *Asa. cupr.* y *sep.* es cuando el cáustico prestará buenos servicios si se halla indicado.—Despues de cáustico será algunas veces conveniente *sep. stann.*

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra:—Afecciones reumáticas y artríticas, sobre todo la *artritis crónica*; Espasmos y convulsiones de los niños y de las personas histéricas; Convulsiones epilépticas (despues del uso de *cuprum*); Baile de San Vito; *Parálisis*, sobre todo las que se manifiestan de un solo lado, ó las que son consecuencia de la repercusion de alguna secrecion mórbida ó de alguna erupcion, tal como la sarna, etc., *Sarna;* Tumores enquistados; Verrugas; Excoriaciones de la piel; Herpes húmedos; Várices; Melancolía, hipocondría é histerismo; Jaqueca; Oftalmías, aun en las personas escrofulosas; Blefaroftalmía; Ambliopia amaurótica; Cataratas; Otitis y otorrea purulenta; Dureza de oido; Coriza crónico, con obturacion de la nariz; Prosopalgia; Parálisis de la cara; Odontalgias reumáticas y artríticas; Afeccion escorbútica de las encías; Fístulas de las encías; Parálisis de los órganos de la palabra, y mu-

dez; Parálisis de los órganos de la deglucion; Embarazo gástrico debido á una indigestion; Hematémesis?; Gastralgia; Abultamiento de vientre en los niños; Estreñimiento; *Hemorróides*; Fístula del recto; Incontinencia de orina; Dismenorrea; Espasmos histéricos; Flores blancas; Excoriacion de los pezones; Agalaxia; Excoriacion y convulsiones de los niños; Catarro y ronquera tenaces; Afonía; Laringitis crónica (con consuncion); *Grippe*; Asma espasmódico?; Afecciones orgánicas del corazon; Bócio; Debilidad de las piernas en los niños; Acortamiento y endurecimiento de los músculos? etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores artríticos y reumáticos, tractivos y dislacerantes,* sobre todo en los miembros. —*Tirones agudos y violentos en las articulaciones* y en los huesos, aliviados con el calor de la cama.—*Acortamiento de los tendones* y rigidez de los músculos flexores de los miembros.—Contraccion calambroídea de muchos miembros.—Torpeza y palidez de alguna parte ó de toda la mitad izquierda del cuerpo.—°*Parálisis.* —*Sacudidas y movimientos convulsivos.—**Accesos de convulsiones*, °con gritos, movimientos violentos de los miembros,, rechinamiento de dientes, sonrisa ó llantos, ojos medio cerrados, mirada fija y emision involuntaria de orinas; los accesos se renuevan por el agua fria, y son precedidos de incomodidad en el vientre y en la cabeza, emision frecuente de orinas, irascibilidad y llantos; despues de los accesos, los ojos se cierran.—**Convulsiones epilépticas*.—Agravacion de los síntomas, generalmente por la tarde al aire libre, mientras que los que han aparecido en esta hora se disipan en el de la habitacion.—*El café parece que agrava tambien todos los síntomas.*—Los síntomas primitivos tardan mas en manifestarse que los de los otros medicamentos de larga duracion de accion.—Padecimientos semilaterales.—**Inquietud insoportable de todo el cuerpo por la tarde*, y en estando sentado, con ansiedad de corazon.—*Por la tarde, gran abatimiento y postracion* de todo el cuerpo.—**Debilidad paralítica, con temblor* y vacilacion de los miembros.—*Mucha susceptibilidad á las corrientes de aire* **y al frio.*

Digitized by Google

Piel.—Prurito violento, sobre todo en el dorso y en las pantorrillas. —*Erupciones semejantes á la sarna. —Erupciones miliares y urticarias. —*Herpes* pruritosos y húmedos. —Vesículas corrosivas. —**Excoriacion* en los niños.—Callos dolorosos en los piés. —*Verrugas, aun con dolor é inflamacion.—Panadizo.—**Várices* dolorosas.

Sueño.—*Gana de dormir por el dia*, como por *soñolencia comatosa.* —*Insomnio* nocturno causado por *ansiedad*, inquietud, calor seco y otras incomodidades, con *sobresaltos frecuentes.*—Sobresaltos al ir á coger el sueño.—Movimientos frecuentes de los brazos y de las piernas durante el sueño.—**Ensueños angustiosos* de cosas molestas ó de querellas, ó confusos y voluptuosos, con palabras y risas.—Por la noche, vértigos, dolor de cabeza, sequedad de la boca y pesadez dolorosa en las piernas.

Fiebre.—**Muy sensible al frio.*—Calofrios nocturnos con dolores en el dorso y seguidos de sudor general.—**Sudor abundante mientras se está andando al aire libre.*—**Sudor nocturno*, algunas veces de olor ácido.

Moral.—**Melancolía y pensamientos tristes* dia y noche, con *llantos.*—*Tristeza hipocondriaca.—**Inquietud*, aprensiones y *mucha angustia.* — Ansiedad de corazon. — *Miedo,* sobre todo por la noche.—Desconfianza del porvenir.—*Desanimado.—*Irascibilidad y arrebatos*, con fuerte susceptibilidad de carácter.—Espíritu querelloso y disputador.—Poco gusto al trabajo.—*Propension á asustarse. —Debilidad de memoria. —Distraccion.—Facilidad de equivocarse en hablando.

Cabeza.—*Atontamiento en la cabeza*, como si estuviese comprimida.—Embriaguez que parece que se va á caer. —*Vértigo con sensacion de debilidad en la cabeza* y ansiedad. —Accesos de dolores de cabeza, con náuseas.—Dolor de cabeza por la mañana, algunas veces al despertar, con sensacion de contusion en el cerebro.—Dolor nocturno en la cabeza, como por un absceso en el cerebro.—*Cefalalgia* sorda y presiva, que pone el humor sombrío y se hace sentir principalmente en la frente ó en el occipucio.—**Dolores lancinantes, sobre todo en las sienes.*—Golpes repentinos en la cabeza y como si escarbaran.—Congestion en la cabeza, con hervidero y ruido interior. — Dolores tensivos ó compresivos en la cabeza.—Los dolores de cabeza no se manifiestan muchas veces sino de un

Digitized by Google

solo lado (el izquierdo).—Calor y sensacion de quemadura en la cabeza.—**Rigidez y punzadas en la cabeza.*—Tension en la piel del cráneo.—Sensacion de torpeza en el occipucio.

Ojos.—Dolor en los ojos, como si la pupila se dilatase.—*Presion en los ojos* como por arena, agravada algunas veces por el tacto.—Prurito, escozor y dolor quemante en los ojos.—**Inflamacion de los ojos y de los párpados.*—**Ulceracion de los ojos.*—*Lagrimeo.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—Dificultad de abrir los ojos, con sensacion como si los párpados estuvieran hinchados.—Conmocion visible de los párpados.—Oscurecimiento de la vista, muchas veces repentino, y algunas como si los ojos estuvieran cubiertos con una piel.—*Vista turbia, como al través de una gasa ó de una niebla.*—**Filetes negros que parecen revolotear delante de los ojos.*—*Luces y chispas delante de los ojos.—Fotofobia.—°Verrugas antiguas en las cejas.

Oidos.—*Otalgia* con dolor presivo hácia afuera.—Punzadas y dolor de excoriacion en los oidos.—*Hinchazon del oido externo*, con punzadas y dolor quemante.—Flujo de un pus fétido por el oido.—Prurito en el lóbulo de la oreja, como por un herpe.—Fuerte impresion de los sonidos en el oido, con dureza de este.—**Ruido sordo y zumbido*, rumor como de carruajes y *otros ruidos en los *oidos y en la cabeza.*—Sensacion de obturacion en los oidos.

Nariz.—Picazon en la punta y en las alas de la nariz.—**Erupcion en la punta de la nariz.*—°Verrugas antiguas en la nariz.—Moco de sangre todas las mañanas.—Epistaxis.—Pérdida del olfato.—*Obturacion de la nariz.—**Coriza seco*, crónico.—Coriza fluente, con tos nocturna, ronquera y dolor de cabeza.—Flujo de mucosidades fétidas por la nariz.—Estornudo matutino.

Cara.—*Color amarillo de la cara*, sobre todo en las sienes, con labios azulados.—Sensacion quemante en las mejillas, sobre todo en los pómulos y en las mandíbulas.—*Dolores artríticos y tensivos en los huesos de la cara en los pómulos y las mandíbulas.—Hinchazon de las mejillas, con dolores pulsativos.—Sensacion de tension y de hinchazon debajo de la mandíbula, que impide abrirla.—*Erupcion de granos rojos en la cara.*—°Parálisis

semilateral de la cara, desde la frente hasta la barba.—Calambres en los labios.—Excoriacion y erupcion en los labios y en las comisuras.—Herpe en el labio inferior.—Dolor tirante, tensivo en las mandíbulas, con dificultad de abrir la boca.—Hinchazon inflamatoria de la barba, con dolor quemante.—Trismus.

Dientes.—Odontalgia provocada por la introduccion del aire al abrir la boca.—Dolor de excoriacion ó dolores tractivos y tiron agudo, *latidos ó *punzadas en los dientes.—**Vacilacion dolorosa y alargamiento de los dientes*.—°Fístula en las encías.—°Ulceracion prolongada en las encías.—*Sensibilidad dolorosa, hinchazon y facilidad de sangrar las encías.

Boca.—*Sequedad de la boca*.—**Acumulacion de mucosidades en la boca*.—Dolor de escoriacion y de quemadura en la boca, en el paladar y en la punta de la lengua.—°Balbuceo, palabra embarazada, sibilante y confusa.—°Parálisis de la lengua.—°Distorsion de la boca y de la lengua al hablar.—Ulcera quemante en la parte interior del labio superior.

Garganta.—Dolor de garganta al hacer esfuerzos, como si estuviera dislacerada interiormente.—Dolor de excoriacion y quemante en la garganta, con aspereza y arañamiento.—Dolor lancinante en la garganta al tragar.—Necesidad contínua de tragar con sensacion de hinchazon, ó de estrechez en la faringe.—°Dificultad de tragar por parálisis de los órganos de deglucion.—Sensacion de frio que sube á la garganta.—Sequedad de la garganta.—*Acumulacion de mucosidades en la garganta y en el fondo del paladar, y expuicion con un ruido estrepitoso.

Apetito.—Gusto pútrido, graso, rancio ó amargo.—Sed ardiente de bebidas frias y de cerveza.—*Repugnancia á las cosas dulces.—Desde el principio de la comida, pérdida del apetito y disgusto.—*Sensacion como si tuviera una indigestion*.—°Sed ardiente con falta de apetito.—°Despues de haber comido pan, presion en el estómago.—*Despues de cada comida presion en todo el vientre*, ó en el estómago, ó bien náuseas y meteorismo, ó bien á veces despeluzamiento ó calor en la cara.

Estómago.—*Erutos vacíos* ó con el gusto á los alimentos ingeridos.—Erutos abortados con estrangulacion en la

Digitized by

garganta.—*Náuseas, sobre todo despues ó durante la comida, ó bien por la mañana.—*Sensacion penosa, como cuando se va á caer en un desfallecimiento.—Secrecion de agua por la boca, como de pituitas.—*Vómitos de una agua acidulada*, seguidos de erutos ácidos.—Vómitos de los alimentos.—Vómito nocturno de una sangre coagulada.—*Dolores en el estómago*, con calor en la cabeza, aumentados por todo movimiento rápido, aliviados estando acostado, y con *horripilacion cuando los dolores se agravan.—*Presion, apretamiento, como por gárfios, constriccion y dolores calambroideos en el estómago* y el epigastrio.—*Dolores lancinantes en el epigastrio.

Vientre.—Presion de los vestidos sobre los hipocondrios.—Tension y *punzadas en la region hepática.*—Dolores de vientre por la mañana.—**Presion en el vientre y en el hipogastrio.—Meteorismo* doloroso y tensivo.—Hinchazon del ombligo, doloroso al tacto.—°*Vientre abultado en los niños.*—Dolores contractivos en el vientre.—Facilidad á resfriarse el vientre, de lo que resulta diarrea ó presion en el estómago.—*Encarcelacion de gases con deposiciones duras.—Emision frecuente de gases fétidos en corta cantidad.

Deposiciones.—**Estreñimiento crónico.—Gana frecuente é inútil de defecar*, con dolores, ansiedad y rubicundez de la cara.—Las deposiciones se evacúan muy fácilmente estando en pié.—Deposiciones nudosas ó de un diámetro muy delgado.—°Deposiciones viscosas y relucientes, como de grasa ó de color claro y blanquecino.—Diarrea por la tarde y por la noche.—Diarrea despues de haberse enfriado el vientre.—Flujo de sangre y dolores incisivos en el recto durante las deposiciones.—*Despues de las deposiciones, angustia*, con palpitacion de corazon y sensacion de ardor en el ano.—**Comezon en el ano.*—Salida de granos hemorroidales, duros, hinchados y doloridos, que impiden la expulsion de los excrementos.—El andar y la meditacion agravan los dolores hemorroidales, hasta llegar á hacerlos insoportables.—°Presion sobre los granos hemorroidales del recto que los hace salir.—°Fístula del recto.—Absceso en el ano.—Dolor de excoriacion y exudacion del ano.

Orinas.—**Conato frecuente de orinar*, con sed y emision poco abundante.—Emision mas abundante de orinas.—

—Emision de orinas por la noche, se orina en la cama. —*Emision de orina involuntaria* dia y noche, aun solo por toser, estornudar y andar. —Orina ácre y corrosiva, pálida, acuosa, color pardo oscuro ó rojizo.—Mucosidades que hacen hilo en las orinas.—Las orinas reposadas se enturbian.—Sensacion de *quemadura al orinar*.—Hematuria.

Partes viriles.—Aumento del apetito venéreo.—°Falta de erecciones.—*Poluciones frecuentes.—Flujo de licor prostático despues de las deposiciones.—Eyaculacion de un esperma sanguinolento durante el cóito.—Presion y punzadas en los testículos.—Ulceras y costras con prurito en la parte interior del prepucio.—Manchas rojas en el miembro.—Secrecion abundante de materia sebácea en la corona del glande.—Prurito en el escroto, en el glande y prepucio.

Reglas.—*Reglas tardias*, pero mas abundantes, con evacuacion de sangre en gruesos coágulos.—Antes de las reglas, melancolía, dolor de riñones y cólicos.—°Reglas demasiado débiles.—*Durante las reglas dolores de riñones*, dolores cólicos y palidez de la cara.—Excoriacion entre las piernas y la vulva.—°*Repugnancia por el cóito en la mujer*.—Calambres de la matriz.—°*Leucorrea abundante*, con olor de las reglas ó que fluye por la noche.—°Excoriacion de los pezones, agrietados y rodeados de herpes. —°Falta de secrecion láctea.

Laringe.—*Enronquecimiento* por mañana y tarde.—*Ronquera prolongada, con voz débil y ahogada.—Extincion de la voz por debilidad de los músculos de la laringe.—Sensacion de excoriacion en la laringe, fuera del tiempo de la deglucion.—Ruido estrepitoso de mucosidades abundantes, sobre todo por la mañana.—Tos con aliento corto y dificultad en la respiracion.—Tos excitada por la palabra y por el frio.—*Tos matutina ó nocturna.—**Tos corta*, provocada por un cosquilleo y una sensacion de excoriacion en la garganta.—**Tos seca*, hueca, conmovente, *con sensacion de quemadura y de excoriacion en el pecho*.—Estertor en el pecho al toser.—Dolores en las caderas al toser.—°Imposibilidad de espectorar las mucosidades que se desprenden tosiendo.

Pecho.—*Respiracion corta.—Accesos de asma espasmódico.—Accesos de sofocacion hablando y andando li-

gero.—Opresion por los vestidos sobre el pecho.—Presion en el pecho.—Punzadas en el pecho y en el torax respirando profundamente y durante un trabajo corporal.—Accesos de compresion calambroídea y de constriccion en el pecho, con ahogo.—**Palpitaciones de corazon.—Opresion de corazon*, con melancolía.—*Punzadas en el corazon.*

Tronco.—Dolores de riñones los que se hacen al menor movimiento dolorosamente sensibles.—Dolores de riñones presivos estando sentado.—**Rigidez dolorosa en el dorso*, sobre todo al levantarse del asiento.—*Tirones y dolores tractivos, agudos en los omóplatos.—Prurito y hormigueo en el dorso.—Rigidez y tension en la nuca.—Erupcion miliar en la nuca entre los omóplatos.—Herpes pruritosos y húmedos en la nuca.—°Hinchazon é infarto de las glándulas del cuello.

Brazos.—Dolores en los brazos por la noche.—*Dolores tractivos y tirones agudos en los brazos y en las manos.—Movimientos convulsivos y sacudidas en los brazos.—Comezon y erupcion en los brazos.—Verrugas en los brazos.—Presion sobre las espaldas.—°Dolores lancinantes en el antebrazo, desde los dedos hasta el codo.—*Sensacion de plenitud en las manos al coger algun objeto.—Dolores tractivos en las manos y en las articulaciones de los dedos.—Debilidad espasmódica y temblor de las manos.—Palidez y torpeza dolorosa de los dedos.—**Encogimiento y endurecimiento de los tendones de los dedos.*—Herpes pruritosos en los dedos.

Piernas.—**Dolor de luxacion en la articulacion coxo-femoral*, con imposibilidad de andar y de estar en pié.—Dolor de rotura en los muslos y en las piernas por la mañana en la cama.—*Rigidez tensiva en las articulaciones de las piernas y de los piés.—*Dolores tractivos y tiron agudo en los muslos*, las piernas, las *rodillas* y los piés, con hinchazon de las partes.—**Andar inseguro y facilidad á caer en los niños.*—Piel marmórea en los muslos y en las piernas.—Tension y dolor calambroídeo en las piernas y en las pantorrillas.—Calambres en los piés.—*Dolores en el empeine, en los tobillos, en la planta de los piés y en los dedos andando.—Dolores neurálgicos en la planta de los piés.—*Acortamiento del empeine*, con dolor tensivo apoyando el pié.—*Frio en los piés.—**Hinchazon de los*

Digitized by Google

piés.—°Dolores en las várices.—Hormigueo en la planta de los piés.—Vesículas corrosivas y ulceracion en los talones.—Panadizo en el dedo gordo.

55.—CEPA.

CEP.—*Allium cepa*, cebolla.—HERING. *Estudios patogenéticos de la América del Norte*, p. 423.—*Hist. nat. y prep.* Véase *Farmacopea homeop.*
ANTÍDOTOS: *N-vom. cham. acon.*
COMPÁRESE CON: *Phos. n-vom. cham. puls. sass.*—INCOMPATIBLES. *Allium. squill. aloes.*

CLINICA.—Sirviendo de guia el conjunto de los síntomas, se verán los casos en que se podrá consultar este medicamento en las afecciones siguientes:—Reumatismos articulares, agudos y crónicos; Síncopes; Letargos; Envenenamientos; Consecuencias funestas de la embriaguez; Empeines; Manchas; Sarampion; Urticaria; Escarlatina; Verrugas; Callos; Uñas quebradizas; Abscesos; Carbunclos; Infartos glandulares.—Fiebres intermitentes; Fiebre amarilla; Fiebres pestilenciales.—Apoplejías; Cefalalgias catarrales; calvicie.—Legañas; Oftalmías catarrales; Equímosis; Ulceras; Manchas en los ojos; Catarata?; Amaurosis incipiente?; Otalgia; Otorrea; Disnea; Zumbido de oidos.—Epistaxis; Coriza fluente.—(Erisipela facial; parálisis del lado izquierdo de la cara).—Estomacace; Escorbuto; (Hinchazon de la lengua; Glosoplegia).—Anginas; Hinchazon de las amígdalas; Ulceras en la garganta; *Anginas catarrales*; Catarro de la faringe y de las fosas nasales.—Gastricismo; Cólicos de los niños; Cólicos gástricos; Cólicos nerviosos, espasmódicos; Cólicos de los glotones; Cólicos de los borrachos; Cólico nefrítico.—Ascitis; (Hernias encarceladas).—Constipaciones; Diarreas; Afecciones verminosas; Grietas en el ano; Hemorróidos.—Catarro vesical; Cálculos urinarios; Cálculos en los uréteres; Cólicos nefríticos; Retencion de orina; Espasmos del esfínter de la vejiga; Debilidad de la vejiga; Poliuria.—Partos laboriosos?; Expulsion tardía de las secundinas?; Entuertos demasiado frecuentes y prolongados; Flegmasía alba dolens?—Catarro de la laringe; Ronquera; Croup; Bronqui-

Digitized by

tis; Catarro brónquico.—Asma.—Panadizos; Sabañones; Podagra.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—°Consecuencias molestas de un tiempo húmedo y frio, tal como lo producen los vientos de Oeste y Nort-Oeste; °consecuencias perniciosas del uso de las cosas crudas y frias (los cohombros, la ensalada); °Sufrimientos por haber tenido los piés mojados, haber andado por humedades, haber respirado un aire impuro ó bebido agua mal sana.—°Conviene tambien á los temperamentos flemáticos y frios como á las naturalezas coléricas y biliosas.—°En los *niños*: afecciones de la cabeza: oftalmías; corizas y estilicidio contínuo de la nariz; anginas; tos; estertor mucoso; cólicos y flatuosidades; afecciones verminosas; sufrimientos urinarios, sobre todo en aquellos que desean mucho el aire libre, así como en los que predominan los flujos catarrales y mucosos, ó han sido suprimidos (concordando en esto mucho con *iod.* y *phosph.*).—En los viejos: cefalalgias; oftalmías; embarazo de la respiracion; asma catarral; sufrimientos nefríticos; vesicales, urinarios; afecciones gástricas é intestinales, principalmente cuando á ellas se junta la disposicion á tener frio, ó un grande deseo de pasear al aire libre (en esto concuerda con *Kal-hydr.*). —Se alivian al aire libre; *los sufrimientos catarrales; *la cefalalgia; *el lagrimeo; *el flujo nasal; los dolores reumáticos.—*Al volver á la habitacion caliente se agravan*: la cefalalgia; la odontalgia; los estornudos y todos los sufrimientos catarrales.—El *frio* alivia la odontalgia; el *calor* la agrava.—*Despues de medio dia*: padecimientos gástricos.—Por la *tarde* y *primera noche*: se agravan la mayor parte de los sufrimientos, sobre todo los epifenómenos de la coriza, en la cabeza, los ojos, la nariz; los dolores en los oidos, los dientes, las mandíbulas, la region estomacal, el hígado, la pélvis, la vejiga, los riñones y los miembros; los erutos, los borborigmos, las ventosidades; las frecuentes micciones; los *sufrimientos asmáticos*, las *expectoraciones* y la fiebre.—Por la *mañana*: mal gusto en la boca; lengua cargada, así como la cavidad bucal y la garganta; dolores de vientre; flatuosida-

Digitized by Google

des; *evacuaciones alvinas.—Los lados del cuerpo*: en la parte *superior*: sufrimientos, *primero á la derecha*, despues á la izquierda; en la *inferior*, *primero á la izquierda*, *despues á la derecha* (á la *derecha*, dolores por cima del ojo, hormigueo); á la *izquierda*, flujo nasal, oftalmía catarral, *dolores en la ingle*, el *vientre* y el *pecho*, dolores nefríticos; *reumatismos*, *principalmente en la parte inferior*, á la *izquierda*; en la superior, á la derecha.—En la posicion *sentada*: dolor por bajo del omóplato derecho;—Dolor de vientre; dolor en la region pubiana; en la posicion *horizontal*: dolor mas fuerte en el costado izquierdo; zumbido de oidos; odontalgia.—*Dolores articulares.—Sensacion de debilidad y laxitud que obliga á acostarse.

Piel.—Picotazos en la piel, como por alfileres; prurito violento, aunque sordo.—Rubicundez de la piel.—Heridas difíciles de curar.—°Contusiones; °quemaduras; °heridas venenosas y otras lesiones traumáticas.—°Verrugas.—°Sarampion?

Sueño.—Bostezos con dolor de cabeza y gastralgia; bostezos y sueño profundo.—Sueño agitado y gana de dormir por la mañana.—*Ensueños frecuentes*: de *naufragios*; de grandes oleadas; de *proximidad del agua*; °ensueños penosos de los convalecientes.

Síntomas febriles.—Frio y horripilaciones en el dorso, sobre todo por la noche, pasando de alto á bajo, con miccion mas frecuente; despues calor y sed.—*Calor que alterna con frio, en las afecciones catarrales; *calor* con borborigmos y coriza; *calor con sed.*—Fiebre intermitente, que se renueva cada vez que se hacen marchas forzadas, con agravacion hácia la mañana y calor *sin* sed.—Sudor: que se excita con facilidad; abundante; por bajo de las axilas y en la palma de las manos.—*Pulso*: acelerado; lleno (lento y duro).

Moral é inteligencia.—Entorpecimiento, torpeza, timidez.—Temor de que se hagan insoportables los padecimientos.—Desesperacion, con cólicos (lo mismo que en *veratr.*); °humor muy melancólico en las afecciones catarrales.

Cabeza.—*Embarazo de la cabeza*, presion, plenitudes, pesadez sobre todo en el occipucio y detrás del vértice de la cabeza, con calor, *durante la coriza*, y centelleo de-

Digitized by

lante de los ojos.—Sensacion de entorpecimiento como en los huesos del cráneo; estremecimiento eléctrico á través de la cabeza; punzadas desde el sincipucio, ó el interior de la cabeza hácia el oido; dolor en la sien, al guiñar los ojos.—°*Cefalalgia catarral*, dolor en la frente.

Ojos.—Dolores *filiformes*, que pasan de los ojos al oido; dolor como si el ojo estuviese atado á una cuerda y se tirase de ella.—Ojos empañados, tiernos, con sensibilidad á la luz, durante la coriza.—En los *ojos*: ardor; picazon como por humo; irritacion, que obliga á frotarlos; rubicundez sobre todo en el izquierdo, con prurito, punzadas y sensibilidad.—Hinchazon alrededor de los ojos.—°Oftalmía catarral.—En las *pestañas*: prurito, calor, punzadas.—**Lagrimeo abundante* (lágrimas dulces).

Oidos.—Dolores, distensiones, que pasan de la garganta hácia la entrada del oido y á sus inmediaciones.—Retintin del oido; ruidos lejanos; zumbidos.

Nariz.—Estornudos por la tarde al entrar en una habitacion caliente.—*Estilicidio por la nariz; fluxion acuosa, con estornudos, picazon ácre y excoriacion de la nariz y del labio superior.—**Coriza fluente*, con lagrimeo, dolor en la cabeza, calor, sed, desgana, tos, temblor de las manos, con agravacion por la tarde en una habitacion caliente y alivio al aire libre.

Cara.—Calor en la cara.—*Dolores filiformes*: en la mandíbula superior derecha; por cima del ojo derecho hácia la raiz de la nariz, que pasa de la mejilla hácia el ojo.—°Parálisis del costado izquierdo de la cara.—°Erisipela facial.

Dientes.—Dolores en los molares, en una habitacion caliente, durante un viento frio y húmedo; aumento por las bebidas frias; alivio por el agua fria, por el limpia dientes y chupando con la lengua.—Dientes de un amarillo súcio.

Boca y **Garganta**.—Olor fétido de la boca y de la garganta.—Lengua súcia, cargada de mucosidades.—Sequedad de la boca, en la raiz de la lengua, en el velo del paladar y en la garganta.—Sensacion de entorpecimiento en la garganta.—**Dolores en la garganta, como si hubiese en ella una pelota*; dolores en la raiz de la lengua; en el paladar; hácia la entrada del oido.—*Rezumamiento*

Digitized by Google

de mucosidades en pedazos: *por la tarde*; que provienen de las *fosas nasales* y con mal gusto de boca.

Gastricismo.—Mal gusto de la boca.—Poco apetito; mucha sed.—Náuseas, que suben á la garganta de pronto. —*Desgana*, *náuseas*; en el fondo de la garganta, que suben del tragadero; en el estómago, con asco; al enderezarse de la posicion horizontal.—*Eructos*: durante el calor; con inflacion de vientre y borborigmos.—Vómito.

Estómago.—Estómago como vacío; sensacion de debilidad en el estómago.—Presion en el cardias, hácia atrás. —Dolor en el píloro, bajo el esternon, á la derecha.—Presion en el estómago y bostezo.

Vientre.—Dolor presivo en la region del *hígado*, con horripilacion en la espalda y frio.—En la region del *bazo*: sensacion de contraccion; punzadas estando acostado.—En el *vientre*: retortijones filiformes, dirigiéndose hácia el medio; cólicos en la region umbilical, mas fuertes en la posicion sentada, menores al andar; sensacion como á consecuencia de un golpe, á la izquierda; ardor fugaz, calor, *dolor violento á la izquierda*, en la parte *baja* (*hácia* el sitio de una hérnia), con gana de orinar y emision quemante.—Vientre inflado y cabeza cargada, con gana inútil de ir al sillico, calor, cólico, respiracion fatigada, los vestidos molestan, todo se alivia con la expulsion de vientos.—*Ventosidades muy fétidas*; abundante emision de vientos sin olor.—°Cólicos por haber comido cohombros, ensalada.—°Cólicos de los niños.

Ano y defecacion.—**Diarreas á la madrugada*; en la mañana.—Evacuaciones difíciles ó enteramente detenidas; gana inútil de obrar.—Punzadas en el recto; dolor, picazon y reptacion en el ano.

Vías urinarias.—Presion violenta sobre un pequeño sitio en la pélvis, á la derecha; dolor incisivo, violento, como por pequeños cuchillos.—Presion quemante primero en la vejiga, despues en el sacro; dolor en la region renal, sobre todo á la izquierda; dolor en la ingle; *presion y otras sensaciones dolorosas en la region vesical*, en el anillo inguinal izquierdo, en la region pubiana y en la del útero.—*Sensacion de debilidad en la vejiga y la uretra; sensacion de calor en estas partes.—**Orinas abundantes*, durante las afecciones catarrales, las parálisis, etc.; orinas espumosas, con los colores del íris; ori-

Digitized by Google

nas rojas, con conatos frecuentes y quemazon en la uretra.

Partes viriles.—Aumento del apetito venéreo (vejiga y próstata dolorosas despues del cóito).—Distension en los cordones espermáticos; ardor en el glande.

Reglas.—Reglas muy abundantes.—Partos fáciles.

Laringe.—Cosquilleo en la laringe; ronquera; tos al respirar el aire frio; **tos*, *ronquera y coriza* en la estacion mala; estertor mucoso y pecho embarazado.

Pecho.—*Respiracion fatigosa*, por una presion en medio del pecho.—En el *pecho*; *presion, hácia arriba; punzadas y ardor en medio del costado izquierdo, al respirar profundamente.

Tronco.—Dolor en los riñones, cuando se retarda el defecar.—Horripilacion en la espalda; dolor bajo el omóplato derecho, despues de haber estado sentado; punzadas en los lomos.—Punzadas en el cuello.

Miembros torácicos.—Dolores en los brazos, sobre todo en el antebrazo izquierdo; sensacion paralítica en las articulaciones.—Sensacion de entorpecimiento en la articulacion del codo izquierdo.—Manos secas y rojas; temblor de la mano derecha.—°Panadizo.

Miembros pelvianos.—Debilidad en las caderas.—Dolores en los muslos y por cima de las rodillas; urticaria en los muslos.—Sensacion paralítica en la rodilla.—*En los piés desolladuras en forma de placas*; dolores en la articulacion del pié y dedo gordo.

56.—CHAMOMILLA VULGARIS.

CHAM.—Camomila comun.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. —*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: algunos dias.

ANTÍDOTOS: Acon. cocc. coff. ign. n-vom. puls.—*La camomila es antídoto de*: Alum. bor. cof. coloc. ign. n-vom. puls. senn.

COMPÁRESE CON: *Acon.* alum. ambr. arn. *ars.* bar. *ber. bry.* camph. caps. caus. *chin. cin. cocc. coff. coloc.* fer. *graph.* hell. hyos. *ign. ipec.* kal. led. lyc. *magn. magn-m.* merc. n-vom. *petr.* phos. *puls. rhap.* rhus. sass. sep. *stram. sulf.*—Es principalmente despues de *magn.* cuando la camomila hará buenos efectos si está indicada.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas* se verá los casos en que se puede consultar este medica-

Digitized by Google

mento contra:—*Diferentes afecciones de las mujeres y de los niños principalmente de las recien paridas y de los niños recien nacidos; Malas consecuencias por el abuso del café y de los paliativos narcóticos*; *Padecimientos á causa de un enfriamiento, ó por un exceso de cólera*; Afecciones reumáticas con fiebre; *Accesos de convulsiones y de espasmos*; principalmente en los recien nacidos, en los niños, durante la denticion en las mujeres embarazadas ó recien paridas y las personas histéricas; Accesos de desfallecimiento y de debilidad histérica; Convulsiones epilépticas; Catalepsia; Sobreexcitacion nerviosa; Atrofia y demacracion de los niños escrofulosos?; Hinchazon inflamatoria é induracion de las glándulas; Erupcion miliar (en los niños?); *Excoriacion de la piel* (en los niños); *Disposicion de toda lesion á ulcerarse;* Inflamaciones erisipelatosas; Ictericia; Estado soporoso con fiebre; *Fiebres inflamatorias y nerviosas, con delirio;* Fiebres intermitentes; Jaqueca y cefalalgia histérica y nerviosa; Cefalalgia catarral, causada por una transpiracion suprimida; *Oftalmia y blefaroftalmia de los recien nacidos, así como tambien las debidas á un enfriamiento* (y en los sujetos artríticos?); Hemorragia ocular; Blefaroespasmos; Otalgia; Parotitis; Erisipela de la cara; *Odontalgia con hinchazon de la mejilla y de las glándulas submaxilares*; Dolores de dientes por abuso del café ó á consecuencia de un enfriamiento; Denticion difícil, con diarrea, fiebre, convulsiones, etc.; *Afecciones biliosas* y gástricas, sea á consecuencia de un acceso de cólera ó de cualquiera otra causa; Gastralgia, aun por haber abusado del café; Acedías en los niños; Hepatitis aguda; Cólicos espasmódicos y flatulentos; Enteritis?; Peritonitis?; Salida de hernias inguinales?; Diarreas mucosas ó biliosas?; Cólera?; Disentería?; Diarrea á causa de la denticion; Lientería?; Metritis?; Metrorragia aun la subsiguiente al parto; Espasmos abdominales de las mujeres embarazadas y recien paridas; Cólicos menstruales; Dolores muy violentos despues del parto, Síntomas precursores (y malas consecuencias?) del aborto; *Peritonitis puerperal*; Supresion de la leche; Fiebre láctea; Excoriacion de los pezones; Erisipela en las mamas; *Endurecimiento de las glándulas mamarias*; Convulsiones, gritos, cólicos, diarrea y excoriacion de los recien nacidos; *Tos catarral con ronquera*, principalmente en los niños, y la producida por un enfriamento en invier-

Digitized by Google

no, ó á consecuencia del sarampion; Afecciones inflamatorias de las vías aéreas?; (Laringitis?, Bronquitis?, Traqueitis?); Croup; Coqueluche?; Tos sofocante de los niños?; Accesos de asma espasmódico ó flatulento, principalmente en los niños; Ciática; Calambres en las pantorrillas, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores reumáticos tractivos* principalmente *por la noche en la cama*, con estado paralítico y sensacion de torpeza en las partes afectas, con necesidad de moverlas constantemente, aliviadas por el calor exterior.—**Dolores con sed, calor y rubicundez* (de una) *de las mejillas* y sudor caliente en la cabeza y la piel del cráneo.—*Dolores pulsativos, como en los abscesos.—**Sobreexcitacion y mucha impresionabilidad de todo el sistema nervioso, con excesiva sensibilidad á todo dolor* que parece insoportable, y conduce á la desesperacion.—*Mucha susceptibilidad al aire libre, *y principalmente al viento.—Miembros como rígidos y paralizados.—Excesiva debilidad y decadencia, desde que el dolor comienza, las fuerzas se van perdiendo sucesivamente hasta llegar al desfallecimiento.—**Accesos de desvanecimiento* con sensacion de laxitud y de desazon interior en la region precordial.—°Accesos de catalepsia, con cara hipocrática, extremidades frias, ojos medio cerrados, pupilas dilatadas y empañadas.—**Accesos de espasmos y de convulsiones*, con cara roja, abotagada, y movimientos convulsivos de los ojos, de los párpados, de los labios, de los músculos de la cara y de la lengua.—°Convulsiones epilépticas con retraccion de los pulgares y espuma en la boca precedidas de cólicos, ó seguidas de un estado soporoso.—Mucho deseo de estarse echado; el niño ni quiere andar, ni que le lleven en brazos.—Crujido y dolor de rotura en las articulaciones.

Piel.—*Erupcion miliar, *con prurito y comezon por la noche.—*Piel enfermiza; toda lesion tiende á ulcerarse.—En las úlceras, hormigueo, picazon, sensacion de ardor y punzadas temblorosas con sensibilidad excesiva al tacto.—*Calor amarillo de la piel.—°Hinchazon inflamatoria de las glándulas.—°Excoriacion en los niños.

Digitized by Google

Sueño.—Soñolencia por el dia sin poder dormir hasta que se acuesta.—**Estado soporoso y coma vigil* ¯con dolor tirante en la cabeza y gana de vomitar, ó °con agitacion febril, respiracion corta y sed.—**Insomnio nocturno con accesos de angustia*, visiones é ilusiones de la vista y del oido.—**En durmiendo*; *sobresaltos con espanto*, *gritos*, *agitacion*, ¯*llantos*, palabras, desvaríos, gemidos, aspiracion con ronquido y °separacion contínua de los muslos.—Ensueños fantásticos, vivos, querellosos, molestos, con rostro melancólico y ceñudo.—Delirios nocturnos.

Fiebre.—Horripilacion con calor interior.—**Alternativa continua de frio ó de horripilacion parcial*, *con calor parcial* en diferentes partes del cuerpo.—**Calor general* sobre todo *por la tarde ó por la noche en la cama*, *con ansiedad*, *sed*, *rubicundez de las mejillas*, *traspiracion caliente en la cabeza ó la frente y en la piel del cráneo*, y algunas veces, principalmente descubriéndose mezclado de calofrios ó de horripilacion.—*Despues ó durante el calor sudor ácido y que causa comezon en la piel.—**Calor quemante y rubicundez* (por lo regular de una sola) *de las mejillas*, principalmente *por la noche con gemidos*, *agitacion* y frio ó calor en el resto del cuerpo.—Calor quemante con sudor y delirios furibundos, sobre todo por la noche.—°Fiebre intermitente con exacerbacion nocturna, presion en la boca del estómago; conato al vómito ó vómitos biliosos, cólicos, diarrea, y emision dolorosa de las orinas.—Sudor nocturno durmiendo.

Moral.—**Accesos de angustia excesiva*, *como si el corazon quisiera salirse*, *con mucha inquietud*, *agitacion*, *exasperacion y anhelacion*, *gemidos y lloros*, ¯acompañados frecuentemente de cólicos tractivos ó de presion en la boca del estómago.—**Disposicion á llorar y á enfadarse*, con gran sensibilidad á las ofensas.—**Humor querelloso y colérico*.—Terquedad en los niños.—*Sobreexcitacion moral, con mucha disposicion á asustarse.—Humor hipocondríaco.—*El enfermo no puede soportar, ni que le hablen, ni le interrumpan su conversacion.—Taciturnidad y repugnancia á la conversacion.—Estado de distraccion y de inadvertencia, como el que está sumergido en la meditacion, con concepcion difícil, como si no oyese bien.—Especie de estupidez y de apatía por el placer y por las cosas exteriores, como soñando des-

Digitized by Google

pierto.—Desea diferentes cosas, que desecha en cuanto las posee.—En hablando ó escribiendo se equivoca fácilmente.—°Delirios frenéticos y furibundos.

Cabeza.—Embriaguez y vacilacion por la mañana en cuanto se levanta.—°Vértigos al incorporarse.—*Vértigos con desfallecimiento.*—*Vértigos con oscurecimiento de la vista.—**Vértigos principalmente por la mañana* ó por la tarde, ó despues de comer, ó de haber tomado café.—*Cefalalgia por la mañana al despertarse*, ó durante el sueño, algunas veces con sensacion como si la cabeza fuese á estallar.—Dolor de contusion y **pesadez presiva en la cabeza.—*Tirones, punzadas y latidos en la cabeza*, frecuentemente *semilaterales*.—Crujido en un lado del cerebro.—*Sudor caliente, viscoso en la frente y en la piel del cráneo.—Dolor tembloroso en la frente, principalmente despues de la comida.—*Congestion pulsativa en la cabeza.

Ojos.—Dolor de excoriacion en los ángulos de los ojos.—Punzadas, sensacion de ardor y calor en los ojos.—**Ojos inflamados °y rojos*, con dolores presivos, principalmente al moverlos y al sacudir la cabeza.—Mucha sequedad en el borde de los párpados.—°Inflamacion del borde de los párpados.—°Hinchazon y rubicundez de los párpados, con secrecion mucosa, *legañas en los ojos y aglutinacion nocturna*.—°Color amarillo de la esclerótica.—Equímosis en el ojo y °hemorragia ocular.—°Oclusion espasmódica de los párpados.—*Estremecimiento de los párpados.—*Ojos convulsos.—*Pupilas contraidas*.—*Chispas delante de los ojos.—Vista turbia, mas frecuentemente por la mañana que por la tarde.—Oscurecimiento semilateral de la vista mirando alguna cosa blanca.—Fotofobia.

Oidos.—**Otalgia con dolores tractivos y tensivos.—**Punzadas en los oidos*, principalmente al bajarse, con propension á enfadarse por cualquier cosa y tomarlo todo á mal.—Tintineo y **zumbido sordo en los oidos*.—Sensacion como si los oidos estuvieran tapados, ó como si un pájaro revolotease cerca y arañara.—Sensibilidad del oido; la música parece insoportable.—**Hinchazon inflamatoria de las parótidas*, como tambien de las glándulas submaxilares y las del cuello.—°Flujo por los oidos.

Nariz.—Coriza con obturacion de la nariz.—Ulceracion ó

Digitized by Google

inflamacion de las ventanillas nasales.—*Epistaxis.—Olfato muy sensible.

Cara.—**Cara caliente, roja, quemante, ó rubicundez y calor de una de las mejillas con frio y palidez de la otra*, °ó cara pálida, hundida, con distorsion de las facciones por el dolor.—*Abotagamiento de la cara.—°*Erisipela en la cara*, con hinchazon dura y azulada de una mejilla.—Hinchazon de una sien, con dolor al tacto.—°Fluxion en la mejilla.—°Arrugas en la frente.—*Sudor caliente y viscoso en la frente.—°Dolores lancinantes, tractivos y pulsativos en un lado de la cara.—Miliar roja en las mejillas.—Color amarillo en la piel de la cara.—*Movimientos convulsivos de los músculos de la cara y de los labios.—**Labios agrietados*, *excoriados* y ulcerados.—°Calambres en las mandíbulas, con apretamiento de los dientes.

Dientes.—**Odontalgia*, lo mas frecuentemente *semilateral* y principalmente *por la noche*, *al calor de la cama*, con *dolores insoportables que conducen á la desesperacion*, hinchazon; *calor* y *rubicundez de las mejillas*, °hinchazon quemante de las encías é infarto doloroso de las glándulas submaxilares.—*Los dolores son ordinariamente tractivos y estremecientes, ó pulsativos y lancinantes, ó como si escarbaran y corrosivos en las muelas cariadas, y *apareciendo frecuentemente despues de haber bebido ó comido alguna cosa caliente* (ó fria), y principalmente *despues de haber tomado café*.—Vacilacion de los dientes.

Boca.—**Sequedad de la boca y de la lengua*, ó flujo de una saliva espumosa.—**Olor pútrido de la boca*.—Lengua roja y hendida, ó cubierta de una capa espesa y amarillenta.—Vesículas encima y debajo de la lengua, °con dolores lancinantes.—Aftas en la boca.—*Movimientos convulsivos de la lengua.

Garganta.— Dolor de garganta con hinchazon de las parótidas, °de las tonsilas y de las glándulas submaxilares.—°Dolores en la faringe, lancinantes y quemantes, con sensacion como si hubiese un tapon en la garganta.—°Imposibilidad de tragar los alimentos sólidos, sobre todo estando acostado.—°Calor quemante en la garganta, desde la boca hasta el estómago.—°Rubicundez oscura en las partes afectas.—°Los alimentos se detienen en el hoyuelo del cuello.

Apetito.—Gusto pútrido ó mucoso.—Gusto ácido de la

Digitized by

boca y del pan de centeno.—**Gusto amargo de la boca y de los alimentos.*—Los alimentos no pueden pasar.—**Disgusto ó deseo pronunciado de café*; algunas veces con gana de vomitar, y aun vómitos y accesos de sofocacion despues de haberlos tomado.—Despues de haber comido, calor y sudor de la cara, meteorismo y plenitud de estómago y de vientre, erutos y gana de vomitar.—**Sed excesiva de bebidas frias.*

Estómago.—Erutos que agravan los dolores de estómago y de vientre.—Erutos ágrios.—°Regurgitacion de los alimentos.—*Gana de vomitar despues de haber comido*, y principalmente *por la mañana.*—Laxitud y especie de desazon en el estómago, como si fuera á desmayarse.—*Vómitos de los alimentos y de materias ágrias con mucosidades.—**Vómitos amargos*, biliosos.—**Presion excesivamente dolorosa en la region precordial*, como si el corazon se comprimiese, con gritos, sudor y angustia.—**Gastralgia presiva*, como por una piedra en el estómago, con respiracion penosa, principalmente *despues de haber comido ó por la noche*, con inquietud y agitacion renovada ó aliviada por el café.—°Dolor quemante en la boca del estómago y en los hipocondrios.

Vientre.—*Tension y plenitud angustiosa en los hipocondrios y en el epigastrio, con sensacion como si todo se dirigiese hácia el pecho.—**Cólico flatulento*, con *meteorismo* y acumulacion de flatuosidades hácia los hipocondrios y anillo inguinal.—**Cólicos excesivamente dolorosos, tirantes, y retortijones* en el vientre, algunas veces por la mañana al salir el sol.—Sensacion de vacuidad en el vientre, con movimientos contínuos en los intestinos, y círculos azules alrededor de los ojos.—°Dolores cólicos quemantes en el epigastrio, con respiracion penosa y palidez de la cara.—*Punzadas en el vientre, principalmente al toser, en estornudando y al tacto.—°Sensibilidad dolorosa del vientre al tacto, con sensacion de ulceracion interior.—*Presion hácia el anillo inguinal, como si fuese á salir una hernia.—*Espasmos abdominales.

Ano.—Estreñimiento como por inercia del recto.—**Diarreas* principalmente *por la noche*, con *cólicos espasmódicos*, las mas veces con *deposiciones mucosas, blanquecinas ó acuosas, ó amarillentas y verdosas*, ó de *mucosidades mezcladas de excrementos como huevos revueltos*, ó deposiciones

Digitized by Google

calientes, corrosivas y de un olor fétido como de huevos podridos, ó evacuacion de materias no digeridas.—*Hemorróides con grietas muy dolorosas y ulceracion en el ano.

Orinas.—Conato frecuente de orinar, con ansiedad.—En orinando, picazon y sensacion de ardor en la uretra.—*Orinas calientes, amarillentas, con sedimento en forma de copos, ú orinas turbias con sedimento amarillento.—Emision involuntaria, ó chorro delgado de las orinas.—Excoriacion en el borde del prepucio.

Reglas.—Reglas suprimidas con hinchazon y dolores presivos en la boca del estómago y en el vientre, dolores como los del parto é hidropesía general.—**Cólicos menstruales*, antes de las reglas.—**Presion hácia el útero, como por los dolores del parto.*—**Metrorragia*, con emision de una sangre roja, oscura y en coágulos, y acompañada de dolores como para el parto.—Dolores quemantes y escozor en la vagina.—Leucorrea corrosiva con escozor.—**Induracion escirrosa de las glándulas mamarias.*

Laringe.—**Catarro y ronquera*, con acumulacion de mucosidades tenaces en la garganta.—Dolor quemante en la laringe.—Constriccion espasmódica en el gaznate.—**Tos seca producida por una titilacion continua en la laringe* y debajo del esternon, principalmente por la tarde y *por la noche en la cama*, continuando aun durante el sueño y acompañada algunas veces de accesos de sofocacion.—La cólera provoca la tos (en los niños).—*Expectoracion de mucosidades de un gusto amargo ó pútrido.

Pecho.—Respiracion corta, crascitante ó sibilante y con ronquido.—Respiracion profunda con elevacion sensible del torax.—Accesos de sofocacion como por constriccion de la laringe ó del pecho.—**Accesos de asma flatulento con ansiedad y plenitud en la region precordial.*—*Opresion de pecho.—**Punzadas en el pecho*, principalmente al *respirar*.—Sensacion de ardor en el pecho con aturdimiento y ansiedad.—Punzadas en la region del corazon, con dificultad en la respiracion.

Tronco.—Dolores de riñones y en el dorso, principalmente *por la noche*.—Convulsiones en el dorso con inversion de la cabeza hácia atrás, y rigidez tetánica del cuerpo.

Brazos.—Adormecimiento y rigidez de los brazos al co-

Digitized by Google

ger algun objeto.—Convulsiones en los brazos.—*Dolores nocturnos con debilidad paralítica de los brazos.—Entumescencia ó frio y rigidez paralítica de las manos.—Entorpecimiento ó movimientos convulsivos de los dedos.—Retraccion de los pulgares.

Piernas.—**Dolor paralítico y tractivo en la cadera* y en el muslo hasta los piés, *principalmente por la noche.*—°Tension de los músculos, de los muslos y las piernas.—**Calambres en las pantorrillas*, principalmente por la noche.—Tirones y estado paralítico de los piés por la noche.—Sensacion de ardor y prurito en los piés, como por sabañones.—Hinchazon del pié y de la planta del pié.

---

57. — CHELIDONIUM MAJUS.

CHEL.—Celidonia mayor.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—Medicamento poco conocido aun.

SINTOMAS GENERALES.—*Traccion paralítica y parálisis* en diversas partes del cuerpo.—Acceso de torpeza con frio y palidez en algunas partes que parecen como muertas.—Punzadas como por alfileres en diferentes sitios.—Dolores calambroídeos.—Mucha laxitud y pereza por la mañana al despertarse.—Aversion al movimiento el cual se hace con mucho trabajo.—Desazon sin dolores y sin males sensibles ó capaces de distinguirlos.—Antiguas úlceras fagedénicas.—Gana de dormir y de echarse, *sin poder conciliar el sueño.*—Sueño tardío.—Al dormirse sobresaltos con espanto, seguidos de dolor de cabeza.—Se despierta á menudo y de pronto, con sudor excesivo que continúa despues de estar despierto.—*Calofrios predominantes*, horripilacion y frio.—Abatimiento.—Aprension é inquietud sobre el presente y el porvenir.

Cabeza.—Vértigos rotatorios, con aturdimiento y horripilacion en la parte superior del cuerpo.—Dolor sordo en la cabeza, con pulsacion en las sienes.—*Sensacion de frio en el occipucio*, que parece subir desde la nuca hácia la cabeza.—*Hormigueo en la piel del cráneo.*—Cefalalgia general.

Ojos.—Dolor encima de los ojos oprimiendo sobre los

Digitized by

párpados.—Aglutinacion de los párpados y ojos empañados por la mañana.—Manchas relucientes delante de los ojos, con lagrimeo cuando se mira.—Pupilas contraidas.—°Oscurecimiento de la córnea.—°Fístula lagrimal.

Oidos y nariz.—Punzadas en los oidos.—Sensacion como si saliese viento por los oidos.—Ruido como de carruajes en los oidos.—Comezon en la nariz.—Temblor y vibracion en la punta de la nariz.—Coriza seco con obturacion de la nariz.

Cara y dientes.—Rubicundez de la cara sin calor.—*Tension pruritosa y tirones en el pómulo.*—Dolor en los dientes inferiores al tacto con vacilacion de ellos.—°Herpes en la cara, sobre todo en la barba.

Boca y garganta.—Sequedad de la boca con sed.—Acumulacion de agua en la boca.—Estrangulacion en la garganta como si se tragase una cosa muy gruesa.—Tension en la region de la faringe con estrechamiento de la garganta y deglucion oprimida.—Sensacion de quemazon y aspereza en la garganta.

Apetito.—Gusto soso ó amargo.—*Incomodidades despues de haber tomado leche cuajada*; la leche azucarada no incomoda y es apetecida con ánsia.—Erutos con gusto de los alimentos.—Hipo.—°Mucho deseo de beber leche.

Estómago.—Dolores corrosivos y como si escarbaran en el estómago que se disipan *despues de la comida.*—Dolores calambroídeos, contractivos en el estómago.—Dolores calambroídeos y pulsacion en la boca del estómago con respiracion ansiosa.—Sensacion de frio ó de quemadura en el estómago.—Punzadas en la region del epigastrio.

Vientre.—Cólicos con *retraccion calambroidea del ombligo* y náuseas.—Dolores cólicos de larga duracion, principalmente *despues de haber comido.*—Dolores cólicos que alternan con deposiciones blandas.—Punzadas sordas por debajo del ombligo, que obligan á replegarse sobre sí mismo.

Deposiciones y orinas.—Deposiciones duras, nudosas y difíciles.—*Diarrea mucosa por la noche.—Orinas pálidas*, frecuentes, abundantes ó en muy corta cantidad.

Reglas.—*Reglas muy abundantes* ó retardadas.—°Desaparicion de la leche de los pechos.

Digitized by Google

Pecho.—Respiracion difícil y oprimida.—Tos acompañada de sordera.—Presion en el pecho respirando.

Dorso.—*Dislaceracion presiva en el dorso*, como si las vértebras lumbares quisieran romperse, solamente con encorvarse hácia adelante ó hácia atrás.

Brazos.—*Parálisis de los músculos del brazo*, con movimientos difíciles y dolorosos.—Hinchazon de las venas de las manos.—Dedos como muertos con las uñas azuladas.

Piernas.—*Parálisis del muslo y de la rodilla*, en apoyándose sobre el pié.—Traccion paralítica desde la cadera hasta los dedos.—Calambre y contraccion en la planta de los piés.—Accesos de torpeza, palidez y frio en los piés, los que están como muertos.—°Rigidez del empeine.

58.—CHINA.

CHIN.—Quina.—Hahnemann.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas:* 9, 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

Antídotos: Arn. *ars.* bell. calc. caps. *carb-v.* cin. fer. *ipec.* merc. natr. natr-m. *puls.* sep. sulf. *veratr.*—*La quina es antídoto de*: Ars. asa. aur. cupr. fer. hell. ipec. merc. sulf. veratr.—S *lenium* agrava sus efectos.

Compárese con: Amm. *arn. ars.* asa. bar. bell. bry. *calc.* caps. *carb-v.* cham. cin. cupr. dig. *fer. graph.* hell. hep. iod. *ipec.* lach. *merc.* mur-ac. *natr. natr-m. n-com.* phos. *phos-ac. puls.* rhus. samb. sep. sil. stann. *sulf.* thui. *veratr.*—Sobre todo despues de: *Ars. ipec. merc. phos-ac.* y *veratr.* es cuando la *quina* hará mejor efecto si está indicada.—Despues de la quina conviene algunas veces: *Ars. bell. puls. veratr.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en los que se podrá consultar este medicamento: contra:—Afecciones de personas de una constitucion deteriorada, seca y biliosa, ó leucoflegmática con disposicion á las afecciones hidrópicas, ó á catarros y otros flujos mucosos ó diarreas; Afecciones, sobre todo del sexo femenino; Afecciones reumáticas; Malas resultas de un acceso de cólera, de un enfriamiento, de un coriza suprimido; Malas consecuencias por abuso del té de la China; Padecimientos de los borrachos?; Inflamaciones asténicas; *Malas resultas por abuso del mercurio*; Padecimientos artríticos; Artrocace?; Hidartrosis?; *Afecciones hidrópicas*; Padecimientos del sistema linfático; Ictericia; Clorosis?; *He-*

Digitized by Google

morragia, sobre todo las que *provienen de debilidad*; Atrofia; *Debilidad*, sobre todo á consecuencia de pérdidas debilitantes (pérdida de sangre, de esperma, ú otros líquidos), ó despues de graves enfermedades agudas; Baile de San Vito?; Padecimientos á consecuencia de las viruelas ó del sarampion; *Fiebres con afecciones* biliosas, gástricas, mucosas y reumáticas; *Fiebres intermitentes; Fiebres de los pantanos*; Fiebres tifoídeas, aun con síntomas de putridez; Fiebres lentas; Hipocondría, sobre todo la que es consecuencia de pérdida de humores; Cefalalgias reumáticas, catarrales y congestivas; Jaqueca; Cefalalgia por supresion de un coriza; Oftalmía aun de las personas escrofulosas; Ambliopia amaurótica, sobre todo despues de los excesos de bebidas alcohólicas ó por pérdida de humores; *Hemorragia nasal* (ó bucal); Prosopalgia y odontalgia reumáticas ó congestivas; *Dispepsia*, gastralgia y otras *afecciones gástricas*, sobre todo *las ocasionadas por pérdida de humores* ó de graves enfermedades agudas; Colerina; *Afecciones biliosas*; Ictérica; Hepatitis agudas y crónicas?; *Obstruccion y endurecimiento del hígado* ó del *bazo*; Esplenalgia?; Cólicos aun por resultas del sarampion; *Cólicos espasmódicos y flatulentos*; Timpanitis; *Ascitis* y ascitis enquistada; Afecciones verminosas; Enteritis crónica con diarrea sin dolor; Diarreas aun las de las viruelas; Diarreas por debilidad; *Lienteria*; Padecimientos hemorroidales: Satiriasis?; Impotencia; Flores blancas; Metrorragias, principalmente las ocasionadas por debilidad; Catarro de las vías aéreas; Grippe; Pleuresía; Neumonía; Bronquitis; Hemoptísis; Neumonía crónica con supuracion; Catarro sofocante?; Gonitis; etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Tirones tensivos ó dislacerantes, temblorosos y lancinantes, sobre todo *en los huesos largos de los miembros, con dolores paralíticos y debilidad de las partes afectas.—Dolores dislacerantes*, reumáticos en los miembros al comenzar á andar.—**Dolores y padecimientos provocados ó agravados por el tacto, por la noche y despues de comer.*—Inquietud en las partes afectas que obliga á estarlas moviendo.—Sensacion de torpeza en diversas partes.—*Adormecimiento de las partes sobre las*

Digitized by Google

que se acuesta.—*Hinchazon artrítica, dura y roja de algunas partes.—**Hinchazon hidrópica* de algunas partes ó de todo el cuerpo.—*Hinchazon erisipelatosa de todo el cuerpo.—**Mucha debilidad general con temblor*, andar con dificultad y *mucha disposicion á transpirar durante el movimiento y el sueño.*— Vivacidad mas que ordinaria, con los ojos fijos.—°Movimientos convulsivos de los miembros. —**Sobreexcitabilidad de todo el sistema nervioso.* — Aversion al trabajo de cuerpo y de espíritu.—Desvanecimientos.—Accesos de asfixia.—*Atrofia y *demacracion*, sobre todo en los brazos y piernas.—*Gran susceptibilidad á las corrientes de aire y padecimientos, por poco que se exponga á estas.—Pesadez de todo el cuerpo.

Piel.—Excesiva sensibilidad en toda la piel.—**Color amarillo de la piel.*—Piel lácia, seca.—Punzadas terebrantes y latidos en las úlceras.—Prurito quemante ó corrosivo, sobre todo al principio de la noche en la cama, algunas veces con erupcion de granos ó de manchas elevadas como las producidas por picaduras de ortigas.

Sueño.—*Gana de dormir por el dia*, frecuentemente con latidos de corazon. —Bostezos frecuentes con pandiculaciones.—**Sueño tardío é insomnio á causa de una gran afluencia de ideas.*—Desvaríos hasta dormirse.—**Insomnio con dolor de cabeza presivo, ó bulimia.*—*Sueño agitado no reparador.—Sobresaltos con espanto al dormirse.—En durmiéndose se está acostado sobre el dorso con la cabeza vuelta á un lado, y los brazos extendidos sobre esta, con respiracion lenta y el pulso lleno y acelerado. —Gemidos y *ronquido durante el sueño*, así como en los niños.—**Ensueños penosos, espantosos que agitan aun despues de haber despertado.*—Ensueños desordenados, insensatos despues de media noche, *con una especie de estupidez cuando despierta.*

Fiebre.—**Calofrios con horripilacion, ó temblor febril, ordinariamente sin sed.—**Frio en todo el cuerpo con congestion á la cabeza*, calor y rubicundez de la cara y frente caliente. —Aumento general del calor, con venas hinchadas sin sed.—**Calofrios con cefalalgia*, náuseas, *adipsia*, vértigos, congestion á la cabeza, *palidez de la cara*, frio en las manos y en los piés, vomituricion de mucosidades, etc.—Calofrios mas fuertes, despues de haber bebido.—**Calor con sequedad de la boca y labios, los que están quemantes,*

Digitized by

rubicundez de la cara, dolor de cabeza, hambre morbosa, delirio, pulso lleno y acelerado.—Calor con picotazos en varios puntos y sed ardiente.—Calor con necesidad de descubrirse, ó con calofrios por poco que se descubra. —°Fiebres cotidianas, y dobles cotidianas, ó tercianas que regularmente principian por la tarde ó despues de mediodia, ó por la mañana, con calofrios y temblor, *seguidos de calor y de sudor nocturno.*—°Fiebres con dolores presivos y congestion á la cabeza, endolorimiento é hinchazon del hígado y del bazo, gusto, erutos, y vómitos amargos y biliosos, color amarillento de la piel y de la cara, tos corta, convulsiva, mucha debilidad, dolores en los miembros y puntos doloridos en el pecho.—**Los accesos febriles van frecuentemente precedidos de padecimientos*, tales como palpitaciones de corazon, estornudos, angustias, náuseas, sed excesiva, bulimia, dolor de cabeza, cólicos presivos, etc.—**La sed* ordinariamente se presenta *antes ó despues de los calofrios ó durante el sudor*, rara vez durante el calor y casi *nunca mientras los calofrios.*—Pulso pequeño y débil.—**Traspiracion fácil durante el sueño* y durante el movimiento.—*Sudores nocturnos, debilitantes.—Sudores oleosos por la mañana.

Moral.—*Apatía é insensibilidad moral.—*Abatimiento hipocondriaco.—**Mucha ansiedad.*—Carácter muy escrupuloso.—*Decaimiento.*—Descontento; se cree desgraciado y que todo el mundo está contra él.—*Irascibilidad excesiva con pusilanimidad é imposibilidad de sufrir* el menor ruido.—Desobediencia.—*Desprecio de todas las cosas; todo le parece falto de animacion.—Terquedad con llantos fáciles ó con irritabilidad.—*Miedo á los perros y á otros animales, sobre todo por la noche.—**Mucha afluencia de ideas* y de proyectos, con lentitud en las ideas.—*Horror al trabajo.*

Cabeza.—*Pesadez sorda de la cabeza*, como por vigilias prolongadas.—Vértigos levantando la cabeza, sobre todo en el occipucio, como si la cabeza fuese á doblarse hácia atrás.—Vértigos con náuseas.—Ataques de dolor de cabeza con náuseas y vómitos.—**Cefalalgia como por un coriza suprimido.*—Pesadez de la cabeza con abatimiento. —Cefalalgia en la frente al abrir los ojos.—*Dolor de contusion en el cerebro, con terebracion presiva en el vértice, agravados por la meditacion y la conversacion.

Digitized by Google

—**Dolor de cabeza presivo*, sobre todo *por la noche con insomnio*, ó por el dia y agravado al aire libre.—**Dolores agudos con estremecimiento ó presivos en la cabeza.*—**Dolor de cabeza como si fuese á abrirse.*—Dolores lancinantes en la cabeza; con fuertes pulsaciones en las sienes.—**Congestion á la cabeza,* con calor y plenitud.—°Movimientos y latidos dolorosos en el cerebro, que obligan á alzar y bajar alternativamente la cabeza.—°Dolores de cabeza aumentados por el tacto, el movimiento y el andar, así como por una corriente de aire, ó por caminar contra el viento.—Los dolores de cabeza ocupan frecuentemente un solo lado.—**Sensibilidad del exterior de la cabeza y aun de la raiz de los cabellos al tacto.*—Dolor á la cabeza, como si le arrancaran los cabellos, ó como si la piel del cráneo se contrajese.—Presion lancinante en las prominencias frontales.—Sudor de la piel del cráneo.

Ojos.—°Dolor en los ojos, como por una presion en los bordes de la órbita.—°Dolor como si un grano de arena se hubiese introducido en el ojo, durante el movimiento.—Escozor penoso en los ojos.—°*Inflamacion de los ojos*, con calor, rubicundez, dolores quemantes y presivos, y agravacion por la tarde.—Ojos empañados.—Ojos prominentes.—°Córnea empañada como si hubiese humo en el fondo del ojo.—°Color amarillento de la esclerótica.—Lagrimeo con hormigueo en la cara interna de los párpados.—°Debilidad de la vista que no permite ver mas que el contorno de los objetos poco distantes.—Al leer, confusion de los caractéres, que parecen pálidos y rodeados de un borde blanco.—**Pupilas dilatadas y poco sensibles.*—Ceguera como por amaurosis.—**Chispas*, puntos negros que revolotean y oscurecimiento delante de los ojos.—Fotofobia.

Oidos.—Dolor de dislaceracion en los oidos, lo mas frecuente en el oido externo.—Punzadas, **zumbido y retintin en los oidos.—Dureza de oidos.—Rubicundez y calor de la oreja exterior, y sobre todo de los lóbulos.—Erupcion en la concha de la oreja.

Nariz.—Nariz caliente y roja.—**Hemorragia de la nariz* y de la boca.—**Coriza con estornudo.*—**Epistaxis.*

Cara.—Calor y rubicundez de la cara, sobre todo en las mejillas y en los lóbulos de las orejas.—**Color pálido, térreo, á veces de un amarillo negruzco.*—**Cara abatida, con*

Digitized by Google

ojos hundidos y ojeras, y nariz puntiaguda.—*Cara abotagada.—*Dolores reumáticos en la cara.—*Labios secos, negruzcos.—*Labios resquebrajados.—Hinchazon de los labios.—Pústulas quemantes, en los labios y en la lengua con picazon.—Dolores é hinchazon de las glándulas submaxilares.

Dientes.—Odontalgia con dolores que producen estremecimiento ó tractivos, provocados por el aire libre ó una corriente de aire.—**Dolor sordo y penoso en los dientes cariados.*—*Odontalgia pulsativa.—*Los dolores de dientes se manifiestan principalmente despues de la comida y por la noche, y se alivian por una fuerte presion exterior ó cerrando fuertemente la boca; un ligero contacto los agrava excesivamente.—Dientes que se mueven, y no duelen sino cuando se mastica.—°Dientes cubiertos de una capa negra.

Boca.—Sequedad de la boca.—Boca pastosa, con sabor insulso y acuoso.—°Lengua resquebrajada, negra ó **cubierta de una capa amarilla ó blanca.*—Punzadas lancinantes, quemantes en la lengua.—Hinchazon dolorosa de la lengua hácia la raiz.—Falta de la palabra.—Evacuacion de sangre por la boca.

Garganta.—Sequedad de la garganta.—Punzadas en la garganta, sobre todo al tragar, provocadas por la menor corriente de aire.—Hinchazon del paladar y de la úvula.

Apetito.—*Gusto soso, mucoso ó acuoso, *sobre todo despues de haber bebido.—Gusto muy salado ó *insipidez de los alimentos.—Sabor dulce de la boca.—*Gusto* ácido *amargo* de la boca, como tambien *de los alimentos y de las bebidas.—**Repugnancia á los alimentos* y las bebidas, *con sensacion de plenitud.*—Gusto ágrio del café y del pan de centeno.—Gusto amargo de la cerveza y del pan de trigo.—Disgusto por la manteca, la cerveza y el café.—Excesivo deseo de vino.—Disgusto por el agua, con deseo de cerveza.—**Sed ardiente*; se bebe á menudo, pero poco de cada vez.—Bulimia con sabor soso en la boca, náuseas y gana de vomitar.—°Voracidad.—Apetito solamente cuando se come, con indiferencia para todos los alimentos.—**Deseo de diversos alimentos* y afan *confuso de golosinas, sin saber por cuál de ellas se decide.*—Despues de cada sorbo de una bebida, horripilacion ó calofrio como carne de gallina, punzadas en el pecho ó cólicos.—Erutos

Digitized by Google

ágrios y alteraciones en el estómago despues de haber tomado leche. —*Mucha debilidad de la digestion, aun *despues de una comida escasa, *desazon*, *gana de dormir*, *suma plenitud de estómago y del bajo vientre*, laxitud y pereza, sabor insulso en la boca, humor hipocondríaco y dolor de cabeza. —*Erutos amargos, ácidos, insípidos, principalmente despues de haber comido.—El dia que se come tarde, nada se digiere.

Estómago. —*Erutos, sobre todo despues de comer, lo mas frecuentemente amargos, ácidos ó insípidos.—**Erutos* con sabor de los alimentos. —°Pirosis, acumulacion de agua en la boca, vomituricion y presion en el estómago despues de haber comido la menor cosa.—°Vómitos ácidos de viscosidades, de agua y de alimentos.—°Vómito de sangre.—**Presion en el estómago* y dolores calambroídeos, *sobre todo despues de haber comido*.—Sensacion de excoriacion y presion en el epigastrio, principalmente por la mañana.

Vientre.—Dolores en los hipocondrios.—**Dolores* lancinantes y presivos *en la region hepática*, sobre todo al tacto.—**Dureza é hinchazon del hígado*.—*Hinchazon y dureza del bazo.—**Punzadas en el bazo*.—Dolores cólicos en la region umbilical con horripilacion.—*Fuerte presion como por un cuerpo duro, y plenitud en el vientre*, sobre todo *despues de cada comida*.—**Hinchazon hidrópica* de vientre con padecimientos asmáticos y tos fatigosa.—Hinchazon parcial del vientre, como por una ascitis enquistada.—**Meteorismo excesivo*, como por una especie de timpanitis.—Dureza de vientre como por induracion de las vísceras.—°Cólico con sed inextinguible.—Cólicos excesivamente dolorosos; dolores calambroídeos y constrictivos en el vientre.—Inflamacion y ulceracion de las vísceras abdominales. —Cólicos presivos, lancinantes (por bajo del ombligo), sobre todo andando de prisa.—*Encarcelacion de flatuosidades; que no salen ni por arriba, ni por abajo.—**Cólicos ventosos* en lo profundo del bajo vientre, con contraccion de los intestinos y afluencia de flatuosidades hasta los hipocondrios.—*Salida de vientos fétidos*.—Presion hácia el anillo inguinal, como si fuera á salir una hernia.

Deposiciones.—Deposiciones poco abundantes y evacuándose lentamente.—Evacuacion difícil de deposiciones

Digitized by Google

blandas, como por inactividad de los intestinos.—°Deposiciones frecuentes de la consistencia de papilla, ó espumosas.—*Evacuaciones pútridas ó biliosas.—**Diarreas mucosas, acuosas, amarillentas.*—°*Diarreas despues de haber comido fruta.*—**Deposiciones diarréicas con excrecion de todos los alimentos no digeridos.*—°Diarreas sin dolores, pero con mucha debilidad.—Deposiciones negruzcas.—**Deposiciones blancas*, algunas veces con orinas de color oscuro.—*Las deposiciones diarréicas sobrevienen principalmente *despues de la comida* ó *por la noche.*—°Deposiciones involuntarias, líquidas y amarillentas.—Evacuacion de mucosidades por el recto.—Presion y punzadas en el recto y el ano.—Sangre de los granos hemorroidales.—*Hormigueo en el ano, como por lombrices.—°Salida de las lombrices.

Orinas.—Conato frecuente y casi inútil de orinar, seguido de presion en la vejiga.—Orinas turbias, blanquecinas, con sedimento blanco.—Orinas oscuras, con sedimento color de ladrillo.—Emision lenta de las orinas, con chorro débil y conato frecuente.—Se orina en la cama.—Hematuria.

Partes viriles.—**Excitacion del apetito venéreo, con ideas lascivas*, dia y noche.—Hinchazon en los testículos y del cordon espermático.—Dolores tractivos de los testículos.—*Poluciones frecuentes °y muy fáciles, seguidas de grande debilidad.

Reglas.—**Congestion al útero*, con plenitud y sensacion penosa, como si todo se dirigiese hácia abajo, sobre todo al andar.—*Evacuacion contínua de sangre por la vagina; sale en coágulos.—*Reglas poco abundantes.*—°Induracion dolorosa del cuello de la matriz.—°Durante las reglas, estremecimiento con calambres en el pecho y en el bajo vientre ó congestion á la cabeza, con pulsacion de las carótidas, cara abotagada, ojos prominentes y lagrimosos, movimientos convulsivos de los párpados y pérdida del conocimiento.—**Flores blancas*, especialmente antes de las reglas y á veces *con contraccion calambroidea* del útero, y sensacion penosa como si todo se dirigiese hácia las ingles y hácia el ano.—°Flujo acuoso y sanguinolento por la vagina, con coágulos de sangre ó de un pus fétido, picazon y excoriacion de los muslos.

Laringe.—*Ronquera, palabra confusa y poca voz cuando se*

Digitized by

canta, á causa de mucosidades en la laringe difíciles de desprender.—Punzadas y arañamiento en la laringe.—Pequeña tos seca, como la producida por el vapor del azufre, por la mañana despues de levantarse.—*Tos sofocante nocturna, con dolores* en el pecho y en los omóplatos, *hasta hacer gritar*.—*Tos con expectoracion difícil de °mucosidades viscosas de color claro, conmocion dolorosa en los omóplatos y vómitos de bilis.—**Tos violenta y convulsiva*, algunas veces aun con vomituricion.—*Tos provocada por la risa, por beber, comer, hablar y aun respirando profundamente, así como tambien por el movimiento.—*Expectoracion de mucosidades blanquecinas mezcladas de partículas negruzcas.—**En tosiendo expectoracion con estrías de sangre*.—*Expectoracion de materias purulentas, en tosiendo.—*Durante la tos presion en el pecho y dolores de excoriacion en la laringe.

Pecho.—*Respiracion difícil, y fuerte opresion de pecho, con mucha angustia, como por plenitud del estómago ó como excitada por una conversacion muy prolongada.—*Accesos de sofocacion*, por mucosidades en la laringe, sobre todo por la tarde, y en la noche cuando despierta.—*Respiracion difícil, fácil solamente estando acostado con la cabeza muy alta.—Silbido y gemidos al respirar.—°Respiracion corta, acelerada.—*Presion en el pecho*, á veces como por un cuerpo duro, sobre todo en el esternon, y despues de la comida.—**Punzadas en el pecho*, al toser y al respirar.—*Punzadas en el costado*, con mucho calor, pulso fuerte y duro y mirar fijo.—*Fuerte congestion en el pecho, y violentas palpitaciones de corazon*.

Dorso.—Dolores de contusion en el dorso y en los riñones al menor movimiento.—Dolor de riñones por la noche, estando acostado sobre el dorso.—Dolores pulsativos, lancinantes en el dorso.—*Traspiracion fácil* en el dorso y la nuca al menor movimiento.—Presion entre los omóplatos como por una piedra.—*Dolores dislacerantes, tractivos* y *con estremecimiento* en los riñones, el dorso, los omóplatos y la nuca, con dolores moviendo estas partes, ó provocados por el menor movimiento.—Tension en los músculos de la nuca y del cuello.

Brazos.—*Dolores dislacerantes, paraliticos* y *que producen entumecimiento en los músculos y en los huesos de los brazos, de las manos y de los dedos, provocados por el tacto*.—Ten-

Digitized by Google

sion y debilidad en los brazos y en las manos.—Extension de los brazos con contraccion de los dedos.—Hinchazon, rigidez y dolores de las articulaciones de los dedos.—Uñas azuladas.

Piernas.—*Dolores dislacerantes, paraliticos, con estremecimiento en los músculos, los huesos de las piernas, de los muslos y de las rodillas, de los piés y de los dedos de estos, sobre todo al tacto.*—Adormecimiento fácil de las piernas estando sentado.—*Debilidad y falta de firmeza en la articulacion coxo-femoral, las rodillas y los tobillos, que se doblan andando.*—Hinchazon roja y dura del muslo, dolorosa al tacto.—°*Hinchazon artritica de las rodillas y los piés, con calor y sensibilidad dolorosa al tacto.*—Absceso duro, de color rojo oscuro, en la pantorrilla.—Inquietud en las piernas; no se puede menos de estarlas moviendo constantemente.—*Hinchazon de los piés*, á veces con manchas rojas, dureza, tension y orinas oscuras.—Parálisis de los piés.

59.—CHININUM SULFURICUM.

CHININ.—Sub-sulfato de quinina.—*Jaurna! a'lemand.—Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Duracion de accion*: probablemente tan larga como la de la *quina.*

Compárese con: Ang. arn. ars. bell. bism. cast. cham. chelid. cic. coff. diad. digit. ferr. ign. ipec. mer. mosch. n-mosch. n-vom. op. puls. sulf. tart. veratr.

Antídotos: **Véanse los medicamentos dichos.**

AVISOS CLINICOS.—*Reumatismos agudos?*; Dolores y afecciones artríticas?; *Neuralgias*, especialmente periódicas ó intermitentes?; Síntomas escrofulosos?; *Hemorragias?*; *Espasmos periódicos* de la cabeza, de la cara y de los brazos?; Eclampsia?; *Epilepsia?; Parálisis, Apoplejia*, aun la serosa; Hemiplegia?; Asfixia??; *Debilidad*, sobre todo despues de las enfermedades agudas, de las fiebres, reumatismos?; Debilidad y marasmo de los viejos; *Erisipela?*; Erisipela gangrenosa?; *Hidropesia?*; *Ictericia?; Efectos de la mordedura de la vibora?*; °Ulceras icorosas;—Ulceras por decúbito?; Ulceras carcinomatosas; *Fiebres intermitentes!??*; Fiebre de los niños; *Fiebres otoñales*, con esplenalgia?; *Fiebres intermitentes*, con inflamacion, hidropesías, afeccio-

Digitized by Google

nes hepáticas?; *Fiebres perniciosas*?; Fiebres exantemáticas?; Fiebres héticas?; *Fiebre amarilla*; *Fiebres nerviosas* con eretismo ó adormecimiento; *Fiebres tifoideas* con petequias y afeccion predominante en el sistema cerebral y nervioso; Fiebres lentas?; °*Delirium tremens*?; *Jaquecas*; *Cefalalgia* reumática, periódica, nerviosa ó intermitente?; Hidrocéfalo agudo?; Hemeralopia??; *Prosopalgias intermitentes*?; Afecciones escorbúticas de las encías?; *Anginas*, sobre todo con deglucion difícil, constriccion, hidrofobia?; *Dispepsias* nerviosas ó con marasmo, fiebre hética, etc., ó aun con vomituricion, vómitos, cólicos?; *Cólico flatulento*?; Meteorismo; Deposiciones involuntarias??; Retencion de orina??; Incontinencia de orina; Síntomas de cálculos??; Diabetes?; Metrorragias?; Flores blancas?; Aborto?; Convulsiones de las embarazadas ó durante el parto??; Fiebre puerperal?; Coqueluche???; Croup; Tísis laríngea??; Tos húmeda?; *Tos húmeda* á consecuencia del sarampion?; Tísis mucosa?; Tísis adinámica con expectoracion purulenta abundante, falta de fuerzas, fiebre hácia la tarde y sudores nocturnos?; *Padecimientos asmáticos* sin tos?; Angina de pecho??; Palpitaciones de corazon intermitentes??; Miclitis?; *Marasmo dorsal*, particularmente por pérdidas seminales????; *Parálisis de los miembros* (superiores é inferiores); Ciática??.

SINTOMAS GENERALES.—Obra primeramente sobre el sistema nutritivo, despues sobre los demás; afecta principalmente el canal intestinal, despues el cerebro, los órganos genitales y urinarios; en fin, las extremidades y la piel.—*Dolores presivos*; *punzadas ó dolores incisivos*, dolores pulsativos, tensivos, quemantes y expansivos. —Dolores dislacerantes, tractivos ó con estremecimiento. —*Crujido* en las articulaciones.—*Dolores dislacerantes*, sobre todo en las piernas; estremecientes en los miembros, tractivos en las manos, los piés, la frente, etc.—*Agravacion de los síntomas cada dos dias*, ó bien *todos los dias á la misma hora*.—*Cada dos dias* (entre otros) se presenta: Traccion en la frente con anorexia y deposiciones en forma de papilla; *dolor frontal* por la tarde, ó bien despues de medio dia, y con calor, sed y sudor.—*Crisis nerviosa*; sobreexcitacion nerviosa con ansiedad, laxitud y

Digitized by

tambien síntomas histéricos.—*Espasmos en los miembros*; convulsiones en el lado izquierdo; con vómitos de bílis, diarrea, congestion á la cabeza y cefalalgia excesiva.—*Parálisis*, primero en un solo lado, despues general.—*Laxitud* con bostezo contínuo; *con incapacidad de trabajar* y *horror al trabajo*; con temblor de los miembros; *mucha debilidad y decrepitud.*—*Marasmo*, aun con fiebre hética, anorexia, estreñimiento, vientre tenso, presion en la region umbilical, náuseas, vomituricion y demencia; marasmo é hidropesía.—*Temblor de los miembros*, *particularmente de los piés*, *con endolorimiento* de los maléolos, *temblor con frio general.*

Piel.—*Piel floja* ó muy sensible al tacto.—*Inflamaciones gangrenosas*; *rubicundez lívida de la piel*, con formacion de una membrana gelatinosa ó de costras superficiales.—*Formacion de una costra espesa*, *lívida y húmeda*, que se ennegrece y seca, con bordes primero rojos y exudantes, despues amarillos y que se reblandecen.

Sueño.—Bostezos frecuentes, sobre todo por la tarde; ó bien con pandiculaciones, calofrios, opresion, brazos como contusos, dolor en el dorso y sensibilidad de las vértebras cervicales y torácicas á la presion.—Gana de dormir por el dia.—*Sueño profundo y no reparador*, *agitado* con *sudores debilitantes*, agitacion y ensueños extraordinarios.—*Por la noche en la cama*, *mucho calor*, con sed excesiva, dolor de cabeza y tintineo en los oidos; *insomnio*, á veces con *sudor abundante*, ó bien con calor seco, picazon en la piel y sudor en la cara.

Síntomas febriles.—*Frialdad de los miembros*, á veces *con temblor*, sensacion de frio con temblor interior, cara pálida, necesidad de orinar y orinas pálidas por la tarde.—*Calofrios*, aun en un tiempo cálido; calofrios temblorosos por la tarde, con calor en la cara, y orina espasmódica que deposita cristales; calofrio por la tarde, con pulso acelerado, frecuente; sequedad de la boca, sed, sueño agitado y depósito de color de ladrillo en las orinas.—*Accesos febriles*, con vértigos, deslumbramiento, dolor frontal, amargor del pan, náuseas, vómitos, diarrea, cólicos, calofrios violentos, mucho calor, bostezos, estornudo y sudor abundante.—Accesos violentos, con *calofrio tembloroso*, *sudores abundantes*, hemorragias y dolores en el hipocondrio izquierdo.—Accesos de una hora

Digitized by

de duracion, compuestos de palidez, calofrios y horripilacion, con labios y uñas azuladas, y pulso frecuente y contraido; despues calor general con rubicundez de la cara, pulso mas desenvuelto (que lo que estaba), sed, y en fin, sudor ligero.—*Durante los calofrios*, palidez de la cara, cefalalgia, retintin en los oidos, sed, apetito aumentado, deposiciones difíciles, dolorosas, y mucho abatimiento moral.—Calor exterior con sequedad de la boca y la faringe, constipacion tenaz y disposicion á caer andando por la calle, ó bien con sudor en el pecho; rubicundez de la cara, movimientos convulsivos de los músculos y pulso frecuente.—*Calor que pasa á sudor*, principalmente por la tarde.—*Pulso* lento, sobre todo despues de medio dia, ó en los ataques periódicos; *pulso lleno* ó pequeño, pero blando y lento; *pulso frecuente como los latidos del corazon*; *pulso acelerado*, especialmente por la mañana ó una hora despues de comer (es decir despues de comer á medio dia, como se tiene de costumbre en Alemania, donde ha sido estudiado este medicamento).—*Sudores* fáciles de provocar, viscosos, que corren á chorro por el pecho, debilitantes, con cansancio inmediatamente despues de cada esfuerzo.

Moral.—Ansiedad por accesos, *excesiva angustia*, á veces por la mañana en la cama que obliga á levantarse mas pronto de lo que se quiere;—ó bien despues de media noche, con gritos y necesidad de levantarse.—Mucho abatimiento moral, melancolía taciturna, desaliento, gana de llorar y desesperacion.—Tristeza y mal humor con bostezos y horror al trabajo.—Excesiva pereza con laxitud.—Excitacion como si hubiese tomado café ó vino.—Mucha alegría.

Sensorio.—*Inteligencia débil*, con debilidad que hace caer, mucho calor en la piel, sequedad de la boca y garganta y constipacion.—Incapacidad de pronunciar los sustantivos y reflexion lenta.—*Sensacion como de vacio en la cabeza*, con calor en la cara, sed ó retintin en los oidos;—atontamiento de cabeza, con zumbido interior ó con embriaguez y pesadez;—estupor con cefalalgia en el lado izquierdo de la frente;—dolor intolerable en la cabeza, que casi impide el andar, con imposibilidad de dirigir los miembros á su voluntad.—*Delirios.—Fuerte exaltacion y especie de demencia.—Vértigos* al bajar la cabeza;

Digitized by Google

—*vértigos* rotatorios;—*vértigos* como si la cabeza cayese hácia atrás, agravados por el movimiento, aliviados acostándose;—vértigos como por embriaguez con zumbido de oidos, calor en la piel y pulso acelerado;—vértigos con cefalalgia y aturdimiento.

Cabeza.—*Cefalalgia*: sobre todo por la tarde, ó bien andando al sol;—*cefalalgia* con laxitud, bostezo, gana de dormir y mal humor, dolor sordo, con sordera, angustia, sudor, temblor de los miembros, pulso lento; *cefalalgia*, especialmente del lado izquierdo, con pulsacion de las arterias temporales, mucha excitacion física, cara pálida, sed violenta, náuseas, debilidad de los piés y sudor general;—*cefalalgia* en la sien izquierda con necesidad de acostarse y mejoría en apoyando la cabeza en sitios frescos.—*Cefalalgia frontal*: por la mañana al despertarse, y especialmente por la tarde;—*cefalalgia* despues de medio dia con pesadez de cabeza y calor en la cara; *cefalalgia con retintin en los oidos y calor general* ó bien cefalalgia del *lado izquierdo* con *vértigos*, apetito aumentado, sed, erutos, náuseas, flatuosidades y extremada laxitud;—*cefalalgia* con dolor en la frente y sienes, con pulsacion de las arterias temporales, calor en la cabeza, retintin de oidos, sed frecuente, orinas abundantes, ansiedad y mucha laxitud.—*Presion en la cabeza*; *presion* en el occipucio, al despertar por la noche y desapareciendo al levantarse; *presion* en la frente y en las órbitas, agravada al mover la cabeza ó los ojos; desde por la mañana hasta por la tarde con calor en la frente.—*Dolor expansivo*, sobre todo en la region temporal, agravado por el movimiento y al aire libre, así como por la noche con sueño inquieto.—*Pulsacion en la cabeza*.—*Ebullicion hácia la cabeza*, por la tarde, sobre todo con pulsacion de las arterias, dolor como si la cabeza fuese á estallar, calor en la cara, vértigos, retintin y zumbido en los oidos, dureza de oido, chispas delante de los ojos, pulso acelerado y frecuente, sueño agitado, lleno de ensueños, y expulsion frecuente de gases por la parte superior é inferior.—Sensibilidad de la piel del cráneo.

Ojos.—Sensibilidad de los ojos con lagrimeo.—*Vista turbia como por una niebla*, con sequedad de los ojos.—Chispas delante de los ojos; *manchas negras*, y á veces solo se ven los objetos de un lado; *oscurecimiento de la vista*, so-

Digitized by Google

bre todo al fijarla en un objeto;—Amaurosis pasajera.

Oidos.—*Retintin en los oidos; zumbido*, sobre todo en el *oido izquierdo*, á veces hasta la sordera en este lado; *dureza de oido*, á veces con dolor de cabeza violento.

Nariz.—Epistaxis;—estornudos frecuentes.

Cara.—*Color pálido, mal semblante; aspecto como de padecer*, con ojos hundidos,—*Cara térrea*, con la esclerótica empañada y ojos tiernos.—Color ictérico.—Rubicundez de la cara, á veces con calor alrededor de los ojos y lagrimeo á la impresion de la luz.—Calor en la cara, en particular por la tarde, ó bien como despues de haber tomado café.—*Labios azulados*; erupcion en el labio superior.

Boca.—*Sequedad*: con calor, sed, mal olor de la boca y sensacion de constriccion en el esófago;—*sequedad* de la boca y faringe con estreñimiento é inteligencia débil.—*Sequedad* con mucha palidez de la mucosa de la cavidad bucal; erosion de las encías y paredes de la boca, con dolor violento y costras gangrenosas.—*Acumulacion de mucosidades en la boca*, con angina nocturna; *acumulacion de mucosidades* con secrecion salival aumentada; salivacion.—*Lengua cubierta de mucosidades blancas*, amarillas en el fondo.—*Lengua cubierta de una capa espesa de un blanco amarillo*;—*ó cubierta de una capa amarillenta sobre todo en la base*, ó bien con lengua seca.

Garganta.—*Dolores en la faringe deglutiendo*, por la mañana al levantarse; *dolores en la faringe* en tragando y moviendo el cuello, violentos por la mañana; *dolores en la faringe* con cosquilleo en este órgano y la laringe; *picor en la garganta*, algunas veces con latidos, ó bien con voz ronca (despues de medio dia); sensacion de sequedad al principio de la tráquea-arteria, con sensacion como si hubiese un cuerpo extraño; sensacion de ardor en la garganta.—Acumulacion de *mucosidades viscosas en la faringe*, particularmente por la noche, que hace despertar y *obliga á toser*.

Apetito y gusto.—*Gusto amargo*, algunas veces con *la lengua en su estado natural*; *gusto* pastoso, soso; de tierra, empireumático.—El *pan* parece que tiene un sabor amargo.—*Falta de apetito*, algunas veces, por muchos dias; indiferencia por los alimentos y bebidas; anorexia con hambre muy pronunciada.—*Mucho apetito con gusto des-*

Digitized by Google

agradable de los alimentos, ó bien con *sed excesiva* (algunas veces, sobre todo por la tarde).—*Hambre con abatimiento*, como por estar en *ayunas*, con buen apetito ó anorexia; *hambre excesiva*, algunas veces *despues de una comida abundante*, cambiándose en *desabrimiento y náuseas*; hambre despues de cenar, acompañada de náuseas, *bulimia*, algunas veces por la noche.

Síntomas gástricos.—*Erutos* despues de la *comida*, con presion en el vientre y estómago, y opresion en el pecho; *erutos secos*, á veces con náuseas; *erutos* amargos, —Hipo y vomituricion.—*Náuseas con erutos* (secos ó amargos); ruidos en el vientre y emision de gases; despues de la comida, náuseas con erutos violentos.—*Disgusto con dolores de cabeza*; disgusto antes de la comida; *disgusto* con náuseas, vómitos, cefalalgia, insomnio, *bulimia nocturna*, *apetito disminuido*, lengua súcia, amarillenta y seca; *disgusto despues de la comida*, con vómitos y amargor creciente de la boca; náuseas con gana de vomitar.—*Vómitos:* durante una fiebre intermitente; *vómitos* con presion en el estómago, con disgusto, *desgana*, *pirosis*, *sensacion de constriccion en el estómago y entumescencia de vientre que dura muchos dias*; vómitos insulsos despues de medio dia.

Estómago.—Plenitud del estómago y tension de vientre.—*Presion en el estómago*: con vomituricion, borborigmos en el vientre y deposiciones líquidas; presion con plenitud *despues de tomar alimento*, *aun el mas ligero*, que fatiga por la noche, *en la boca del estómago*, *con disminucion del apetito.—Cardialgia* (calambres en el estómago), algunas veces con *gana de vomitar*.—Dolor tirante en el esófago con borborigmos en el vientre y emision de gases.—*Sensacion de calor en la boca del estómago y la region precordial* hasta en el duodeno, con erutos en seco, *ardor en el estómago partiendo del cárdias y extendiéndose hasta el vientre y el pecho.*

Hipocondrios.—En los *hipocondrios*: tension, presion en la region epigástrica.—En la *region hepática*: dolores algunas veces y con particularidad por la tarde; en la *region hepática*, *presion* aliviada por decúbito del mismo lado, sensacion como de ulceracion subcutánea; en dicha region, *hinchazon*.—En la *region esplénica*: dolor sordo que se disipa por decúbito del mismo lado; en la *re-*

Digitized by Google

gion esplénica, *dolor presivo*, tension que obliga á aflojar los vestidos (algunas veces en los dos hipocondrios); en *dicha region, punzadas*, *hinchazon* con punzadas dolorosas al andar y en apoyándose sobre estas partes.—*Hinchazon y dureza* de las regiones *esplénica y hepática* con *punzadas* sobre todo en respirando profundamente, en estornudando, etc.

Vientre.—Dolores en la parte superior del vientre, desde la region epigástrica hasta el ombligo, agravados con la presion; en la misma region cólicos violentos, cólicos por la mañana hácia la region del estómago; dolor de dislaceracion en el vientre, con pulso frecuente, pequeño y acelerado.—*Retortijones en la parte superior del vientre*: sin evacuacion, algunas veces con *mucha laxitud en la parte superior y en la region umbilical*, y algunas veces por la tarde con ventosidades y ruidos en el vientre, *retortijones con deposiciones diarréicas fétidas, en forma de papilla y emision de vientos fétidos* algunas veces, y sobre todo por la mañana al levantarse.—*Timpanitis*, á veces con tension, erutos y expulsion de gases.—*Tension del vientre* con *dolor á la presion*, algunas veces y sobre todo por la tarde con desarrollo de flatuosidades, ó bien con emision de gases fétidos.—**Cólicos flatulentos*, °timpanitis.—*Ruidos en el vientre*, como por una diarrea, con emision de gases, muchos ruidos en la region epigástrica con vientre timpanítico, borborigmos y emision de gases.—*Inflamacion* de larga duracion de la *membrana mucosa de los intestinos*.—*Tisis intestinal*, con náuseas, vomituricion, falta de apetito, vientre tenso, presion permanente en la region umbilical, constipacion, enflaquecimiento, fiebre hética y enajenacion.

Deposiciones y ano.—*Constipacion tenaz*, con mucho calor en la piel, sequedad de la boca y el paladar, debilidad de cabeza, con desvanecimientos momentáneos, alternando con deposiciones frecuentes, blancas y en forma de papilla.—*Deposiciones duras*, escasas, perezosas, algunas veces *trabadas*; deposiciones blandas, difíciles de evacuar, á veces *con necesidad* ó bien con sensacion como si un objeto ascendiese desde la mano hasta la espalda.—*Necesidad* de deponer, á veces sin efecto, ó bien con dolores cólicos y seguida de una evacuacion.—Evacuacion abundante, *blanda*; á veces con borborigmos y

Digitized by Google

emision abundante de gases; evacuacion abundante en forma de *papilla, diarréica, con dolores cólicos*, algunas veces *con emision de gases abundantes*, ó bien (por la mañana despues de levantarse), con *deposicion fétida*.—Varias deposiciones durante la mañana; *diarreas*, á veces con tirones y dolores incisivos en los intestinos delgados.—*Debilidad de los intestinos*, con *estado natural de las primeras vias*.—*En el ano* sensacion de calor irradiándose en la extension de los intestinos.—*Agravacion de los padecimientos hemorroidales*, prurito en el recto y tenesmo; con hemorragia de sangre arterial por el ano, ó con flujo de sangre por el recto (rectorragia).

Vías urinarias.—*Necesidad* de orinar con emision abundante de una *orina* como agua.—*Aumento en la secrecion y emision de la orina.—Orina saturada, que deposita concreciones cristalinas; orina*, como suero, pálida, clara, con necesidad frecuente; *orina precedida de meteorismo, con respiracion difícil*, en los hidrópicos; *orina abundante, saturada, turbia* ó de un *olor muy fuerte*.—Disminucion de las *orinas*, algunas veces saturadas y con cristalizaciones.—*Orina turbia*, roja, ó de un olor subido, que se enturbia prontamente, con copos mucosos *volviéndose jumentosa* con sedimento amarillo, arenoso y color arcilloso y graso; *orina turbia descomponiéndose fácilmente*, con cristales.—*Orina acuosa* (spástica), algunas veces con concreciones cristalinas.—*Orina espumosa*, con sedimento fino, blanco-amarillento al enfriarse.—*Sedimento* blanco-amarillento, de un olor fuerte, color arcilloso, de una orina clara como agua; *sedimento* amarillo-rojizo en las orinas abundantes, orina fuerte, y color de ladrillo.—Arenillas.—*Cristales en las orinas* con abundante sedimento amarillento; orina clara como agua, con sedimento color de arcilla, proveniendo de la misma orina acuosa; ó con sedimento amarillo, rojizo y orinas mas abundantes; *cristales en las orinas* saturadas y raras.—Despues de orinar, por la tarde, escozor contractivo en el orificio de la uretra.

Partes genitales.—Apetito venéreo, suprimido y disminuido.—*Presion* dolorosa *extendiéndose hácia las ingles.—Reglas* muy abundantes.—*Durante las reglas*, encogimiento y apretamiento en el vientre, elevándose desde el ombligo hasta el pecho, con presion extendiéndose

Digitized by

hasta los anillos.—Flujo de sangre por la vagina con ardor y turgencia de esta parte á la salida de la leucorrea durante el período menstrual.

Laringe.—*Ronquera* todos los dias despues de mediodia (á las 4) con constriccion, ó bien hinchazon que oprime la garganta, irritacion que hace toser, *dificultad de la respiracion*, dolor en la frente, calor en la cabeza, pulso acelerado, frecuente, blando, presion en el alto vientre, y sobre todo en el hipocondrio izquierdo, emision de gases fétidos, orina saturada que forma cristales, y dolor de las vértebras pectorales, apoyándose sobre ellas. —*Irritacion en la garganta que hace toser*, algunas veces con expectoracion difícil; *irritacion en la garganta con tos fuerte* todo el dia, ó bien por la tarde, dificultad de arrancar dia y noche; *irritacion en la garganta con* tusiculacion seca; con tos gruesa; con expectoracion de mucosidades gelatinosas tosiendo.

Pecho.—Respiracion corta y oprimida en haciendo mucho ejercicio; con *opresion de pecho*; con respiracion difícil, y con meteorismo, desapareciendo rápidamente despues de orinar.—*Accesos de sofocacion* nocturna (angina œdemat. lymph.), *hácia media noche*, con *hinchazon de la garganta*, *que está casi cerrada*, *respiracion difícil*, *ruidosa*, *jadeante*, sudor por todo el cuerpo, con calofrio general (*sobre todo en el dorso*), pulso lento, pequeño, blando; dolor á la presion sobre las vértebras pectorales; *accesos de sofocacion* con acumulacion de mucosidades en la boca; y tambien con hambre excesiva que obliga á comer; *accesos de sofocacion* con emision abundante de gases; con sueño tranquilo despues del acceso, y disposicion á la reaparicion de los síntomas por una tos sostenida.—*Dolores en el pecho*, en el costado derecho toda la mañana, dolores transversalmente en el pecho.—*Presion en el costado izquierdo del pecho*, dolorosa sobre todo respirando profundamente, y llevando los brazos hácia atrás, mejorándose apoyando el brazo y encorvándose.—Sensacion como si estuvieran cogiéndole con una mano detrás del esternon.—*Punzadas en el pecho*: hácia el corazon, inmediatamente despues de comer; *punzadas en el costado izquierdo del pecho* con imposibilidad de respirar profundamente; *punzadas* que parece quieren salir los pulmones, sobre todo estando acostado ó sentado, se disipan

Digitized by Google

andando ó estando en pié; *punzadas* en el costado derecho del pecho, dolor que corre hasta la espalda cortando la respiracion, y aliviado echándose hácia adelante, ó con dolores lancinantes debajo del esternon, respirando profundamente y por movimientos rápidos.—Palpitaciones de corazon.—Al *exterior* del pecho, punzadas como de picotazos en la piel (algunas veces por la tarde en el dorso y en los muslos), en saliendo al aire libre, seguidos de traspiracion en el pecho y el dorso.

Dorso.—Riñones.—Extremidades.—*Sensibilidad dolorosa en las vértebras dorsales, apoyándose sobre ellas*, sobre todo durante el *calofrio de la fiebre.*—En el *cuello*, dolor á los lados de los nervios yugulares, dirigiéndose hácia la laringe, con sensibilidad á la presion; en el cuello hinchazon indolente.—En el *brazo* sensacion despues de cada deposicion, como si corriesen dos gotas desde la mano hasta el sobaco.—°Parálisis de las extremidades superiores; ¯parálisis de estas extremidades con crujido de la articulacion escápulo-humeral; así como con dolor de dislaceracion y tirones en las manos.—Parálisis de las *extremidades inferiores*; parálisis con ¯dolores dislacerantes en las piernas; y con sensibilidad dolorosa en los maléolos y temblor de los miembros; así como con hinchazon edematosa de los piés.

60.—CHLORUM.

CHLOR.—Cloro.—Archivos de Stapf.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.

ANTÍDOTOS: Contra los *efectos tóxicos* de este medicamento la clara de huevo?, la leche?, la harina?, la magnesia?, creta?, vapores de alcohol?, el alcohol?, el alcohol tomado con azúcar?, *hidrógeno sulfuroso atenuado.*—*Sirve de antídoto* contra el ácido hidrociánico y los hidrosulfatos de sustancias amoniacales.

GENERALIDADES.—*Parece ejercer una accion particular sobre el sistema de las membranas mucosas.*—En las personas habituadas á los vapores del cloro, los efectos de esta sustancia consisten en debilidad y en la desaparicion del tejido adiposo.—Entorpecimiento de los miembros.—Temblor.—Flojedad.—*Ganas de estar acostado.*—Debilidad en las extremidades inferiores.—*Al aire libre:* lagrimeo; mejoría de los padecimientos del pecho, y del

Digitized by

despeluzamiento, así como de la fiebre, paseando.—Horripilaciones mas fuertes al sol.—*Por la mañana*: al despertar hácia las tres de la mañana angustia; gusto en la boca, como en la fiebre; debilidad en el vientre, diarrea, estornudos, lagrimeo, rigidez de los miembros; dificultad para levantarse, humor irascible.—*Despues de mediodia*: Flujo por la nariz: mas indispuesto despues de la comida.—*Por la tarde*: menos apetito; coriza rápido; ataque de tos; horripilacion; despeluzamiento.—El cloro parece hacer efecto con mas prontitud cuando es tomado por la tarde.

Piel.—La piel de la nariz está como excoriada.—Aplicado el cloro sobre la piel, produce una sensacion semejante á la picadura de los insectos, con traspiracion abuntante, congestion de sangre á la piel, y una erupcion de pequeñas nudosidades y de vesículas.—Produce erupciones herpéticas y sudores críticos.—°Sarna y herpes.—°Ulceras fétidas y carcinomatosas.

Sueño.—Sueño tardío los primeros dias despues de cada excitacion de espíritu; despues, sueño por la tarde temprano.—Por la mañana, dificultad de levantarse y mal humor.—En despertando por la mañana, hácia las tres ó las cuatro, sensacion como si fuera á declararse una grave enfermedad.

Fiebre.—*Calofrios*, *horripilacion y tirita* por la tarde, estando en habitacion caliente.—Horripilacion por la mañana, mas fuerte en el dorso y *aumentada al sol.*—Fiebre por la mañana, desde las diez hasta las dos de la tarde; horripilacion fria en la parte anterior del brazo, del dorso y de los muslos, con vista turbia y dolor de cabeza antes del acceso; despues de la comida, aumento del calor y malestar, que obliga á acostarse, aunque el *paseo en la habitacion produce alivio mas tarde.*—Calor durante y despues de comer, con humor muy irascible.—Calor en el estómago y en las vías aéreas.—Fiebre y catarro del cerebro.—Se efectúa crisis por el sudor.—°Tifus?, °fiebre escarlata?, °mejorados los tísicos por los sudores.

Moral.—Moral muy abatida, hasta el punto de temer volverse loco y no poder ocuparse de sus negocios; todo parece confuso, con imposibilidad de acordarse de nada.—Gran dificultad para acordarse del nombre de las personas que ve, ó bien recordarse de ellas oyendo sus

Digitized by

nombres.—Accesos de mucha angustia.—Muy mal humor y gran irascibilidad, sobre todo por la mañana.

Cabeza.—Vértigos y aturdimiento.—*Sensacion dolorosa y fatigosa en el vértice y á lo largo del lado izquierdo de la cabeza, con necesidad de acostarse.*—Dolor de cabeza con romadizo; horripilacion, y despues de la comida.

Ojos.—*Lagrimeo, sobre todo al aire libre, por la mañana* al despertar y durante el reuma.—Ojos prominentes.—Vista turbia durante la fiebre.

Oidos.—Zumbido en los oidos.

Nariz.—Sensibilidad de la membrana mucosa de la nariz.—Sensacion como si los ángulos de la nariz estuvieran excoriados.—Secrecion de un agua corrosiva por la nariz.—*Sequedad de la nariz*, ó sensacion de una sequedad que ahoga; con excitacion en la laringe al toser, *transformándose mas tarde en coriza.—Coriza violento* con afeccion muy considerable de la membrana mucosa de la nariz y de la boca.—Derrame por la ventanilla nasal derecha, con obturacion de la izquierda.—Por la tarde, repentinamente, derrame de serosidades corrosivas por la nariz, con obturacion de la misma, lagrimeo y sequedad de la lengua, del paladar y de la parte posterior de la faringe.—Por la mañana violentos estornudos, despues coriza por la tarde.—A las 24 horas, el coriza se transforma en secrecion de un moco amarillo, como el de un reuma cocido ó hecho.

Cara.—Color de la cara rosado subido.—Cara tumefacta.

Dientes.—Sensacion de plenitud en los dientes.

Boca y garganta.—Membrana mucosa de la boca fuertemente afectada.—Excoriacion y pequeñas úlceras en la boca, la garganta, y la faringe, con rubicundez.—Imposibilidad de tragar.—¿Ulceras pútridas en la garganta?, anginas malignas?.—Sequedad de la boca, la lengua, el paladar y la garganta, sin sed; muchas flemas en la boca.—Salivacion.

Apetito y gusto.—Deseo por el vino, aumentado.—El humo del tabaco repugna y causa una sensacion picante en la lengua y de sequedad en la garganta.—Vómitos de materias moreno-verdosas, gritos y muerte (en los perros).

Estómago.—Obra sobre la membrana mucosa del estómago como un excitante.—Acidez de estómago en los

Digitized by

que trabajan en el cloro.—Despues de la muerte, la membrana mucosa del estómago es de un rojo oscuro como cereza; *en el píloro, manchas negras* con costras ó agujeros; *úlceras en el fondo del estómago con borde amarillento.*

Vientre.—Debilidad en el vientre por la mañana.—°Afecciones no inflamatorias del hígado?—Despues de la muerte, capa espesa y amarilla (de bílis) en el *duodeno* y *yeyuno.*—La calidad de la bílis se halla alterada.

Deposiciones.—*Deposiciones diarréicas*, sobre todo por la mañana.

Orinas.—Gana frecuente de orinar.—Orinas mas abundantes.

Partes genitales.—Impotencia súbita, igualmente repugnancia completa á todo placer sexual; las mas fuertes excitaciones dejan frio (despues cesa totalmente la causa ocasionada por *licop.*, lo que prueba cuán absurdo era querer negar la accion del licopodio, como ciertos críticos tuvieron la arrogancia de hacerlo. *Nota del doctor Hering*). —°Sífilis?.

Laringe y tos.—*Accesos de sofocacion y tos*, seguidos á veces de un *reuma tenaz.*—Irritacion violenta en la laringe, la tráquea-arteria y los bronquios, con opresion y presion en el pecho, imposibilidad de tragar, sensacion de un excesivo alivio al aire libre (sin embargo de no disminuir la opresion y la constriccion), mucha angustia que no permite pronunciar mas que palabras entrecortadas, respiracion difícil, excesiva afeccion de la membrana mucosa de la nariz y de la boca, acumulacion de mucosidades en la boca, *coriza violenta*, cara abotagada, ojos prominentes, tos espasmódica (aliviada respirando *ácido hidrosulfúrico*).—Sensacion de estrangulacion y de constriccion de pecho (respirando el cloro).—Inflamacion de la membrana mucosa de los bronquios.—Cuando se respira en gran cantidad, *produce la hemoptisis*, *la tisis* y la muerte; en menor cantidad produce la tos y opresion, ó bien una sensacion de calor en las vías aéreas y expectoracion mas fácil.—Espasmo en la glotis.

Pecho.—*Opresion en el pecho*, dificultad de la respiracion, *constriccion* y *accesos de sofocacion*, á veces con tos violenta.—Despues de la muerte, el corazon se halla lleno

Digitized by Google

de sangre venosa, las pleuras cubiertas de falsas membranas y conteniendo serosidades rojizas.

Tronco.—Movimientos convulsivos violentos del cuello y de la columna vertebral, tirando la cabeza hácia atrás. —Por la mañana menos rigidez en el dorso, como otras veces, mas tirantez en todos los miembros.

Extremidades inferiores.—Debilidad en los muslos.

61.—CICUTA.

CIC.—Cicuta acuática.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 4 y 5 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Arn. tabac. (en caso de envenenamiento).—*La cicuta es antídoto de* Op.

COMPÁRESE CON: Arn. con. lyc. merc. op. puls. thui. sil. veratr.—Cuando la cicuta será eficaz, siempre que se halle indicada, será sobre todo despues de *lach.*

CLINICA.—Guiándose por el *cuadro de síntomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra: — Convulsiones, espasmos histéricos, epilepsia, eclampsia, catalepsia, tétanos, trismus y *otras afecciones espasmódicas*, sobre todo en las mujeres y niños, ó *por abuso del opio*; Funestos resultados de la introduccion de cuerpos extraños (una espina, etc.) en las partes blandas; *Herpes húmedos y costrosos*; Congestion y otras *afecciones cerebrales*, aun á consecuencia de conmocion del cerebro; Tiña; Ambliopia amaurótica, con afeccion cerebral; Hemorragia de los oidos; Dureza de oido; Ozena?; Herpes faciales; Costra láctea?; Cáncer de los labios?; Ulceras en la boca (despues del uso de *laches.*); Trismus; Tartamudez?; Afecciones gástricas; Afecciones verminosas con convulsiones; Parálisis de la vejiga?; Convulsiones de las parturientas; Calambres de pecho, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores de excoriacion ó como si se hubiese recibido golpes* en varias partes.—**Temblor de los miembros.*—*Sacudidas como por chispas eléctricas en la cabeza, los brazos y las piernas.—*Contorsiones calambroídeas y estremecimiento de los miembros.—**Con-*

Digitized by

vulsiones generales y ataques de epilépsia, algunas veces con gritos, *palidez ó color amarillo de la cara*, *apretamiento de las mandíbulas*, aturdimiento y distorsion de los miembros, suspension de la respiracion y espuma en la boca; despues de los accesos, el cuerpo queda insensible y como muerto.—Estado de insensibilidad y de inmovilidad, con pérdida del conocimiento y de las fuerzas.—*Ataque de catalepsia, con relajacion de todos los músculos y falta de la respiracion.—**Tétanos*.—*Dolores tractivos en los miembros.

Piel.—Comezon quemante por todo el cuerpo.—**Erupciones purulentas*, con costras amarillentas y quemantes.—Granos lenticulares de un rojo oscuro.—Prurito quemante por todo el cuerpo.

Sueño.—Insomnio y sudor nocturno.—*Estando casi dormido, movimientos inquietos y ensueños confusos.—Se despierta con frecuencia, con sudor abundante, pero que alivia.—Ensueños vivos de los acontecimientos del dia.

Fiebre.—*Calofrios, y deseo de estar continuamente cerca del fuego*.—Frio en los muslos y en los brazos, con mirada fija.

Moral.—Ansiedad y mucha facilidad á afectarse vivamente oyendo referir cosas tristes.—Gemidos, quejas y fuertes quejidos.—Disgusto y mal humor.—Sospechas y desconfianza con misantropía.—Propension á espantarse.—Manía con bailes, risas y gestos ridículos.—*Demencia*.—Aturdimiento y falta de comprension.

Cabeza.—*Vértigos* y vacilacion *hasta el punto de caer*.—°Vértigos rotatorios al incorporarse en la cama, con oscurecimiento de la vista.—Embriaguez.—Cefalalgia supra-orbitaria.—*Accesos de cefalalgia semilateral*, con náuseas.—Pesadez de la cabeza, con aturdimiento.—Presion en la frente con estupefaccion.—Disminucion de los dolores de cabeza, poniéndose derecho ó expeliendo gases.—°Dolor de cabeza, como por conmocion del cerebro.—**Erupciones supurantes en la piel del cráneo*, con dolores quemantes.—Estremecimientos y sacudidas espasmódicas en la cabeza, la que se dobla hácia atrás.

Ojos.—Dolor quemante en los ojos.—*Pupilas, ó muy contraidas, ó muy dilatadas.—**Pérdida momentánea de la vista, con vértigos al andar*.—*Mirar fijo*, á veces con cierta especie de estupidez.—°Todos los objetos vacilan delante

Digitized by

de la vista.—°Todos los caractéres están en movimiento cuando se lee.—°*Diplopia ú oscurecimiento de la vista*, algunas veces alternando con dureza de oido.—Círculo luminoso y de color alrededor de todos los objetos que se miran.—°Fotofobia.—°Aglutinacion nocturna de los párpados.

Oidos.—Sensacion de excoriacion y dolor de contusion detrás de las orejas.—°*Erupciones purulentas delante, detrás y sobre las orejas.*—Flujo de sangre por los oídos.—Audicion confusa, que algunas veces alterna con oscurecimiento de la vista.

Nariz.—Dolores de excoriacion y de contusion en el ala de la nariz.—°*Costras en las ventanillas nasales.*—Flujo amarillo por la nariz.—Obturacion de la nariz, con secrecion abundante de mucosidades.

Cara.—*Palidez* y frio *en la cara*, con las manos frias.—Mejillas pálidas, con ojeras y ojos abatidos.—Rubicundez é hinchazon de la cara y del cuello.—°*Erupcion en la cara, confluente, purulenta* y de un rojo oscuro, con granos lenticulares sobre la frente.—Costras quemantes con serosidades amarillentas en el labio superior, las mejillas y la barba.—*Ulcera dolorosa en los labios.*—Hinchazon dolorosa de las glándulas submaxilares.—°*Trismus.*—°Disposicion á rechinar los dientes.

Boca y garganta.—*Espuma fuera y dentro de la boca.*—Pústulas blanquecinas, dolorosas al tacto, y *úlceras en el borde de la lengua.*—Palabra difícil, con movimientos convulsivos de la cabeza y de los brazos á cada palabra que se pronuncia.—Mutismo.—Imposibilidad de tragar, la garganta está como cerrada.

Apetito.—Falta de apetito á causa de una sensacion de sequedad en la boca.—°Saciedad y presion en el estómago, desde el primer bocado.—*Mucho deseo de comer carbon.—Sed ardiente*, sobre todo durante los calambres.—Despues de haber comido, cólicos, retortijones, presion en el epigastrio y gana de dormir.

Estómago.—Hipo violento y ruidoso.—Regurgitacion amarga y amarillenta, bajándose, y seguida de una sensacion quemante en la garganta.—Náuseas por la mañana y durante la comida, algunas veces con dolor de cabeza.—Vómitos de sangre.—Vómitos alternando con espasmos tónicos en los músculos del pecho y movi-

Digitized by Google

mientos convulsivos de los ojos.—Presion quemante en el estómago.—Dolores pulsativos en el epigastrio, el que se halla muy meteorizado.—*Opresion y ansiedad en la region epigástrica.*

Vientre.—°*Cólicos con convulsiones*, como por lombrices.—*Dolores cólicos inmediatamente despues do la comida*, con gana de dormir.—°Pellizcos y borborigmos en el vientre.—Acumulacion de flatuosidades con angustia y mal humor.—Dolor de ulceracion en las ingles.

Deposiciones y orinas.—Estreñimiento.—*Deposiciones líquidas y muy frecuentes.*—Retencion de orinas.—*Necesidad frecuente de orinar.*—Orinas involuntarias como por parálisis de la vejiga.

Pecho.—Ronquera.—**Respiracion dificil* y falta de aliento.—Tos con expectoracion abundante.—Presion sobre el pecho, como por un peso, con respiracion oprimida.—*Espasmos tónicos en los músculos del pecho, que alternan con vómitos.—Calor en el pecho.—Dolor de contusion y de excoriacion en la extremidad inferior del esternon.—Dolor de quemadura en los pezones.

Dorso.—*Emprostótonos.*—Tension por encima de los omóplatos.—Dolor de ulceracion en los omóplatos.—*Tension como por una llaga en los músculos del cuello*, volviendo la cabeza hácia atrás.—°Hinchazon del cuello.

Brazos.—Dolor de contusion ó de excoriacion en las articulaciones de la espalda y en los antebrazos.—Sensacion de pesadez y falta de fuerza en los brazos.—**Estremecimientos y movimientos convulsivos en los brazos y en los dedos.*—Dedos como muertos.

Piernas.—*Estremecimientos involuntarios de los miembros inferiores.*—Rigidez dolorosa de las piernas.—Temblor en las piernas.—Se doblan los piés andando.

62.—CIMICIFUGA RACEMOSA.

CIMIC.—Yerba de San Cristóbal en racimos.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Ha sido usada con feliz éxito en las afecciones siguientes: *Convulsiones epileptiformes*, durante ó poco antes de la aparicion de las reglas.—*Corea*, agravada por el período

Digitized by Google

menstrual, y afectando principalmente el costado izquierdo.—*Ninfomanía* y otras *alteraciones mentales*, con fuerte sobreexcitacion del sistema nervioso y del moral.—*Meningitis cérebro-espinal*, con violenta cefalalgia, como si una cuña estuviese atravesada, á cada pulsacion del corazon, desde la nuca hasta el vértice de la cabeza, con el dorso embarazado, espasmos clónicos y tónicos, dolores violentos en el globo del ojo y lengua engrosada.—*Prosopalgia*, sobre todo cuando al mismo tiempo hay afeccion de los ovarios.—En la *tisis tuberculosa*, contra las congestiones é inflamaciones pulmonares, por consecuencia de un resfriamiento, con tos seca y fatigosa; así como contra la diarrea y los sudores nocturnos.—*Pleurodinia*, del costado derecho, agravada por el movimiento hasta hacer lanzar gritos.—*Metrorragia* con sangre coagulada de color oscuro, dolores dorsales violentos hasta las nalgas y los muslos, humor lloroso, sobreexcitacion nerviosa, convulsiones histéricas y dolores violentos en la cabeza y el globo de los ojos, agravados por el menor movimiento.—*Supresion de las reglas*, á consecuencia de un resfriamiento ó de una emocion moral, con dolores reumatismales en los miembros, cefalalgia violenta y calambres uterinos.—*Dismenorrea* con los mismos síntomas indicados mas arriba en la *metrorragia*.—*Sciática*, cuando hay afeccion de los ovarios y del útero.—*Reumatismo articular* de los miembros inferiores, con fuerte calor é hinchazon de las partes afectadas.—*Dolores violentos, agudos*, en la cabeza, los ojos, los oidos, ó en el vientre, durante el embarazo ó á consecuencia de un aborto.

63.—CINA.

CIN.—Artemisa de Alepo.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usad s*: 9, 30.—*Duracion de accion*: 14 á 21 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Ipec?.—*Se emplea como antídoto de*: *Chin.*

COMPÁRESE CON: *Arn.* bell. bry. *ca'c. caps.* cham. *chin.* fer. hep. ignat. ipec. *phos.* sabad.—Sobre todo despues de; *arn.* y *hyos.* es cuando la cina hará buen efecto siempre que se halle indicada.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas* se verá los casos en que se puede *consultar* este medica-

Digitized by

mento contra:—Afecciones de los niños; Debilidad por pérdida de humores; Atrofia?; Afecciones escrofulosas; Convulsiones, epilépsia, eclampsia y otras afecciones espasmódicas; *Fiebres intermitentes*, aun las de los pantanos; Afecciones cerebrales, encefalitis, hidrocéfalo agudo de los niños; Ambliopia amaurótica, aun la ocasionada por la masturbacion; Manchas de la córnea; Afecciones gástricas; *Afecciones verminosas*; Orinarse en la cama; Coqueluche, principalmente en los niños escrofulosos ó que padecen de lombrices, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores paralíticos, tractivos en los miembros.—Presion y apretamiento con punzadas obtusas ó *dolores dislacerantes calambroideos*, tirones y estremecimientos ó punzadas quemantes en diversas partes.—*Convulsiones* y distorsion de los miembros.—Convulsiones epilépticas nocturnas, seguidas de cefalalgia.—Convulsiones epilépticas con gritos, emprostótonos y movimientos violentos de manos y de piés.—Rigidez tetánica de todo el cuerpo.—La presion exterior agrava ó renueva los padecimientos.—Sensibilidad dolorosa de todos los miembros al movimiento y al tacto.—La mayor parte de los padecimientos aparecen por la noche ó estando sentado, y se agravan por la mañana y por la tarde.—°Torpeza en los miembros.

Sueño.—Bostezos frecuentes, con temblor y horripilacion.—°*Insomnio nocturno con agitacion*, llantos, gritos, calor y angustia.

Fiebre.—*Horripilacion frecuente con temblor, aun cerca del fuego.*—*Fiebres cotidianas ó °tercianas, *con bulimia, náuseas, lengua limpia, diarreas; pupilas dilatadas y demacracion.—Calofrios por la tarde.—°Excesivo calor febril con delirio, ansiedad y agitacion.—*Calor, sobre todo en la cabeza, con palidez ó color amarillento de la cara y ojeras, ¯ó con rubicundez de las mejillas.—°Despues de la fiebre dolor de cabeza.—Sudor frio en la frente y en las manos.

Moral.—*Humor lloroso y con quejidos.—El niño llora cuando se le toca.—Inquietud contínua con deseo de muchas cosas diferentes, las que desecha poco tiempo

Digitized by Google

despues de conseguidas.—Mucha angustia y ansiedad paseando al aire libre.—Delirio.

Cabeza.—Cefalalgia, alternando con presion en el bajo vientre.—*Presion con atolondramiento como por un peso* que *gravita sobre la cabeza*, sobre todo paseando al aire libre. —*Cefalalgia desgarradora tractiva*, agravada por la lectura y la meditacion.—Dolores sordos en la cabeza, con ojos fatigados principalmente por la mañana al despertarse.

Ojos.—Presion en los ojos fatigándolos con la lectura.—Movimientos convulsivos de los músculos supraciliares. —*Turbacion de la vista* al leer, *que desaparece frotándose los ojos*.—**Pupilas dilatadas*.—*Vista débil con fotofobia y presion en los ojos, como si se hubiese introducido arenas en ellos.

Nariz.—Epistaxis.—*Licor que obliga á rascarse la nariz*.—Evacuacion de pus por la nariz.—Estornudo violento que provoca una sensacion de presion en las sienes, y parece que va hacer abrir el pecho.—Coriza fluente con sensacion de quemadura en las ventanillas nasales.—*Obturacion de la nariz.

Cara.—*Palidez de la cara con ojeras*.—Color térreo.—**Cara* abotagada y *azulada*, *sobre todo alrededor de la boca*.—°Cara alternativamente pálida y fria, ó roja y caliente.—Dolores calambroídeos y tirones sucesivos en los pómulos.

Dientes.—Dolor de dientes provocado por el aire y las bebidas frias.—Dolores de excoriacion en los dientes.—Rechinamiento de dientes.

Garganta.—Imposibilidad de tragar sobre todo los líquidos.—Sequedad y aspereza en la boca.

Apetito.—Sed aumentada.—Hambre pronunciada poco despues de la comida.—Voracidad.—**Bulimia*.—°Aversion del niño de pecho á mamar.—°Gusto amargo del pan.—°Vómitos ó diarreas despues de haber bebido.—**Vómitos de mucosidades y de ascárides*.—°Vómitos con lengua limpia.—°Vómitos biliosos.—°Erutos desagradables.

Vientre.—Pellizcos tenaces e el vientre.—Rotacion dolorosa en la region umbilical que está muy sensible al tacto.—Dolores en el vientre parecidos á los del parto, así como cuando las reglas van á presentarse.

Digitized by

Deposiciones.—°Deposiciones diarréicas de la consistencia de papilla.—°*Salida de ascárides* y de lombrices por el ano.—Diarreas de bílis y de materias estercoráceas.—Deposiciones diarréicas, involuntarias, blanquecinas.

Orinas.—Necesidad frecuente de orinar con emision abundante.—°*Se orina en la cama.*—*Orinas que se enturbian muy pronto.—Emision involuntaria de orinas.

Reglas.—*Reglas muy anticipadas y muy abundantes.*—Metrorragia.

Laringe.—Abundancia de mucosidades en la laringe, que obliga á esforzarse constantemente para expelerlas.—Tos provocada por una respiracion profunda.—Tos limitada, ronca, pasajera por la tarde.—**Tos seca calambroidea*, con falta de aliento, ansiedad, palidez de la cara, y gemidos despues del acceso, ó con rigidez del cuerpo y hemorragiá de la nariz y de la boca.—*Tos con sobresaltos repentinos y pérdida del conocimiento.

Pecho.—Dificultad de la respiracion y *opresion angustiosa en el pecho*, como si el esternon comprimiese el pulmon.—Respiracion corta, frecuentemente interrumpida ó estertorosa.—Sensacion de dolor como si escarbaran, y calambroídeo en el pecho, como si fuera á estallar.—Punzadas con estremecimiento y como si escarbaran en el pecho.

Miembros.—Dolores de magulladura en los riñones.—Dolores tractivos con estremecimiento en el dorso.—Dolor de dislaceracion y tirones paralíticos en los brazos.—*Dolores de dislaceracion calambroideos en los brazos y en las manos.*—Contraccion y estremecimiento de las manos y de los dedos.—Debilidad de la mano; cuanto coge deja caer.—Dolores paralíticos ó *calambroideos*, y estirones en las piernas.—Extension calambroídea de las piernas.

64.—CINNABARIS.

CINN.—Cinabrio.—Sulfuro rojo de mercurio.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 9. 30.—*Duracion de accion*: hasta 5 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

Digitized by

CLINICA.—No se ha empleado este medicamento mas que contra: *Excrecencias sicósicas*, *flores blancas y corizas corrosivos.*

SINTOMAS GENERALES.—Frio en las articulaciones.—Estirones y horripilacion en los brazos y en las piernas.—Dolores paralíticos en los miembros con pereza y gana de dormir.—Insomnio nocturno, que, sin embargo, no fatiga.—Pesadilla despues de media noche.

Cabeza.—Nariz.—*Accesos de cefalalgia violentísima, en el occipucio y las sienes, aliviados por la compresion de la cabeza.*—Zumbido sordo y estupefaciente en la cabeza, poco despues de comer y por la noche antes de acostarse.—Punzadas en los tegumentos de la cabeza.—Sensibilidad dolorosa del cráneo y de los cabellos al tacto.—Inflamacion de los ojos con punzadas presivas y lagrimeo contínuo, fijándolos sobre un objeto.—Coriza violento fluente con secrecion de serosidades quemantes.

Boca y apetito.—Sensacion quemante, contractiva en el paladar.—*Salivacion.*—Sequedad y calor nocturno en la boca y en la garganta con mucha sed.—Contracciones presivas en la garganta tragando en vacío.—Falta de apetito con disgusto á todos los alimentos.—Despues de la comida, sensacion desagradable de hinchazon en todo el cuerpo, con presion al pecho y al estómago.—Por la noche, calor que sube desde el estómago hácia el cuello y la cabeza, y se disipa cuando se incorpora en la cama.

Deposiciones y orinas.—*Deposiciones blandas, frecuentes* precedidas de pellizcos en el vientre.—Diarreas nocturnas tenaces, sin cólicos.—Dolor de excoriacion en la uretra al orinar.

Partes genitales.—Hinchazon del miembro.—*Gonorrea bastarda con rubicundez é hinchazon del prepucio.*—Erupcion granulosa en el glande.—*Condilomas.*—Apetito venéreo fuertemente exaltado y *mucha disposicion al cóito* con *apetito excesivo de comer y beber.*—Fuertes erecciones al principio de la noche en la cama.—*Sudores fétidos y corrosivos* entre el escroto y los muslos cuando se anda.

Pecho.—Tos seca, á pequeños intervalos estando acostado.—Dolores pulsativos y lancinantes en el pecho, sobre todo andando.

Digitized by

Tronco.—*Dolor de dislaceracion á un lado del dorso*, aun por la noche al moverse en la cama, aliviado por el calor del fuego.—Dolores de luxacion en las vértebras del cuello.

Miembros.—Dolor de dislaceracion en los brazos escribiendo, aliviados por el calor del fuego.—Fuertes punzadas en el brazo.—Estremecimiento doloroso en la pierna, por la noche despues de haberse dormido.

65.—CISTUS CANADENSIS.

CIST.—Cisto heliantemo.—Hering.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 1 (afecciones escrofulosas), 15 (afécciones de las vías aéreas).

Compárese con: Bell. carb-veg., phos.: estos medicamentos pueden administrarse alternativamente con el cisto, siempre que se hallen indicados.

CLINICA,—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra:—*Infarto de las glándulas* con supuracion, úlceras *y otras afecciones escrofulosas*, *Afeccion escorbútica de las encias;* Otorrea purulenta; Cáries de la mandíbula; Laringitis crónica, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Por la tarde, dolores en las rodillas, en la mano derecha y en la escápula izquierda.—°Agravacion de los padecimientos por la mañana.—Dolores tractivos en las partes musculosas de las manos y de las extremidades inferiores, con dolores en las articulaciones de las manos, de los dedos y de las rodillas.—Dolores desgarradores y tractivos *en todas las articulaciones*, sobre todo en las de las rodillas y de los dedos.—°Glándulas infartadas y ulceradas.—Dolores de contusion y sensacion de laxitud en todos los miembros.—°Piés frios.—°Disposicion al frio.—Calofrios violentos con temblor, seguidos de calor febril, con las orejas rojas é hinchadas, é infarto de las glándulas del cuello.—Calor con sed, que obliga á beber mucho.—Prurito en todo el cuerpo, sin erupcion.—Cualquiera alteracion agrava considerablemente los padecimientos.—Malas resultas de una pesadumbre.

Digitized by

Cabeza y ojos.—Dolor compresivo de cabeza, con presion por encima de los ojos y en la frente.—Sensacion de peso por encima de los ojos.—Punzadas en el ojo izquierdo.—Sensacion en el ojo como si hubiese en él alguna cosa que estuviera dando vueltas, con punzadas.

Oidos.—Hinchazon desde la oreja hasta la mejilla.—Hinchazon en el interior de las orejas.—Oidos cerrados por hinchazon, *con flujo.*—°Flujo de serosidades y de un pus fétido por los oidos.

Nariz.—Sensacion de quemadura en la ventanilla izquierda.—*Inflamacion é hinchazon dolorosa de las ventanillas de la nariz.—Estornudos sin coriza ni otra causa.*

Cara.—Sensacion como si los músculos de la cara se tiraran hácia un lado.—Calor y ardor en los huesos de la cara.—Calor pasajero en la cara.—°Erisipela vesiculosa en la cara.—°Cáries de la mandíbula inferior.

Boca y garganta.—Encías hinchadas, excoriadas, que sangran fácilmente, y de un aspecto asqueroso.—Dolor en la lengua, que parece como excoriada.—°Sequedad de la lengua y del paladar.—°Comezon periódica en la garganta.—°Cosquilleo y *dolor de excoriacion en la garganta*, sobre todo por la mañana.—*Sensacion continua de sequedad* y de calor en la garganta.—Sensacion insoportable en la garganta, en tragando saliva para aliviar la sequedad.—°Sensacion como de arena en la garganta.—°Mejoría de los síntomas de la garganta despues de haber comido.—°Dolores en la garganta al respirar aire fresco.—°Sensacion de reblandecimiento de la garganta.—°A cada emocion punzadas en la garganta, que hacen toser.—°Expectoracion difícil de mucosidades muy tenaces.

Estómago.—Deposiciones.—°Náuseas frecuentes.—Dolores de estómago despues de la comida.—Punzadas en el hipocondrio izquierdo.—Gases abundantes y sensacion de malestar en el vientre.—Diarrea pasajera.—Diarrea despues de haber comido frutas.

Pecho.—°Aliento fétido.—°Dolores en la laringe.—°Presion sobre el pecho.—Sensacion de plenitud en el pecho.—Por la noche, despues de acostado, hormigueo por todo el cuerpo, con respiracion difícil y ansiedad, aliviada por el aire fresco.—°Tos excitada por punzadas en la garganta.—Expectoracion de mucosidades amargas.

Tronco y miembros.—Debajo del omóplato, mancha

Digitized by

roja, dolorosa al tacto y seguida de una erupcion erisipelatosa, con dolores quemantes que se agravan por el tacto.—Por la tarde, dolores violentos en la espalda y en el pecho, que se cree aliviar dándose golpes en dicha parte.—°Infarto y supuracion de las glándulas del cuello.—Dolores en la espalda. — Dolores de luxacion en la muñeca, con dolores tractivos y corrosivos.—Despues de medio dia, dolores violentos en la mano, y que impiden servirse de ella.—Dolores en los dedos, escribiendo.—Dolores desgarradores en el muslo, andando.—Dolores en las rodillas y muslos, andando y estando sentado.—Por la tarde, punzadas violentas en el dedo del pié.

66.—CLEMATIS ERECTA.

CLEM.—Clematide derecha —HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. —*Dósis usadas:* 6, 30.—*Duracion de accion:* hasta 6 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Bry. camph.

COMPÁRESE CON: Bell. bry. rhus. sass.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de sintomas* se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra:—Padecimientos por el abuso del mercurio; *Reumatismo articular*, principalmente *á consecuencia de gonorreas suprimidas*; *Erupciones de herpes costrosos*; Excrecencias fungosas?; Ulceras carcinomatosas?; Melancolía?; Jaqueca y otras especies de cefalalgias?; Tiña?; Oftalmías crónicas; Cáncer de los labios?; Estrechez de la uretra, *orquitis*, *infarto é induracion de los testículos*, y otras afecciones de las vías urinarias y de las partes genitales *á consecuencia de una gonorrea suprimida*; Gonorrea crónica?; *Infarto*, *induracion de las glándulas*; Nudosidades artríticas; Cáncer de las mamas?; etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Movimientos convulsivos de los músculos en diversas partes del cuerpo. —*Relajacion de los músculos.—Demacracion excesiva.*—Fatiga de todos

Digitized by Google

los miembros, sobre todo despues de comer, con latidos en todas las arterias.—*Como crujido en todo el cuerpo*, despues de acostado.

Piel.—°Erupciones miliares tenaces.—°Erupciones vesiculosas en el cuerpo.—°*Herpes escamosos*, con flujo de un pus sanioso, amarillento y corrosivo, y con rubicundez, calor é hinchazon de la piel.—°*Herpes tenaces*, rojizos y exudantes, con comezon insoportable por el calor de la cama.—Los herpes están rojos y húmedos durante el creciente de la luna, pálidos y secos en el menguante.—Dolor quemante ú hormigueo y pulsacion en las úlceras, con punzadas en los bordes al tacto.—Pústulas sarnosas por todo el cuerpo.

Sueño.—Mucha gana de dormir por el dia, y aun por la mañana á poco de haberse levantado.—Insomnio por la tarde y por la noche.—Sueño con ensueños frecuentes, agitacion y ansiedad.—Por la mañana, sensacion como si no se hubiese dormido bastante.

Fiebre.—°Fiebre cuartana, que consiste en horripilacion seguida de sudor.—Sudor al despertar, con sensibilidad de la piel, de tal modo que no puede soportar el descubrirla.

Moral.—*Tristeza y aprensiones*.—Morosidad.—Aversion á la conversacion.—Indiferencia.

Cabeza.—Por la mañana, pesadez y torpeza de la cabeza.—Tension presiva en la frente y en los lados de la cabeza, así como en los huesos del cráneo.—Presion como si escarbaran en el cerebro.—Terebracion en las sienes.—Martilleo y golpes en la cabeza.—Granos purulentos en la frente, dolorosos al tacto.—Dolores quemantes incisivos en la piel de la frente.—Erupciones en la cabeza; flíctenas exudantes en el occipucio y en la nuca.

Ojos y oidos.—Presion sobre el globo del ojo.—*Escozor en los ojos y en el borde de los párpados*, sobre todo al cerrarlos.—Punzadas en los ángulos de los ojos.—°*Inflamacion de los ojos*, con lagrimeo abundante.—Inflamacion y ulceracion de los bordes de los párpados.—Fotofobia.—Dolor quemante en el exterior del oido.—Tintineo en el oido.

Nariz.—Granos purulentos, dolorosos al tacto, sobre la raiz y la punta de la nariz.—Coriza fluente, con secrecion abundante de mucosidades.

Digitized by

Cara.—*Color pálido y enfermizo*.—Sensacion de quemadura en la piel de las mejillas.—Dolores incisivos, quemantes en el labio inferior.—Erupciones flictenóides en los labios.—Vesículas blanquecinas en la nariz y en la cara, como cuando se está mucho tiempo al sol.—Granos purulentos en la barba.—Hinchazon de las glándulas submaxilares, con nudosidades duras, tensivas, pulsativas y doloridas al tacto.

Dientes.—Dolor de dientes, agravado en fumando tabaco.—Dolores nocturnos en los dientes, que en la posicion horizontal se agravan hasta conducir á la desesperacion, con agitacion, debilidad, ansiedad y padecimientos insoportables, destapándose.—Dolores lancinantes ó tirones sucesivos en las muelas, que se extienden hasta la cabeza, é incapacitan para todo trabajo intelectual.

Boca.—Sequedad de la lengua por la mañana.—Punzadas obtusas y terebrantes en la raiz de la lengua.—Expectoracion de saliva sanguinolenta.

Apetito.—Pronta saciedad aunque los alimentos halaguen el gusto.—Náuseas en fumando, con debilidad de las piernas.

Vientre.—Dolores de contusion en la region hepática, al tacto y bajándose.—En andando, contracciones incisivas en la region renal.—Presion hácia afuera del anillo inguinal, como si una hernia quisiera declararse.—**Hinchazon é* °*induracion de las glándulas inguinales*, con dolores que producen estremecimientos.

Deposiciones.—Deposiciones frecuentes, líquidas ó diarréicas, sin cólicos.

Orinas.—*Aumento de la secrecion de la orina*.—*Orinas purulentas*.—Durante la emision de las orinas, tirones en el cordon espermático.—Desde que se empieza á orinar, sensacion de quemadura y escozor en la uretra.—**Estrechez de la uretra*, con emision de orina que se detiene de pronto ó no sale mas que gota á gota.

Partes genitales.—Dolores tractivos en los testículos y en el cordon espermático hasta las ingles y los muslos.—**Inflamacion dolorosa é hinchazon de los testículos*.—°Induracion de los testículos.—Espesor del escroto.—Aversion á los placeres venéreos, como despues de haber abusado de ellos.—Dolor quemante en el miembro viril durante la eyaculacion en el cóito.

Digitized by

Pecho.—Golpes violentos, con punzadas sordas en los costados del pecho y del vientre.—Punzadas en el pecho, que se agravan inspirando.

Miembros.—Pústulas pruritosas alrededor del cuello, con excoriacion despues de haberse rascado.—Herpe húmedo desde la nuca hasta el occipucio.—°Hinchazon de las glándulas axilares.—Presion y tirantez de los músculos, de los brazos y de las manos.—°Nudosidades artríticas en las articulaciones de los dedos.—Erupcion de pústulas en la region lumbar.—Dolor de dislaceracion en los muslos.—°Herpes escamosos en el muslo.—Forúnculos en el muslo.—Vesículas corrosivas en las manos y en los dedos, con hinchazon; el agua fria agrava los padecimientos.

67.—COCCULUS.

COCC.—Coco de Levante.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. —*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: 20 á 30 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. n-vom.—Se emplea como antídoto de: Cham. cupr. ign. n-vom.

COMPÁRESE CON: *Ant. ars.* carb-veg. *cham. coff.* colch. *cupr. ign.* iod. *ipec.* merc. mosch. natr. natr-m. nitr. *n-vom. oleand.* puls. rhus. sabin. sass. stram. tart. veratr.—Sobre todo despues de *ipec.* es cuando el cocculus conviene si está indicado.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—Afecciones de personas (mujeres sobre todo) de un temperamento dulce y flemático, ó bien bilioso y colérico; Sufrimientos causados por un arrebato de cólera; malos resultados por abuso de la camomila; Afecciones causadas por el movimiento de un carruaje, de un columpio ó de una embarcacion; Debilidad nerviosa; Síncope de las personas histéricas, *Parálisis*, sobre todo de los *miembros inferiores* con exaltacion del sistema nervioso; *Espasmos y convulsiones*, con especialidad en las mujeres histéricas y mal regladas; Convulsiones traumáticas; Afecciones artríticas; Baile de San Vito; Fiebres con afecciones biliosas ó gástricas, aun las causadas por el abuso de la camomila; *Fiebres lentas con debilidad nerviosa*, sobre todo

Digitized by

despues de graves enfermedades agudas, de fiebres tifoídeas, del cólera, etc.; Congestion cerebral y apoplejía aun á consecuencia de evacuaciones sanguíneas; Jaqueca y cefalalgia histérica; Exofagitis?; *Afecciones gástricas y biliosas*, así como las ocasionadas por el movimiento de un carruaje, etc.; Mal de mar; *Gastralgia* aun á consecuencia de debilidad; *Cólicos espasmódicos y flatulentos*; Hernias inguinales (en los niños); Cólicos menstruales; Dismenorrea, con padecimientos espasmódicos, flores blancas, calambres de la matriz y otros padecimientos de las doncellas y de las mujeres que no han parido; Tenesmo de la vejiga en las mujeres embarazadas; Calambres de pecho; Palpitaciones de corazon; *Tabes dorsal?*; Gota en las manos y en los piés; Gonitis artrítica, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Tirones y dolor de dislaceracion paralíticos, por accesos ó contínuos, *en los miembros y en los huesos*.—Movimientos convulsivos de los músculos en diversas partes.—Dolores osteócopos, como si escarbaran en los miembros. —Dolores de contusion aun en los órganos internos.—*Sensacion de vacuidad ó *de constriccion en los órganos internos*.—Sensibilidad dolorosa de los miembros al mas ligero contacto. —Rigidez dolorosa y crujido en las articulaciones.—**Padecimientos semilaterales*. — Dolores reumáticos, con hinchazon caliente de las partes afectas. — Dolores lancinantes en los tumores frios.—Infarto é induracion de las glándulas.—Hemorragias.—**Calambres y convulsiones de los miembros y de todo el cuerpo*, °algunas veces provocados por úlceras ó por llagas, dolorosamente sensibles al tacto, ó cuando se quiere hacer uso de las partes afectas.—°Movimientos convulsivos de los miembros y de los músculos, como en el baile de San Vito.—°Durante los accesos de convulsiones, está la cara roja, abotagada y caliente. —Temblor de los miembros.—Ataques de epilépsia.—**Parálisis*, principalmente *semilaterales*, con insensibilidad de las partes afectas.—*Agravacion de los síntomas por el *sueño*, *la palabra*, *el beber y el comer*; pero sobre todo *en tomando café ó fumando*, así como por el aire frio. —*Debilidad y pérdida de fuerzas*, despues de la menor fa-

Digitized by Google

tiga corporal, el movimiento ó la interrupcion del sueño.—*Falta de energía vital.*—*Desvanecimientos.—Entorpecimiento, unas veces de los piés, otras de las manos, por accesos pasajeros.—*El aire libre es insoportable*, sea caliente ó frio.—°Marasmo.

Piel.—Mucho prurito, sobre todo al principio de la noche al desnudarse ó despues en la cama.—Granos rojos, semejantes á los de mijo, con comezon á la accion del calor.—Erupcion de granos duros y nudosos, con auréola roja y dolor quemante.—Manchas rojas y de color de vino en el pecho y en los lados del cuello.—*Color pálido de la piel.

Sueño.—Necesidad irresistible de dormir por la mañana.—Bostezo espasmódico.—Sueño tardío á causa de una gran afluencia de ideas.—Sueño incompleto como un coma vigil.—*Sueño interrumpido por una angustia y una inquietud terrible.*—Durante el sueño, sobresaltos, gritos, movimientos convulsivos de las manos, de los ojos y de la cabeza.—*Ensueños angustiosos, espantosos*; de muertos, de enfermedades, etc.—Miedo de espectros, por la noche.—Sueño no reparador, con desvelo frecuente.

Fiebre.—Calofrios y sensacion de frio con temblor.—°Por la tarde calofrios y horripilaciones en el dorso.—Fiebre con disposicion al frio, aunque la piel esté caliente al tacto.—*Calor quemante y encendimiento de las mejillas*, frecuentemente con frio en los piés.—°Fiebre con dolores calambroídeos en el estómago y debilidad paralítica en los riñones.—Transpiracion fácil durante el movimiento, con mucha fatiga.—Sudores por la noche y por la mañana.—°Pulso lleno, duro y frecuente.

Moral.—**Preocupacion y reflexiones tristes y melancólicas*, como si hubiesen recibido algunas ofensas.—°Humor hipocondríaco, desesperacion.—**Mucha aprension con ansiedad*, inquietud y miedo de la muerte.—*Disposicion á asustarse.—*Susceptibilidad excesiva.—Disposicion á tomarlo todo en mal sentido y á incomodarse.—Manía.—Se equivoca sobre la duracion del tiempo, que le parece corre con rapidez.—°Llantos frecuentes.

Cabeza.—Obnubilacion de la cabeza, sobre todo despues de haber bebido ó comido.—*Atontamiento de cabeza*, aumentado por la lectura ó la meditacion.—*Vértigo como por embriaguez*, al incorporarse en la cama, *con ganas de*

Digitized by Google

dormir, que obliga á volverse á echar.—Accesos de vértigos, con náuseas y pérdida del conocimiento.—*Dolor de cabeza con gana de dormir* ó con vómitos y dolores de contusion en los intestinos.—*Dolores presivos, violentos, sobre todo en la frente.—*A cada movimiento, dolor de cabeza, como si los ojos quisieran salirse de sus órbitas, con vértigos.—**Dolor de cabeza que se siente como vacia y hueca*, ó *sensacion de constriccion en el cerebro.*—Dolores pulsativos tan pronto en el vértice de la cabeza como en las sienes.—*Temblor convulsivo de la cabeza.*

Ojos.—Presion y dolor de contusion en los ojos y *dificultad de abrir los párpados por la noche.*—°Rotacion convulsiva del globo de los ojos, durante los espasmos.—°Pupilas fuertemente dilatadas.—*Inflamacion de los párpados.*—Ojos prominentes, vítreos.—Vista turbia con manchas negras delante de los ojos.—Fantasmas delante de los ojos.

Oidos y nariz.—Zumbido sordo con dureza de oido, y sensacion como si los oidos estuvieran tapados.—Hinchazon de las parótidas.—Hinchazon de la nariz, á veces semilateral.—Coriza con las ventanillas nasales ulceradas.

Cara y dientes.—**Cara de un rojo vivo*, abotagada y caliente, sobre todo en las mejillas.—Calor fugaz de las mejillas.—Círculos azules alrededor de los ojos.—Cara contraida convulsivamente.—Calambres en el pómulo y en los maseteros.—*Hinchazon é induracion de las glándulas submaxilares.*—Dolores en los dientes cariados, solamente comiendo.—Vacilacion de los dientes, con hinchazon de las encías.

Boca y garganta.—*Sequedad de la boca sin sed.—*Espuma en la boca formando burbujas.*—Lengua cubierta de una costra amarilla.—*Sequedad de la garganta.*—Sensibilidad excesiva al paladar; los alimentos parece tienen un sabor fuerte y estan muy salados.—*Constriccion de la garganta*, que parece estar paralizada.—*Dolor quemante en el esófago y hasta la garganta, con sabor sulfuroso en la boca.

Apetito.—Gusto metálico, cobrizo.—*Gusto ácido*, sobre todo despues de la comida y al toser.—Gusto ácido del pan.—*Gusto amargo del tabaco.*—*Deseo de bebidas* frias y sobre todo de *cerveza.*—*Sed durante la comida.*—*Disgusto

Digitized by

excesivo por todas las comidas y bebidas sin excepcion. —*Repugnancia á todos los ácidos.*—Bulimia.

Estómago.—Erutos con dolor en el estómago y en el epigastrio.—**Erutos con gana de vomitar.*—*Erutos vacíos ó fétidos y pútridos.—**Accesos de náuseas hasta hacer perder el conocimiento.*—Gana de vomitar al incorporarse en la cama, que obliga á volverse á acostar.—Gana de vomitar durante la comida, ó á consecuencia de un enfriamiento, con acumulacion abundante de saliva.—°*Vómitos y náuseas por el movimiento del carruaje ó por el de una embarcacion.*—Sensacion de plenitud en el estómago, con dificultad en la respiracion.—**Violentos dolores calambroideos, y apretamiento como por un garfio, en el estómago, algunas veces despues de la comida.*—Opresion ansiosa y *pellizcos en el epigastrio, con dificultad en la respiracion.*

Vientre.—Dolores de contusion en los hipocondrios.—°Dolor presivo en la region hepática, agravado por la tos ó en bajándose.—°Punzadas en la region hepática.—*Dolores abdominales como si los intestinos estuviesen magullados*, ó como por un absceso interior, á cada movimiento.—Presion como por una piedra en la region umbilical y en el bajo vientre.—*Sensacion en el vientre como si estuviera hueco y vacío.*—*Meteorismo.—*Pellizcos contractivos en la parte superior del vientre con suspension de la respiracion.*—*Dolor de sensacion quemante, tirantez y dislaceracion en el vientre.—Dolores calambroídeos en el vientre.—**Cólicos flatulentos ó colambroideos*, sobre todo por la noche, agravados en tosiendo, ó inclinándose hácia adelante.—**Disposicion á presentarse una hernia inguinal.*

Deposiciones y orinas.—*Estreñimiento* con tenesmo.—*Deposicion dura, difícil.*—Deposicion diarréica de olor pútrido.—*Deposiciones blandas, amarillas y °quemantes en el ano.—Orina acuosa con gana urgente de evacuarla.—*Gana frecuente de orinar, aun en las embarazadas.

Partes viriles.—Prurito en el escroto.—*Dolor tirante y de contusion en los testículos*, al tacto.—Mucha sensibilidad y excitacion de las partes genitales, con deseo del cóito.—Despues del cóito, debilidad de las piernas, pesadez y sensacion de contusion por todo el cuerpo.

Reglas.—**Reglas muy anticipadas con calambres en el bajo vientre.*—Reglas dolorosas, con flujo abundante de una

Digitized by Google

sangre coagulada, seguidas de hemorróides.—°*Supresión de las reglas con cólicos espasmódicos* y presivos, flatuosidad, *debilidad paralítica*, opresion, ansiedad, *calambres de pecho*, accesos de náuseas hasta el desfallecimiento, y movimientos convulsivos de los miembros.—°Reglas poco abundantes, irregulares, con leucorrea en los intervalos.—(Metrorragia).—°*Flujo de mucosidades sanguinolentas por la matriz*, durante el embarazo.—*Leucorrea, semejante al agua en que se lava la carne, entremezclada de una serosidad saniosa y purulenta.—°Calambres de la matriz.

Laringe.—*Tos fatigosa, por opresion de pecho*, que no se manifiesta sino durante la tos.—Tos periódica cada cuarta noche, ó hácia las dos de la mañana, con constriccion en la garganta que obliga á toser.

Pecho.—*Suspension de la respiracion* que se detiene en el hoyuelo del cuello, *como por constriccion de la garganta.*—Respiracion corta, intermitente.—Presion sobre el pecho, como por una piedra.—*Calambres en el pecho* con suspiros y gemidos.—**Constriccion* tensiva *del pecho* algunas veces de un solo lado; con dificultad en la respiracion.—Ruido como de agua y *sensacion de vacuidad en el pecho.*—Fatiga en el pecho por leer en alta voz.—°Congestion en el pecho con ansiedad.—**Palpitaciones de corazon.*—Manchas rojas en el pecho.

Tronco.—*Dolor de dislaceracion paralítico en los riñones.*—Tirones y dolores dislacerantes en el dorso, sobre todo hablando, andando ó en bajándose.—Punzadas entre los omóplatos y en los riñones.—Crujido en las vértebras del cuello durante el movimiento.—Debilidad de los músculos del cuello, los que no pueden sostener la cabeza.—Manchas rojas en el cuello.

Brazos.—Punzadas en la articulacion húmero-escapular y en el brazo, durante el reposo.—*Dolores lancinantes en el brazo*, procedentes de un dedo herido.—Convulsiones del brazo con retraccion de los pulgares.—**Parálisis de los brazos.*—Palpitacion de los músculos del brazo.—*Color de magulladura en los huesos del brazo* durante el movimiento.—°*Hinchazon caliente y artrítica en las manos*; entorpecimiento ó calor y frio que alternan de la una á la otra mano.—°Torpeza de las manos.—Contracciones calambroídeas y estremecimiento de los dedos.

Digitized by Google

Piernas.—*Parálisis de los miembros inferiores* que provienen de los riñones.—Dolor de dislaceracion tractivo de las rodillas, los piés y los dedos de estos.—*Dolor de contusion* en los muslos, durante el movimiento.—Crujido de las rodillas durante el movimiento.—*Hinchazon inflamatoria de la rodilla con punzadas pasajeras.*—Sensacion quemante en los piés.—*Hinchazon cálida y pruritosa de los piés*, algunas veces tambien por la tarde.—Entorpecimiento de los piés.—Frio y transpiracion de los piés.

68.—COCCUS CACTI.

COCC.—*Coccinela Indica*, Cochinilla de Méjico.—*His. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Duracion de accion*: En las afecciones agudas, de 24 á 48 horas lo más, y de algunas semanas en las crónicas.

CLINICA.—Medicamento que podrá llegar á ser de mucha importancia en las afecciones de las *membranas mucosas*, ciertas *melancolías* y *misantropías*, las afecciones de los *órganos urinarios*, *genitales* y *respiratorios*, como en las *oftalmias*, *estomatitis*, *bronquitis mucosas*, así como ciertas afecciones *espasmódicas*.—Describiré á continuacion los *síntomas* mas importantes, y que particularmente parecen ser característicos de este medicamento.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores quemantes*, *lancinantes*, *penetrantes* en las membranas mucosas de los ojos, de la lengua, de la garganta, de los bronquios y de la uretra; Dolores *calambroideos* en el esófago, estómago y recto, los riñones y la vejiga; movimientos convulsivos; agravacion de los padecimientos por el movimiento y el calor; disminucion por el reposo, el frio, las lociones frescas, el aire libre.—*Sueño* agitado, interrumpido por dolores vesicales y gana de orinar; con ensueños en que figuran muchas personas, sueños de palacios y de sociedades escogidas, en las que se halla impertinente, ó de tiernas relaciones amorosas.—*Fiebre* que consiste en *horripilacion* y *calofrios frecuentes*; calor en la cara durante los dolores vesicales.—*Moral triste*, mal humor despues

Digitized by

de algunos instantes de sentir un bienestar con genio alegre.

Cabeza.—Dientes.—Pesadez de *cabeza*, con presion como por congestion de sangre, aumentada por los movimientos de la cabeza, y disminuida por el frio y lociones frias. —*Ojos* doloridos, como por la introduccion de un cuerpo extraño, con entumecimiento de los párpados.—*Oidos* como cerrados, con presion y estirones; dolores pulsativos, presivos y lancinantes en los oidos, hasta la boca y la garganta; zumbido.—*Nariz* seca, con sensacion de obturacion catarral y secrecion como de un romadizo; costras en las ventanillas nasales, que están rubicundas.—En los *dientes*, sensacion de frio, estirones y dolores de dislaceracion.

Boca y garganta.—Sequedad de la boca y de la garganta con sensacion de ardor, picazon, constriccion y sed aumentada.—*Faringe* como afelpada; mejoría en bebiendo cosa fria.—Deglucion como impedida por sequedad.—Sensacion de aspereza y de sequedad en la garganta, aumentada hablando.—Rubicundez y pústulas en las tonsilas y en el velo del paladar.—*Lengua* limpia, roja y seca.

Apetito.—Deposiciones.—Saciedad pronta y mortificacion del estómago despues de comer; conato á vomitar. —Sensacion de frio en la region del estómago; *calambres*, *presion* y *acumulacion de gases* en el estómago; *presion como por una piedra*.—Punzadas en la region del bazo y del hígado.—*Padecimientos por acúmulo de flatuosidades*.—*Deposiciones* desde luego duras (los primeros dias), despues blandas y en forma de papilla.—Constipacion y deposiciones blandas alternativamente, con punzadas, sensacion de ardor y presion en el recto hasta la vejiga y la uretra.

Vias urinarias.—*Cólicos nefríticos*, con dolores presivos, lancinantes y calambroídeos, extendiéndose á lo largo de los uréteres hasta la vejiga y la uretra; en la *vejiga*, tension, pesadez, plenitud y dolor incisivo, con dolor calambroídeo en el cuello de la vejiga.—En la *uretra*, comezon, cosquilleo, punzadas y prurito durante y despues de la miccion.—*Gana de orinar frecuente y urgente*; sensacion de un obstáculo que se opone á la emision de la orina al empezar la miccion; *orinas abundantes*, que salen en un chorro muy fuerte; encogimiento del meato

Digitized by

urinario en la mujer; golpe de la orina esparramado en la mujer; *miccion frecuente por el dia y por la noche*; *orinas frecuentemente pálidas*, *acuosas*; algunas veces amarillas, cargadas, pesadas, densas, ó turbias con sedimento rojo; orinas ácres, quemantes; *sedimento de mucosidades* en filamentos, turbias ó en bedijas.

Partes genitales y reglas.—Prurito en el prepucio, en el glande y en el escroto; granos que supuran, hácia el medio del miembro.—*Sobreexcitacion del apetito venéreo y mucha lascivia* con ensueños voluptuosos y erecciones frecuentes.—*Vulva tumefacta*, con dureza, sensacion de desolladura, y dolores pulsativos con sensacion de ardor tan violentos, que no permiten por la noche permanecer en la cama, y arrancan lágrimas.—*Reglas muy abundantes y muy activas*, de sangre negra y espesa; evacuacion de mucosidades por la vagina, precedida de dolores que conducen al desfallecimiento y se prolongan hasta las ingles, la vejiga y el púbis.

Laringe.—*Ronquera permanente*, picor y sequedad en la laringe y la tráquea-arteria, mejorada solamente por el calor de la cama; *voz tomada constantemente*, con mucha fatiga en la laringe despues de la menor conversacion; aliento cálido.—*Tos excitada por un cosquilleo constante en la laringe*; *tos violenta que ocasiona vómitos*; tos como si ladrara, sobre todo por la noche y hácia la mañana; tos seca, *tos gruesa* con *expectoracion de mucosidades amarillentas ó verdosas*, ó espesas, viscosas y albuminosas; sensacion de ardor en la laringe despues de cada golpe de tos; *tos nocturna* con ó sin expectoracion; aumento de la tos por el calor de la habitacion y el de la cama, mejorándose con el agua fria tomada en pequeñas gárgaras; tos provocada por limpiarse los dientes.—*Expectoracion de mucosidades abundantes*, *albuminosas*, *blanquecinas ó amarillentas*, de un gusto salado, á veces con vomituricion, y aun con vómitos de alimentos despues de comer; expectoracion de mucosidades, *tos por la mañana*, con expectoracion de mucosidades amarillentas ó grises y rojizas, espesas, globulosas y de un gusto ágrio, ó agridulce y nauseabundo.—*Coqueluche?*.

Pecho y respiracion.—Aliento cálido.—Punzadas radiantes y presion en el pecho; *dificultad de la respiracion* como si el torax estuviera muy estrecho, con necesidad

Digitized by

de respirar profundamente.—El *corazon* está palpitante, y se aumenta por momentos; palpitaciones como por un sobresalto, con pulsacion en el pecho, la cabeza y en los oidos por la noche.—Presion y dolor hácia el corazon como si escarbaran y hubiera desolladura; sensacion como si todo afluyera hácia el corazon.

Dorso y miembros.—Tension, presion, punzadas y dolor de dislaceracion en los lomos, la nuca, el cuello, los brazos, las manos y los dedos, hasta en la region de los riñones, así como en las caderas, los muslos, las corvas, la tibia, las pantorrillas y los dedos de los piés, aumentándose por la mañana y por el movimiento.—Sensacion de picotazos y latidos, como por puntas de vídrio ó de corrientes eléctricas, en los muslos, las rodillas y sobre las uñas de los dedos de las manos y los piés, aumentados de tal suerte por el movimiento, que imposibilita el andar.

69.—COFFEA CRUDA.

COFF.—Coffea arabica.—Café crudo.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usa-das*: 3, 10, 30.—*Duracion de accion*: hasta 10 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Acon. cham. ign. n-vom.—El café es antídoto de psoricum y de todos los antipsóricos.

COMPÁRESE CON: *Acon. agar.* ang. *ars. bell.* bry. *canth.* carb-veg. *caust. cham. cocc.* coloc. con. *ign.* kal. laur. magn. *merc. n-vom. op.* phos. phos-ac. puls. rhus. sep. sulf. valer.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra: —*Sobreexcitacion nerviosa; Neuralgias excesivamente dolorosas.*—Malas consecuencias de un enfriamiento; Convulsiones; Prodromos de la viruela, del sarampion (y de la escarlatina); *Miliar purpúrea; Insomnio por sobreexcitacion nerviosa;* Fiebres intermitentes; *Malas resultas de una alegría inesperada ó excesiva*; Apoplejías sanguíneas y serosas?; Jaquecas?; Cefalalgia congestiva?; Dureza de oido; *Odontalgias y anginas* excesivamente dolorosas; *Dolores de parto y dolores cólicos muy violentos;* Peritonitis puerperal; Gritos y agitacion de los recien nacidos; Gastralgia?; Padecimientos gástricos por resultado de la viruela, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

Digitized by

SINTOMAS GENERALES.—**Mucha impresionabilidad dolorosa de las partes afectas.*—Excesiva movilidad de los músculos y agilidad de todo el cuerpo.—**Sobreexcitabilidad moral y física.*—*Aversion al aire libre*, con malestar y exacerbacion de los síntomas durante el paseo.—*Convulsiones con rechinamiento de dientes* y frio en los miembros. —**Insomnio* por exaltacion de la imaginacion, afluencia de ideas y visiones fantásticas.—Necesidad de acostarse y de cerrar los ojos, aun cuando no pueda dormir.—Mucho despeluzamiento, con *aumento de calor febril.*—°Fiebre con angustia inconsolable.—°Horripilacion con cólicos y agitacion violenta.—**Llantos, chillidos, gritos, agitacion y decaimiento*, sobre todo durante los accesos de dolor.—°Gritos en los niños.—*Ansiedad de corazon y de conciencia con aprensiones.*—*Vivacidad y locuacidad exaltadas.—Vivacidad y exaltacion de la imaginacion, con las facultades intelectuales mas pronunciadas.

Cabeza.—Garganta.—Dolores de cabeza como si el cerebro estuviese contundido.—*Cefalalgia semilateral*, como por un clavo introducido en el hueso parietal.—Pesadez de la cabeza.—Congestion á la cabeza, sobre todo hablando.—Ojos vivos, rojos, con vision mas perspicaz.—Sensibilidad excesiva del oido; los sonidos de la música parecen ser mas fuertes y mas agudos que lo que son en sí.—°Dureza de oido, con zumbido de estos. —Epistaxis con torpeza de la cabeza.—Calor de la cara con rubicundez de las mejillas.—**Tirones sucesivos y dolores vivos en los dientes con inquietud, ansiedad y llantos*, sobre todo por la noche y despues de la comida.—**Ligera inflamacion de la garganta con sensibilidad dolorosa*, é hinchazon del velo del paladar.

Estómago.—Deposiciones.—Gusto en la boca á avellanas ó á almendras dulces.—El humo del tabaco parece ser mas agradable.—Sensacion de hambre inmoderada. —Sed aumentada, sobre todo por la noche.—°Vómitos biliosos.—*Calambres de estómago*, con dolores presivos lancinantes.—Ansiedad y opresion en la region epigástrica; los vestidos oprimen.—**Dolores abdominales que conducen hasta la desesperacion*, sobre todo en las mujeres.—Deposiciones blandas, frecuentes.—**Diarrea*, °*tambien durante la denticion.*

Orinas y partes genitales.—Emision de orina abun-

Digitized by Google

dante, sobre todo hácia media noche.—Mucha excitacion del apetito venéreo, con flacidez ó fuerte excitacion de las partes genitales.—Excitacion inmoderada de las partes genitales de la mujer, con prurito voluptuoso, mucha secrecion mucosa y flujo frecuente de sangre.—Metrorragia.

Pecho y miembros.—*Tos corta, seca, por cortos accesos y muy aproximados, con mucha excitacion en la laringe y agitacion angustiosa.—*Accesos de sofocacion.*—Temblor de las manos, mientras se tiene en ellas algun objeto.—Contracciones calambroídeas de los dedos.—Calambres en las pantorrillas al doblar las rodillas.—Calambres en la planta de los piés, extendiendo el empeine.—Temblor de los pies.

70.—COLCHICUM AUTUMNALE.

COLCH.—Cólchico, Azafran bastardo.—*Archives de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 3, 10, 30.—*Duracion de accion:* hasta 30 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: N-vom. puls. cocc.

COMPÁRESE CON: Acon. chin. cocc. *merc.* natr-m. *n-vom. op. puls.* sep

---

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—*Afecciones reumáticas y artríticas*; Parálisis; Afecciones hidrópicas; Fatiga nerviosa debida á vigilias prolongadas; Sobreexcitacion nerviosa; Otorrea purulenta á consecuencia del sarampion; Gastritis?; Ascitis?; Afecciones gástricas; Disentería; Cólicos flatulentos, sobre todo en las personas histéricas; Afecciones de las vías urinarias y de los riñones; Calambres de pecho; Hidrotorax, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolor de dislaceracion reumático y artritico en los miembros* y otras partes del cuerpo, sobre todo por un tiempo cálido.—Punzadas con estremecimiento en los músculos y en el periostio de los miembros, particularmente por un tiempo frio.—Estre-

Digitized by Google

mecimiento frecuente del cuerpo.—Punzadas en las articulaciones.—*Debilidad paralítica en los músculos.*—Dolores acompañados de *debilidad paralítica y de parálisis real.*—Hinchazones hidrópicas.—Los padecimientos son extraordinariamente agravados por la fatiga intelectual, *el contacto*, una luz muy viva y el olor á carne de cerdo. —*Exacerbacion de los síntomas desde la entrada de la noche hasta la aurora.*—Decaimiento general, y por consiguiente, sensibilidad dolorosa de todo el cuerpo, de modo que no es dueño de moverse sin gemir.—°Fatiga nerviosa y debilidad por el trabajo de la noche.

Piel.—Prurito como por ortigas.—*Hormigueo en diferentes partes*, como si hubieran estado heladas.—Erupcion de rojo escarlata en la cara, en los brazos y muslos.

Fiebre.—Fiebre reumática, con cansancio sumo, doloroso en las articulaciones de las manos y de los piés, dolores en la espalda, en las caderas y en los riñones, la raiz de la lengua dolorida al tragar, sudores ácidos.

Sueño.—*Gana de dormir por el dia*, con inaptitud para el trabajo.—Insomnio por sobreexcitabilidad nerviosa.—Despierta frecuentemente asustado.—Calor nocturno con mucha sed.

Moral.—Excesivo *abatimiento*.—Mal humor.—Los padecimientos se hacen insoportables.—La menor impresion exterior saca á uno de sí.—Debilidad de la memoria.—*Olvido* y distraccion.

Cabeza.—*Presion en el occipucio*, durante algun esfuerzo intelectual.—Dolores de cabeza calambroídeos, sobre todo por encima de los ojos.—Dolor de dislaceracion semilateral en la cabeza.—*Hormigueo en la frente y en la cabeza.*

Ojos.—Dolores en los ojos, como si estiraran y escarbaran en lo profundo del ojo.—Hinchazon de los párpados inferiores.—Supresion de las glándulas de Meibomio.—Traccion visible en el párpado inferior.

Oidos.—Otalgia, con punzadas desgarradoras.—*Hormigueo en las orejas*, como si hubieran estado heladas.—Sensacion de obturacion en los oidos.—°Flujo purulento por los oidos, con dolores tractivos.

Nariz.—Dolor presivo en el hueso de la nariz.—Dolor de excoriacion en el tabique de la nariz, agravado por el tacto.—*Sensibilidad excesiva del olfato.*—Coriza tenaz, con

Digitized by Google

estertor de mucosidades viscosas y abundantes, que provienen de la nariz.

Cara.—Rasgos de la cara desfigurados.—*Aspecto enfermizo,* triste, de sufrimiento.—Rostro manchado de amarillo.—Hinchazon edematosa de la cara.—Sensacion como de separacion en los huesos de la cara.—Sensacion en los maseteros., como si se ensancharan, con dificultad de abrir la boca.—Traccion y estremecimientos sucesivos en los músculos y en los huesos de la cara. —*Dolor de dislaceracion semilateral en la cara,* desde el oido hasta la cabeza.—*Hormigueo en la piel de la cara,* como si hubiera estado helada.—Labios agrietados.—Dolor de dislaceracion en el labio inferior.—Dolores calambroídeos en la articulacion de la mandíbula.

Dientes.—*Odontalgia con dolores dislacerantes.*—Sensibilidad de los dientes cuando se tocan unos con otros al cerrar la boca.—Dolores agudos en las encías.

Boca.—Calor en la boca.—*Dolor dislacerante en el paladar.* —*Salivacion serosa*, abundante, con sequedad de la garganta.—*Torpeza, rigidez é insensibilidad de la lengua.*

Garganta.—Ligera inflamacion de la garganta, como por hinchazon del orificio del esófago.—Hormigueo en el paladar.—Constriccion en el esófago.—Inflamacion, dolor de dislaceracion y punzadas en el paladar y en la garganta.—Acumulacion de mucosidades verdosas en la garganta y en la boca.

Apetito.—Apetito que se satisface prontamente, solo con el aspecto ú olor de los alimentos, con repugnancia.—*Insipidez de los alimentos.*—Mucha sed, sobre todo con deseo del café,

Estómago.—Erutos de aire muy frecuentes.—Hipo contínuo.—*Náuseas* que llegan hasta hacer perder el conocimiento *por el olor de los huevos fritos ó de la carne grasienta.*—Náuseas mientras está comiendo.—Náuseas despues de haber tragado la saliva.—*Vómito de alimentos* ó de bílis, á veces con dolores violentos en el estómago, y diarrea biliosa amarillenta.—*Estómago muy sensible al tacto.*—Sensacion de excoriacion y hormigueo en el estómago.—*Sensacion de frio ó de ardor en el estómago.*—Punzadas en la boca del estómago.

Vientre.—Meteorismo y plenitud de vientre.—*Presion hácia el exterior en la parte superior del vientre.*—Cólico

Digitized by Google

con dolores dislacerantes.—Dolor de excoriacion en el lado izquierdo del vientre al tacto.—*Hinchazon hidrópica del vientre.—Dolor de quemadura y presion en el bajo vientre, en la region de la vejiga y en las partes genitales internas.

Deposiciones.—Estreñimiento.—*Deposiciones lentas*, difíciles, insuficientes, con necesidad urgente.—Evacuacion de las deposiciones sin sentirlo.—**Diarrea disentérica de mucosidades blancas*, trasparentes, gelatinosas.—Evacuacion de mucosidades abundantes por el recto.—Deposiciones sanguinolentas y como mezcladas de falsas membranas.—Prolapsus del recto.—Hormigueo, prurito, sensacion de ardor y *dislaceracion en el ano.*—Calambres en el esfinter del ano.

Orinas.—Necesidad urgente de orinar, con emision abundante de orinas claras.—**Emision poco abundante de orina de un color oscuro, con tenesmo y sensacion quemante.*—Orina parda, ó negruzca.—Sedimento blanquecino en la orina.—*Sensacion quemante y presion en las vias urinarias* y de la vejiga.—Tirones, dolores dislacerantes ó incisivos en la uretra.

Laringe.—Hormigueo en la tráquea-arteria.—Cosquilleo en la faringe, que provoca una ligera tos seca.—Tos frecuente, corta y seca.—Tos nocturna con emision involuntaria de orinas.

Pecho.—*Dificultad en la respiracion y opresion de pecho.*—*Opresion de pecho*, *tensiva*, *presiva* y periódica.—Punzadas en el pecho algunas veces al respirar.—*Dolor dislacerante en el pecho*, con punzadas obtusas.—Dolor de excoriacion en el pecho al tacto y durante el movimiento.—Hormigueo en el pecho.—*Violenta palpitacion de corazon.*

Tronco.—*Dolor de excoriacion en los riñones durante el movimiento.*—Dolor de dislaceracion en el dorso.—Tension lancinante entre los omóplatos.

Brazos.—*Dolores dislacerantes en los brazos*, *las manos y los dedos.*—*Dolor de parálisis en los brazos.*—Temblor de las manos.—Contraccion calambroídea de los dedos.—*Hormigueo en los dedos*, como si hubieran estado helados.—Torpeza en la punta de los dedos.

Piernas.—*Dolores dislacerantes en las piernas, los piés, y los dedos.*—Tirones paralíticos en los muslos.—*Hincha-*

Digitized by

zon caliente de las piernas, con dolores agudos durante el movimiento.—*Hormigueo en los pulgares*, como si hubieran estado helados.

71.—COLOCYNTHIS.

COLOC.—Coloquíntida.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmcop. homeop.—*Dósis usadas*: 24, 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. caus. cham. coff. staph.—*Se emplea como antídoto de* Caus.

COMPÁRESE CON: Arn. ars. *bell.* canth. *caus*: *cham.* coff. dig. *staph.* veratr.

CLINICA.—Dejándose conducir por el *conjunto de síntomas* se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra: *Polisarcia; Malos resultados de emociones morales con indignacion y afliccion*; *Afecciones calambrosas*; Afecciones artríticas; Artrocace; Fiebres biliosas, sobre todo las que son debidas á una afliccion ó á un acceso de ira; *Jaqueca;* Oftalmías artríticas y de otra naturaleza; Prosopalgia; Gastralgia, gastritis (?) y otras afecciones gástricas; *Cólicos espasmódicos*, inflamatórios y flatulentos; Timpanitis?; Enteritis?; *Cólicos á consecuencia de una indignacion ó de una humillacion*; Cólicos por enfriamiento; Padecimientos biliosos; Diarrea con vómitos; Diarreas crónicas; Disenterías; Fiebre puerperal; Hemorróides; Coxalgia; *Coxartrocacia*; aun la producida por una luxacion ú otra causa mecánica; Luxacion espontánea, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Padecimientos semilaterales.*—**Calambres dolorosos ó contracciones calambroideas* en las partes internas ó externas.—*Encogimiento de los tendones*, en algunas partes solamente ó en todo el cuerpo *con contraccion de todos los miembros*, hasta el punto de parecerse á un puerco-espin.—Rigidez de todas las articulaciones.—*Punzadas desgarradoras, que recorren el cuerpo en toda su longitud.*—Abatimiento físico durante la marcha al aire libre.—*Desvanecimiento con frio de las partes exteriores.*

Digitized by

Piel.—*Prurito penoso, con grande inquietud en todo el cuerpo*, sobre todo por la noche en la cama seguido de traspiracion.—Descamacion general de la piel.—Erupciones parecidas á la sarna.—°Piel caliente y seca.

Sueño.—Sueño agitado por la noche.—°Soñolencia con los ojos abiertos alternando con delirio.—Insomnio á consecuencia de un acceso de ira.—Durante el sueño, se está acostado sobre el dorso, con una de las manos apoyada sobre el occipucio.—Sueños frecuentes, vivos y lascivos.

Fiebre.—Frio y calofrios con calor en la cara, sin sed.—**Pulso duro*, lleno y acelerado.—°Calor seco, general.—*Sudor nocturno* con olor de orina, en la cabeza, en las manos, en las piernas y en los piés.

Moral.—*Decaimiento moral* con taciturnidad.—Humor lloroso.—**Ansiedad é inquietud*, con °intento de escaparse.—°Falta de sentimientos religiosos.

Cabeza.—Vértigos que llegan hasta el punto de hacer caer, cuando se vuelve prontamente la cabeza, con vacilacion de las rodillas.—Dolor de cabeza como proveniente de haberse expuesto á una corriente de aire, disipándose andando al aire libre.—*Dolor compresivo en el sincipucio* agravado al bajarse ó estando echado sobre el dorso.—**Accesos de dolor de cabeza semilateral, tractivo* y calambroídeo ó presivo, °*con náuseas y vómitos* algunas veces todos los dias hácia las cinco de la tarde.—Dolor en la frente y en los ojos, como partiendo del exterior y dirigiéndose hácia el interior.—Cefalalgia, dolores violentos, que no permiten estar acostado y hacen gritar ó llorar.—Accesos de dolores de cabeza seguidos de sofocacion.—°Congestion á la cabeza.—Dolor quemante en la piel de la frente y en la del cráneo.—°Calor en la cabeza.

Ojos.—Inflamacion de los ojos.—**Dolores quemantes incisivos y punzadas en los ojos*.—°Flujo de una serosidad ácre por los ojos.

Cara.—Pulsacion y hormigueo en la nariz.—Cara pálida y descompuesta con ojos abatidos.—*Dolores tensivos, desgarradores, quemantes ó lancinantes en la cara, frecuentemente de un solo lado, y extendiéndose hasta los oidos y la cabeza.—°Costras en la cara.—°Cara de un rojo oscuro (durante la fiebre).—Cara abotagada con calor y

Digitized by

rubicundez de la mejilla izquierda y dolores desgarradores.

Boca.—Dolores en los dientes como si el nervio estuviese tirante ó extendido.—*Dolores pulsativos en los dientes del lado izquierdo.—Aspereza de la lengua.—°Lengua cubierta de una costra amarilla.—Calambres en la garganta con erutos vacíos y palpitaciones del corazon.

Estómago.—Apetito disminuido, sin sed, y acompañado de un sabor insulso en la boca, ó bien aun cuando se tenga un gran deseo de bebidas.—Náuseas contínuas con erutos.—*Gusto amargo de la boca y de todos los alimentos.—**Por poco que se haya comido, cólicos y diarrea.*—*Dolores de estómago, algunas veces despues de la comida.—°Vómito de los alimentos ó de materias verdosas.—Vómitos con diarrea.—°Sensibilidad dolorosa del epigastrio al tacto.—Presion violenta en el estómago y la region precordial.

Vientre.—**Meteorismo como por una timpanitis.*—**Dolor calambroideo* y constriccion de los intestinos, sobre todo despues de un acceso de cólera.—**Cólicos excesivamente violentos*, con dolores incisivos, calambroídeos ó contractivos, que obligan á doblarse sobre sí mismo, *con inquietud en todo el cuerpo* y con sensacion de horripilacion en la cara, que parece partir del bajo vientre.—°Cólicos con calambres en las pantorrillas.—°Cólicos como por enfriamiento.—*Cólicos despues de la comida.—Pellizcos y sensacion como si agarraran con garfios en el vientre, aliviados por un movimiento violento.—*Dolores cólicos y punzadas en el vientre, como por un cuchillo, con despeluzamiento y dolores desgarradores que recorren las piernas.—*Gran sensibilidad; dolores de contusion y sensacion de vacuidad en el vientre.—*Abultamiento de vientre.—**El café y el humo del tabaco disminuyen los cólicos.*—°Hernia inguinal.

Deposiciones.—Estreñimiento.—*Deposiciones diarréicas* amarillo-verdosas, espumosas y de olor acedo, pútrido ó de moho.—Diarreas mucosas.—Deposiciones sanguinolentas.—**Deposiciones disentéricas*, con cólicos.—Durante la cámara, contraccion en el recto.—Hinchazon dolorosa de los *granos hemorroidales del ano y del recto.*—Flujo de sangre por el ano.—°Parálisis del esfínter del ano.

Digitized by Google

Orinas.—Tenesmo en la vejiga.—*Disminucion de la secrecion de las orinas.*—Emision de orinas abundantes y de color claro durante los dolores.—Orinas fétidas que muy pronto se espesan, se hacen gelatinosas y viscosas.

Partes genitales.—Sensacion como si todo afluyese hácia dichas partes desde los dos lados del vientre, como para provocar la eyaculacion.—Excitacion del apetito venéreo, como una especie de priapismo.—*Impotencia completa.*—Retraccion del prepucio detrás del glande.—Nudosidades dolorosas en las mamas.

Laringe y pecho.—*Cortos accesos de tos seca, provocada por una irritacion en la laringe* ó por fumar.—Accesos de asma por la noche.—Opresion de pecho como si estuviese comprimido.—Palpitaciones de corazon.

Tronco.—Dolores tractivos en el dorso, como si los músculos estuviesen estirados.—Tension en el cuello y en los omóplatos.—Infarto y supuracion de las glándulas axilares.

Brazos.—Dolor de contusion en la articulacion de la espalda, sobre todo despues de haberse encolerizado.—Dolor osteócopo presivo y lancinante en los brazos.—Dolor calambroídeo en las manos, que no permite abrir los dedos sino con dificultad.—Tirones en los tendones de los pulgares.

Piernas.—°Dolor en la articulacion coxo-femoral, como si estuviera oprimida por ligaduras de hierro, en la pélvis y en la region del sacro, *con dolores desde la region lumbar hasta las piernas.*—Lancinaciones tensivas en la region lumbar y en las caderas, sobre todo estando acostado de espalda.—Dolor durante la marcha, como si el psoas fuese muy corto.—°Luxacion espontánea de la articulacion coxo-femoral.—*Falta de flexibilidad en las rodillas que no permite ponerse en cuclillas.*—Calambres en las piernas.—Punzadas en las piernas, sobre todo estando en quietud.—Mucha pesadez y temblor de las piernas.—Dolor dislacerante en las plantas de los piés durante el reposo.

Digitized by Google

72.—CONIUM MACULATUM.

CON.—Cicuta mayor.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Coff. nitr-spir.—*Se emplea el conium como antídoto de*: Nitr-ac.

COMPÁRESE CON: Arn: asa. belt. coff. *dig. du'c.* graph. iod, *lyc.* magn-m. magn. merc. mosch. *nitr-ac. n-vom.* phos. phos-ac. plumb. *puls.* rhus. rut. sabad. sep. staph. sulf.-ac. tar. teucr. valer.

CLINICA.—Guiándose por el *cuadro de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—*Afecciones hipocondriacas*, sobre todo en los *celibatos de principios severos* y de una *abstinencia absoluta*, ó bien en las personas que han abusado del cóito; Espasmos, accesos de debilidad y otras *afecciones de personas histéricas*; Afecciones escrofulosas con induracion y obstruccion de las glándulas; *Afecciones de los viejos*, de las mujeres, y sobre todo de las embarazadas; *Antiguas afecciones á consecuencia de contusiones*, principalmente en las glándulas, así como tambien en las partes tendinosas y membranosas; Equímosis senil; Afecciones hidrópicas; Clorósis; Manchas hepáticas; *Herpes*; Induraciones escirrosas y úlceras carcinomatosas, sobre todo á consecuencia de una contusion; Cáries?; Ulceras gangrenosas?; Petequias?; Fiebres lentas?; Fiebres inflamatorias?; Melancolía hipocondríaca ó histérica; Manía?; Apoplejía con parálisis, principalmente en las personas de edad; Jaquecas; Hidrocéfalo?; Congestion cerebral con vértigos; Oftalmía, principalmente de las personas escrofulosas; Catarata producida por un golpe (una conmocion); Oscurecimiento de la córnea?; *Fotofobia escrofulosa*; Miopia; Presbiopia; Ambliopia amaurótica; Otalgia; Dureza de oido; Infarto de las parótidas; Ozena, aun la producida por el abuso del mercurio; Prosopalgia; *Cáncer de los labios*; Espasmos en la garganta; *Dispepsias*, *acedías*, náuseas y otras afecciones gástricas; Cáncer del estómago?; Estreñimiento; Lientería?; Diabetes?; Hematuria?; Catarro de la vejiga?; Retencion de orina; Estranguria; Orquitis por resultas de una contusion?; Impotencia á consecuencia de poluciones;

Digitized by Google

Poluciones en los jóvenes de una constitucion irritable; *Calambres de la matriz*; Dismenorrea; Amenorrea?; Flores blancas; Esterilidad con amenorrea?; Escirro (y cáncer) de los pechos, sobre todo á consecuencia de una contusion; Clorósis; Catarro con fiebre, angina y padecimientos gástricos; Tos seca en sujetos escrofulosos; Tos convulsiva y sofocante; Coqueluche; Hemoptísis?; *Asma, sobre todo de los ancianos*; Asma histérico?; Afecciones crónicas del corazon, etc., etc.

Véase la nota, pag. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Calambres y *dolores calambroideos en diferentes partes.*—*Cansancio sumo de los miembros y de las articulaciones durante el reposo.—*Dolores nocturnos* y padecimientos que turban el sueño.—Los síntomas aparecen durante el reposo, y se agravan al comenzar á andar ó al movimiento.—Facilidad á derrengarse.—**Accesos de padecimientos histéricos é hipocondriacos.*—Saltos de tendones, temblor y *sacudimientos convulsivos en los miembros.*—Ebullicion de sangre.—Hinchazones hidrópicas.—**Hinchazon é induracion de las glándulas*, con dolores de hormigueo y lancinantes.—*Accesos de desvanecimiento.—*Excesivo abatimiento general con risas involuntarias.—Sensacion de fatiga, sobre todo muy de mañana en la cama.*—*Inquietud en el cuerpo, sobre todo en las piernas.—*Falta de energía y debilidad nerviosa.*—Consuncion.—*Decaimiento súbito de fuerzas durante la marcha.—Mucha disposicion á resfriarse.—**Excesiva fatiga y otros padecimientos por el paseo al aire libre.*—*Falta constante de calor vital natural.—Movimientos convulsivos de las partes superiores del cuerpo, con parálisis de las partes inferiores.

Piel.—Punzadas y *prurito con picoteo en la piel.*—Color azulado de la piel en todo el cuerpo.—Inflamacion dolorosa de la piel.—°*Erupcion urticaria á consecuencia de un ejercicio corporal excesivo.*—Granos como los de la sarna, que se hacen costrosos.—°Manchas parduscas, ó rojas y pruritosas por el cuerpo, que desaparecen y vuelven á aparecer.—°*Herpes húmedos*, ó costrosos y quemantes.—Ulceras negruzcas, con flujo sanioso, sanguinolento y fétido, y extension con hormigueo.—Ulceras gangrenosas.

Digitized by Google

—Ulceracion de los huesos.—Panadizos.—Petequias.—**Manchas rojizas y verdosas como por equimosis.*

Sueño.—**Gana de dormir por el dia*, aun muy de madrugada.—Somnolencia.—**Gana de dormir por la tarde con caida de los párpados.*—*Sueño tardo.—Sueño agitado y no reparador, con llantos y ensueños frecuentes, ansiosos y espantosos.—Ensueños de enfermedades, de mutilaciones, de muertos, de peligros y de querellas.—Por la noche, dolor de cabeza, náuseas, gastralgia, epistaxis, dolores en los miembros, etc.—Ensueño incompleto, hácia media noche, con mucha angustia.—Pesadilla.—Estremecimiento de los miembros durante el sueño.

Fiebre.—Calofrios, frio y horripilacion frecuente.—Calor seco interior.—Fiebre lenta, con falta total de apetito.—Fiebre inflamatoria, con mucho calor, sudor abundante, anorexia, diarrea y vómitos.—Fiebre con inflamacion de la garganta y tos.—Pulso irregular.—*Sudores nocturnos*, aun al principio del sueño.—Sudores locales, fétidos y mordicantes.

Moral.—**Angustia histérica*, con tristeza y mucha gana de llorar.—Antropofobia, y sin embargo, miedo de estar solo.—Carácter perezoso (miedo de ladrones).—Ideas supersticiosas.—*Propension á asustarse.—**Mal humor y morosidad.*—**Indiferencia hipocondriaca.*—*Falta de energía moral.—*Inaptitud para el trabajo.*—*Irritabilidad y disposicion á enfadarse.—Ideas desordenadas y manía.—Confusion de ideas, como cuando se está amodorrado.—Concepcion lenta.—Debilidad de las facultades intelectuales y de la memoria.—*Olvida fácilmente.—Delirio.

Cabeza.—Embriaguez despues de haber tomado la mas pequeña cantidad de una bebida espirituosa.—**Vértigo rotatorio* al levantarse y °algunas veces llega á caer de lado, *cuando se mira hácia atrás*, ó cuando se está acostado sobre todo por la mañana en la cama.—*Golpe de sangre*, con cara hinchada y equimosada, como en un hombre estrangulado, respiracion difícil, pulso lento, extremidades frias.—*Accesos de dolores de cabeza con náuseas* y vómito de mucosidades.—Dolores que producen estupefaccion en la cabeza, sobre todo durante la marcha al aire libre.—Sensibilidad excesiva del cerebro, aun para la palabra, y un moderado ruido.—Dolores de cabeza cotidianos, por escasez de las deposiciones intestinales.

Digitized by Google

—Dolores semilaterales de la cabeza, como si estuviera contusa.—Sensacion como si hubiese en la cabeza un cuerpo extraño voluminoso.—Pesadez y plenitud en la cabeza, sobre todo por la mañana al despertarse.—Tirones en la cabeza, con entorpecimiento del cerebro.—*Accesos de dolores de cabeza dislacerantes, que obligan á acostarse.—**Dolores lancinantes tenaces en el sincipucio*, ó que parecen salir por la frente.—Pesadez y apretamiento como por un garfio en la frente, como si proviniera del estómago.—*Caida de los cabellos.*

Ojos.—*Presion en los ojos*, leyendo.—**Picazon por debajo de los ojos*, con dolor quemante y *que produce* escozor, cuando se les frota.—Punzadas con prurito ó escozor en el ángulo interno de los ojos.—°*Sensacion de frio en los ojos*, durante la marcha y al aire libre.—Dolor de quemadura en los ojos, con presion en las órbitas por la tarde.—Inflamacion y rubicundez de la esclerótica.—*Orzuelo en los párpados.—°(Manchas en la córnea).—Color amarillo de la esclerótica.—Ojos tiernos.—Ojos prominentes.—Mirar trémulo.—Oscurecimiento de la vista.—Ceguera momentánea por el dia, al ardor del sol.—**Miopia.*—*Presbiopia.—Diplopia.—Movilidad de los renglones cuando se lee.—*Manchas negras y bandas de color delante de la vista, estando en la habitacion.—Aspecto rojo de los objetos.—**Alucinamiento á la luz del dia.*—*Fotofobia °con color rojo pálido del globo del ojo.

Oidos.—*Dolor de dislaceracion y punzadas en los oidos y alrededor de las orejas*, sobre todo paseándose al aire libre.—**Acumulacion de cerúmen*, semejante á papel mojado, y que está mezclado de mucosidades purulentas.—Cerúmen de color de sangre.—**Zumbido, retintin y ruido sordo en los oidos.*—Sensibilidad dolorosa del oido.—°Disminucion del oido, que cesa cuando se saca el cerúmen, y hasta que este se ha reproducido ó renovado no vuelve.—°Hinchazon é induracion de las parótidas.

Nariz.—*Hinchazon de las ventanillas nasales.—°*Evacuacion purulenta por la nariz.*—Hemorragia nasal.—Exaltacion del olfato.—*Estornudo muy frecuente.—°Sensacion de sequedad penosa en la nariz.—°*Obturacion tenaz de las ventanillas nasales.*—°Obturacion de la nariz por la mañana.

Cara.—°*Calor en la cara.*—Color pálido, azulado y á veces

Digitized by Google

tambien con hinchazon de la cara.—Hendiduras en la piel de la cara con dolor de excoriacion despues de haberse lavado y enjugado.—**Dolores* nocturnos *en la cara*, dislacerantes y lancinantes.—*Prurito, erupciones con picazon, °herpes y úlceras corrosivas en la cara.—Erupcion granulosa en la frente.—Sequedad y excoriacion de los labios.—Ampollas y úlceras en los labios.—*°Ulcera carcinomatosa en el labio.*—Apretamiento espasmódico de las mandíbulas.—Rechinamiento de dientes.

Dientes.—**Odontalgia generalmente tractiva*, °provocada por andar al aire libre, ¯ó excitada por los alimentos frios en los dientes cariados.—*Punzadas, ¯sacudidas, corrosion y terebracion en los dientes.—Encías hinchadas, equimosadas y que dan sangre fácilmente.

Boca.—Sequedad de la boca y de la garganta, ó salivacion.—Palabra embarazosa.—Lengua entorpecida, dolorida, hinchada.—Dolor de garganta, como por una bola que asciende del epigastrio.—Deglucion impedida.—**Deglucion involuntaria.*—Necesidad constante de tragar cuando se anda contra el viento.—*Calambres en la garganta.*—*Aspereza en la garganta.

Apetito.—*Amargor en la boca y la garganta.—*Gusto pútrido ó ácido de la boca.—*°Falta total de apetito* y mucha debilidad de la digestion.—El pan no puede tragarse, ni agrada.—Bulimia.—Deseo de café ó de alimentos ácidos ó salados.—Durante la comida y sobre todo *despues de haber tomado cosas de leche*, *sensacion de meteorismo en el estómago y en el vientre*, y pronta saciedad.—**Despues de la comida*, *acedias*, *pirosis*, presion y plenitud en el estómago, erutos, ¯*cólicos*, flatulencia, *náuseas*, dedos como muertos, debilidad, fatiga y sudores.

Estómago.—*Erutos vacíos, frecuentes y sonoros, que á veces duran todo el dia.—*Erutos abortados con sensacion de plenitud en el hoyuelo del cuello.—*Erutos con gusto á los alimentos.*—*Pirosis que sube á la garganta, algunas veces despues de la comida.—Regurgitaciones ácidas, sobre todo despues de la comida.—**Náuseas con gana de vomitar y pérdida completa del apetito*, ó bien con erutos y laxitud.—Náuseas despues de cada comida por la tarde.—Vómitos de mucosidades.—Presion en el estómago aun durante la comida.—Meteorismo del estómago.—Dolor calambroídeo contractivo, *punzadas* y dolor

Digitized by

de excoriacion en el estómago y en el epigastrio.—*Dolor* con sensacion de frio en el estómago.

Vientre.—Dolor tensivo en los hipocondrios, como por una ligadura fuertemente apretada.—Presion, traccion, *dolor de dislaceracion y punzadas en la region hepática.*—*Lancinaciones en el hipocondrio izquierdo, á veces por la mañana en la cama, con opresion.—*Plenitud de vientre, aun por la mañana al despertarse.—Hinchazon de las glándulas del mesenterio.—*Contraccion de vientre con opresion.—Cólicos espasmódicos.—Dolores abdominales incisivos y lancinantes.—°Movimiento y dolor desgarrador en la region umbilical.—**Sensacion de excoriacion en el vientre*, sobre todo andando por empedrado.—*Ruido y borborigmos en el vientre.—Emision de ventosidades fétidas, frias, con dolores cólicos.—°Desarrollo de gases.—°Dolores cólicos al expeler las ventosidades.

Deposiciones.—*Estreñimiento con tenesmo.—*Deposiciones duras*, que solo se hacen cada dos dias.—*Deposiciones* diarréicas *no digeridas*, con dolores cólicos y erutos frecuentes.—*Diarreas debilitantes.*—Punzadas en el ano.—Ardor y sensacion quemante en el recto, durante y fuera del tiempo de las deposiciones.—Deposiciones con estrías sanguinolentas.—Despues de las deposiciones debilidad, palpitacion de corazon, emision frecuente de gases y temblor.

Orinas.—°Presion en la vejiga, como si las orinas fuesen á salir violentamente.—*Por la noche emision de orina* frecuente y algunas veces involuntaria.—Flujo de orina con dolores violentos.—°*Orina espesa*, blanca, turbia.—Orinas rojas.—Retencion de la orina.—Emision difícil de una orina que no fluye mas que gota á gota.—Emision nocturna.—Se orina en la cama.—*Gana frecuente de expeler una orina clara y acuosa.—Moco viscoso mezclado con orinas que no se pueden evacuar, sino con grandes dolores.—Evacuacion de pus por la uretra.—*Hematuria*, algunas veces con dificultad de la respiracion.—*Las orinas se detienen de golpe y no empiezan á fluir hasta despues de algunos instantes.—*Dolores incisivos en la uretra durante la emision de las orinas.—Sensacion quemante y punzadas en la uretra, sobre todo despues de la emision de las orinas.

Partes viriles.—**Hinchazon de los testículos.*—Lascivia.—

Digitized by Google

°*Impotencia y falta de ereccion.*—°Falta de energía en el cóito.—°*Erecciones insuficientes y de muy corta duracion.*—Emision fácil de esperma, aun sin fuertes erecciones.—°Despues del cóito sumo abatimiento.—**Poluciones inmoderadas.*—Secrecion de licor prostático durante las deposiciones y despues de toda emocion moral.

Reglas.—°*Calambres de la matriz*, con pellizcos ó dolor de crispatura ó como si escarbaran por encima de la vulva, acompañados de tension en el vientre, y de punzadas hasta el costado izquierdo del pecho.—**Comezon en las partes genitales* externas é internas.—Punzadas en la vagina y sensacion como si todo se dirigiese hácia abajo.—Punzadas en los labios de la vulva.—**Reglas muy anticipadas y °muy débiles.*—**Supresion de las reglas.*—Antes de las reglas dolores en los pechos; ensueños ansiosos, calor seco, cansancio de los miembros, humor lloroso, inquietud y dolores hepáticos.—*Durante las reglas, sensacion como si todo afluyese hácia abajo y tirones en el muslo ó *calambres dolorosos en el vientre.*—**Leucorrea quemante*, *ácre*, *corrosiva* y mordicante, acompañada ó precedida de cólicos.—Mamas lácias.—*Induracion escirrosa de las glándulas mamarias, con prurito y dolores lancinantes.

Laringe.—Catarro con fiebre, dolor de garganta y falta de apetito.—Ronquera.—Sequedad de la laringe circunscrita á una pequeña parte, y cosquilleo que da gana de toser.—*Tos provocada por comezon y arañamiento en la garganta.*—Tos seca provocada por un cosquilleo, con opresion de pecho y fiebre por la tarde.—Tos sofocante, con calor fugaz en la cara.—**Tos seca*, *convulsiva.*—**Tos como la de la coqueluche*, *con expectoraciones sanguinolentas*, *ó por accesos por la noche.*—La tos se manifiesta generalmente por la noche ó por la tarde.—Tos provocada respirando profundamente, ó tomando cosas ácidas ó saladas.—Tos bronca, pero sin expectoracion.—Expectoracion amarilla, purulenta y de olor pútrido.—Tos que se aumenta estando acostado.—Durante la tos, dolores en la cabeza ó en el vientre, con punzadas en el costado izquierdo agravadas por el movimiento.

Pecho.—**Respiracion corta andando*, y al menor movimiento, frecuentemente con tos convulsiva.—**Dificultad de la respiracion*, *aun por la mañana al despertarse.*—Res-

Digitized by Google

piracion difícil y lenta, sobre todo por la noche en la cama.—Dificultad de la respiracion con dolores de pecho por la noche en la cama.—Accesos de sofocacion como si alguna cosa obstruyese la garganta.—**Punzadas en el esternon* ó en el costado del pecho.—Dolores violentos en el pecho con fuerte tos.—Presion en el pecho, en el esternon y en la region del corazon.—Dolores tractivos en el pecho.—*Sacudidas en el pecho.—Palpitaciones de corazon, sobre todo despues de haber bebido.—Golpes frecuentes en la region del corazon.—Cáries del esternon.

Tronco.—Dolores en los riñones cuando se inclina hácia atrás.—*Presion y compresion por encima de las caderas.—Dolor presivo, calambroídeo y tractivo en el dorso.—*Tension en la nuca.—Dolor de excoriacion en las vértebras del cuello.—Engrosamiento del cuello.

Brazos.—**Espaldas doloridas, como si estuvieran magulladas y excoriadas.*—Herpes húmedos, costrosos y quemantes en el antebrazo.—Adormecimiento de las manos, y sobre todo en la palma de estas.—**Sudor en la palma de las manos*.—Torpeza de los dedos.—Prurito en el dorso de los dedos.—Manchas amarillas en los dedos y uñas amarillentas.—Panadizo.

Piernas.—Dolores tractivos en las caderas.—Dolores artríticos en las rodillas, dislacerantes y tensivos, agravados al empezar á andar, despues de haber estado sentado, con sensacion como si los tendones fuesen demasiado cortos (durante la supresion de las reglas).—*Inquietud y postracion de las piernas.—*Laxitud en las rodillas.—Hinchazon dolorosa en las piernas y en los piés.—°*Manchas rojas en las pantorrillas*, algunas veces dolorosas, volviéndose verdes ó amarillas en seguida, como despues de un golpe ó una contusion, y que impide mover el pié, que se halla retraido, como si los tendones se hubiesen acortado.—Calambres en las pantorrillas.—*Frio y *mucha disposicion á enfriarse los piés*.—Torpeza é insensibilidad de los piés.—Vesículas purulentas en los piés.

Digitized by Google

73.—COPAIVÆ BALSAMUM.

COP.—Bálsamo de copaiba.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop. *Dósis usadas*: 5, 30.—*Duracion de accion*: 10 á 12 dias.—Medicamento poco conocido, y que no se ha empleado sino contra las gonorreas.

SINTOMAS.—Erupciones urticarias.—Fiebre cotidiana antes de medio dia, calofrios y frio; despues de medio dia, calor general y sed con deseo de agua fria.—Durante el frio febril, el empeine del pié está dolorosamente sensible al movimiento.—*Espuicion de sangre.*—Gana de vomitar.—*Dolores de dislaceracion en el vientre*, precedidos de tirones en los huesos de los muslos.—Sensacion de quemadura en el vientre.—Borborigmos y movimientos en los intestinos.—*Deposiciones blancas*, *diarréicas*, principalmente por la mañana, con frio y dolores dislacerantes tractivos en el vientre, que obligan á doblarse sobre sí mismo.—Deposiciones involuntarias.—*Gana continua é inútil de orinar.*—Estranguria.—Prurito, escozor y sensacion de quemadura en la uretra antes y despues de la emision de las orinas.—Dolor de excoriacion en el orificio de la uretra.—*Inflamacion é hinchazon del orificio de la uretra*, *la que queda abierta*, con dolor pulsativo en todo el miembro.—Flujo amarillo y puriforme por la uretra.—*Metrorragias.*—Palpitaciones de corazon.

74.—CORALLIUM RUBRUM.

COR.—Coral rojo.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 30.—Remedio todavia muy poco conocido.

SINTOMAS GENERALES.—Cansancio sumo de los miembros despues del menor ejercicio al aire libre.—Manchas rojas y lisas en la piel.—Sensacion de frio en las partes calientes al descubrirlas.—Los síntomas de calor y de frio se mejoran por el calor artificial.—Calofrio febril, con sed ardiente y dolores en la frente.—Calor seco

Digitized by Google

interior y exterior con pulso lleno y duro.—Bostezos violentos, frecuentes, que se suceden con rapidez, con dolor en la articulacion de la mandibula.—*Gana irresistible de dormir.*—Ensueños ansiosos y sobresaltos en durmiéndose.—En durmiendo agitacion y anhelacion.—Humor regañon é imprecaciones á causa de los dolores.—Irascibilidad y mal humor.

Cabeza.—Cabeza pesada, como á consecuencia de una embriaguez.—Confusion en la cabeza, que está como vacía y hueca.—Embriaguez despues de haber bebido muy poco vino.—*Cefalalgia presiva como si todo lo que hubiera en el cráneo se fuese á salir por la frente*, lo que obliga á estar moviendo la cabeza, y no se siente alivio, sino descubriendo el cuerpo, manifestando entonces un calor quemante.—Cefalalgia violenta, con náuseas fuertemente agravadas desde el momento que uno se sienta.—Dolor en el sincipucio, como si estuviese aplastado.—Agravacion de los dolores de cabeza y arrebato de sangre á esta y á la cara, bajándose.—Sensacion como de viento que atraviesa la cabeza en moviéndola rápidamente.—Sensacion como si la cabeza hubiera aumentado de volúmen.

Ojos.—Sensacion de compresion en las órbitas.—Dolor de excoriacion en los ojos, moviendo el globo ó los párpados.—Sensacion de calor en los ojos, cerrando los párpados; sensacion como si se inundasen de lágrimas.—Sensacion de quemadura en los ojos á la luz de las bujías.

Nariz.—*Hinchazon semilateral de la nariz*, con calor, pulsacion é insomnio.—Ulcera que causa dolor en la nariz.—Epistaxis, algunas veces por la noche.—Mucha sequedad en la nariz.—Coriza fluente con secrecion excesivamente abundante, de una mucosidad inodora que parece sebo.

Cara.—*Calor de la cara*, que se aumenta bajándose.—Dolor de contusion en el pómulo, que se agrava al tacto.—Dolor de luxacion en la articulacion maxilar, cuando se mastica, y en abriendo mucho la boca.—*Hinchazon dolorosa de las glándulas submaxilares.*—Labios agrietados, doloridos.

Apetito.—Excesiva sequedad del paladar y de la garganta, con sensacion de excoriacion al tragar.—*Insipi-*

Digitized by Google

dez de los alimentos.—Gusto dulce de la cerveza.—Deseo de cosas ácidas ó saladas.—Despues de la comida, la cabeza anda alrededor como si estuviera ébrio.

Partes genitales.—Orinas quemantes y de color de arcilla, con sedimento del mismo color.—Mucho sudor en las partes genitales.—Hinchazon del prepucio con dolor de excoriacion al tacto.—*Gonorrea bastarda*, con secrecion fétida y de color verde amarillento.—Ulceras rojas y lisas en el glande y en la cara interna del prepucio, con secrecion saniosa y amarillenta.—Poluciones.

Pecho.—Tos dolorosa como si hubiera una piedra que deprimiese la pleura.—Expectoracion, amarilla, puriforme, á consecuencia de la tos.—*Respirando profundamente*, *sensacion* de frio *en las vias aéreas*, con ruido estrepitoso de un moco bronquial y difícil de arrancar.

Miembros.—Dolor presivo en los omóplatos, agravado al toser.—Rigidez de la nuca.—Dolores en las articulaciones escapulares, como si la cabeza del húmero estuviese violentamente oprimida hácia afuera.—Manchas lisas y de color rojo oscuro en la palma de las manos y en los dedos.

75.—CROCUS SATIVUS.

CROC.—Azafran cultivado.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop homœop.—*Dósis usadas*: 6, 30.—*Duracion de accion*: hasta 7 dias.
ANTÍDOTOS: Op.
COMPÁRESE CON: Acon. bell. ign. mos. op. plat.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra:—Baile de San Vito; Afecciones histéricas; Imbecilidad; Melancolía; Melancolía religiosa; *Hemorragias activas*; Coma; Blefarospasmo; *Metrorragia*, aun la que subsigue al parto ó la debida á un susto; Hemoptisis?; Aborto; Loquios muy abundantes, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Movimientos como de alguna cosa viva* en diferentes partes del cuerpo.—Accesos con-

Digitized by

vulsivos, como la corea, con risas, saltos y danzas que alternan con accesos de coqueluche.—Sensacion de relajacion y de flexibilidad en las articulaciones.—*Adormecimiento de algunos miembros por la noche ó durante el sueño.*—Mejoría de los síntomas al aire libre; muchos de ellos *aparecen por la noche*, y *se agravan*, en general, *por la mañana.*—Ebullicion de sangre, algunas veces en todo el cuerpo.—**Flujo por diversos órganos de una sangre negra y viscosa.*—Pesadez y cansancio sumo de los miembros despues de un ligero ejercicio.—*Alternativa notable de síntomas físicos y morales los mas opuestos.*—Debilidad general excesiva, con *accesos de desvanecimiento* durante el movimiento.—Suma *postracion por la mañana.*—Temblor de todos los miembros.

Piel.—Rubicundez escarlata en todo el cuerpo.—Sabañones.—Supuracion de las heridas antiguas.

Sueño.—*Mucha gana de dormir entre el dia*, sobre todo despues de la comida, algunas veces á última hora de la tarde.—*Soñolencia* con ojos empañados y vidriosos.—Cánticos, gritos, sobresaltos durante el sueño.—Ensueños espantosos, ó alegres y placenteros.

Moral.—*Mucha disposicion á entristecerse*, alternando algunas veces con *excesiva alegría y humor jocoso.*—*Mucha gana de reir*, de chancearse y de cantar, algunas veces con debilidad excesiva.—*Manía alegre y festiva*, con palidez de la cara, dolor de cabeza y oscurecimiento de la vista.—No tiene voluntad propia.—Arrebato colérico y violento, frecuentemente seguido de un arrepentimiento inmediato.—*Alternativa de dureza y de dulzura de carácter.*—*Olvido y distraccion.*—Vivacidad de la memoria.

Cabeza.—Cefalalgia estupefaciente, como si se estuviese ébrio, con ojos abatidos.—*Vértigos con desvanecimiento.*—Vértigo con turbacion al levantarse despues de haber estado acostado.—Cefalalgia por encima de los ojos, con dolor quemante, sensacion de quemadura y presion en los ojos, sobre todo al nochecer con la luz artificial.—Cabeza pesada por la mañana, con presion en el vértice.—*Dolor tractivo en la frente*, con náuseas.—Pulsacion semilateral en la cabeza y en la cara.—*Golpes en la frente* y en las sienes.—Sensacion de vacilacion en el cerebro durante el movimiento.

Ojos.—Prurito en los párpados.—Hormigueo en las co-

Digitized by

jas.—Presion, *dolor de excoriacion* y *sensacion de quemadura en los ojos* y en los párpados, sobre todo cerrándolos ó leyendo, ó por la noche á la luz de las bujías.—*Sensacion de hinchazon de los ojos* como si hubiera llorado mucho.—Sequedad de los ojos.—*Lagrimeo* en leyendo.—*Aglutinacion nocturna de los párpados.—Estremecimiento visible de los párpados.*— Pesadez y contraccion calambroídea de los párpados.—°*Calambres nocturnos en los párpados.*— Pestañeo contínuo.— *Pupilas dilatadas.*— Necesidad contínua de frotar los ojos.—Vista turbia como á través de un velo, sobre todo por la noche leyendo á la luz de las bujías.—El papel parece tener un color rojo pálido cuando se lee.—Chispas delante de los ojos.

Oidos.—Otalgia semejante á un calambre.—Retintin en los oidos por la noche despues de haberse acostado.—Ruido en los oidos, con dureza de oido, sobre todo bajándose.

Nariz.—*Epistaxis de una sangre negra y viscosa*, las mas veces solo por una nariz, y hasta hacer perder el conocimiento.— Estornudo violento y frecuente.

Cara.—*Color térreo de la cara.*— Alternativa de rubicundez y palidez del rostro.— Calor ardiente de la cara, sobre todo por la mañana.— Labios agrietados y ulcerados.—Pulsacion en un solo lado de la cara.—°Manchas rojas en la cara.

Boca.—Picazon y aspereza en la boca.—Acumulacion de agua en la boca.— Lengua húmeda y cubierta de una costra blanca, con ereccion de las papilas.

Garganta.—*Ligera inflamacion de la garganta como por prolongacion de la úvula*, ó como si hubiera un tapon en la garganta durante y fuera del acto de la deglucion.—*Carraspera y aspereza en la garganta.*

Apetito.—Gusto repugnante, ácido, insípido.—Gusto dulce ó amargo en el fondo de la faringe.—Sed contínua por la tarde, con malestar del vientre despues de haber bebido.—Falta de apetito, con sensacion de plenitud por poco que se haya comido.

Estómago.—Erutos vacíos por la mañana en ayunas.—*Pirosis* despues de haber comido con buen apetito.—Desabrimiento, desazon y sensacion de desfallecimiento en el epigastrio.—Dolor quemante en el estómago.—Borborigmos y fermentacion en el epigastrio.

Digitized by

Vientre.— *Vientre meteorizado, con sensacion de plenitud.*— Dolores de vientre calambroídeos.—Pellizcos en el vientre despues de haber bebido (agua).— Dolores de vientre por enfriamiento.— *Movimientos en el vientre como por una cosa viva.*— Golpes debajo del hipocondrio izquierdo.— *Sensacion de pesadez en la region inguinal.*

Deposiciones.—*Prurito y hormigueo en el ano.*—Punzadas obtusas en el costado y por encima del ano.

Orinas.—Flujo de sangre por la uretra.—Orinas amarillas.

Reglas.—*Afluencia de sangre hácia las partes genitales*, como para presentarse las reglas.—*Reglas muy frecuentes y abundantes.*—Reglas dolorosas.—*Metrorragias de una sangre negra y viscosa.—Evacuacion de sangre durante el novilunio y plenilunio.

Laringe.—*Tos violenta, seca, que conmueve*, y se alivia muchas veces pasando la mano por el epigastrio.

Pecho.—Dificultad de la respiracion.—Necesidad de respirar profundamente á consecuencia de una sensacion de peso en el corazon.— Al inspirar, sensacion como si se hubiese introducido vapor de azufre en la garganta. —Aliento fétido.— Punzadas en el pecho, y sobre todo en los costados.— *Movimientos como por alguna cosa viva* en el pecho.— Golpes en el pecho que suspenden la respiracion.—Sensacion de calor que sube al corazon, con ansiedad y dificultad de la respiracion, aliviada por bostezos.— Sensacion de peso en el corazon.

Tronco.—Tirones en los riñones, con dolor en las ingles. —Sensacion de rigidez en el cuello durante el movimiento.— Hinchazon del cuello al exterior.

Brazos.— Dolor en la articulacion escapular moviendo el brazo, como sucederia si estuviera dislocado ó fuese á dislocarse.— *Adormecimiento del brazo y de las manos*, con inmovilidad, sobre todo por la noche durante el sueño.—Tirones como si escarbaran en los antebrazos. —*Pesadez y dolor de contusion en los antebrazos*, despues de haberlos movido ligeramente.— Picotazos ardientes y tension en la punta de los dedos, como por estancacion de sangre, despues de pasearse al aire libre.—*Sabañones en las manos y en los dedos.*

Piernas.— Sensacion de debilidad en los muslos estando sentado.— Dislaceracion nocturna en una pierna con

Digitized by Google

inquietud en esta parte.—Dolor de contusion en las pantorrillas.—Fatiga en la planta de los piés, con dolor quemante y hormigueo.—*Sabañones en los dedos pulgares.*

76.—CROTALUS HORRIDUS.

CROTAL.—Veneno de la serpiente de cascabel.—HERING.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Duracion de accion;* muchas semanas.

ANTÍDOTOS: 1.° phosph. 2.° ar. bell. caps.

COMPÁRESE CON: 1.° bell. hep. merc.; 2.° ars. caus.; 3.° carb-veg. phos-ac · 4.° alum. caps. con. dulc. natr-m. n-vom. samb. veratr.

SINTOMAS GENERALES.—*La mayor parte de sintomas se manifiestan del lado derecho*, y los dolores parecen ocupar con preferencia los huesos de los miembros.—Los sujetos gruesos parece son mas afectados que las personas delgadas.—°*Afecciones de la primavera.*—°Endolorimiento de todos los miembros, no permitiendo ni aun estar acostado.—°Reumatismos inveterados.—°*Parálisis.*—Laxitud, accesos de desfallecimiento, muerte aparente.—Temblor por todo el cuerpo.—Espasmos y convulsiones.—*Hemorragias por todas las aberturas del cuerpo.*—Sangran fácilmente las heridas.—°*Clorosis?*

Piel y lesiones de continuidad.—Equimosis.—Manchas negras, rojas ó jaspeadas.—Manchas amarillas en toda la piel.—°*Ictericia.*—°*Fiebre amarilla.*—Hinchazon edematosa del cuerpo.—Ulceras alrededor de las heridas crónicas.—Se abren de nuevo las antiguas cicatrices.—Gangrena con rubicundez negruzca.

Sueño.—Excesiva somnolencia, aun en medio del dia, ó por la tarde.—Por la mañana al despertar, miembros como quebrantados.—°Delirios nocturnos, con ojos abiertos.

Fiebre.—Fiebre ardiente.—Pulso casi insensible, trémulo, intermitente.—°Fiebre tifoídea.—Fiebre terciana.—Sed durante la fiebre.

Moral—Abatimiento con indiferencia para todo.—Angustia é inquietud.—°*Melancolía.*—°Humor querelloso.—°Demencia.—Debilidad notable de la memoria.

Cabeza.—Vértigos.—Afecciones cerebrales.—°*Cefalalgia* por congestion de sangre y constipacion.—Estremeci-

Digitized by Google

miento y vacilacion en el vértice, sobre todo subiendo las escaleras.—*Punzadas en las sienes.*— Prurito violento en la piel del cráneo, con formacion de películas.—Hinchazon de la cabeza.

Ojos.—**Sensacion de ardor en los ojos.*—Rubicundez de los ojos, con lagrimeo.— *Flujo de sangre por los ojos.*— *Ojos amarillos* ó tiernos, turbios y ojerosos.— Pupilas dilatadas.— Escotomía en leyendo.

Oidos.— Calor en los oidos.— Estirones con sensacion de obturacion.— Flujo de sangre por los oidos.

Nariz.— *Epistaxis*, con vértigos.

Cara.— *Cara blanca como alabastro*, con cerco azul alrededor de los ojos.—Color aplomado.—Cara amarilla °ó roja y tumefacta.— Erisipela en la cara.—°Granos en la cara en los jóvenes en la primavera.— Temblor de los labios.— Calambres en las mandíbulas.

Dientes. — Sacudimientos en una muela como por un golpe.— Exfoliacion de los dientes.— Vacilacion de los dientes.

Boca y garganta.—Lengua negra é hinchada.—Pérdida de la palabra, como por constriccion de la lengua y de la garganta.—Palabra confusa, indistinta.—Deglucion difícil de la saliva.— Necesidad frecuente de tragar la saliva, con sensacion como si la garganta se comprimiese.—*Hidrofobia.*

Gastricismo.— Regurgitacion de un líquido ágrio y ácre, despues de haber comido pan blanco.— Pirosis.— Náuseas por accesos, sobre todo durante la marcha y al parar.—*Despues de haber comido cualquiera cosa, vómito de los alimentos, violentos, verdosos, biliosos y muy amargos.— Vientre tan fuertemente irritado que arroja todo cuanto toma.*

Estómago y vientre.— Dolores de estómago.— Endolorimiento en la boca del estómago.— Punzadas en la boca del estómago.— Presion en el estómago, con gusto rancio en la garganta.— Incomodidad de los vestidos alrededor de los hipocondrios.— Presion debajo de la region esplénica ó punzadas como despues de una carrera forzada.—**Dolores cólicos*, °por la mañana y despues de comer.—Sensacion de ardor en el vientre.—Inflamacion de los intestinos.—Vientre timpanítico como si estuviera muy lleno, con dolor al tacto y sensacion de ardor.

Digitized by

Ano y deposiciones.—°Estreñimiento con dolor de cabeza.—Deposiciones diarréicas frecuentes, con dolores cólicos por debajo del ombligo.—Evacuaciones involuntarias.—*Sangre por el ano.*

Orinas.—°Retencion de las orinas que ocasiona dolor, con gritos muy fuertes.—Sensacion como si una bola rodara por la vejiga y quisiera salir por la uretra.—Orinas aumentadas.—Orinas saturadas y aumentadas.—Salida de sangre por la uretra.

Partes viriles.—Apetito venéreo exaltado.

Laringe.—Ronquera y voz apagada, bronca.—Cosquilleo en el hoyuelo del cuello, que provoca la tos.—Tos seca.—Tos con punzadas en el costado.—Expectoracion sanguinolenta.—Hemoptisis.—Dolor en la laringe al tacto.

Pecho.—Respiracion rápida, con la boca abierta.—°Mucha opresion de pecho por la noche, no permitiendo estar acostado de ningun lado.—Disnea con sed inextinguible.—Disnea con angustia, náuseas, sed y diarrea.—°*Opresion hasta el desfallecimiento.*—Dolores en el pecho, con vómitos de materias verdosas.—Neumonía.—Pericarditis.

Tronco.—°Dolores de riñones.—Hinchazon debajo de la mandíbula y alrededor del cuello.

Miembros superiores.—En la articulacion humeral, nudosidades blandas debajo de la piel, con punzadas.—°Dolor de excoriacion en los brazos, como á causa de una contusion.—Temblor de las manos durante el reposo.—Dolores osteócopos, paralíticos, en los dedos.—Salida de sangre debajo de las uñas.—°*Panadizo.*

Miembros inferiores.—Adormecimiento fácil de las piernas en cruzándolas.—Estirones por la tarde al andar, desde la cadera derecha hasta el pié.—Dolor calambroídeo y laxitud en los muslos, como despues de esfuerzos penosos.—Ulceras en el muslo.—Dolores artríticos en la rodilla.—Hinchazon del muslo con sensacion de ardor.—Dolores como de rotura en los maléolos, muy fuertes andando.—Dolor de excoriacion en la planta de los piés, como por haber andado sobre un piso puntiagudo.—Hinchazon de los piés, con sensacion de frio y de ardor interior.—Dedos pulgares de los piés, como resentidos por haber andado mucho tiempo.

Digitized by

77.—CROTON TIGLIUM.

CROT.—Aceite de croton.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—Medicamento todavía muy poco conocido en la práctica.

SINTOMAS GENERALES.—Laxitud general y abatimiento; dolores en los miembros.—*Malestar general* con laxitud seguida de gana de dormir, agravada acostándose, con pérdida de la vista y del oido; gotas de sudor sobre la frente y sensacion al salir como si fuera imposible llegar á la casa próxima, con vértigo, palidez de la cara, laxitud y abatimiento, necesitando salir al aire libre, donde sin embargo se halla peor.—*Quebrantamiento del cuerpo*, algunas veces con sensacion de malestar.—Sensacion de adormecimiento en todo el cuerpo.—Fuerte excitacion de todo el cuerpo; temblor general.—*Debilidad* á veces con malestar ó bien con abatimiento.—Accesos de desvanecimiento.—Mejoría de los síntomas durante el sueño.

Piel.—Piel ardiente, sobre todo en las manos, con hinchazon de las venas; prurito seguido de dolor quemante; inflamacion vesiculosa de la piel; rubicundez con pústulas que al dia siguiente forman costras; pústulas con inflamacion casi general de los tegumentos del vientre y seguida de descamacion.

Sueño.—*Bostezos frecuentes* por la mañana con sensacion de flacidez y de endolorimiento en el estómago.—*Necesidad de dormir*, invencible despues de medio dia, obligando á acostarse y sin poder dormir, con palpitaciones de corazon.—*Sueño agitado por la noche*, á causa de una *afluencia de ideas* penosas, y angustiosas algunas veces.—*Por la noche en la cama*, agitacion angustiosa sin poder dormir, despues sueño ligero con ensueños penosos.—Se despierta á media noche de un sueño pesado, con pesadez en las piernas, como plomo; al despertar, laxitud, quebrantamiento de los miembros, pesadez y atontamiento de la cabeza; dolor de cabeza que hace despertar.—Se despierta súbitamente.—*Se duerme* acostado sobre el dorso, y se despierta por una polucion.—*Muchos ensueños*, penosos y aflictivos, de sí mismo.

Digitized by

Fiebre.—*Frio* con extrema facilidad; frio sobre todo en las extremidades, y que se présenta con carne como de gallina, y se disipa en la cama; frio despues del medio dia, el que no cesa ni aun en la misma cama; *frio* principalmente en el dorso, sobre todo en el vientre; *frio* desde los piés hasta las pantorrillas; frescura de la piel, hasta que se eleva el pulso, que entonces se pone caliente y aun madorosa; frio repentino y palidez de las manos (como muertas) con arrugas en los dedos.—*Frio* con horripilacion; por la tarde, calofrio, recorriendo todo el cuerpo.—Estado *febril*, algunas veces doloroso; primero con calor aumentado de todo el cuerpo, despues con sensacion de frio en el dorso y en la region de las vértebras lumbares.—*Aumento de calor por todo el cuerpo*, y en el vientre.—*Calor*, que parte de las vértebras lumbares; calor general con traspiracion y cefalalgia; calor quemante, con escozor, despues del frio que empieza en las vértebras lumbares.—*Pulso* frecuente y lleno, acelerado y vivo, *débil* y algunas veces frecuente al mismo tiempo, ó bien pequeño y lleno, pequeño y acelerado.—*Sudor*, á veces solamente en la frente.

Moral.—*Tristeza*, á veces con repugnancia al trabajo, ó con ansiedad y disgusto por todo; *melancolía frecuente*.—Agitacion.—Humor *regañon*, algunas veces con tédio.—*Repugnancia al trabajo*, se pasea con indiferencia y no emprende nada con formalidad.—Fisonomía descompuesta con ojos huraños y centelleo.—Debilidad de la memoria.

Cabeza.—Turbacion de la cabeza, y al levantarse, se está como desvanecido, atontado y con presion en la frente; y en este sitio presion y pesadez, y con presion en las sienes y algunas veces *en el occipucio*, como si estuviera cogido con un tornillo (en el lado izquierdo), con pesadez en la cabeza, y como si escarbaran en los ojos, con plenitud, oscurecimiento y pesadez en la frente, sobre todo en el lado derecho, con presion que desciende y se propaga desde el occipucio hasta el oido con punzadas; *aturdimiento* en la cabeza como por bebidas espirituosas.—*Vértigos*: con dolores de cabeza, pesadez; *vértigos* que hacen caer estando en pié; *vértigos* que no permiten casi estar sentado, sobre todo al elevar los ojos; *vértigos* con aturdimiento de la cabeza hasta cenar; *vértigos* al pa-

Digitized by

sarse al aire libre; *vértigos* sobre todo hácia la derecha, con presion en el ojo; *vértigos* en el sincipucio con tirones al través de la nariz hasta la frente.—*Plenitud en la cabeza*: plenitud con aturdimiento y pesadez en la frente; *plenitud en la cabeza* todo el dia con fuerte pesadez y que no permite leer; *plenitud* con sensacion de vértigos en la frente, con presion.—*Presion en la cabeza*: *presion* en la sien derecha y en el lado correspondiente de la frente, en el *sincipucio*, y algunas veces sobre todo en el izquierdo, ó bien con dolores violentos, latidos y tension, partiendo desde la frente, con atontamiento de toda la cabeza, agravada despues de la comida; *presion* con aturdimiento, y en las órbitas, agravada en la habitacion y hácia la tarde, sobre todo al aire libre; presion en el occipucio.—*Tension* en el sincipucio, con presion y punzadas; *tension* con apretamiento en las sienes. —*Dolores dislacerantes*: ascendiendo hasta el vértice; *dolores dislacerantes* en la frente, hasta la sien derecha, donde se trasforman en punzadas.—*Punzadas* en la frente, debajo del ojo derecho, en la sien izquierda; y entre el occipucio y la nuca.—*Congestion* en la cabeza, que principia con incomodidad en el vientre, y piel ardiente y madorosa.—*Al exterior*: picotazo en los tegumentos de la cabeza, hormigueo en el occipucio, estremecimiento de la cabeza, sensacion de ardor en la sien como por carbones ardiendo; sensibilidad en los tegumentos de la cabeza hasta el punto de hacer daño el sombrero.

Ojos.—*Punzadas*, sobre todo en el ojo izquierdo, estremecimientos y punzadas en el ángulo izquierdo, con contracciones frecuentes y temblor en todo el ojo, dolores contractivos en los párpados del ojo izquierdo, sobre todo hácia el ángulo interno.—Prurito en los párpados. —*Irritacion* de la conjuntiva, *rubicundez* inflamatoria de la conjuntiva izquierda; *irritacion* de la conjuntiva con *inflamacion* del ojo á consecuencia de la introduccion de una gota de aceite, ocupando todo el lado de la cara, *hinchazon edematosa de los párpados*, pequeñas *vesículas* alrededor del ojo, *hinchazon* de una glándula subcutánea debajo del párpado inferior derecho, con rubicundez de la piel.—Fuerte temblor en los párpados.—Lagrimeo.—*Vista turbia*. como por un velo, ó por el humo

Digitized by

del tabaco; nube en el ojo mas débil, despues en los dos; *pérdida de la vista*, algunas veces como por un vértigo (en la habitacion), ó bien por pesadez y debilidad de los ojos.

Oidos.— *Compresion en el oido* izquierdo, algunas veces espasmódica y bastante profunda; presion sorda hácia los dos conductos auditivos; presion y zumbido con atontamiento de la cabeza; presion con punzadas debajo del oido izquierdo.—*Dureza de oido*, en el derecho, ó con pérdida del oido de corta duracion; ruido en los oidos.

Nariz.—Inflamacion de la nariz y de toda la cara.—*Erupcion* en el tabique de la nariz, con rubicundez de esta parte, dolor al tacto y pequeñas vesículas amarillas que despues forman una costra y por último se encallecen.—Irritacion del interior de la nariz; sequedad; falta de respiracion por la nariz.—Aumento de la secrecion nasal; ligero coriza.

Cara.— Palidez y frio en la cara; calor aumentado; sensacion de ardor algunas veces, sobre todo en las mejillas, ó bien en toda la cara y durante muchos dias.—*Inflamacion* de la cara y de la nariz; hinchazon de la cara, erupciones de granos.—*Labios* quemantes, algunas veces y sobre todo en las comisuras, y con hinchazon de los bordes exteriores; tension en la comisura de los labios; *sequedad de los labios*, algunas veces con hendiduras, sobre todo por la tarde y con tension.— En la articulacion *témporo-maxilar* izquierda, tirones; *hinchazon de alguna de las glándulas submaxilares*, con dolor al tacto.

Dientes.— En una *muela* cariada, dolor de excoriacion al masticar.— Las *encias* sangran al limpiarlas; hinchazon interior, algunas veces dolorosa.

Boca.— *Boca* como quemada interiormente; ardor interior; sequedad con picazon en la garganta.—*Acumulacion de agua*, á veces con abundante secrecion por las comisuras de la boca, ó con secrecion de saliva aumentada, con sensacion de calor en la boca, ó con salivacion frecuente, ó irritacion de las *glándulas salivales*, obligando á escupir frecuentemente, provocando una sensacion de ardor y una acritud con gusto rancio en la garganta, que no cesa sino despues de haber experimentado en el recto síntomas análogos, seguidos de una deposicion.—

Digitized by Google

Lengua cubierta de un barniz blanco.—Hinchazon del *paladar*, cosquilleo, rascamiento y sensacion de ardor en la union de las partes blandas y sólidas.

Faringe.—Sensacion en la faringe como de un *cuerpo* extraño que dificulta la deglucion.—Estremecimientos en la garganta.—*Arañamiento en la garganta* que obliga á espectorar; *arañamiento quemante en la laringe y faringe*; arañamiento precedido de sensacion de aspereza, y seguido de sensacion de ardor, el cual se mitiga al tomar caldo.—*Sensacion de ardor en la garganta*: ardor como por pimienta, contínuo, con contraccion, considerable mejoría despues de un corto sueño, mejorado inspirando, agravado en espirando; ardor en la garganta y el esófago hasta el estómago.—*Epiglotis* con rubicundez y prolongacion; *amigdalas* hinchadas y dolorosas á la presion.—*Sequedad de la faringe*, con irritacion como por inflamacion, con dificultad de tragar, y expectoracion de mucosidades ácidas como vinagre.—Expectoracion abundante de mucosidades viscosas, con gusto ácido.

Apetito y gusto.—*Gusto* de almendras; gusto soso, con hormigueo que causa dolor en la punta de la lengua; gusto pastoso con lengua cubierta de una capa blanca; gusto dulce, amargo y como por la electricidad en la punta de la lengua; gusto amargo, ácido, ácre, que asciende desde el estómago.—*Apetito* y sed disminuidos; anorexia; repugnancia á la cerveza; inapetencia, imposibilidad de comer aun sopa de leche, á causa de la desgana y del dolor de corazon; despues de haber tomado leche, fuerte disgusto y náuseas, con gana de vomitar.—*Despues de la comida*, dolor en el vientre.

Sintomas gástricos.—*Erutos con náuseas*, algunas veces y sobre todo despues de haber bebido, ó bien con abatimiento; con inapetencia.—*Regurgitaciones* de agua y de bílis por la tarde.—Hipo.—*Náuseas y ganas de vomitar*: náuseas frecuentes, con disgusto y malestar contínuo: náuseas con inapetencia contínua, con frio, *regurgitacion de agua y salivacion*, con vértigos y falta de apetito, y que no permite casi el escribir; náuseas con borborigmos; vomituricion, convulsion en el estómago frecuente con acumulacion de agua en la boca.—*Vómitos* con náuseas; vómito como de café, de mucosidades.

Digitized by

con amargor de boca; vómito de una agua amarillenta, con olor de aceite y gusto soso como el del mismo aceite; vómito despues de la comida, de agua, de mucosidades y de pan, con náuseas contínuas; vómitos amargos por la tarde, de alimentos ingeridos en la cena precedidos de náuseas, plenitud y presion en el estómago, seguidos de sudor en la cara; vómito por la noche de un líquido ácido de olor ácre, precedido de náuseas; vómitos violentos *de los alimentos ingeridos*, paseándose al aire libre (despues de náuseas muy fuertes), ó bien de agua á causa de las náuseas, agravadas despues de comer tostadas con manteca; vómitos fuertes, prontos, de una agua espumosa, blanco amarillenta, con esfuerzos espasmódicos; vómitos de bílis.

Estómago.—Plenitud con sensibilidad dolorosa del estómago; plenitud *presiva*, á veces con náuseas y anorexia.—Sensibilidad dolorosa del estómago al tacto, con sensacion de vacuidad y náuseas, con ganas de vomitar hasta despues de medio dia.—*Presion en el estómago*; presion con ruidos en el vientre, cosquilleo, angustia é incomodidad; presion con *apretamiento angustioso*, y malestar excesivo, ó bien acompañado de tension, presion en la boca del estómago.—*Contracciones* en el estómago, con presion en la boca del estómago y secrecion acuosa por los ojos y la nariz; movimientos espasmódicos, con náuseas, como por gana de vomitar; *retraccion* del cardias.—Rascamiento en el estómago; *sensacion de ardor*, algunas veces como por carbones ardiendo; sensacion de ardor y calor en la boca del estómago; borborigmos, con pesadez en el pecho.

Vientre.—*Punzadas en el bazo*; presion.—*Dolores* violentos en el vientre y estómago; el bajo vientre afectado y dolorido; dolores de vientre mejorados despues de tomar una sopa de leche; dolor permanente en el vientre cuando se toca el ombligo, con ruido y dolor en el vientre; dolores en la region umbilical y el bajo vientre; *los dolores en la region umbilical se agravan* al tacto, ó *apoyándose sobre la misma parte*, extendiéndose á veces hasta el ano cuando se efectúa el prolapso.—*Cólicos en la region umbilical*, algunas veces por la tarde, y con timpanitis seguidos de una deposicion; dolor como si se anudasen los intestinos en la region umbilical, seguidos de dolo-

Digitized by

res dislacerantes en el lado izquierdo, violentos dolores espasmódicos en el vientre, mas fuertes estando sentado é inclinado hácia delante, que andando y estando en pié.—*Tension en el vientre*: tension entre el ombligo y la boca del estómago; tension penosa y espasmódica en la parte superior del vientre, sobre todo estando sentado, tension fuerte con timpanitis en todo el vientre, deposicion, emision de gases fétidos, y considerable agravacion de todos los síntomas estando sentado; tension en la region umbilical con presion sobre el ano estando sentado.—*Presion en el vientre*, extendiéndose hasta el estómago, con náuseas rápidas, picotazos y tension en el ombligo, debajo del cual hay presion con apretamiento.—*Pellizcos en el vientre*, con borborigmos *en la region umbilical*, algunas veces y sobre todo andando, pellizcos con retortijones, algunas veces y con particularidad en la region umbilical y en el lado izquierdo del vientre con presion sobre el ano; fuertes pellizcos, al despertarse, con borborigmos, y poco despues emision de gases fétidos con mucha necesidad de deponer, y evacuacion con dolores agudos y espasmos abdominales.—*Dolores cólicos con pellizcos, en el colon transverso*, renovados despues de deponer; dolores cólicos que parten del ombligo, cortan la respiracion y obligan á encorvarse de lado; dolores cólicos debajo del ombligo, como si cortasen con cuchillos, disipándose despues de una deposicion; dolores agudos *en la region umbilical* y los intestinos, seguidos al mismo tiempo de una deposicion.—*Dolor de dislaceracion en el vientre*, durante la comida, en el lado derecho del vientre, con dolores incisivos debajo del estómago, en el colon y en la region umbilical despues de la comida.—*Punzadas en el vientre*; debajo del ombligo, á la izquierda del mismo, en el *ciego*, y en la S del colon.—*Dolores de excoriacion* en el bajo vientre al toser; sensacion como si se moviese *agua tibia* en los intestinos, sobre todo en el lado izquierdo; *sensacion de frio* en el vientre.—*Pesadez*: en la parte superior del vientre con náuseas, y en el bajo vientre, con retraccion del mismo.—*Plenitud en el vientre*: con borborigmos y cólicos, con pellizcos; plenitud de vientre con *tension* y cólicos en la region umbilical.—*Timpanitis* todo el dia con tension y borborigmos.

Digitized by

agravados al andar.—*Movimientos* en el vientre; fluctuacion como por agua; borborigmos algunas veces en el lado izquierdo; agrandamiento, sobre todo en los intestinos delgados.—*Exteriormente*, calor hormigueante en los tegumentos del vientre.—Tension y dolor *en las ingles*.—*Emision de gases*: antes de la deposicion con borborigmos en el vientre; *emision frecuente* de gases fétidos, algunas veces con punzadas ó bien como en una deposicion blanda.

Deposiciones.—Ano.—*Necesidad de deponer*, con agrandamiento y punzadas en el vientre, como por calor y agitacion en el vientre; *necesidad de deponer con presion en el ano, como por una diarrea*; por la mañana en la cama y despues de haberse levantado, deposicion seguida de dolor de excoriacion en el ano, deposicion pronta inmediatamente de haberse levantado ó puesto en ejercicio; deposicion tan apremiante que no deja llegar al servicio.—*Deposiciones* blandas, *como de papilla*, á veces con ardor en el ano; deposiciones viscosas, mucosas, *acuosas*, algunas veces muy abundantes y *frecuentes*, aun por la *noche*, ó bien con punzadas en el ano; deposiciones líquidas con sensacion de rascamiento en el ano; deposiciones *amarillas*, *diarréicas*, algunas veces despues de los vómitos, ó bien con sudor; deposiciones mucosas con tenesmo; deposicion líquida de un verde oscuro, seguida de laxitud de larga duracion; deposicion, primero dura, despues bilioso-mucosa y finalmente acuosa; deposiciones oscuras, en forma de papilla, con mucosidades ó bien seguidas de borborigmos en el lado izquierdo; deposiciones de un verde gris, negruzcas, prontas y de un solo golpe.—Despues de haber tomado café, las deposiciones (frecuentes) cesan.—*Despues de la deposicion*: tirones y presion en la parte superior del vientre y la region umbilical.—*Expulsion de ascárides* y de la solitaria.—*En el recto*, presion y tenesmo con dolores agudos como si se anudasen los intestinos, estando sentado.—*En el ano sensacion de ardor*, no permitiendo algunas veces estar sentado, y con hinchazon de la circunferencia del ano ó con pulsaciones y punzadas; rascamiento despues de la deposicion, dolor de excoriacion y sensacion de ardor despues de estar en ejercicio, dolores contractivos y punzadas al andar; dolor como si

Digitized by Google

fuese á salir una espina; dolor de excoriacion despues de la deposicion; con prolapsus del ano y necesidad de deponer; y al comprimir el vientre, presion en el ano hasta las partes genitales del glande, con lo cual se presenta mucha angustia, opresion, sudor en la frente y náuseas con pérdida de la vista y del oido; el reposo adormece los dolores.

Orinas.—*En la region renal derecha*, fuertes punzadas que dificultan la respiracion; excitacion de los riñones con orina abundante.—*Necesidad de orinar*, á veces inmediatamente despues de haberlo efectuado; *emision aumentada*, algunas veces con *orina frecuente*, aun cada media hora.—*Orina amarilla* abundante, *nubes* (1) *en las orinas*, que algunas veces se enturbian; despues que se disipan las nubes, sobrenadan cristales oscuros; orina pálida, espumosa por la mañana; orina pálida con sedimento blanco por el dia; orina amarilla anaranjada pálida por la noche, un poco turbia y con bedijas en el fondo; orina oscura, inflamada y muy llena de copos por la noche y la mañana; orina rojo-sanguinolenta, depositando muchas mucosidades en el fondo, que al moverlas se prolongan en hilos; sedimento turbio en las orinas, despues de haber orinado, con película de diversos colores.—*Al orinar*, *ardor* en la uretra y en el glande.

Partes genitales.—*Miembro* doloroso, con rubicundez del glande y punzadas en la uretra; tirones en el *cordon espermático* izquierdo, que impiden andar; retraccion del *testículo* izquierdo, mientras que el derecho está flácido; erupcion *herpética* en el escroto; erecciones.—*Reglas* escasas ó del todo suprimidas, y con disnea y palpitaciones de corazon, principalmente al subir una escalera.

Laringe.—Ronquera; *voz ronca*, algunas veces como por un romadizo, ó con necesidad de expectorar; cosquilleo en la laringe; *secrecion* y *acumulacion de mucosidades*, aumentadas algunas veces por cosquilleo, ó principalmente por la tarde; catarro bronquial; presion en la laringe, sobre todo en el lado izquierdo.—*Tos* con ruido estrepitoso frecuente; *Tos continua*, á veces con mucosidades en los bronquios, que no se pueden desprender; *Tos con*

(1) Damos por analogía el nombre de *nubes* á los copos que se observan algunas veces, un poco debajo de las superficies de las orinas que se dejan en reposo en un vaso. (*N. del T.*).

Digitized by Google

expectoracion de mucosidades, sobre todo por la mañana, ó bien por la tarde y con presion en el pecho; mucosidades contínuas en los pulmones, que no se pueden desprender, con disnea y silbido al respirar profundamente.

Pecho.—Respiracion.—*Respiracion* difícil por dolores de vientre; disnea; respiracion con *opresion*, y á veces con angustia; *disnea*, á veces con plenitud y angustia en el pecho; respiracion corta despues de la deposicion; disnea agravada al subir una escalera.—Dolor en el *pecho* al apoyarse sobre él; *plenitud y sensibilidad dolorosa en la cavidad* torácica, con punzadas quemantes en el lado izquierdo y entre los omóplatos, ó bien con presion y sensacion de ardor de derecha á izquierda; un malestar extraño en el pecho y vientre; sensacion de vacuidad en el pecho.—*Presion en el pecho* al respirar profundamente; presion fuerte por la tarde; presion profunda en medio del pecho.—*Punzadas en el pecho* : punzadas hácia abajo á la derecha, al inspirar; punzadas *en el lado izquierdo*, algunas veces, y sobre todo por la tarde.—*Pulsacion* en la region escapular derecha.—*Sensacion de ardor en el pecho*, algunas veces violento, hasta en los intestinos.—*Palpitaciones de corazon*, algunas veces *violentas*, que se hacen sentir exteriormente y durante el cóito; palpitaciones despues *de la comida*, sobre todo estando acostado; palpitacion súbita en la region de la aorta.—*Punzadas frecuentes en la region del corazon*, algunas veces y sobre todo al inspirar; estremecimientos frecuentes hácia el corazon; el ventrículo izquierdo del corazon es particularmente el afectado.—*Exteriormente*, pulsacion, ruido de fuelle y latidos en el pecho; dolor de dislaceracion.

Dorso, riñones, etc.—Hormigueo como por insectos en la region *lumbar*.—En las vértebras cervicales, presion y tirantez.

Extremidades superiores.—Presion sobre la escápula derecha; punzadas en la izquierda.—*En los brazos*, pesadez y laxitud; dislaceracion tensiva; sensacion de pesadez y abatimiento; dolores desgarradores en el derecho.—En el *codo* izquierdo, perforacion en la articulacion.—Tirones en el *antebrazo* derecho; tension, presion y quebrantamiento; dolor de dislaceracion en el izquierdo.—Tirones en la *mano* derecha.—Tirones en los *dedos* de la

Digitized by Google

mano izquierda; tirones y dolores dislacerantes en el dedo medio del pié izquierdo; dolores como si escarbaran en las últimas falanges de los dedos.

Extremidades inferiores.—Dolor tensivo en la *articulacion coxo-femoral* izquierda, sensibilidad de esta, sobre todo al levantarse del asiento; tirantez é hinchazon en las nalgas y en el ano despues del movimiento.—En las *piernas*, laxitud y flojedad.—En los *muslos*, tension y sensacion de ardor; sensacion de ardor pruritoso en el izquierdo; sensacion de parálisis en el mismo.—En las *rodillas*, como si escarbaran y dolor de dislaceracion; tension y picazon, dolor con hormigueo, artrítico.—En la *pierna* izquierda, picazon, dolor de dislaceracion, estremecimientos durante la siesta; ardor pruritoso en la tibia derecha.—En el *pié derecho*, pesadez y presion en la articulacion, *punzadas* en los piés, algunas veces como si estuvieran luxados (el izquierdo); estremecimientos y dolores dislacerantes en la planta del pié izquierdo.—En los *dedos*, punzadas y dolores dislacerantes, sobre todo en los pulgares.

78.—CUPRUM METALLICUM.

CUPR.—Cobre metálico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 20 á 30 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Bell. chin. cocc. dulc. bep. ipec. merc. n-vom.—*Se emplea como antídoto de*: Aur.

COMPÁRESE CON: *Bell.* calc. *chin. cocc.* dros. *dulc. hep.* iod. *ipec. merc. n-vom.* puls. rhus. suif. *veratr.*—Cuando el cobre se mostrará eficaz, siempre que se halle indicado, será sobre todo despues de *veratr.*—Despues del cobre conviene muchas veces: *Calc. veratr.*

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones reumáticas; Dolores osteócopos; Afecciones espasmódicas y convulsiones, sobre todo en las personas irritables y sensibles; Epilepsia; Baile de San Vito, aun cuando provenga de un susto; Debilidad con sobreexcitacion del sistema nervioso; Consuncion?; Parálisis?; Ictericia?; Erupciones crónicas? Sarna?; *Ulceras inveteradas*; Herpes?; Cáries?; Fiebres héticas?; Fiebres lentas?; Melancolía; Manía; Rabia?; Encefalitis?;

Digitized by Google

Oftalmías?; Gastralgia?; Gastritis? y otras *afecciones gástricas*; *Cólera asiático*; Cólicos espasmódicos; Diarreas; Coqueluche; Hemoptísis?; Croup?; *Asma espasmódico*, principalmente en los niños, á consecuencia de un enfriamiento, ó en las mujeres durante las reglas, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores dislacerantes, presivos ó estremecientes en los miembros.—*Dolor de contusion* en muchos sitios, sobre todo en las articulaciones y *miembros.*—*Dolores osteócopos.*—Dolores reumáticos.—Muchos dolores, sobre todo los que son *presivos*, se agravan al *tacto.*—Dolores con estremecimiento que recorren todo el cuerpo.—Sacudimientos ó golpes dolorosos en diversas partes.—°Llorando, convulsiones con falta de aliento y retraccion de los muslos.—*Espasmos tónicos con pérdida del conocimiento, inversion de la cabeza hácia atrás, rubicundez de los ojos, salivacion y emision frecuente de orinas.—*Convulsiones epilépticas.—°Movimientos involuntarios de los miembros, como en el baile de San Vito, con rubicundez de la cara, distorsion de los ojos, de la cara y del cuerpo, llantos y ansiedad, bufonadas y gana de esconderse.—°Las convulsiones principian frecuentemente por los dedos, y sobre todo por los pulgares.—Risa espasmódica.—*Estremecimientos convulsivos por la noche, *durmiendo.*—**Convulsiones violentas* con excesivo desarrollo de fuerzas.—Afecciones paralíticas.—*Síntomas que aparecen periódicamente y por grupos.*—Mucha laxitud y decaimiento de todo el cuerpo.—**Debilidad tenaz.*—Consuncion.—*Mucha impresionabilidad de todos los órganos.—Accesos de desvanecimiento.

Piel.——*Erupciones* parecidas á la sarna.—Herpes con escamas amarillas.—Cáries.—Erupciones miliares, sobre todo en el pecho y en las manos.—°Ulceras tenaces.

Sueño.—*Sueño profundo*, con sacudidas en el cuerpo y *estremecimiento* en los miembros.

Fiebre.—°Calofrios despues de los ataques de epilepsia.—Fiebre lenta.—Sudor frio.—Excesivos sudores por la noche.

Moral.—Melancolía con accesos de angustia mortales.—

*Falta de fuerza moral.—Ansiedad y lloros alternando con bufonadas.—Alternativa de dulzura con obstinacion. —Inaptitud al trabajo, con temor á la ociosidad.—*Accesos de enajenacion mental*, con ideas fijas de ocupaciones imaginarias, á las que se entrega, ó con cánticos alegres, ó bien con malicia y morosidad, y frecuentemente con pulso acelerado, ojos rojos, inflamados, miradas extraviadas y *seguidas de sudor.—Furor.*—Demencia.—Pérdida de los sentidos y del entendimiento.—Delirio.—°Carácter muy medroso.

Cabeza.—Vértigo leyendo ó mirando á la atmósfera.—*Vértigo* rotatorio, *como si la cabeza fuera á caerse hácia adelante.*—°Sensacion como si la cabeza estuviera vacía. —Dolor en el hueso parietal que hace gritar, poniendo sobre él la mano.—Dolores de contusion en el cerebro y en las órbitas, cuando se mueven los ojos.—*Depresion estupefaciente en la cabeza, con hormigueo en el vértice.*—Presion en las sienes, agravada por el tacto.—Tiron en la cabeza con vértigos, que se alivia estando acostado.—°Dolor de cabeza á consecuencia de un ataque de epilepsia.—Punzadas exteriores, quemantes en un lado de la frente, en las sienes y en el vértice.—Dolores en el occipucio y en la nuca, moviendo la cabeza.—Hinchazon de la cabeza, con el rostro encendido.—Distorsion de la cabeza, hácia un lado y hácia atrás.

Ojos.—Comezon en los ojos, hácia la tarde.—**Presion en los ojos* y en los párpados, agravada al tacto.—Ojos rojos, inflamados, extraviados, fijos.—*Convulsiones y movimientos inquietos de los ojos.*—Ojos prominentes, brillantes.—*Ojos cerrados.*—Pupilas insensibles.—Oscurecimiento de la vista.—Dolores de contusion en las órbitas, volviendo los ojos.

Oidos.—Dolor de dislaceracion en los oidos.—Presion en los oidos, como por un cuerpo duro.

Nariz.—Fuerte congestion á la nariz.—*Obturacion de la nariz.—Violento coriza fluente.

Cara.—*Cara pálida* con ojos abatidos y ojerosos.—Cara azulada.—*Distorsion espasmódica de la cara.*—Aire triste y angustioso.—Rubicundez de la cara.—*Labios azulados.* —Excoriacion del labio superior.—Presion en la mandíbula inferior, aumentada por el tacto.—Calambre de la mandíbula.

Digitized

Dientes y boca.—°Odontalgia con tirones agudos, hasta las sienes.—Boca pastosa por la mañana.—Acumulacion de agua en la boca.—*Espuma en la boca.*—Sensacion quemante en la boca.—Lengua mucosa, cubierta de una costra blanca.—Gritos como el canto de las ranas.—Pérdida de la palabra.—°Punta de la lengua fria.

Garganta.—Sequedad de la garganta con sed.—Inflamacion de la faringe con deglucion impedida.—*Se oye el ruido que hacen las bebidas al bajar.—Hinchazon de las glándulas del cuello.

Apetito.—*Sabor soso*, ó metálico, ó ácido, salado.—Gusto acuoso de los alimentos.—Apetencia por las cosas frias, mas bien que por las calientes.

Estómago.—Erutos contínuos.—*Hipo.*—°Evacuacion de agua como pituitas, despues de haber tomado leche.—*Nauseas con gana de vomitar*, desde el bajo vientre hasta el esófago, pero principalmente en el epigastrio con embriaguez, disgusto y sabor pútrido en la boca.—*Vómitos* periódicos, *violentos*, aliviados bebiendo.—*Vómitos de bilis*, de agua, de materias viscosas y aun de sangre.—*Vómitos violentos*, con presion en el estómago, *calambres en el vientre, diarrea y convulsiones.*—Calambres en el estómago.—**Presion excesivamente penosa en el estómago y en el epigastrio, que se agrava por el tacto y el movimiento.*—Ansiedad en el epigastrio.

Vientre.—Dolores de contusion en los hipocondrios al tacto.—Dolores tractivos, desde el hipocondrio izquierdo hasta la cadera.—Dolores violentos en el vientre, con mucha ansiedad.—Vientre duro, con dolores violentos al tacto.—*Presion en el vientre*, como por un cuerpo duro, agravada al tacto.—Retraccion del vientre.—*Cólicos espasmódicos con convulsiones* y gritos agudos.—Ulceras lancinantes y corrosivas en los intestinos.

Deposiciones.—Estreñimiento con mucho calor en el cuerpo.—*Diarreas violentas*, algunas veces sanguinolentas.—Salida de sangre por el ano de los granos hemorroidales.

Orinas.—Necesidad urgente de orinar, con emision poco abundante.—Emision frecuente de orinas fétidas, viscosas.—Punzadas quemantes en la uretra, durante y fuera del tiempo de la emision de las orinas.—°*Hematuria.*

Partes genitales.—Hinchazon del miembro, con infla-

Digitized by Google

macion del glande.—Antes de las reglas, ebullicion de sangre, palpitacion de corazon y dolor de cabeza.

Laringe.—Ronquera tenaz con necesidad de acostarse.—Ruido en los bronquios, como de mucosidades.—Cosquilleo en la laringe.—**Tos seca con sofocacion*, como la coqueluche.—Tos con expectoracion de mucosidades blanquecinas, durante los ataques de un asma espasmódico.—Tos matutina con expectoracion de materias pútridas.

Pecho.—*Respiracion acelerada* con quejido, estertorosa con esfuerzos convulsivos de los músculos abdominales.—Respiracion difícil, corta, con tos espasmódica y crepitacion en el pecho.—Tos con respiracion sibilante, tan pronto como se piensa respirar.—Dificultad en la respiracion, aumentada al toser, al reir, al echar el cuerpo hácia atrás, etc., así como por la noche.—Asma al subir una escalera ó andando de prisa, con necesidad de respirar profundamente.—Asma espasmódico.—*Accesos de sofocacion*.—Presion en el pecho.—*Contraccion dolorosa del pecho*, sobre todo despues de haber bebido.—*Calambres de pecho*, que interceptan la respiracion y la voz.—Palpitaciones de corazon.

Tronco y brazos.—Sensacion de pesadez en las glándulas axilares.—Hinchazon de las glándulas del cuello.—Herpe en la flexion del brazo.—Hinchazon de la mano con inflamacion de un vaso linfático hasta el hombro.—Presion y tirones agudos en los huesos del metacarpo.—Debilidad y parálisis de la mano.—Estremecimiento de las manos, por la mañana despues de levantarse.—Torpeza y encogimiento de los dedos.—°Convulsiones en los dedos.

Piernas.—Dolores en las piernas, sobre todo en las pantorrillas durante el reposo.—Dolores tensivos y calambres en las pantorrillas.—Dolores presivos y tractivos en el metatarso.—Sensacion quemante en la planta de los piés.—°Sudor en los piés.—°Supresion del sudor de los piés.—Cansancio sumo y rigidez de las piernas.—*Convulsiones en los dedos.

Digitized by Google

79.—CUPRUM ACETICUM.

CUPR-AC.—Acetato de cobre, Cardenillo. —*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. Poco conocido.

SINTOMAS GENERALES. —*Laxitud* con temblor y falta de apetito; *Mucha debilidad* algunas veces con convulsiones; imposibilidad de estar en pié.—*Insensibilidad* y debilidad; rigidez de los miembros y del cuerpo; parálisis de los miembros.—Posicion en decúbito lateral (en los animales), con angustia y con deposiciones verdes y espumosas; el animal está tendido, casi sin respiracion, con necesidad de vomitar, y casi próximo á la muerte.—Posicion supina, con inversion de la cabeza hácia atrás, mucha agitacion y gritos frecuentes.— Trismus, con espasmos en el paladar y mutismo; *sacudimientos convulsivos*, con movimientos en los músculos, tambien convulsivos, de la masticacion y deglucion, vómitos dolorosos y disnea.—Ictericia; *inflamacion é hinchazon* (por aplicaciones externas).—*Fiebre* con timpanitis y constipacion; calor con pulso duro, cefalalgia, dificultad de tragar y timpanitis; pulso pequeño y contraido.—*Extremada angustia*, con *vómitos*, *cólicos*, *sed*, *frialdad de los miembros y pulso* acelerado y espasmódico; tristeza y abatimiento, con ojos ojerosos, lengua húmeda, gusto metálico en la boca, anorexia, ruido estrepitoso contínuo, erutos con gusto de cobre, sed violenta y pulso pequeño.—Delirio.

Cabeza.—Nariz.—Pesadez de la cabeza y ligera sordera; cefalalgia violenta con sed y fuertes cólicos.—Expresion en la *cara* de mucho sufrimiento; flujo de sangre por la nariz.

Síntomas gástricos.—Gusto de cobre y lengua cubierta de costra gris.—*Repugnancia á beber y comer* (en los animales), algunas veces con vomituricion. —*Erutos* con gusto cobrizo y ruido estrepitoso contínuo, como de mucosidades.—*Conato continuo de vomitar*, algunas veces *con tos* y respiracion *convulsiva*, ó bien con emision frecuente de orinas.—*Vómitos* algunas veces muy frecuentes, con cólicos y convulsiones; vómito verdoso, blanco, espumoso; vómito frecuente de materias azuladas, se-

Digitized by Google

guido de vomituricion, gemidos, disnea y pulso irregular y frecuente; *vómitos y evacuaciones diarréicas*; vómitos sanguinolentos, á causa de vomituriciones frecuentes.

Estómago.—Vientre.—En la *region precordial*, dolor de dislaceracion y contracciones periódicas del estómago. —Vientre retraido, poco sensible á la presion, violentos *cólicos acompañados de vómitos* y de diarrea; cólicos nocturnos con vómitos; considerable hinchazon de vientre con evacuacion abundante de materias fecales; vientre duro, timpanítico y doloroso al tacto.

Deposiciones y orinas.—*Deposiciones con muchas lombrices*, negruzcas, ó con mucosidades sanguinolentas; *deposiciones verdes*, algunas veces con *vómitos dolorosos*; deposiciones acompañadas de tenesmo y de debilidad general.—*Orina* turbia, de un rojo oscuro, con sedimento amarillo, acompañada de mucha sed y de malestar general.

Partes sexuales.—Reglas muy abundantes y violentas.

80.—CUPRUM CARBONICUM.

CUPR-CARB.—Sub-carbonato de cobre.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. hom op.—Poco conocido.

SINTOMAS.—*Laxitud*, algunas veces con pulso pequeño, contraido y cefalalgia violenta, ó bien con insomnio y pulso débil, debilidad y desvanecimientos frecuentes, dolores en los miembros; *parálisis de los miembros* (brazos y piernas); *estremecimientos convulsivos*, algunas veces violentos, síntomas apopléticos.—*Fiebre* y estupor letárgico; pulso pequeño, desigual y un poco convulsivo.—*Angustia* con temblor de los miembros y dolores de estómago; hidrofobia, con cólicos, vómitos y desvanecimientos.—*Cefalalgia violenta*, algunas veces con vómitos. —*Color pálido*; cara hipocrática, con vientre doloroso y timpanítico.—*Gusto* cobrizo en la boca.—*Náuseas* con vómitos verdes, cólicos, convulsiones y pérdida del conocimiento; *disgusto* algunas veces *con vómitos* y constipacion; erutos con vómitos y cólicos acompañados de mucha angustia.—*Vómitos*, algunas veces *violentos*, ó bien

Digitized by Google

continuos, y generalmente con *cólicos violentos*, ó con movimientos convulsivos y espasmos; vómitos con diarrea sanguinolenta.—*Dolores de estómago* algunas veces *muy violentos*, con *vómitos* y cólicos (ó tenesmo); ardor en el estómago.—*Dolores de vientre*, algunas veces con vómitos violentos y frecuentes; dolores cólicos, violentos y fiebre: dolores de dislaceracion y retortijones en el vientre; *cólicos violentos* algunas veces con flatuosidades ó *con vómitos* (á veces de materias biliosas con vomituricion y falta de apetito); hácia las dos de la mañana, cólicos con vómitos; cólicos periódicos, seguidos de temblor en los miembros y de transpiracion abundante.—*Constipacion* de larga duracion; diarrea de larga duracion.—*Asma*.—Debilidad y dolores en las extremidades inferiores; calambres en las pantorrillas.

81.—CYCLAMEN EUROPAEUM.

CYCL.—Ciclamen de Europa.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—Medicamento aun poco conocido y que no se ha empleado mas que en las *odontalgias* y algunas veces en las *afecciones gastricas*.

SINTOMAS GENERALES.—Traccion presiva ó dolores de dislaceracion, principalmente en los puntos donde los huesos están cubiertos tan solo por la piel.—Durante el movimiento, todos los sufrimientos desaparecen, exceptuando el abatimiento; mas número de síntomas se manifiestan cuando se está sentado.—Grande laxitud, sobre todo por la tarde, con cansancio sumo y rigidez en las piernas, y presion tractiva en los muslos y las rodillas.

Piel.—Comezon corrosiva en muchas partes de la piel, sobre todo estando sentado.—*Comezon lancinante é insoportable al principio de la noche en la cama.*

Sueño.—*Mucha gana de acostarse y de dormir.*—Por la noche sueño tardío, con pulsaciones sensibles en el cerebro.—*Pesadilla.*

Fiebre.—Calofrios febriles y frio, seguidos de calor, sobre todo en la cara, con rubicundez que se aumenta despues de la comida, en seguida ansiedad, con calor

Digitized by

en algunas partes, en el dorso de la mano y en la nuca, pero no en la cara.—Sudores frios.

Moral.—Pesar secreto, y perturbacion de conciencia.—Mal humor, grosería y desvío en la conversacion por accesos.—Amor al trabajo, alternando con pereza.—Memoria, alternativamente viva y débil.—Torpeza y confusion del entendimiento, con inaptitud para toda especie de trabajo.

Cabeza.—Vértigos estando de pié, como si el cerebro se moviese.—Dolor de cabeza con atolondramiento y oscurecimiento de la vista.—Punzadas en el cerebro al bajarse.—*Punzadas en las sienes*.—Comezon con picoteo en la piel del cráneo, la cual solo muda de sitio rascándose.

Ojos.—**Nariz**.—Ojos empañados y cóncavos.—Punzadas en los ojos y en los párpados.—Hinchazon de los párpados.—*Pupilas dilatadas*.—Vista turbia como á *través de una nube*.—Traccion en los oidos.—*Disminucion en la audicion*, como si las orejas estuvieran tapadas.—*Disminucion del olfato*.—Coriza fluente con estornudo.

Dientes.—*Odontalgia con tracciones sordas por la noche*.—Punzadas y terebracion en la dentadura.

Boca.—Lengua cubierta de una capa blanca.—Sensacion contínua de aspereza y de mucosidades en la boca.—Sensacion de torpeza en el labio superior, como si estuviera endurecido.—Por la tarde mucha sequedad del paladar, con hambre y sed.

Apetito.—Gusto pútrido en la boca.—Sabor soso de todos los alimentos.—*Hambre y apetito poco pronunciados*, sobre todo por la mañana y por la tarde.—*Pronta saciedad seguida de disgusto*, desde que empieza á comer.—*Repugnancia por la manteca* y por los alimentos frios.—Despues de comer mucha gana de dormir.

Estómago.—Erutos frecuentes, vacíos ó ácidos.—*Erutos con hipo*, sobre todo *despues de comer*.—Náuseas con gana de vomitar, y malestar en la region epigástrica, como despues de haber tomado alimentos grasos, sobre todo despues de la comida y la cena.—*Evacuacion de agua como de pituitas*, *con náuseas*, sobre todo por la tarde.—Vómitos sanguinolentos con diarrea de la misma naturaleza, sudor frio, retintin en los oidos, convulsiones y vértigos.

Digitized by Google

Vientre.— *Plenitud* y *presion en la boca del estómago*, como por estar sobrecargado de alimentos.—Malestar en el bajo vientre, con náuseas.—Sensibilidad dolorosa del bajo vientre por el mas ligero contacto.—Accesos prontos de dolores cólicos con pellizcos.—*Borborigmos en el bajo vientre, inmediatamente despues de la comida.*

Deposiciones.— Deposiciones duras, frecuentes.— Evacuaciones de consistencia de papilla.— Presion tractiva en el ano y en el periné, como por una ulceracion subcutánea.— Diarrea sanguinolenta.

Orinas.— Gana frecuente de orinar, con emision abundante de orinas blanquecinas.— Punzadas en la uretra al orinar.

Pecho.— Por la tarde, aliento corto como por debilidad. —Accesos de sofocacion.— *Opresion de pecho con dificultad de la respiracion.*— Lancinaciones y tirones agudos en el pecho, con respiracion corta y embarazosa.— Presion en el corazon como por congestion de sangre, con *palpitaciones de corazon* muy sensibles.

Tronco.— Dolores lancinantes en los riñones.—Dolores de excoriacion en la nuca.— Presion con debilidad paralítica ó traccion en la nuca y en el cuello.

Brazos.— *Presion como por un cuerpo duro en los brazos, y hasta en los dedos*, que impide escribir.— Dolores tractivos en los brazos, y hasta en los dedos.— Dolor como despues de haber recibido un golpe, ó dolor de contusion en los brazos.— Traccion dolorosa en el brazo y en la muñeca.—Contraccion de los dedos.— Vesículas rojas en las articulaciones de los dedos, precedidas de prurito violento.

Piernas.— *Dolores calambroideos en los muslos.*— Manchas rojas en los muslos, como por una quemadura.— Comezon frecuente y violenta en las pantorrillas, en los tobillos y en los dedos de los piés.— *Color de luxacion en las articulaciones del pié.*— Dolores de excoriacion en los dedos, andando.— Dedos de los piés como muertos despues de haber andado.— Sudor fétido entre los dedos.

Digitized by Google

82.—DAPHNE INDICA.

DAPH.—Dafne de las Indias.—HERING.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:*—1, 30.—*Duracion de accion*: muchas semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Bry. dig. rhus. silic. sep. zinc.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—*Afecciones reumáticas* y *artríticas*, aun despues de gonorreas suprimidas; Artritis vaga; Dolores osteócopos y exóstosis; Ambliopia amaurótica; Gastralgia y otras afecciones gástricas, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores lancinantes como de golpes* en diferentes partes del cuerpo, pasando muchas veces con rapidez de una parte á otra, y que se agravan por el aire frio y bebiendo aguardiente.—*Dolores reumáticos y artríticos, así en los músculos como en los huesos.*—°Exóstosis con dolores lancinantes, ó presivos y sordos.—°Dolores de excoriacion en los exóstosis.—**La mayor parte de los padecimientos se manifiestan en el lado izquierdo del cuerpo*, y se agravan principalmente al aire fresco, como tambien durante la menguante de la luna, ¯por la mañana ó °hácia la tarde, y *sobre todo en la cama.*—*Mucha laxitud y cansancio sumo de todos los miembros.*—°Necesidad de estar acostado.—*Insomnio completo °algunas veces á causa de dolores osteócopos.—Gana de dormir sin poderlo conseguir.—Ensueños de fuego ó de gatos negros, con pesadilla.—°Sueño agitado no reparador.—Sobresaltos con espanto al dormirse, acompañados de despeluzamiento con sudor viscoso.—Fiebre semejante al tifus, con calofrios excesivos seguidos de calor contínuo, de sudor viscoso por todo el cuerpo y pérdida completa del apetito.—Fiebre con síntomas gástricos y nerviosos.—*Sudor viscoso* de olor pútrido.—

Digitized by

*Abatimiento moral. — Carácter miedoso. — Irritabilidad, sobreexcitacion y temblor durante los dolores.— Irascibilidad, falta de espíritu é indecision.

Cabeza. — Cefalalgia provocada por un trabajo intelectual cualquiera.— °Dolor detrás de los ojos de una sien á otra.— °*Sensacion de plenitud en la cabeza como si el cráneo quisiera estallar*, °sobre todo incorporándose en la cama.— *Sensacion como si la cabeza fuese muy voluminosa*, con punzadas en las sienes.—Sensacion como si las partes exteriores del cerebro estuvieran inflamadas y chocasen dolorosamente contra el cráneo.— **Excesivo calor en la cabeza, sobre todo en el vértice*, y á veces con sensacion como si esta estuviese comprimida.—Pulsacion dolorosa en las sienes (y en las encías), algunas veces con dolor de excoriacion al tacto.— °*Exóstosis en el cráneo*.— Tuberosidades en el vértice, blandas como si interiormente tuvieran agua, con dolores penosos, sobre todo por la noche; los dolores impiden el sueño y se agravan al tacto.— °Hinchazon dura en todo el lado izquierdo de la cabeza (del cráneo?), con sensacion de torpeza y dolores lancinantes agudos, pasajeros.

Ojos y oidos.—°Sensacion de rascamiento en los ojos.— Sensacion penosa alrededor de los ojos y de los párpados, con sequedad y pesadez de los últimos.— Sensacion dolorosa como si comprimiesen los ojos hácia afuera de la cabeza.— Dolores violentos en las pupilas, por la tarde, con mucha sobreexcitacion nerviosa.— Ojos inflamados, débiles, tiernos y como llenos de lágrimas.— °Sensacion como si una película se hubiese puesto delante de los ojos.— °Vista débil, con confusion de los caractéres al leer.— °Diplopia.— Pupilas fuertemente contraidas.— Zumbido de oidos.

Cara y dientes.— *Calor y sensacion quemante en las mejillas*, alrededor de las orejas y en el vértice, á veces con necesidad contínua de bostezar.— Sensacion de hinchazon, de rigidez y de tension en la articulacion témporomaxilar, con escozor quemante en la piel.— Pulsacion en los dientes y en las encías.— Dolores tractivos agudos en todos los dientes.— Odontalgia con ó sin salivacion.— Odontalgia con erecciones, ó despues del cóito. — Dolor de muelas con accesos de calofrios, ó con disposicion á traspirar.

Digitized by Google

Boca y vientre.—Lengua saburrosa de un solo lado.—°Sequedad de la lengua, como si estuviera tostada, despues del sueño.—°Fetidez de la lengua.—Salivacion.—Saliva caliente.—Mucho deseo de fumar.—°Pirosis y vómitos ágrios.—Vómitos con náuseas despues del desayuno.—°Sensacion de plenitud y meteorismo en la region precordial.—Presion en el estómago despues de haber bebido.—°Calambres frecuentes en el estómago.—°Despues de cada comida, dolor quemante y sensacion de excoriacion en el estómago, con erutos de aire frecuentes; los dolores se extienden hasta el hipocondrio izquierdo y el dorso.—Punzadas y dolores en la region esplénica.—Dolores artríticos que pasan rápidamente desde los miembros al vientre.—Dolor de vientre con calofrios.

Deposiciones.—Partes genitales.—°Opresion de vientre y estreñimiento.—°Deposiciones poco copiosas y sanguinolentas al fin.—°*Emision de orina frecuente y abundante.*—°*Emision nocturna frecuente.*—*Orinas turbias*, espesas, amarillentas, como huevos podridos.—Orinas de color amarillo rojizo.—Orinas fétidas.—Sedimento rojizo, que se adhiere á las paredes del vaso.—Dolor de excoriacion en la uretra, orinando.—Sudor en el escroto.—Flujo de licor prostático despues de orinar.—Erecciones durante los dolores de muelas.—Despues del cóito, dolor de muelas.

Pecho.—Vista débil.—Aliento fétido.—Expectoracion serosa, abundante.—Expectoracion sanguinolenta.—°*Tos con vómitos*, y °expectoracion amarillenta, espumosa, mezclada á veces de estrías de sangre; la tos fatiga y priva el dormir.—°Latidos y estremecimientos del corazon con imposibilidad de estar acostado sobre el lado izquierdo.—Dolores agudos en la region del corazon, con decaimiento y temblor.—Ahogo por la noche con sensacion como si las glándulas del cuello estuvieran hinchadas, y las arterias ingurgitadas de sangre.

Miembros.—Dolores en la nuca con dolor de cabeza.—Prurito quemante en el dorso.—Tiron doloroso á lo largo de la médula espinal, agravado en bajándose.—Flíctenas en los brazos y en las manos con mucho prurito.—Dolores osteócopos, terebrantes, y dolores lancinantes agudos en los dedos.—Miliar con prurito en

Digitized by Google

las piernas.—Dolores reumáticos en los muslos y en las rodillas.—Frio en las rodillas y en los piés.—Dolores de contusion en los dedos.—°Hinchazon dolorosa en la parte carnosa del dedo pulgar del pié, con dolores que muchas veces pasan rápidamente á otras partes del cuerpo.

83.—DIGITALIS PURPUREA.

DIG.—Digital purpúrea.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dosis usadas:* 30.—*Duracion de accion*: hasta 50 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: N-vom. op.

COMPÁRESE CON: *Ars. bell. chin.* coff. co'oc. *con.* bell. *merc. n-von. op. petr. puls. spig. sulf-ac.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones artríticas (con nudosidades)?; Obstruccion é induracion de las glándulas; Ictericia; Cianosis; *Afecciones hidrópicas*; Fiebres con afecciones gástricas, biliosas ó mucosas; Fiebres lentas con afecciones del sistema nervioso?; Fiebres verminosas?; Melancolía por afeccion orgánica del corazon?; Apoplejía serosa?; Hidrocéfalo?; Oftalmías catarrales (artríticas y escrofulosas)?; Cataratas?; Ambliopia amaurótica?; *Afecciones gástrico-mucosas ó biliosas*; Gastritis?; Ascitis; Uretritis crónica?; Estrecheces de la uretra; Tenesmo de la vejiga á consecuencia de una gonorrea; Hidrocele; *Amenorrea* con los dedos de un color azulado y manchas del mismo color en la cara; Hemoptísis; Afecciones orgánicas del corazon; Hidrotorax?, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Punzadas quemantes* y dolor de dislaceracion sobre todo *en los miembros*.—Dolores penetrantes y sensacion de cansancio sumo en las articulaciones, como despues de una gran fatiga.—Ingurgitacion de las glándulas.—Hinchazones tirantes y dolorosas, sobre todo en los miembros.—Convulsiones.—Ata-

Digitized by Google

ques de epilépsia.—*Hinchazones hidrópicas.—Marasmo.—*Mucha postracion y debilidad nerviosa.*—Accesos de debilidad excesiva, sobre todo despues del desayuno y de la comida.—Postracion rápida de las fuerzas, *como si fuera á desmayarse*, con sudor general.

Piel.—Comezon corrosiva, que cambia, si no se rasca, en un picoteo quemante é insoportable.—Descamacion de la piel de todo el cuerpo.—°Piel azulada, principalmente en los párpados, en los labios, en la lengua y en las uñas.

Sueño.—Gana de dormir por el dia y *soñolencia* interrumpida por accesos de vómitos convulsivos.—Por la noche, sueño incompleto con agitacion.—**Sueño nocturno interrumpido* por ensueños penosos, con sobresaltos.

Fiebre.—*Frio por todo el cuerpo*, frecuentemente con sudor frio, sobre todo en la frente ó en un solo lado del cuerpo.—*Frio en las manos y en los piés.*—Accesos frecuentes y repentinos de calor fugaz seguidos de debilidad.—*Sudores nocturnos y abundantes*, precedidos á veces de calofrios ú horripilacion, con calor interior en el dia.—*Pulso* pequeño, débil y de una lentitud excesiva, pero acelerado por el mas ligero movimiento.

Moral.—**Angustia extrema*, sobre todo por la tarde con *disposicion á llorar y mucho temor del porvenir.*—Remordimientos.—*Morosidad* llorosa con sensacion de malestar interior.—Indiferencia.—Mucho gusto al trabajo.—Debilidad de la memoria.—Delirios nocturnos y agitacion.

Cabeza.—Aturdimiento.—**Vértigos con temblor.*—*Presion y sacudidas en la cabeza*, sobre todo durante los trabajos intelectuales.—Tension en la frente al volver los ojos.—Dolor de dislaceracion en las sienes y en los lados de la cabeza.—*Punzadas en las sienes y en la frente*, las que á veces se extienden hasta la punta de la nariz, sobre todo despues de haber bebido frio.—*Prurito en el cerebro* en un solo lado de la cabeza.—*Sensacion* al bajarse, *como si el cerebro cayera hácia adelante.*—Ondulacion en el cerebro, como si contuviera agua con pesadez de la cabeza.—Hinchazon de la cabeza.—*La cabeza se inclina constantemente hácia atrás.*—Congestion violenta á la cabeza, con mucho ruido en los oidos.

Ojos.—*Presion en los ojos considerablemente aumentada por el tacto.—**Dolor quemante* y presion por encima

Digitized by

de los ojos, °con vista turbia.—Punzadas en los ojos.—*Rubicundez inflamatoria de la conjuntiva y de los párpados, con hinchazon y sensacion, como si se hubiese introducido arena en los ojos.—*Inflamacion de las glándulas de Meibomio.*—**Lágrimas* que producen escozor aumentadas por una viva claridad y al aire frio.—**Aglutinacion de los párpados*, con mucha secrecion de mucosidades.—Disposicion de los ojos á volverse hácia un lado.—Pupilas insensibles y dilatadas.—Vista turbia como á través de una niebla.—Oscurecimiento de la vista y ceguera completa, como por una amaurosis.—Oscurecimiento del cristalino.—Ilusiones de la vista.—Fantasmas, visiones y color de arco íris delante de los ojos.—**Los objetos parecen verdes ó amarillos.*—Chispas delante de los ojos.—Diplopia.—El fuego parece azulado.

Oidos.—Otalgia con dolores tensivos y contractivos en los oidos.—Hinchazon de las parótidas.

Cara.—*Palidez del rostro.*—°*Color azulado de los labios y de los párpados.*—Convulsiones en un solo lado de la cara.—Dolores calambroídeos y tractivos en los pómulos.—Hinchazon de la mejilla con dolor al tacto.—Erupciones con prurito corrosivo en las mejillas y en la barba.—Poros negros y supurantes en la cara.—Hinchazon de los labios.—Erupciones en los labios.—Labios secos.

Boca.—*Aspereza, excoriacion y sensacion como de rascamiento en la boca* y en la garganta, con gusto pastoso.—*Saliva de un gusto soso* y fétido.—*Salivacion* con excoriacion de la lengua y de las encías.—°*Lengua azulada.*—Hinchazon de la lengua.—Ulcera en la lengua.—Lengua cubierta de mucosidades blancas.

Apetito.—Gusto insípido, sobre todo despues de haber fumado, algunas veces con acumulacion contínua de saliva en la boca.—°Amargor de la boca.—*Gusto mucoso.*—Gusto amargo del pan.—**Falta de apetito*, algunas veces con la lengua limpia.—Sed, sobre todo de bebidas ácidas.—*Excesiva apetencia por las cosas amargas.*—Despues de la comida presion y meteorismo en el vientre y estómago.

Estómago.—Erutos y regurgitaciones ágrias, algunas veces despues de la comida.—Pirosis.—**Náuseas con gana de vomitar*, postracion moral é inquietud.—*Vomituricion convulsiva.—Vómitos y náuseas, con plenitud y presion en el epigastrio.—*Vómitos matutinos* ó nocturnos.

Digitized by Google

—*Vómitos de mucosidades*, de alimentos, ó de bílis, con náuseas excesivas.—Náuseas por la mañana al despertar.—Náuseas y vómitos durante la comida.—Vómito de alimentos desde que se empieza á expectorar.—Vómitos violentos con vértigos.—Sensacion de retraccion del estómago.—Presion, dolor quemante y pesadez del estómago y epigastrio.—*Sensacion de debilidad en el estómago, como si fuera á extinguirse la vida*, sobre todo inmediatamente despues de la comida.—Dolores calambroídeos en el estómago, á veces con náuseas y vómitos, aliviados por los erutos.—Punzadas en la boca del estómago; hasta las costillas y el dorso.—Plenitud en la boca del estómago.

Vientre.—Dolor de tension contractivo en los hipocondrios.—°Sensibilidad y dolores presivos en la region del hígado.—Torsion y pellizcos calambroídeos en los intestinos.—Cólicos lancinantes y dislacerantes con gana de vomitar, sobre todo durante el movimiento y la espiracion.—°Meteorismo.—°Ascitis.—Dolores cólicos como por un enfriamiento, ó una diarrea.—Tension calambroídea en las ingles.—Padecimientos por flatuosidades.

Deposiciones.—*Deposiciones blancas como greda ó color de de ceniza.—Diarreas de excrementos mezclados de mucosidades*, precedidas de calofrios y de dolores cólicos.—Deposiciones disentéricas.—Deposiciones involuntarias.—Diarreas acuosas.

Orinas.—*Retencion de orinas.—Necesidad penosa* y casi inútil *de orinar*, con *emision de orinas calientes, quemantes y excesivamente raras.—Emision difícil de la orina*, como por estrechez de la uretra.—Miccion nocturna.—Flujo de orinas.—Disminucion de la secrecion de las orinas, alternando algunas veces con emision abundante.—Dolores incisivos en la uretra, antes y despues de la emision de las orinas.—Emision involuntaria de las orinas.—*Orinas de color oscuro parduscas ó rojizas.*—Náuseas antes y despues de la emision de las orinas.—Orinando, sensacion quemante y constriccion en la uretra.—Inflamacion del cuello de la vejiga.

Partes genitales.—Dolor de contusion en los testículos.—*Hinchazon de los testículos.*—Apetito venéreo considerablemente exaltado, con erecciones y poluciones frecuentes.—Hinchazon hidrópica del escroto.

Digitized by

Laringe.—Ronquera y coriza por la mañana.—Mucosidades abundantes en la laringe, las que se desprenden tosiendo ligeramente.—Tos despues de la comida con vómito de los alimentos.—**Tos seca*, con dolores en las espaldas y en los brazos.—Tos con expectoracion de materias parecidas al almidon.—Escozor en el pecho al toser.—Tos calambroídea, seca, provocada por una conversacion sostenida.—**Expectoracion sanguinolenta* al toser.

Pecho.—*Respiracion penosa y dificil*, sobre todo por la noche, *estando acostado*, y por el dia, andando ó estando sentado.—Por la mañana constriccion del pecho que ahoga, y obliga á incorporarse en la cama.—°Padecimientos asmáticos, como por un hidrotorax.—Presion en el pecho estando encorvado.—Tension en el pecho, con necesidad de respirar profundamente.—Dolor contractivo en el pecho estando encorvado.—Escozor en el pecho.—Sensacion de debilidad en el pecho, procedente del estómago.—Congestion en el pecho.—*Aceleracion de las funciones del corazon, con palpitaciones* sensibles al oido, angustia y contraccion en el esternon.—Horripilacion en las mamas.—Palpitaciones violentas, con ebullicion de sangre, por la noche, obligando á levantarse y á abrir la ventana.

Tronco.—Dolores tractivos en el dorso y en los riñones. como despues de un enfriamiento.—Dolores de contusion en los riñones, al sonarse.—Rigidez y tension de los músculos, del cuello y de la nuca.

Brazos.—Tirones paralíticos y dolores dislacerantes en los brazos.—Hinchazon nocturna de la mano derecha y de los dedos.—*Frio en las manos*.—Dolores dislacerantes en las articulaciones de los dedos.—Rigidez súbita y paralítica de los dedos.—Torpeza y adormecimiento fácil de los dedos.

Piernas.—Mucha rigidez de las piernas despues de haber estado sentado, la que se disipa andando.—Falta de energía y debilidad paralítica en las piernas.—Hinchazon de las rodillas, como por un esteatoma.—Dolores incisivos en el muslo, y sensacion quemante en la pantorrilla al cruzar las piernas.—Tension en la corva.—*Piés frios*.—Hinchazon de los piés por el dia.

Digitized by

84.—DROSERA ROTUNDIFOLIA.

DROS.—Rocío del sol.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop. —*Dósis usadas*: 9, 12, 30.—*Duracion de accion*: 6 á 7 dias.
ANTÍDOTOS: Camph.
COMPÁRESE CON: Acon. bry. cin. cupr. hep. hyos. ipec. n-vom. *spong. veratr.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra: — Epilepsia; *Fiebres intermitentes*; Presbiopia y otros defectos de la vista (aun á consecuencia de una oftalmía sifilítica?); *Afecciones gástricas*; *Catarro y ronquera*, aun á consecuencia del sarampion; *Coqueluche*; Afecciones de las vías aéreas, aun las que son el resultado del croup; *Laringitis crónica*, aun con ulceracion; Neumonía crónica?; Tísis incipiente, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Punzadas corrosivas* en la cavidad de los huesos, de los brazos y de las piernas excesivamente fuertes, con lancinaciones violentas en las *articulaciones*, durante el reposo mas bien que durante el movimiento.—Presion lancinante y dolorosa en los músculos (de los miembros), que no se mejoran en ninguna posicion.—*Dolores de contusion*, *sensibilidad excesivamente* dolorosa, debilidad paralítica *en todos los miembros.*—Debilidad en todo el cuerpo, con mejillas y ojos hundidos. Convulsiones epilépticas con sueño y esputos de sangre despues de los accesos.—La mayor parte de los síntomas aparecen por la noche y por la mañana, como igualmente con el calor y durante el reposo.

Sueño.—Ronquido durante el sueño, estando echado sobre el dorso.—*Sobresaltos frecuentes con espanto durante el sueño.*—Por la noche despierta á causa de un sudor que se presenta.—Sueño á medio dia y por la tarde á la caida del sol.

Fiebre.—Horripilacion por todo el cuerpo, con calor en la cara, frio glacial en las manos y falta de sed, ó *calo-

Digitized by Google

frios con frio y palidez de las manos, de los piés y de la cara.—Calor con dolor de cabeza y tos convulsiva.—**Fiebre con náuseas y gana de vomitar*, y otros padecimientos gástricos, ó con ligera irritacion en la garganta.

Moral.—Abatimiento moral, causado por ideas de enemistades imaginarias.—*Ansiedad*, sobre todo estando solo con miedo á los espectros.—Inquietud que no permite ocuparse mucho tiempo del mismo objeto.—Inquietud sobre el porvenir.—Exasperacion á la menor ocasion.—Impulsos de ahogarse.—*Obstinacion* en ejecutar lo que una vez ha resuelto.—La menor cosa pone fuera de sí al enfermo.

Cabeza.—Aturdimiento doloroso en la cabeza, como despues de haber hablado mucho.—Vértigos paseándose al aire libre, hasta el punto de hacer caer (á la izquierda).—*Dolores presivos en la cabeza*, sobre todo en la frente y en los pómulos, algunas veces con náuseas y aturdimiento.—Latidos y martilleo en la frente, de dentro á fuera.—*Dolores de excoriacion en la piel del cráneo.*

Ojos.—Punzadas en los ojos hácia el exterior, sobre todo en bajándose.—*Suspension de la vista, ó confusion y palidez de los caractéres, leyendo.—**Presbiopia*.—°Deslumbramiento por la claridad de la luz de la bujía, y por la del dia.—°Como un velo delante de los ojos.

Oidos.—Punzadas y apretamiento en los oidos, sobre todo al tragar.—Dureza de oido con susurro y zumbido.

Nariz.—**Epistaxis*, sobre todo por la tarde.—Mucosidad sanguinolenta al sonarse.—Excoriaciones en la nariz, de un color negruzco.—Sequedad contínua de la nariz.—Mucha sensibilidad á los olores ácidos.—Coriza fluente con estornudo.

Cara.—Palidez de la cara con mejillas cóncavas y ojos abatidos.—Sensacion quemante, picazon en la piel de las mejillas y por debajo de los ojos.—Labios agrietados y constantemente secos.—Presion en los pómulos hácia afuera, agravada por la presion y el contacto.—Excoriaciones negras en la barba, en la cara y en la nariz.

Boca y garganta.—Dolores lancinantes en los dientes, despues de haber tomado bebidas calientes.—Ulceras en la lengua.—*Sangre en la boca.—Ulceracion del velo del paladar.—Punzadas en la garganta despues de haber comido alguna cosa salada.—Dificultad de tragar los ali-

Digitized by

mentos sólidos, como por estrechez de la garganta.—Sensacion en la garganta, como si se hallasen migas de pan detenidas.—Ruido estrepitoso de mucosidades amarillentas ó verdosas.

Apetito.—Sed, sobre todo por la mañana.—Insipidez de los alimentos.—Gusto amargo de los alimentos y sobre todo del pan.—Erutos amargos.—Hipo frecuente.—*Evacuacion de agua como de pituitas*.—°Repugnancia por la carne de puerco.—Vómitos por la noche y despues de comer.—°*Vómitos de bilis*, por la mañana.—Vómitos de sangre.—Náuseas despues de haber tomado alimentos grasos.—°Vómitos de viscosidades y de alimentos durante la tos.—Punzadas y latidos en la boca del estómago.

Vientre.—Dolores en los hipocondrios, tosiendo y al tacto.—Cólico despues de haber comido cosas ácidas.

Deposiciones y orinas.—Deposiciones frecuentes de mucosidades sanguinolentas con dolores cólicos.—Necesidad frecuente de orinar con emision poco abundante, generalmente gota á gota.—Emision de orina por la noche.—Orinas de un color oscuro, y olor fuerte.

Reglas.—Reglas suprimidas.—Reglas tardías.—Flores blancas con dolores como los de parto.

Laringe.—*Hormigueo en la laringe*, que provoca una tos corta con punzadas hasta la garganta.—Sensacion como si hubiera un cuerpo blando en la laringe, una pluma, por ejemplo.—*Sensacion de sequedad, de aspereza y de arañamiento en el fondo de la garganta*, con necesidad de toser.—°*Ronquera y voz muy baja y honda*.—°Laringe dolorida en hablando.—Acumulacion de viscosidades, alternativamente duras y blandas, amarillentas, grises ó verdosas.—°*Tos y ronquera*.—Tos que sale del fondo del pecho, con dolores en los hipocondrios y en el pecho, los que se alivian poniendo encima la mano.—*Tos por la noche y por la tarde*, inmediatamente despues de acostarse.—°*Tos seca, calambroidea, con vomituricion*.—°*Tos fatigosa como la coqueluche*, con rostro azulado, respiracion sibilante, accesos de sofocacion, *epistaxis, hemorragia por la boca*, y ansiedad.—Las tos es provocada por las risas, los llantos, y por las emociones morales.—°*Vómito de alimentos despues y durante la tos*.—Tos con aliento fétido.—El canto, el humo del tabaco y las bebidas excitan la tos.—Tos con expectoracion de una sangre de color rojo

Digitized by

vivo, ó de coágulos negruzcos.—*Tos por la mañana con expectoracion amarga y nauseabunda.—**Tos con expectoracion de materias purulentas*, y punzadas en la parte superior del pecho.—Expectoracion verdosa.

Pecho.—*Dificultad de la respiracion al hablar*, como si la garganta se contrajese, principalmente estando sentado.—Opresion de pecho, *como si al toser ó al hablar, detuviese alguna cosa la voz.*—Apretamiento en el pecho al toser.—Dolores en el pecho al toser y al estornudar.—Dolores de ulceracion subcutánea en el esternon, oprimiéndole.

Tronco.—*Dolores de contusion en el dorso.*—Rigidez de la nuca con dolores durante el movimiento.—Excoriaciones negras en el pecho y en las espaldas.

Brazos.—*Dolores de contusion en las articulaciones de los brazos y de las manos.*—Calambres y rigidez de los dedos al coger algun objeto.—Dolores nocturnos en los huesos de los brazos.

Piernas.—Dolores paralíticos en la articulacion coxo-femoral, y en los muslos al andar, y que obliga á cojear.—Punzadas incisivas en las piernas.—Dolor de dislaceracion en las articulaciones de los piés, *como si estuviesen dislocadas*, solamente andando.—Rigidez de las articulaciones de los piés.—Sudor frio en los piés, los que están constantemente frios.

85.—DULCAMARA.

DULC.—Dulcamara.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dosis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* 20 á 30 dias.

ANTÍDOTOS: Camph. ipec. merc —*Se emplea como antídoto de:* Cupr.

COMPÁRESE CON: Acon. ar . bell. bry. con. *cupr.* ipec. *lach. merc. n-com.* phos. *rhus.* sulf.—Sobre todo despues de: *Cupr. merc.* y *lach.* es cuando la dulcamara se mostrará eficaz si se halla indicada.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra:—Padecimientos por el abuso del mercurio; *Afecciones á causa de un enfriamiento* (aun en el agua); Afecciones de las membranas mucosas; Afecciones escrofulosas, con obstruccion é induracion de las glándulas; Tumores frios; Afecciones hidrópicas; *Parálisis*; Afecciones á consecuen-

Digitized by Google

cia del sarampion; *Herpes de diferentes especies*, aun las que proceden del abuso del azufre; Pénfigo en los niños, reblandecimiento de los huesos; *Erupciones urticarias*; Verrugas; Escarlatina y miliar purpúrea, cuando hay complicacion de estas dos enfermedades; Fiebre con afeccion de las membranas mucosas; Cefalalgia, sobre todo á consecuencia de un enfriamiento; Costra láctea; Oftalmía escrofulosa; Ambliopia amaurótica; Glosoplegia; Anginas, sobre todo la catarral (despues del uso del *mercurio*); Afecciones escorbúticas de las encías; Colerina; Disentería por enfriamiento; Diarrea mucosa?; *Catarro de la vejiga*; Estrechez de la uretra?; Bubones escrofulosos; Herpes en las partes genitales; Catarros inveterados con ronquera; Coqueluche?; Tísis mucosa?; Asma pituitoso; Neumonía crónica?; Hidrotorax; Tísis incipiente?; etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores dislacerantes* ó lancinantes, tractivos en los miembros.—**Padecimientos como por enfriamiento de diversas partes.*—*Agravacion de los padecimientos, principalmente por la tarde ó por la noche*, y durante el reposo; mejoría por el movimiento.—Dolores con frio.—°Secrecion y excrecion inmoderada de las membranas mucosas.—**Hinchazon é induracion de las glándulas.*—Demacracion.—**Anasarca general.*—*Hinchazon rápida de todo el cuerpo.*—Debilidad y cansancio sumo en general.—Convulsiones semilaterales con pérdida de la palabra.—*Afecciones paraliticas* de los miembros.—*Mucha laxitud.*

Piel.—Sequedad y calor de la piel.—**Miliar urticaria* con fiebre.—*Herpes de diferentes especies, á saber: (a) °Herpes húmedos, costrosos, *pálidos, exudantes despues de haberlos rascado; (b) Herpes rojizos con aureola encarnada que sangran despues de haberlos rascado; (c) Herpes de bordes rojos con sensibilidad dolorosa al contacto y al agua fria; (d) Herpes pequeños redondos, que sangran despues de haberlos rascado; (e) °Herpes secos, furfuráceos.—°Costras herpéticas por todo el cuerpo.—*Erupciones herpéticas con hinchazon de las glándulas.—*Verrugas.*—°Herpes en las articulaciones.—°Erupcion de pústulas pruritosas que pasan á supuracion y se cubren de

Digitized by

una costra, sobre todo en los miembros inferiores y en la parte posterior del cuerpo.

Sueño.—*Mucho deseo de dormir por el dia.*—°Sueño nocturno, agitado, inquieto á consecuencia del calor y de estremecimiento del cuerpo, sobre todo despues de media noche.—*Despierta muy temprano.*—Sueños espantosos.—Visiones por la mañana al despertarse.

Fiebre.—Por la tarde calofrios frecuentes y frio que no se apaciguan ni aun al calor del fuego.—Frio durante los dolores.—°Al principio calofrios febriles, despues calor quemante con dolor aturdiente en la cabeza, rostro encendido, calor quemante del paladar, y sed inextinguible de bebidas frias.—**Calor seco y sensacion quemante en la piel*, con delirio y sed.—°Fiebre con exacerbacion por la tarde.—Pulso duro y tirante.—*Sudor general*, sobre todo por la noche.—Sudor fétido con emision abundante de orinas.

Moral.—*Agitacion moral.*—Mucha impaciencia.—°Desea con impaciencia diversas cosas, las que rechaza en cuanto las consigue.—Disposicion á reñir sin encolerizarse.—Delirios nocturnos, con exacerbacion de los dolores.

Cabeza.—°Mucho aturdimiento, como si hubiera en la frente un tornillo que la comprimiera.—Dolores presivos, con aturdimiento en diversas partes de la cabeza.—*Terebracion y dolor quemante en la frente y como si escarbaran de dentro afuera.—*Los dolores de cabeza se agravan por el mas ligero movimiento, ° y aun por hablar.—*Sensacion de pesadez en la cabeza.*—Congestion á la cabeza, con zumbido de oidos y dureza de oido.—Sensacion como si el occipucio estuviese mas desarrollado.

Ojos.—Presion en los ojos, sobre todo leyendo.—Sensacion como si saliera fuego por los ojos.—*Inflamacion de los ojos.—Estremecimiento de los párpados al aire frio.—Chispas delante de los ojos.—Vista turbia, como por una amaurosis incipiente.

Oidos.—Otalgia por la noche con náuseas.—Tirones agudos con punzadas en los oidos.

Nariz.—*Epistaxis de una sangre* muy caliente y de un *rojo vivo*, con dolor presivo por encima de la nariz.—Coriza con obturacion de la nariz, agravada al aire frio.

Digitized by

Cara.—Palidez de la cara con color circunscrito á las mejillas.—°Erupcion y verrugas en la cara.—°Costras espesas, parduscas ó amarillentas en la cara, en la frente, en las sienes y en la barba.—Herpe en las mejillas que exuda.—Temblor de los labios al aire frio.—Parálisis de la mandíbula inferior.—°Hinchazon de las glándulas submaxilares.—Rubicundez de la cara.—Distorsion de la boca.

Boca.—*Salivacion.*—*Sequedad de la lengua.*—°Lengua cubierta de mucosidades espesas.—Hinchazon de la lengua.—Granos y úlceras en la boca.—Encías desprendidas y fungosas.—**Parálisis de la lengua* y palabra impedida, sobre todo resfriándose.—Ligera inflamacion de garganta como por prolongacion de la úvula, con dolor presivo. Dolor quemante en el paladar.—**Dolor de garganta, como despues de un enfriamiento.*

Apetito.—Gusto soso y como de jabon en la boca.—°Amargor de la boca.—**Sed ardiente* de bebidas frias, generalmente con sequedad de la lengua, unido á una secrecion mas abundante de saliva.—Hambre con repugnancia á todo alimento.—Despues de haber comido moderadamente, meteorismo de vientre y del epigastrio.—* Náuseas con *vómitos de mucosidades viscosas.*

Estómago.—*Presion en el estómago y en el pecho.—Contraccion calambroídea en el estómago, hasta el punto de impedir la respiracion.—Retraccion del epigastrio, con dolor quemante.

Vientre.—Dolores en la region umbilical.—Pellizcos lancinantes y *dolores cólicos en la region umbilical*, sobre todo por la noche.—Pellizcos corrosivos y sensacion, como si una lombriz serpeara por el vientre.—**Dolores de vientre como por un enfriamiento.*—*Infarto inflamatorio y endurecimiento de las glándulas inguinales con dolores tractivos y tensivos.

Deposiciones.—Estreñimiento.—**Diarrea como despues de un enfriamiento*, con dolores cólicos, ó con vómitos, erutos y sed.—**Diarreas de mucosidades verdosas ó parduscas.*—Diarrea sanguinolenta, con *picazon en el ano*, y prolapsus del recto.—°Diarreas nocturnas, serosas, con cólicos.

Orinas.—Retencion de orina.—Orinas raras y fétidas.—Orina clara y viscosa, ó turbia, *con sedimento mucoso.*—

Digitized by Google

Orinas rojas, quemantes.—°*Emision involuntaria de orinas*, como por parálisis del cuello de la vejiga.—Emision difícil de las orinas y gota á gota.—°Renitencia de la vejiga.—*Evacuacion de mucosidades por la uretra.—Estrechez de la uretra.—Orinas turbias y blanquecinas.

Reglas.—Reglas tardas y mas abundantes.—°Erupcion herpética en los grandes labios.—Antes de las reglas, erupcion miliar.—Herpes en el pecho.

Laringe.—Catarro y ronquera, como por un enfriamiento.—°Tos con ronquera.—Tos gruesa.—Tos con expectoracion de sangre de un rojo vivo.—*Tos semejante á la coqueluche, °provocada respirando profundamente.

Pecho.—Fuerte *opresion de pecho*, sobre todo respirando.—*Punzadas obtusas*, como de golpes en los dos lados del pecho.—Dolor penoso de ondulacion en el costado izquierdo del pecho.—Fuerte palpitacion de corazon por la noche sensible al exterior.

Tronco.—*Dolores violentos en las regiones lumbares*, por encima de las caderas, como si escarbaran, lancinantes ó tractivos, principalmente por la noche en el reposo.—*Rigidez de la nuca*.—Infarto é induracion de las glándulas de la nuca y del cuello.—Tirones lancinantes en los riñones, en las espaldas y en los brazos.

Brazos.—*Parálisis de los brazos*, con frio glacial, como por una apoplejía.—Dolor paralítico en los brazos, como por una contusion, principalmente estando en reposo.—*Erupcion herpética y *verrugas en las manos*.—*Sudor en la palma de las manos*.

Piernas.—Traccion y dolor de dislaceracion en las piernas, sobre todo en los muslos.—Herpes en las rodillas. Abotagamiento é hinchazon de las piernas hasta las rodillas.—Sensacion quemante en los piés y en los dedos de estos.—Descamacion erisipelatosa y prurito en los piés.—Hormigueo en los piés.

Digitized by Google

86.—EUPHORBIUM.

EUPHORB.— Euforbio oficinal.— *Archivos de* STAPF.— *Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeopática.— *Dósis usadas*: 21, 30.— *Duracion de acoion*: hasta 50 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS: Camph. citr.
COMPÁRESE CON: Bell. merc. mez. nitr-ac.—Sobre todo despues de: *bell. merc. y nitr-ac.* es cuando este medicamento conviene, si se halla indicado.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra:—Padecimientos por abuso del mercurio?; Afecciones de los huesos y de las membranas mucosas?; Ulceras inveteradas y entorpecidas?; Escarlatina; Verrugas; Oftalmías catarrales!; Erisipela vesiculosa de la cara?; Esofagitis?; Gastralgia?; *Melladura de los dientes*; Ptialismo; Afecciones de las vías urinarias; Malas consecuencias de una pleuresía ó de una pulmonía, con adherencia de la pleura?, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores en los miembros, dislacerantes, ó presivos y lancinantes*, sobre todo *durante el reposo*, aliviados por el movimiento.—Dolores lancinantes y *tensivos* en los músculos.—*Dolores quemantes* en diversas partes del cuerpo, *sobre todo en los órganos internos*.—Debilidad paralítica de las articulaciones con dificultad de levantarse del asiento.—Excesiva flojedad y laxitud.—La mayor parte de síntomas se agravan durante el *reposo*, estando sentado y *por el tacto*.

Piel.—*Prurito corrosivo y quemante que obliga á rascarse* constantemente.—Estrías de un rojo casi color de púrpura en la piel.—*Forúnculos*.—*Ulceras indolentes*.—(Esfacelo?) °Verrugas.

Sueño.—*Gana de dormir por el dia*, acompañada de bostezos frecuentes.—Soñolencia comatosa por el dia.—Dificultad de dormirse al principio de la noche, con temblor y sobresaltos.—Se despierta con frecuencia.

Fiebre.—Horripilacion y *falta de calor vital*, sobre todo en las afecciones de los órganos internos.—Calofrios al

Digitized by Google

empezar á comer.—Horripilacion y calofrios con frio en las manos y calor en las mejillas sin sed.—Sudor matutino con calor sin sed.

Moral.—Aprensiones que causan angustia.—Taciturnidad.—Gusto para el trabajo.

Cabeza.—Vértigos rotatorios que hacen caer de costado.—*Dolores de cabeza presivos*, lancinantes.—*Dolor de contusion en el occipucio.*—Inflamacion erisipelatosa en el exterior de la cabeza.

Ojos.—*Inflamacion de los ojos*, con prurito y sequedad de los párpados y de los ángulos de los ojos.—Inflamacion crónica de los ojos.—*Lagrimeo con escozor y aglutinacion* nocturna *en los párpados.*—Secrecion abundante de mucosidades en los ángulos de los ojos.—La córnea se pone turbia.—Turbacion de la vista.—Miopia.—Diplopia.

Oidos y nariz.—Otalgia al aire libre.—Picazon que causa sofocacion en la nariz y hasta en el cerebro, con evacuacion abundante de mucosidades.—Estornudos frecuentes.

Cara.—*Hinchazon erisipelatosa de la mejilla con erupcion de vesiculas amarillentas* y dolor terebrante y como si escarbaran.—Hinchazon pálida de la mejilla.—Dolor quemante en la cara.

Dientes.—*Dolores de dientes presivos lancinantes*, ó con dolor terebrante, agravados por el contacto y la masticacion ó bien al principio de la comida, con calofrios y dolor en la cabeza y los pómulos.—*Mellas en los dientes.*

Boca y garganta.—Sequedad de la boca sin sed.—*Salivacion con horripilacion*, gana de vomitar y pellizcos en el estómago.—Saliva salada.—*Dolor quemante desde la garganta* hasta el estómago, acompañado de calor, ansiedad, temblor y evacuacion de agua por la boca, como pituitas.

Estómago.—Gusto soso, rancio, amargo.—Mucha sed de bebidas frias.—Erutos vacíos.—Hipo.—Evacuacion de agua por la boca, como pituitas, con calor, ansiedad y temblor.—Dolor de contusion en el estómago.—Relajacion y flacidez del estómago, con retraccion del vientre.—*Calambres de estómago contractivos.*—Pellizcos y sensacion de arañamiento en el estómago.—*Dolor quemante en el estómago* y en el epigastrio.—Inflamacion del estómago.

Digitized by Google

Vientre.—Dolores de vientre con dolores constrictivos. —*Cólico espasmódico*, ventoso, *con dolor como si se abriera el vientre ó que parece oprimir* hácia arriba, que se alivia generalmente apoyando el codo sobre la rodilla, y la cabeza sobre la mano.—Sensacion de vacío en el vientre.—*Dolor quemante en el vientre.*—Dolor dislacerante como por una luxacion en las ingles.

Deposiciones y orinas.—Conato urgente de deponer con prurito en el recto.—*Diarreas liquidas con tenesmo*, sensacion de quemadura en el ano, y dolor de excoriacion en el vientre.—Gana urgente de orinar, con emision difícil, poco abundante y *gota á gota.*—Flujo de sangre por la uretra.

Partes genitales.—Lancinaciones dislacerantes en el glande.—Prurito voluptuoso en el prepucio.—Dolor de dislaceracion en los testículos.—Dolor quemante en el escroto.—*Erecciones continuas sin lascivia.*—Evacuacion de licor prostático.

Laringe.—*Tos seca*, profunda, provocada por un *cosquilleo quemante en la tráquea-arteria* y en el pecho.—Tos seca dia y noche como por una opresion, por la mañana con expectoracion frecuente.

Pecho.—Respiracion difícil y aliento corto, con dolor tensivo en los músculos del pecho.—Sensacion de extension espasmódica en el pecho.—Sensacion como si *uno de los lóbulos del pulmon estuviera adherido.*—Presion en los músculos del pecho.—Lancinacion presiva en el esternon.—Lancinacion en el lado izquierdo del pecho, durante el reposo, aliviada por el movimiento.—*Dolor quemante en el pecho.*

Tronco y miembros.—Dolor calambroídeo en la espina dorsal, por la mañana en la cama, estando acostado sobre el dorso.—Sudor en el cuello.—Tension paralítica en la articulacion de la espalda durante el reposo, aliviada por la marcha.—*Estrías de color escarlata*, en los antebrazos, pruritosas al tacto.—Tracciones calambroídeas en la mano despues de haber escrito.—*Dolores de luxacion en las caderas.*—Dolor quemante por la noche en los huesos de los muslos.—*Mucha debilidad en las piernas.*—Contraccion calambroídea de los dedos de los piés.

Digitized by

87.—EUPHRASIA OFFICINALIS

EUPHR.—Eufrasia oficinal.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeopática.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* hasta 20 dias en algunos casos.

ANTÍDOTOS: Puls?.

COMPÁRESE CON: Arn. merc. n-vom. puls. seneg. spig.

CLÍNICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Malos resultados de una contusion, un golpe, una caida, etc.; *Oftalmias* reumáticas, escrofulosas, catarrales, traumáticas, etc.; *Blenorrea de los ojos*; Oscurecimiento, inflamacion y manchas de la córnea; Ambliopia amaurótica; Tos húmeda á consecuencia de la grippe; Condilomas, etc., etc.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores calambroídeos en todo el cuerpo.—Picazon en las extremidades como de una mosca, con sensacion de torpeza.—Exacerbacion de los síntomas por la tarde.—*Mucha gana de dormir por el dia*, como por estar fatigados los ojos.—*Bostezos violentos*, paseándose al aire libre.—Lancinaciones violentas en diversas partes y que impiden dormir.—Sueños espantosos, se despierta á menudo sobresaltado y asustado.—Predominio del frio.—Mucho sudor nocturno.—Taciturnidad y repugnancia á la conversacion; está concentrado en sí mismo.—Indiferencia hipocondríaca.—Pereza.—Melancolía.

Cabeza.—*Pesadez y dolor de contusion en la cabeza*, por la tarde, que se aumentan estando acostado.—*Dolor de cabeza* presivo *con fotofobia* y calor principalmente en la frente.—Punzadas en las sienes y en la frente.—Latidos en la cabeza, sensibles al exterior.

Ojos.—*Presion en los ojos.*—Sensacion mordicante en los ojos.—Rubicundez inflamatoria de los ojos.—°*Inflamacion de la córnea.*—*Inflamacion y *ulceracion del borde de los párpados*, con dolor de cabeza.—°*Cicatrices de úlceras y manchas en la córnea.*—**Evacuacion abundante de lágri-*

Digitized by Google

mas corrosivas, hasta el punto de cegar, sobre todo cuando se está expuesto al viento.—*Hinchazon y aglutinacion de los párpados.—Escozor en los ojos como por arena.—Lancinaciones en los ojos, excitadas por una luz demasiado viva.—Erupciones de granos muy pequeños miliares alrededor de los ojos.—**Secrecion abundante de mucosidades, algunas veces sanguinolentas, por los ojos y los párpados.*—Compresion en los párpados.—Contraccion de los ojos y los párpados, que obliga á pestañear.—La luz parece oscura y que vacila.—*Fotofobia*, sobre todo á la luz del dia y al sol.

Oidos.—Otalgia, con dolores terebrantes en el tímpano.

Nariz.—Granos purulentos en las alas de la nariz.—Excoriacion y sensibilidad dolorosa en las ventanillas nasales.—Epistaxis.—Coriza fluente por el dia; por la noche obturacion de la nariz.—**Violento coriza fluente, con secrecion abundante de mucosidades*, entorpecimiento excesivo de la cabeza y lágrimas corrosivas.

Cara.—Rigidez de las mejillas, hablando y durante la masticacion, con sensacion de calor y dolores lancinantes.—Miliar en la cara con sensacion de quemadura y rubicundez cuando se moja la cara.—Labio rígido, como si fuese de madera.—*Punzadas en la mandíbula inferior y en la barba.*

Boca.—*Tartamudez é interrupcion frecuente de la palabra.*—Dificultad en la palabra á causa de una rigidez paralítica de la lengua y de las mejillas.—Sensacion de regurgitacion que sube á la garganta.

Dientes.—Dolores lancinantes en los dientes inferiores. Las encías sangran con abundancia.

Estómago.—Orinas.—Gusto insípido.—Náuseas y amargor de boca despues de haber fumado.—Erutos con gusto á los alimentos.—*Pellizcos en el vientre por accesos cortos.*—Apretamiento presivo y quemante á través del vientre.—Cólicos que alternan con afecciones de los ojos.—Deposiciones duras é insuficientes.—*Emision frecuente de una orina abundante y clara.*

Partes viriles.—Retraccion espasmódica de las partes genitales, al principio de la noche en la cama.—Prurito lancinante y voluptuoso en el glande y en el prepucio.—°Condilomas.—Retraccion y hormigueo en los testículos.

Digitized by Google

Pecho.—Tos, sobre todo por el dia con expectoracion difícil.—Tos con suspension de la respiracion.—*Tos matutina, con expulsion abundante de mucosidades*, y coriza fluente.—Dificultad de la respiracion, aun estando sentado.

Miembros.—*Dolores calambroideos*, presivos *en el dorso*.—Dolor de adormecimiento en los brazos y en las manos.—*Dolores calambroideos*, presivos, *en las manos y en los dedos*.—Accesos de hinchazon de las articulaciones de la mano ó de los dedos, en moviendo estas partes.—Torpeza en los dedos.—Punzadas en las piernas durante el reposo.—Tension como por acortamiento de los tendones en la corva y el tendon de Aquiles, cuando se anda.—Sensacion de pesadez y *dolor calambroideo en las pantorrillas*, estando mucho tiempo de pié.—Sacudidas que suben á lo largo del muslo, seguidas de torpeza paralítica de esta parte.

88.—FERRUM METALLICUM.

FER.—Hierro metálico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. —*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: 6 á 7 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Arn. ars. bell. chin. hep. ipec. merc. puls. veratr.—*Se emplea como antídoto de*: Ars. chin. té de china.

COMPÁRESE CON: Amm. *ars.* calc. *carb-veg.* cham. *chin.* cin. *graph. hep.* ipec. n-vom. *puls.* sep. thui. veratr.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra—Afecciones artríticas; Malas consecuencias del abuso de la quina, ó del té de China; Parálisis, aun las que provienen de pérdida de humores; Afecciones hidrópicas; Clorosis; *Congestion de sangre y hemorragias*, con sobreexcitacion de todo el sistema sanguíneo; Atrofia?; Debilidad por pérdidas debilitantes?; Fiebres intermitentes, empeoradas por el abuso de la quina; Jaqueca; Cefalalgia congestiva; Oftalmías escrofulosas?; Hemorragias nasales y bucales; *Dispepsia con vómito de los alimentos* (sobre todo en los tísicos); Gastralgia; Cólicos espasmódicos, flatulentos y *verminosos*; Lienteria?; *Diarrea*, sobre todo en

Digitized by Google

los tísicos y en los niños; Ascárides; Metrorragia aun despues del parto; Esterilidad: Aborto; Vómito en las embarazadas; Grippe; Coqueluche?; Asma espasmódico y (flatulento)?; Tos convulsiva; Tísis (primer período); Hemoptísis; Congestion de pecho, con palpitaciones de corazon; Edema de los piés por pérdidas debilitantes, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores violentos, *dislaceracion y punzadas*, sobre todo por la noche, con necesidad de mover las partes afectas.—*Várices*.—Calambres y contraccion espasmódica de los miembros.—Hinchazones hidrópicas con dolores lancinantes.—**Ebullicion de sangre y hemorragias.—La mayor parte de síntomas se manifiestan por la noche*, se agravan estando sentado, y se mejoran por un movimiento suave.—**Mucha laxitud y debilidad general*, provocadas solo por hablar, que alternan á veces con un temblor angustioso de todo el cuerpo.—°*Demacracion*.—Despues de haberse paseado al aire libre, fatiga nerviosa hasta el punto de perder el conocimiento, con oscurecimiento de la vista y zumbido en la cabeza.—*Gran necesidad de estar echado* y debilidad paralítica.

Piel.—Sensacion quemante en diversas partes de la piel, con dolor de excoriacion al tacto.—°Palidez de la piel de todo el cuerpo, con color térreo.

Sueño.—**Mucha fatiga soñolienta, con sueño agitado por la noche*, anhelacion angustiosa, afluencia de suenos, y dificultad de volverse á dormir cuando despierta.—*Sueño tardío* por la tarde.—Ojos medio abiertos durante el sueño.—Imposibilidad de dormir echado de un lado.

Fiebre.—Calofrios frecuentes y de corta duracion.—°Parece que hay falta de calor vital.—Despeluzamiento por la tarde con frio en la cama toda la noche.—Calofrios con mucha sed, precedidos ó acompañados de dolor de cabeza.—Calor seco con necesidad de destaparse.—*Ebullicion de sangre por el dia*, con calor por la tarde, sobre todo en las manos.—**Fiebre* con congestion á la cabeza, abotagamiento alrededor de los ojos, hinchazon de las venas, vómito de los alimentos, respiracion corta y debilidad paralítica.—*Sudor abundante*, fácilmente *provoca-*

Digitized by Google

do por el menor movimiento, y durante el sueño. —Sudor nocturno de un olor fuerte.—Sudor frio con ansiedad durante los calambres.—°Sudor colicuativo y viscoso.—°Sudor por la mañana, á consecuencia de los dolores de cabeza.

Moral.—*Ansiedad con latidos en el epigastrio.*—Humor querelloso, áspero, disputador, y arrebatado.—Sin dias fijos alegría que alterna con tristeza.

Cabeza.—Aturdimiento y pesadez de la cabeza.—Vértigo que hace caer hácia adelante, como por el movimiento de un carruaje, *sobre todo en bajándose, moviéndose, etc.—Aturdimiento y vértigo rotatorio mirando una corriente de agua.—*Dolor presivo en la cabeza, sobre todo al aire frio.—Atontamiento doloroso de la cabeza, por cima de la raiz de la nariz, sobre todo por la tarde. —Tirones desde la nuca hasta la cabeza, en la que se sienten punzadas y zumbidos.—**Dolores de cabeza periódicos, como si martillaran, y pulsativos,* ¯que obligan á echarse; °cada dos ó tres semanas.—*Congestion á la cabeza.—Dolor en la piel del cráneo,* como si estuviese excoriado.—Plica.

Ojos.—*Ojos turbios, empañados y lagrimosos,* sobre todo despues de una ligera fatiga (escribiendo).—*Ojos rojos con dolor quemante.*—Hinchazon y rubicundez de los párpados con orzuelo.

Oidos y nariz.—Zumbido en los oidos, que se alivia apoyando la cabeza sobre la mesa.—*Epistaxis,* principalmente por una sola ventanilla nasal y por la tarde.—Acumulacion contínua de coágulos de sangre en la nariz.

Cara y garganta.—**Dolor del rostro térreo* ó **pálido, macilento,* con ojos hundidos.—**Cara de un color rojo como de fuego.*—Manchas amarillas ó azuladas en la cara.—Manchas rojas pequeñas sobre la mejilla, que está pálida.—Abotagamiento de la cara alrededor de los ojos. —*Labios pálidos.—*Dolores presivos en la garganta,* al tragar.—*Esputos de sangre.*

Apetito.—Gusto de un sabor dulce soso como de sangre. —*Gusto amargo de los alimentos.—Falta de apetito, sobre todo por la mañana, alternando con bulimia.—Disgusto á la carne y los ácidos.—La carne pesa sobre el estómago.—Sed inextinguible, ó falta de sed.—Los alimentos sólidos parecen demasiado secos.—Despues de

Digitized by Google

cada comida, erutos y regurgitacion de los alimentos, aun de los que se han comido con buen apetito.—Vómitos despues de haber tomado ácidos.—*Despues de comer* ó beber cualquiera cosa, *presion en el estómago y en el vientre*.—La cerveza atonta la cabeza ó hace vomitar.

Estómago.—Náuseas con gana de vomitar durante la comida.—**Vómito de los alimentos*, sobre todo *por la noche*, ó inmediatamente despues de la comida, aun no habiendo comido mas que huevos frescos.—Vómitos ágrios y erutos ácidos.—Erutos amargos despues de haber comido sustancias grasientas.—**Presion en el estómago*, sobre todo despues de haber comido carne.—Dolor calambroídeo en el estómago.—*Calambres presivos en el estómago* siempre que se ha bebido ó comido.

Vientre.—Meteorismo y dureza en el vientre.—Dolores calambroídeos en el vientre y en el dorso.—Calambres en los músculos abdominales, como si el vientre estuviera contraido, sobre todo haciendo esfuerzos ó bajándose.—*Cólicos* flatulentos *por la noche*.—Pesadez dolorosa en el bajo vientre al andar.

Deposiciones.—**Diarreas* °*acuosas* y corrosivas, algunas veces acompañadas de dolores calambroídeos en el vientre, el dorso y el ano.—°*Lienteria*.—Deposiciones mucosas.—**Ascárides en el recto*.—Hemorróides secas y *fluentes*.

Partes genitales.—Exaltacion del apetito venéreo con erecciones y poluciones frecuentes.—Evacuacion de mucosidades por la uretra.—**Metrorragias*, °*con* mucha excitacion del sistema sanguíneo, y dolores como los del parto.—Rostro excesivamente encendido y flujo abundante de una sangre, unas veces líquida, otras negra y coagulada, acompañada de dolores como los del parto en los riñones y en el vientre.—Reglas débiles y de una sangre pálida.—Supresion de las reglas.—Durante el cóito, escozor y dolor de excoriacion en la vagina con falta de placer.—Antes de las reglas dolores lancinantes en la cabeza, con retintin en los oidos.—**Aborto*.—Leucorrea lechosa y corrosiva.—Esterilidad.

Laringe.—Ronquera y aspereza en la garganta.—Cosquilleo en la tráquea-arteria, que excita considerablemente la tos.—Tos solamente moviéndose y andando.—*Expectoracion purulenta causada por la tos.—*Tos espasmódica*, sobre todo por la mañana, con expectoracion de muco-

Digitized by Google

sidades tenaces y transparentes, *que cesan inmediatamente despues de la comida*; ó *°tos espasmódica, seca, que empieza despues de la comida, con vómito de los alimentos.*—Expectoracion fétida, verdosa, con estrías de sangre.—*Tos con expectoracion de sangre, sobre todo por la noche, ó por la mañana.—°Tos despues de la comida, con vómito de los alimentos.—Al toser, dolores en el occipucio, ó punzadas y dolor de contusion en el pecho.

Pecho.—*Dificultad de la respiracion*, con levantamiento casi imperceptible del pecho, y considerable dilatacion de las ventanillas nasales en la espiracion.—**Dificultad de la respiracion*, sobre todo por la tarde ó por la noche, como procedente del epigastrio, agravándose durante el reposo y aliviándose por las ocupaciones intelectuales ó físicas.—Accesos de sofocacion por la noche en la cama con dolores quemantes en la garganta y en la parte superior del cuerpo, y frio en los miembros.—**Opresion constrictiva del pecho.*—Calambres constrictivos en el pecho agravados por la marcha ó el movimiento.—Lancinacion tensiva en el pecho y hasta en los omóplatos.—Congestion en el pecho.—Palpitaciones de corazon.

Tronco.—*Dolores de dislaceracion entre los omóplatos, por la noche.*—Punzadas en los omóplatos, en moviendo los brazos.—Rigidez de los músculos del cuello, con dolor durante el movimiento.—Hinchazon de las glándulas del cuello.

Brazos.—**Punzadas y dolores de dislaceracion* en la articulacion de la espalda y en el brazo, ó tirones, debilidad paralítica y *pesadez*.—Inquietud en los brazos.—Hinchazon y descamacion de la piel de las manos.—Calambres y torpeza en los dedos.

Piernas.—*Dolores de dislaceracion con punzadas violentas*, desde la articulacion coxo-femoral hasta la tibia, agravados por la noche en la cama y con el reposo.—Dolor paralítico y torpeza en los muslos.—*Debilidad en las rodillas, hasta el punto de doblarse, con inquietud en esta parte.—Várices en las piernas.—*Rigidez, *traccion y pesadez en las piernas.*—Hinchazon de las rodillas y de las articulaciones de los piés.—*Hinchazon de los piés con dolor tractivo, sobre todo al empezar á andar.—Calambres en las pantorrillas, las plantas de los piés y los dedos.

Digitized by Google

89.—FERRUM MURIATICUM.

FERR-MUR.—Muriato ó hidroclorato de hierro.—BOENNINGHAUSEN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—Poco conocido

SINTOMAS.—*En los miembros*, algunas veces, espasmos súbitos; torcedura de los miembros; dolores dislacerantes paralíticos desde la articulácion de la espalda hasta la parte superior del brazo y de la clavícula, con imposibilidad de levantar los brazos, y se disipan por un movimiento suave.—Calambres en las pantorrillas, durante el reposo, sobre todo por la noche.—*Calor* seco, con tendencia á destaparse; olor fuerte del sudor nocturno; sudor frio en la cara, durante los calambres de los músculos.—Dolores en el occipucio al toser.—En la *nariz*, existe constantemente sangre coagulada.—*Cara* pálida, con manchas rojas en las mejillas, las que tambien están pálidas.—Los alimentos sólidos parecen ser secos é insulsos.—Falta de *apetito*, sobre todo por la mañana; horror á la carne y á los alimentos ácidos.—*Sed* inextinguible, ó bien adipsia.—*Eructos*, con gusto ácido, amargo, despues de tomar alimentos sólidos; *vómitos*, despues de haber comido huevos.—*Dolores de vientre*, calambres en los músculos, como si el vientre estuviera retraido, sobre todo por una fatiga producida al bajarse, despues de la cual no se puede levantar sino muy lentamente.—Durante el *cóito*, dolor de excoriacíon y escozor en la vagina, con ó sin sensacion voluptuosa.—*Respiracion* fuerte, como durante el sueño, estando sentado y tranquilo.—*Tos* espasmódica, por la mañana con expectoracion de mucosidades viscosas, transparentes y que cesan inmediatamente, despues de haber comido; al toser dolor como de quebrantamiento ó bien punzadas en el pecho.

Digitized by

90.—FLUORIS ACIDUM.

FLUOR-AC. — Acido fluórico ó fluorhídrico.—Dr. Hering. — *Hist. nat. y prep* Farmac. homeop.—*Dósis usada:* 15 á 30.

Compárese con: Ambr. baryt. ca'c. coni. *nitr-ac.* op. *phosph.* rhus. *silic.* — Conviene este medicamento á veces y con particularidad despues de: *Ca'c. silic.*, sobre todo en las enfermedades de los huesos; así como el *nitr-ac*, en las afecciones sifilíticas por abuso del mercurio.—El *fluor-ac.* conviene muchas veces despues de estos medicamentos, y en las mismas circunstancias.

Antídoto: Nitr-ac.?

GENERALIDADES.—Sensacion como si descoyuntasen ó separasen los miembros del cuerpo, en las articulaciones de la cadera y de los omóplatos.—Dolores con estremecimiento en diversas partes.—Dolores violentos, quemantes, pulsativos ó terebrantes, en general de corta duracion.—Dolores vagos, ligeros, como si fuera á manifestarse comezon en la parte izquierda del cuerpo.—Presion y dolores paralíticos, sobre todo en las manos, los brazos y los piés.—Diversos dolores en los huesos del antebrazo y de los muslos.—Mucha disposicion á mover constantemente todo el cuerpo, muestra su mal humor en el rostro y los movimientos.—Las manos, los dedos, los pulgares de los piés, las mandíbulas, los labios, las cejas, los párpados y los músculos de la cara están constantemente en movimiento.—*Aumento de la actividad muscular*, sin fatiga; aun andando doble de lo que apenas podia anteriormente, no se fatiga nada, no obstante el calor ó el frio (efecto curativo?).—El andar fatiga, con dificultad de levantar las piernas, que parecen muy pesadas.—Súbitamente excesiva fatiga, sobre todo por la tarde.—*Mucha laxitud*, á veces con náuseas y erutos.—Pesadez paralítica de todo el cuerpo.—El mayor número de síntomas aparecen en la habitacion ó mientras se está leyendo ó escribiendo.—Varios síntomas son mas fuertes durante el reposo, algunos aun son peores estando en pié, *pero menos fuertes que estando sentado.*—En seguida que se levanta, todos los síntomas aparecen de nuevo.—*Mejoria de los síntomas por el movimiento y la marcha.*—El movimiento no agrava mas que la pesadez de cabeza, el dolor de la cadera, del pecho, la diarrea; el andar no

Digitized by

agrava mas que los padecimientos gástricos, el prurito, el calor, el sudor, los dolores en la articulacion del pié. —El mayor número de síntomas parece manifestarse á la *derecha* en la *parte superior del cuerpo*, y á la *izquierda* en la *parte inferior*.—El uso del café no parece contrariar la accion de las atenuaciones altas, mas sí parece agravar los síntomas nerviosos, así como el vino es contra el calor y las congestiones sanguíneas.—°*Padecimientos sifilíticos* y mercuriales crónicos.

Piel.—La aplicacion exterior de este medicamento destruye la piel, se desarrolla un dolor violento, los alrededores de la parte afecta se vuelven blancos y dolorosos, forman una ampolla espesa que se llena de pus.—Pústulas despues, á la mas ligera aplicacion sobre la piel.—*Dolores quemantes circunscritos en varios puntos de la piel* (despues del uso interno).—Prurito en la cabeza, en las cejas, los párpados y la cara; el prurito se manifiesta, sobre todo en la parte posterior del cuerpo, en particular en el dorso, y se agrava hácia la tarde, ó aparece al principio de la noche y la mañana.—*En el mayor número de casos el prurito es con picoteo y hormigueo, circunscrito á puntos reducidos, obligando imperiosamente á rascarse, y seguido á veces de pequeños granos reunidos en grupos.*—Pequeños grupos de puntos rojos, precisando á rascarse por la noche, como si un herpe quisiera formarse.—*Las antiguas cicatrices vuelven á hacerse pruritosas y rojas en los bordes*, y se cubren de pequeñas vesículas. —Manchas rojas, elevadas, por encima de las cejas.—Granos, sobre todo en los muslos y en las piernas, los que se cubren de costras seguidas de descamacion. —*Varios y pequeños telangiectasis* en forma de vesículas muy pequeñas, sanguinolentas, como granos pequeños desde el grueso de uno de mijo hasta el de uno de linaza.—°*Hinchazones varicosas rebeldes.*—°*Herpes secos, pruritosos, quemantes.*—°*Ulcera cariosa.*—°Ulceras mercuriales.

Sueño.—*Deseo continuo de dormir*, sobre todo por la mañana y particularmente antes de medio dia.—*Por la tarde temprano gana de dormir*, y casi constantemente *seguido de un sueño prolongado por la noche.*—*Insomnio toda la noche*, seguido á veces, *hácia la mañana, de un corto sueño completamente reparador.*—*Sueño profundo y largo toda la mañana*, con estornudos al despertar.—*Muchos ensueños.*

Digitized by

principalmente *de muertos* ó de cosas horrorosas; los ensueños son algunas veces tan manifiestos que las cosas parecen ser reales, pero que se olvidan pronto.—*Frecuentemente los ensueños no tienen lugar mas que hácia la mañana ó despues de media noche.*—Ronquido y gritos durante el sueño.—*Por la mañana al despertar cree hallarse mejor, aun cuando haya dormido poco.*

Fiebre.—*Calofrios en varios puntos.—Calorificacion del cuerpo aumentada*; siente un frio agradable, y se siente con mas calor despues de haber tenido frio, y ya no se resfria, por la noche, aunque deje la ventana abierta.—Las lociones frias son muy agradables y producen la sensacion de un bienestar excesivo.—*Dolor general con náuseas.* —°Soportan con mucha facilidad el calor del estío.—Sudor y sensacion de calor mas marcado del lado izquierdo que del derecho.—*Sudor abundante, ácido y de un olor desagradable.—Por la tarde sudor viscoso*, desagradable y muy abundante (andando), ó bien con prurito.—Sudor á consecuencia de pensamientos tristes.

Moral.—°*Disposicion á pensamientos que causan inquietud.* —Por la tarde muy descontento, lo ve todo en negro, á la mañana siguiente muy despierto y dispuesto á chancearse.—*Mal humor*, mucha disposicion á encolerizarse, pensando únicamente en lo que puede suceder; se aburre de sí mismo hasta perder toda su serenidad.—Mucha disposicion, estando solo, á toda especie de pensamientos imaginarios, que tienen un carácter *marcado de aversion contra las personas que ve con mas frecuencia.*—°*Humor insoportable en una señora de bastante edad, paralítica*, que riñe con sus parientes, y despide á su indispensable enfermera y atormenta á toda su familia.—Incomodidad contra determinadas personas, hasta el ódio, cesando en seguida que estas se presentan.—Indiferencia y disgusto por sus quehaceres.—*Satisfaccion, alegria*; *todo place, todo parece agradable* los primeros dias.—Los dias siguientes de tomar el medicamento, *carácter mas terco* y menos disposicion que los primeros dias á hablar y andar paseando sin objeto.—Durante muchos padecimientos, sensacion como si estuviera en un peligro, ó lo fuese á suceder alguna cosa horrible.—Por la mañana sensacion como si se hubiera envejecido rápidamente, con necesidad de mirarse al es-

Digitized by Google

pejo.—Dificultad de hallar el órden de sus ideas, cuando ha sido interrumpido en sus pensamientos.—Inteligencia difícil para las cosas filosóficas, pero perfectamente buena para las prácticas.—Mucha propension á olvidar las cosas.—Memoria mas lúcida por la mañana.

Cabeza.—Frecuentemente, *sensacion de vacilacion*, en la cabeza, desde luego estando sentado, así como á cada movimiento corto y rápido.—Vértigos con náuseas.—*Congestion dolorosa á la cabeza*, despues de estar en pié, al comenzar á andar, ó bien con pérdida del conocimiento y sensacion como si subiera un golpe de sangre.—*Turbacion de cabeza*, principalmente por la *mañana* hasta desayunarse, y sobre todo *del lado derecho de la cabeza*, ó del occipucio.—Pesadez de la cabeza, con dolor sordo y profundo en medio de la frente.—Cefalalgia presiva de dentro afuera, como si la cabeza estuviera muy pesada, precedida de salivacion que disminuye al momento que empieza el dolor de cabeza.—Pesadez encima de los ojos, con náuseas, y mas fuerte durante el movimiento.—*Dolores presivos en la cabeza*, á veces subiendo de la nuca, ó como dentro de los huesos de la frente, *pero sobre todo en las sienes ó en los lados del occipucio*.—Presion en las sienes de dentro afuera.—Presion en el cerebro hácia arriba.—Por la mañana sensacion como si hubiera un cuerpo extraño en el hueso parietal izquierdo.—Por la tarde, despues de haber hablado mucho, calor en la cara y apretamiento presivo profundo en el interior del lado izquierdo de la cabeza, seguido de odontalgia en la mandíbula superior izquierda, con sensacion como si se serraran los dientes, y sobre todo en los puntos donde han arrancado alguno.—*Dolores de cabeza que pasan rápidamente de un punto á otro*, con sensacion de un peligro inminente.—Cefalalgia con náuseas y vértigos.—Especie de debilidad indescriptible, sobre todo en la cabeza y en las manos, con malestar en el estómago.—Prurito en la cabeza, que obliga á rascarse.—Los cabellos se pegan fácilmente.—°Caida de los cabellos.—°Cáries de la apófisis petrosa de los huesos temporales.

Ojos.—Manchas rojas elevadas encima de las cejas.—Descamacion y sensacion de picoteo en las cejas.—Prurito en los ojos, en los ángulos y en los párpados, que obli-

Digitized by Google

gan á frotarse.—Flujo por los ojos; lagrimeo.—Dolores y presion, sobre todo en el ojo derecho.—Sensacion como si abrieran los párpados por fuerza, y se sintiera en ellos un aire fresco.—*Vista mas clara y mas fuerte*; los caractéres pequeños se leen con mas facilidad que otras veces.—Un extenso círculo luminoso delante de los ojos, al cerrarlos.—Al principio de la noche en la cama, chispas que cruzan delante de los ojos.—Los anteojos se hacen insoportables, sobre todo durante los accesos de coriza, aunque la vista se ponga á distancia mas corta.—°*Fistula lagrimal* en el ojo izquierdo, como si se moviera en su interior un cuerpo puntiagudo, con costras largas y blancas en la fístula, humedad y prurito periódico.

Oidos.—Dolores que suben por detrás de la oreja derecha, hasta la cabeza, con dolor en el talon.—*Dolor y presion en el oido derecho*.—Por la mañana, la susceptibilidad del oido es mas fuerte.

Nariz.—Granos purulentos, lisos, con bordes rojos, en el ala izquierda de la nariz, con la desaparicion de una excoriacion dolorosa crónica de la ventanilla nasal derecha.—Pequeños granos entre la raiz de la nariz y el ojo.—°Granos con una aureola ancha é inflamada en el dorso de la nariz.—*Estornudos frecuentes*, por la mañana con acumulacion de saliva en la boca y algunas mucosidades serosas en la nariz.—Por la mañana, en enjuagándose la boca, acumulacion pronta de mucosidades en la nariz.—*Frecuentemente accesos de coriza que vienen súbitamente y desaparecen lo mismo.—Despues de haber tomado cerveza por la tarde (ó vino tinto), coriza súbito al dia siguiente por la mañana, con evacuacion violenta.*

Cara.—Aspereza en la frente, en forma de una línea convexa.—*Calor en la cara*, sobre todo por la tarde despues de haber hablado mucho, ó bien despues de haber bebido vino.—*Mucho deseo de lavarse la cara con agua fria.*—Calor en la frente ó debajo de los ojos.—Prurito como de picoteo en el lado derecho de la cara.—Los músculos de la cara en contínuo movimiento.—*Dolores en los huesos faciales*, bien espasmódicos, bien quemantes, ó como si se moviera un cuerpo puntiagudo.—°Dolor desde el ojo derecho extendiéndose hasta delante de la mandíbula superior.—°*Erupciones* herpéticas y costras en la cara en los niños de dos años; pequeños granos que re-

Digitized by Google

sudan, sobre un fondo rojo con prurito tan fuerte que obliga á rascarse.—°*Costra láctea*, con erupcion en la cabeza.— *Sensacion como de estorbo calambroideo en las mandíbulas*, y en la derecha con calor.— Sensacion como si royeran en los huesos de la mandíbula inferior.

Dientes.—*Sensacion de calor en los dientes*, sobre todo en los dientes caninos é incisivos.—Embotamiento de los dientes.— Dolor de dientes en la mandíbula del lado izquierdo.— Dientes de tal modo doloridos que la masticacion se hace imposible.— El aire frio entrando en la boca, se fija dolorosamente en los dientes cariados.—El dolor de muelas del lado derecho pasa rápidamente al muslo izquierdo.— °*Fistula dentaria* en un diente canino superior derecho.— Los dientes incisivos parecen estar aguzados, como picados, hasta el punto de hacer daño en la lengua cuando se los toca.— Gusto ácre, pútrido, en la raiz vieja de un diente incisivo superior.—°Los dientes cariados parece segregan menos que antes, como igualmente las encías sangran menos.

Boca y garganta.— Gusto parecido á tinta, y que parece provenir de un diente.—Sensacion de ardor y como de excoriacion en la boca y en los labios.— *Acumulacion de saliva en la boca*, por la noche, con diarrea, ó bien durante los estornudos; salivacion seguida de cefalalgia.— Sensacion de picoteo en la lengua, con salivacion y escozor en el paladar.—°*Pequeña úlcera* dolorosa en la boca, en los ángulos que forman las mandíbulas, y muy sensible masticando.— Sequedad en el paladar, al lado izquierdo.— Sensacion como si la region de las fosas nasales estuvieran muy abiertas, durante el paseo al aire libre.—Sensacion como si á la entrada de la faringe, hácia el lado izquierdo, hubiera un punto excoriado, ó quisiera formarse una úlcera.—Sensacion de calor en la garganta. — *Constriccion de la garganta*, con borborigmos, presion y sensacion de ardor en el estómago, erutos y vomituricion.— Sensacion de picazon en la laringe obligando á hacer el movimiento de la deglucion y á hacer mucho ruido.—Irritacion de garganta con dolor de excoriacion y *deglucion difícil hasta el punto de no ser posible tragar el pan sin grandes dolores*; las mucosidades desprendidas con un ruido estrepitoso contienen un poco de sangre.

Digitized by

Gusto y apetito.— Gusto en la boca como de tinta, que parece proviene de un diente.—Gusto ácre, pútrido, que tiene su origen en la raiz de un diente.— Gusto salado en la boca, por la mañana al despertar.— Gusto ácido y *sensacion como de grasa en la boca.*— Gusto que queda en la garganta despues de tragar los alimentos.— *Pronta saciedad en comiendo*; ó comiendo menos que otras veces; los alimentos gustan más; despues, apetito mas pronunciado por la tarde que al medio dia.—Apetito aumentado, hambre muy pronunciada y mucha voracidad.— Deseo de cosas picantes.—Menos gusto por el vino que por otras cosas.— Durante el aumento de apetito, necesidad de contraer los músculos abdominales. —Repugnancia al café, despues de haber experimentado lo contrario los primeros dias.

Estómago.— *Erutos ácidos frecuentes,* á veces con pirosis. y necesidad de arrojar mucha ventosidad.— *Erutos de aire frecuentes,* á veces con dolor de corazon.— Erutos de un gusto soso y nauseabundo, con gana de vomitar —Presion, constriccion, plenitud, calor y sensacion de ardor en el estómago.—En el intervalo de las comidas, presion, como por una indigestion.— Ruido como de agua en el estómago.

Vientre.— °*Dolores en el lado izquierdo del vientre como en el bazo,* presivos ó punzantes.— Estremecimientos en el lado izquierdo del vientre.— *Dolores de vientre inmediatamente despues de haber comido* (peces en vinagre, melon ó arenques).— Dolores de vientre con borborigmos, y dolores vagos.— Latidos como los del pulso, al tocar el pecho y vientre.— Sensacion de desfallecimiento, como de vacío en la region umbilical, con necesidad de respirar profundamente, y mejorado en apretando el vientre.— *Muchos borborigmos y frecuente emision de gases.—Ventosidades muy fétidas.*

Deposiciones.— *Deposiciones diarréicas*, por la mañana, despues de tomar el café y á la entrada de la noche, con tenesmo y salida del recto, en un hombre afectado de padecimientos hemorroidales.—°Diarrea de estío.—Diarrea nocturna, con acumulacion de saliva en la boca, dolores en el estómago, y sensacion como si se acumularan gases en el vientre.— *Deposiciones abundantes en forma de papilla*, algunas veces con pellizcos; las depo-

Digitized by

siciones diarréicas se suceden cada dos dias; despues se van retrasando dos horas cada mañana hasta llegar al medio dia.—Sensacion como si los gases no pudiesen ser expelidos.—*Antes de las deposiciones, muchas ventosidades muy fétidas.*—Congestion al ano despues de haber bebido vino.—Prurito hemorroidal en el ano.

Orinas.—Dolores en la region vesical y las ingles.—Antes y despues de la emision de las orinas, dolor en la vejiga ó en el cuello; la vejiga está tambien dolorosa á la presion.—Secrecion de la orina, disminuida los primeros dias; aumentada los dias siguientes.—*Emision fácil de orinas claras, sin aumentarse mas de lo ordinario, y despues con sensacion de bienestar.—Olor penetrante, ácre de las orinas.*—Olor agradable de las orinas, con sedimento de un rojo púrpura.

Partes genitales.—Sensacion de congestion hácia los cordones espermáticos.—Punzadas y estirones del testículo derecho hácia el anillo inguinal.—*Apetito venéreo disminuido, sin impotencia*, los primeros dias, ó bien *deseo violento del cóito, con erecciones sobre todo por la noche durante el sueño.*—Eyaculacion menos pronta que otras veces, y muy abundante, sin incomodidad despues.

Reglas.—Reglas muy anticipadas, mas abundantes que otras veces, con flujo de una sangre espesa y coagulada. —*Leucorrea* amarillenta, corrosiva, con excoriacion y sensacion de ardor en las partes.—°*Metrorragia crónica con padecimientos asmáticos.*

Laringe.—Sensibilidad en la laringe con dolor de excoriacion en tosiendo y expectorando fuerte.—Excoriacion en la garganta hasta dentro de la laringe.—Dolor en la laringe, como si estuviese un cartílago excitando la deglucion.—Ruido estrepitoso de mucosidades sanguinolentas.

Pecho.—Dolores en el costado izquierdo al respirar.—*Necesidad de respirar profundamente*, á veces con sensacion de plenitud en el pecho.—Opresion en el pecho, como si estuviese muy estrecho en su parte anterior.—Dificultad de la respiracion como si hubiese un obstáculo en la parte superior del pecho y en el hoyuelo del cuello.—Silbido al respirar, con necesidad de respirar profundamente.—°*Hidrotorax*, los padecimientos están bastante aliviados.—Inquietud, dolor de excoriacion y

Digitized by

estremecimiento en el *corazon*.— Presion en el pecho; punzadas en el lado izquierdo; dolor en el lado izquierdo, hasta las ingles, aumentado en respirando profundamente.— Prurito en el pecho, obligando á rascarse hasta hacerse sangre.— Rubicundez é hinchazon de un pezon, precedido de prurito.

Tronco.—Prurito en el cuello y pecho, obligando á rascarse con violencia, por la tarde en saliendo.— Dolor tractivo del lado derecho de la nuca y del cuello.—Rigidez de la nuca.— Calambres en los músculos del cuello. — Calor, como de un aire caliente, en la nuca subiendo hácia el occipucio, ó dirigiéndose hácia el hombro.— Calor en medio del dorso esparciéndose hasta los lomos. — Por la noche dolor profundo en lo interior de la region lumbar izquierda.— Dolor dorsal, profundo en el interior, debajo de la punta de los omóplatos, y mas pronunciado estando sentado y sobre todo yendo en carruaje.— Dolor dorsal, como en la region renal.— Prurito y pequeños granos en el dorso y en los hombros.— Sacudimiento y estremecimientos en el sacro.

Extremidades superiores.—Prurito y granos en las espaldas.—*Dolores osteócopos en los brazos*, pasando del brazo derecho al izquierdo.— Presion en los brazos.— Dolores en las articulaciones del codo.— Sacudimientos dolorosos, eléctricos en los dedos.—Dolor reumático en los huesos del brazo derecho, con parálisis.—Entorpecimiento paralítico del brazo derecho, por la tarde apoyándose sobre él, con sensacion de picoteo.—*Por la mañana al despertar, el brazo derecho pesado, y como adormecido*, ó bien como contuso y helado.— *Adormecimiento de la mano y el brazo izquierdo, hácia la mañana con estremecimiento y debilidad paralítica*, todos los dias hasta medio dia.— *Falta de fuerza, debilidad, torpeza y sensacion paralítica en las manos*.—Dolor en las articulaciones de la mano derecha y los dedos.— *Las manos están muy encendidas en la parte interior*, como jaspeadas, con sensacion de calor y de plenitud. —°*Sudor continuo en la palma de las manos*.— Prurito y pepueñas vesículas sarnosas, en el índice derecho. —Dolores osteócopos, sensacion de luxacion, de picoteo y palpitaciones, como despues de una contusion, en los dedos.— Comezon en la punta de los dedos.—Dolor que parece salir de debajo de la uña del

Digitized by

dedo pulgar.—Sensacion de ardor reiterado en la punta del dedo pequeño.—Sensacion como si un cabello estuviera colocado á lo largo del dorso del dedo pequeño.—Dolor de excoriacion en las verrugas de la mano izquierda.—Las uñas parecen crecer mas rápidamente.—°*Piel de las manos*, quebradiza, seca, resquebrajada, sobre todo despues de haberse lavado, punta de los dedos como huecas, uñas quebradizas y dobladas hácia adentro en los rincones.

Extremidades inferiores.—Picazon en los huesos de la cadera derecha, extendiéndose por encima de las nalgas.—Dolor en la cabeza del femur izquierdo.—Dolor en el nervio ciático derecho.—Dolor y sensacion de contusion en la cadera izquierda, sobre todo en subiendo á la cama, ó en levantándose.—A lo largo del muslo desde la cadera ó bien desde la region vesical, dolor quemante, pasando como un relámpago en el nervio.—Muslos como magullados.—*Dolores en las rodillas*, sobre todo por la tarde.—*Dolores tractivos en las piernas*, *particularmente* en la izquierda.—*Fácil adormecimiento de las piernas*, sobre todo en el lado izquierdo.—Dolor tractivo del empeine del pié derecho, por la tarde paseando, seguido de debilidad paralítica en la articulacion del pié y de la rodilla.—*Dolor paralítico como una luxacion en las articulaciones de los piés.*—Calor y sensacion de ardor en la planta del pié derecho.—Sensacion de ardor en los dedos pulgares, impidiendo casi el andar.—Endolorimiento en los callos de los piés.—*Ulceras* en las piernas alrededor de los maléolos.

91.—GELSEMINUM SEMPERVIRENS.

GELS.—Gelsemina.—Véase HALE, *Remedios americanos*.

Usado hasta ahora con feliz éxito contra: *Eclampsias* y *convulsiones epileptiformes* de las mujeres y de los niños, con violento espasmo de la glotis.—*Epilepsia*, con embarazo en el vértice de la cabeza y sensacion de plenitud en la region de la médula oblongada.—*Parálisis*, sin pérdida de la sensibilidad; parálisis de los órganos de la deglucion

Digitized by Google

y afonía á consecuencia de la difteritis.—*Fiebres intermitentes*, con dolores presivos y lancinantes, que atraviesan las sienes y las narices, con ojos centellantes y locuacidad.—*Congestiones cerebrales*, durante la denticion.—*Meningitis cérebro-espinal*, con pérdida completa de la vista, de la palabra y del movimiento; pulso y respiracion débiles, náuseas y vómitos.—*Coriza* á cada cambio de temperatura, con dolor de garganta en la parte superior de la laringe; dolor al tragar, hasta en el oido; disnea.—*Prosopalgia*, con palpitaciones y contracciones musculares alrededor de las partes afectadas; grande nervosidad y pérdida de las voliciones sobre los movimientos voluntarios.—*Difteritis*, con gemido, parálisis ó anestesias parciales, y vista anómala, que hace aparecer los objetos ó mas distantes, ó dobles ó al revés.—*Espasmo de la glotis*, con voz crupal, inspiraciones lentas y espiraciones súbitas y violentas.—*Gastralgia* con sensacion de peso ó tirantez; epigastrio como vacío y hambre falsa.—*Ictericia* con grande postracion y cámaras como de arcilla ó crema.—*Diarrea* despues de cada emocion moral.—*Espermatorrea* con cara pálida, ojos hundidos, abatimiento, andar pesado y vacilante, y fácil excitacion del apetito sexual.—*Leucorrea*, con estilicidio blanco, sensacion de plenitud en el epigastrio y dolor en el sacro.—*Menorragia*, con estilicidio contínuo de sangre sin dolor.

92.—GINSENG.

GINS.—Ginseng.—*Bib'ioteca homeopática de Ginebra*, t. VIII, p. 150.—*Historia natural y prep.* Vease Farm. hom.

A pesar de que el doctor Jahr no inserta en su octava edicion la *patogenesia* de esta sustancia, como ha venido haciendo en todas sus anteriores, inclusa la séptima, fundado en que la planta de este nombre no está bien determinada; nosotros hemos creido conveniente hacerlo como está en la traduccion española, cuya tercera edicion es esta.

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—Laxitud dolorosa en las extremidades superiores é inferiores; frio, temblor y adormecimiento de las manos, con los dedos como muertos, y tendencia á manifestarse los síntomas, sobre todo en el lado derecho.—*En el cuello* y en el pecho granos pruritosos; prurito en el dorso del pié derecho.—Mucha gana de dormir; sueño profundo, tranquilo y prolongado hasta la mañana; tarda en despertar, ó bien despierta con espanto sobresaltado.—Como si hubiera *fiebre*, malestar con deseo de dormir, calofrio interior, con calor exterior, hormigueo en los dedos, bostezos y pandiculaciones, calofrios con temblor, sed, sequedad de la boca, tirones en el estómago y debilidad de las piernas, como despues de una grave enfermedad; excesiva sensibilidad al frio y disposicion á entumecerse; despues del paseo imposibilidad de entrar en calor; *pulso* normal.—Hay tranquilidad generalmente en la parte *moral*, sin embargo con disposicion á la impaciencia; se temen trastornos y necesidad momentánea de llorar, abrigando temores para el porvenir.

Cabeza.—Vértigo, oscurecimiento; atontamiento y pesadez de cabeza; dificultad de reflexionar; debilidad de la memoria.—Sensibilidad dolorosa de la cabeza: cefalalgia semilateral, punzadas desde el lado derecho de la frente hasta la órbita, con pesadez de los párpados, tendencia irresistible al sueño, calor en la cabeza y pesadez en las sienes; sacudidas súbitas en el occipucio, seguidas de dolor de contusion.

Ojos.—Presion en los ojos que obliga á frotarlos, oclusion de los párpados superiores, sobre todo el derecho; grande dificultad de abrir los párpados con pesadez y dolor en ellos; prurito en los párpados.—Fatiga en los ojos á la claridad, y mirando fijamente se ven los objetos dobles; confusion de los caractéres al leer.

Cara.—Alternativamente encendida y pálida.—*Rubicundez eritematosa* quemante en la mejilla derecha, en las alas de la nariz y en la barba; *erupcion miliar* con hormigueo, prurito y calor á causa de las excoriaciones en las partes eritematosas, y á consecuencia de esto, herpes farináceos con descamacion á los 15 dias.—*Labios* rojos, secos, hendidos y que sangran fácilmente, sobre todo el labio inferior.

Digitized by Google

Síntomas gástricos.—*Lengua* roja, quemante con sed, despues blanca en el centro.—Apetito aumentado; erutos secos y algunas veces ágrios; náuseas y conato á vomitar, con erutos que alivian.

Estómago.—*Presion* en el estómago con timpanitis en esta parte, borborigmos en el vientre, tension y sensacion como de acúmulo de gases, emision de estos, malestar y bostezos.—*Tirones* dolorosos en el estómago, como por hambre, á consecuencia de calofrios con punzadas dolorosas en la region precordial, cólicos violentos que recorren el vientre, hinchazon del estómago y pulsacion, angustia, conato al vómito y dolor en el lado izquierdo hácia el corazon por calofrios que se extienden hasta el codo.—Dolor contractivo en el estómago, con angustia, dificultad de la respiracion, tirones en el estómago y punzadas en el lado derecho que cortan la respiracion.

Vientre.—*Dolor en el lado derecho del bajo vientre, hasta las ingles, con hormigueo doloroso hasta el pié* y el dedo pulgar de este, donde se sienten punzadas muy dolorosas.—Dolores *en el hipogastrio* con fuerte presion en las ingles, timpanitis, tension y presion en la parte inferior; cólicos en el bajo vientre de derecha á izquierda, ascendiendo hasta la region precordial con timpanitis aliviada por la emision de gases.—*Dolores cólicos* violentos desde la region coxo-femoral hasta el vientre que obligan á encogerse.—*Cólicos* que suben hasta el estómago con presion y dolor al tacto; *sensacion como si escarbaran*, dolorosa en el lado derecho del vientre hasta las ingles y estómago, con dolores cólicos en todo el bajo vientre, gana de vomitar y dolor de excoriacion en el lado derecho debajo de las costillas, agravado por la presion.—Dolores en el vientre como por una presion en círculo con sensacion como si escarbaran y estremecimientos en la cadera derecha; dolor en el lado derecho del hipogastrio, desde la cadera hasta las costillas, con fuertes dolores en la region precordial; *punzadas* en el lado derecho de la parte superior del vientre con imposibilidad de soportar los vestidos apretados, dolores en el vientre, borborigmos, emision de gases y punzadas como por cuchillos en la region estomacal.—*Timpanitis* dolorosa hasta debajo de las costillas derechas, con dolores en la region

Digitized by

del corazon y eructos que alivian, timpanitis dolorosa con quebrantamiento de los riñones, dolor de contusion en la region ilíaca, agravado á la presion, malestar general y dolores que recorren el vientre y pecho, presion en el estómago y dificultad de soportar los vestidos oprimidos en esta parte.

Deposiciones y orinas.—*Deposicion* difícil sin ser dura; deposicion dura con esfuerzos y seguida de ardor en el ano; tenesmo y punzadas en el recto; deposiciones líquidas por la tarde, precedidas de cólicos.—*Necesidad* frecuente de *orinar*, con sensacion de ardor, orina clara abundante; orina amarilla con sedimento lateritio; orina de un amarillo claro con sedimento rojizo; en la *uretra*, escozor, prurito y sensacion de ardor, con necesidad frecuente de orinar.

Partes viriles.—Mucha excitacion de las partes genitales; erecciones nocturnas sin poluciones; ensueños vivos, lascivos, de los que se conserva recuerdos siempre que se toma medicamento.

Pecho.—Presion y opresion en el pecho con gran dificultad de respirar; respiracion corta, angustiosa; opresion en el pecho con ansiedad y punzadas en la boca del estómago y en la region renal; decaimiento de fuerzas y laxitud de los miembros.

Dorso y extremidades superiores.—Entre los *omóplatos*, *punzadas* hasta el hombro derecho, ó bien á lo largo de la espina dorsal hasta el sacro, sobre todo al incorporarse, acompañadas de dificultad en la respiracion.—Pesadez en la *nuca* con dolor de quebrantamiento, todo lo largo del dorso y el sacro.—Contraccion de los dedos de la mano derecha y rigidez de sus articulaciones.

Extremidades inferiores.—Rigidez dolorosa del muslo izquierdo desde la *cadera* hasta la rodilla.—Pesadez de *las extremidades inferiores*, contraccion de los músculos de la *pierna* izquierda, con dolor de contusion en la articulacion coxo-femoral; dificultad de andar, hormigueo y rigidez desde el muslo hasta el pié, dolor en la rodilla y dolor incisivo y violento en la cadera derecha hasta el vientre, que obliga á doblarse sobre sí mismo.—*Dolor de quebrantamiento en los muslos y riñones* con mucha laxitud por la mañana al levantarse, con dolores reumáticos paralíticos en las extremidades inferiores.—Como si

Digitized by Google

escarbaran por la noche en la pierna derecha desde la cadera hasta *el dedo pulgar*, en el que se sienten violentas punzadas; punzadas violentas en el dedo pulgar del pié izquierdo que antes habia padecido una hinchazon artrítica; punzadas que alternan en los dedos pulgares; dolor calambroídeo hasta la punta de los dedos pulgares que empieza desde la cadera derecha; dolor de dislaceracion lancinante en la articulacion del pié derecho.

93.—GRANATUM.

GRAN.—Corteza de la raiz del granado.—*Biblioteca homeop. de Ginebra.* — *Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.— *Dósis usadas*: 0? 1? 30?
COMPÁRESE CON: Ars. chin. iod., etc.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Intoxicacion por el arsénico; Desfallecimiento, síncope y lipotimia; Supuracion de los órganos internos, sobre todo del hígado; Hinchazones inflamatorias; Heridas; Ulceras; Sabañones; Fiebres tercianas, gástricas, biliosas y tifoídeas; Oftalmía; Manchas de la córnea?; Lipitudo; Ulceracion en la oreja; Epistaxis; Reblandecimiento y hemorragia de las encías; Estomacace; Odontalgia; Vacilacion de los dientes; Ulceras de la boca; Angina serosa y catarral; Amigdalitis, con ulceracion; Disgusto y vómito de los alimentos; Gastralgia; Diarrea y disentería; Diarreas serosas; Cólera; Prolapsus del recto; Procidencias de la vagina y del útero; Leucorrea; Tos catarral; Ronquera; Pleuresía; Hemoptísis; Palpitaciones de corazon, etc., etc. (y todas las afecciones contra las cuales la antigua escuela ha recomendado este medicamento.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Mucha laxitud y fatiga, sobre todo en las piernas*, á veces con imposibilidad de estar en pié y necesidad de acostarse.—Laxitud soñolienta con dolor de cabeza como despues de haber pasado toda la

Digitized by Google

noche cometiendo excesos.—*Excesivo abatimiento y postracion*, á veces con calor ardiente en las manos.—Temblor de los miembros.—Relajacion y flacidez de los músculos, sobre todo en los miembros inferiores.—Demacracion.—Bostezos á veces convulsivos y pandiculaciones frecuentes.—Sueño agitado con *ensueños frecuentes*, *gritos* y agitacion.—Horripilaciones semilaterales y parciales, á veces con dolores de cabeza semilaterales.—*Calor seco*, *ardiente por todo el cuerpo*, con necesidad de descubrirse.—Las horripilaciones y los calofrios suceden ordinariamente por la mañana; el calor se manifiesta por la tarde.—Sudores al menor movimiento.—Gran sensibilidad y disposicion á afectarse.—Irritabilidad y arrogancia.—Humor brusco y querelloso.—Escrúpulos hipocondríacos.—Melancolía, humor sombrío, abatimiento y desaliento.—Estupor y aturdimiento intelectual.

Cabeza.—*Vértigos*, sobre todo durante un trabajo intelectual, ó por la mañana al levantarse, y á veces con oscurecimiento de la vista, ó con náuseas y dolores de estómago.—*Sensacion de vacio en la cabeza*.—Dolor estupefaciente y *pesadez dolorosa de la cabeza*, sobre todo en la frente.—Presion en la frente y en el occipucio.—Dolores tractivos agudos, principalmente en el lado derecho de la cabeza.—Punzadas en la frente.—Pústulas en la frente y en la sien, con dolor de excoriacion, dejando pequeños tubérculos cuando se secan.

Ojos.—**Oidos**.—**Nariz**.—Ojos ojerosos y cóncavos.—Prurito y escozor quemante en los ángulos de los ojos.—Sequedad y escozor en los ojos.—Color amarillo de la esclerótica.—Inflamacion de los ojos, como en la coriza.—Pupilas dilatadas.—Movimientos convulsivos de los párpados.—Oscurecimiento de la vista.—Vista débil.—Aprctamiento calambroídeo, *dolores tractivos agudos y punzadas en los oidos*.—Retintin y zumbido sordo en los oidos.—Calor ardiente y sequedad en las ventanillas nasales, ó acumulacion de un moco pegajoso.—*Prurito con hormigueo en la nariz*.—Coriza alternativamente seca y fluente.

Cara y dientes.—Color enfermizo, amarillento, y térreo.—*Calor ardiente en la cara*, á veces pasajero.—Prurito corrosivo en la cara y sobre todo en las mejillas.—

Digitized by Google

Hinchazon de la mejilla, con lividez, calor ardiente, prurito, tension y hormigueo como en los sabañones.—Dolores presivos y tractivos agudos en la cara, en los pómulos y en la raiz de la nariz, frecuentemente de un solo lado.—Sequedad y sensacion quemante en los labios.—Dolor tractivo agudo, tension y apretamiento en las articulaciones maxilares y crujido durante la masticacion.—Dolores lancinantes en los dientes, aun por la noche en la cama.—Los dientes parece que se han alargado.—Encías excoriadas y que sangran fácilmente.

Boca y garganta.—*Abundante acumulacion de saliva*, á veces de un sabor soso en la boca.—Lengua húmeda y blanca.—Abundante expectoracion de mucosidades.—Sensacion de astriccion en diversas partes de la boca y de la garganta.—Estrechez de la garganta.

Apetito.—Mucha variedad en el gusto; gusto alternativamente fino y entorpecido.—Apetito alternativamente disminuido y aumentado.—*Hambre extraordinaria y voracidad*, aun despues de comer.—Apetito variable; deseo de diversas cosas, y sobre todo de café, de frutas, de alimentos suculentos y de ácidos.—Sed con deseo de agua.—Los alimentos líquidos y las patatas causan náuseas y erutos.

Estómago.—*Erutos de aire, frecuentes y sonoros.—Náuseas frecuentes, á veces con laxitud, acúmulo de agua en la boca, dolor de vientre y de estómago, frecuente gana de deponer, sin resultado, despeluzamientos, mal semblante y mal humor.—Vómitos*, aun por la noche y á veces con laxitud, temblor, sudor ó vértigos.—Presion penosa, plenitud, sensacion de ardor y ansiedad en la region precordial.—Calambres de estómago, por la mañana en ayunas.

Vientre.—*Dolores de vientre frecuentes y muchas veces contínuos*, en algunos casos con náuseas, acúmulo de agua á la boca, despeluzamiento y decúbito, ó con vértigos.—*Dolores de vientre despues de cada comida*, ó por la mañana en ayunas.—Dolores de vientre aliviados por el calor exterior, y acostándose, así como bebiendo agua fria. Pellizcos, punzadas y rotacion alrededor del ombligo y en el estómago.—Ansiedad en el vientre.—*Meteorismo doloroso del abdómen*, á veces con hambre canina.—*Produccion y evacuacion frecuente de gases.*—Hinchazon del ombligo como por una hernia umbilical.—*Fermentacion en*

Digitized by

el vientre.—Traccion en el vientre como para deponer.—*Presion dolorosa é hinchazon en las ingles como si fuera á salir una hernia.*

Deposiciones.—Hace muchas deposiciones al dia.—Evacuaciones copiosas y de color muy oscuro.—*Diarreas con cámaras frecuentes*, y evacuacion de materias fecales y mucosas.—Antes de las deposiciones diarréicas, náuseas y fermentacion en el vientre; durante las deposiciones, calor ardiente en la cara y presion en el recto; despues calor ardiente en esta parte.—*Tenesmo* con movimientos y fermentacion en el vientre.—Prolapsus del recto mientras las evacuaciones.—*Prurito y titilacion insoportables en el recto.*—Prurito quemante en el ano, en las nalgas, en el periné, en el escroto y en la parte vellosa de los órganos genitales, y sobre todo en los muslos.—Punzadas en el ano y en el recto.

Orinas y partes genitales.—Dolores incisivos, lancinantes y corrosivos en la uretra.—Inflamacion é hinchazon de la uretra.—Secrecion mucosa por la uretra, como en una gonorrea, con traccion quemante en los cuerpos cavernosos, hasta el glande.—Excitacion del apetito venéreo.—Reglas muy activas y muy abundantes, y acompañadas de cólicos y de presion, desde los riñones hasta las ingles.—*Leucorrea amarillenta.*

Pecho.—*Sensacion de ansiedad en el pecho y gemidos.*—Fuerte opresion de pecho, con laxitud en las piernas.—Presion en el pecho y á través del esternon.—Dolores reumáticos, lancinantes y tractivos, en el diafragma.—*Punzadas en el pecho*, sobre todo andando.—Tension y opresion dolorosa en los costados.—*Palpitaciones de corazon*, á veces al menor movimiento.—Dolores y contracciones calambroídeas en los músculos del pecho.

Tronco y miembros.—*Frecuentes dolores de quebrantamiento y de sobrepeso en las espaldas y riñones.*—Traccion, dolores reumáticos, hormigueo y *sensacion de parálisis en los brazos con dificultad de levantarlos.—Dolores reumáticos en las articulaciones de las manos y de los dedos*, así como en los antebrazos.—Rigidez dolorosa y paralítica en los dedos.—Hinchazon de los pulpejos de los pulgares, con lividez, calor ardiente, y entumecimiento de las venas.—*Prurito corrosivo é insoportable en la palma y dorso de las manos.*—Sensacion de tirantez en la cadera

Digitized by Google

como por una ciática.—Dolores tractivos agudos, estiron paralítico, pesadez y punzadas en la rodilla —Dolor de luxacion en el empeine.—Callos dolorosos en los piés.

94.—GRAPHITES.

GRAPH.—Grafites.—Plombagina.—Lápiz plomo.—Mina de plomo.—*Hierro carburado.*—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 3).—*Duracion de accion*: hasta 50 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Ars. n-vom. vinum.—*Se emplea como antídoto de*: Ars.

COMPÁRESE CON: *Acon.* agar. ambr. amm. *ars.* bell. bry. *calc. carb-v.* cham. *chin.* con. *guai. hep.* hyosc. *kal. lyc. magn.* magn-m. *n-vom. phos.* puls. rhus. sabin. sep. *sil.* sulf.—Sobre todo despues de *lyc.*, es cuando *graph.* conviene, si se halla indicado.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones artríticas aun con nudosidades; Infarto é induracion de las glándulas; Excoriacion de la piel; Afecciones escrofulosas; *Erisipelas flemonosas, vesiculosas*; Zona; *Herpes de muchas especies*, sobre todo en la cara y en las mujeres que tienen las reglas escasas; Ulceras inveteradas; Tumores enquistados (Lupias); Melancolía; *Tiña*; Jaqueca; Oftalmías de diferentes especies; Dureza de oido y zumbido por congestion de sangre; *Erisipela de la cara*; Parálisis de la cara; *Dispepsia;* con ó sin vómitos de los alimentos; Gastralgia; Cólicos flatulentos; Bubones escrofulosos?; Ténia; Estreñimiento ó diarrea crónicos; *Padecimientos hemorroidales*; Hidrocele; Induracion de los testículos; Impotencia?; Satiriasis?; *Dismenorrea*, sobre todo la que proviene de estancacion en el sistema de la vena porta; Cáncer de la matriz; Amenorrea; Excoriacion de los pezones; Excoriacion de los niños; Asma espasmódica?; Catarro sofocante; Deformidad de las uñas, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores calambroídeos, *calambres y contracciones en diversas partes.*—Tension en algunas partes, *como por acortamiento de los tendones.*—Estremecimiento y distorsion de los miembros.—*Estiro-

Digitized by Google

nos artríticos y dolores de dislaceracion en los miembros y las articulaciones, sobre todo en las partes ulceradas.—°*Nudosidades artríticas.—Disposicion á una derrengadura.*—°*Entorpecimiento fácil de los miembros.*—Rigidez é inflexibilidad completa de las articulaciones.—Hinchazones duras, con dolores lancinantes.—Dolores nocturnos que se sienten aun durante el sueño.—Los síntomas se disipan despues de un paseo al aire libre.—Várices con punzadas, tension y prurito.—*Hinchazon y dureza de las glándulas.—Dolores durante el cambio atmosférico.—Malestar general, que obliga á gemir, sin sensacion alguna notable de dolor.—*Fuerte pulsacion en todo el cuerpo*, y sobre todo en el corazon, aumentada por el menor movimiento.—*Tirones en todo el cuerpo*, con necesidad de extender los miembros.—Sensacion de temblor en todo el cuerpo, con estremecimiento de los miembros.—**Mucho enflaquecimiento.*—°*Mucha disposicion á resfriarse*, y temor al aire libre y corrientes de aire.—*Laxitud general.*—Caida rápida de las fuerzas.—Aumento de los padecimientos tomando frio.

Piel.—*Sequedad tenaz de la piel* y falta de transpiracion.—Efélides.—Manchas rojas en la piel, como de picaduras de pulgas.—*Inflamaciones erisipelatosas.—°Erisipela vesiculosa y semejante á la *zona*, en el vientre y en el dorso.—**Herpes y otras erupciones húmedas* ó costrosas, á veces con secrecion de serosidades corrosivas, ó con comezon por la tarde y por la noche.—°*Tumores enquistados.*—**Vesículas corrosivas.*—**Excoriacion de la piel*, sobre todo *en los niños.*—**Piel enfermiza, toda lesion tiende á ulcerarse.*—Vegetaciones exudantes y pus fétido en las úlceras, con dolores dislacerantes, quemantes y lancinantes.—**Deformidad y espesor de las uñas.*

Sueño.—Mucha gana de dormir de dia y por la noche muy temprano.—*Dificultad de dormirse.—Sueño agitado, por la noche, del cual se despierta á menudo.—Sueño nocturno, incompleto, como si no hiciese mas que dormitar.—Sueño no reparador por la noche, y seguido *por la mañana* de un *sueño comatoso*.—Por la noche afluencia de ideas, algunas veces penosas.—**Mucha agitacion por la noche con ensueños ansiosos y espantosos*, opresion y ahogo.—*Durante el sueño, sobresaltos con espanto.—Ensueños de muertos, de fuego; ensueños con

Digitized by

reflexiones.—*Por la noche*, *ideas penosas*, angustia, calor, inquietud, estremecimientos, *padecimientos gástricos*, y otras muchas incomodidades.

Fiebre.—Calofrios, *por la mañana* y por la tarde, con ó sin calor, y seguidos de sudor.—*Sudor*, frecuentemente muy fétido, *al menor movimiento*, ó á la menor fatiga, aun en hablando.—*Sudor nocturno*, algunas veces fétido.

Moral.—*Abatimiento, tristeza y *disgusto profundo*, *con falta de ánimo y llantos abundantes*.—Agitacion, opresion de corazon y *angustia*, como si fuera á morirse ó *estuviera amenazado* de una gran desgracia, frecuentemente con dolor de cabeza, vértigos, náuseas y sudor.—**Agitacion ansiosa*, algunas veces trabajando sentado, *ó por la noche*. con necesidad de dejar la cama.—**Agitacion é inquietud por la mañana*.—Carácter medroso.—Determinacion lenta y perplejidad.—Mucha impresionabilidad.—Disposicion á asustarse.—Irascibilidad.—*Horror al trabajo.—Distraccion.—Se equivoca hablando ó escribiendo.

Cabeza.—°Fatiga á consecuencia de un trabajo intelectual.—Sensacion de entorpecimiento en la cabeza.—**Embriaguez* y vértigos, sobre todo por la *mañana en levantándose* ó en despertando; así como por la tarde con deseo de acostarse.—Atontamiento de cabeza.—Accesos de dolores de cabeza, algunas veces semilaterales, con náuseas y vómitos ácidos.—*Dolores de cabeza violentos por la mañana*, hasta provocar el sudor frio y hacer caer de debilidad.—Dolor de cabeza por el movimiento del carruaje, así como en moviendo la cabeza, ó durante y despues de la comida.—Dolor de cabeza del lado que se está echado.—*Tension y constriccion presiva del occipucio*, con rigidez de la nuca.—Pesadez y contraccion en la frente.—Dolor compresivo en el vértice de la cabeza despues de mediodia, con rotacion de la misma.—Ebullicion de sangre con latidos y zumbido sordo en la cabeza.—*Dolor de dislaceracion y estirones en la piel del cráneo, en los dientes y en las glándulas del cuello.—**Prurito en la piel del cráneo*.—**Costras húmedas en la cabeza*.—*Sudor en la cabeza andando al aire libre.—Descamacion abundante de la piel del cráneo.—**Caida de los cabellos*, *aun en los lados de la cabeza*.—Encanecimiento de los cabellos.

Digitized by

Ojos.—Pesadez de los párpados, que caen como paralizados.—**Presion en los ojos* y los párpados, como si en ellos se hubiese introducido arena.—**Punzadas en los ojos*.—Calor y sensacion quemante en los ojos, sobre todo á la luz de las bujías.—**Inflamacion de los ojos*, con rubicundez de la esclerótica, inyeccion de las venas, hinchazon y secrecion mucosa abundante de los párpados.—Orzuelo con dolor tractivo.—*Legaña seca en los párpados y en las pestañas.—*Aglutinacion de los párpados y *lagrimeo*.—*Oscurecimiento de la vista bajándose.—*Miopia.—Confusion de los caractéres al leer.—°Chispas delante de los ojos.—**Fotofobia*, *sobre todo de dia*.

Oidos.—Punzadas y latidos en los oidos.—°*Sequedad de la oreja inferior*.—°Olor fétido y flujo ¯de sangre *y de pus por los oidos.—*Costras, herpes, exudacion, y *excoriacion detrás de las orejas*.—**Dureza del oido*, ¯mejorada por el movimiento del carruaje.—*Canto, zumbido, retintin y ruido como el de un trueno en los oidos.—Zumbido en los oidos por la noche.—Sensacion como si el aire se introdujese con fuerza en la trompa de Eustaquio.—°Silbido en los oidos.

Nariz.—Hinchazon de la nariz.—Sensacion de tension en lo interior de la nariz.—Puntos negros en la nariz.—**Costras secas dentro de la nariz*.—**Ventanillas nasales excoriadas, agrietadas y ulceradas*.—*Olor fétido por la nariz.—Moco sanguinolento al sonarse y epistaxis, sobre todo por la tarde y por la noche, con congestion á la cabeza y calor á la cara.—Flujo de un pus fétido por la nariz.—Exaltacion del olfato.—*Obturacion y sequedad penosa de la nariz.—°Coriza contínua en enfriándose.—**Coriza seca* con dolores de cabeza y ¯náuseas que le obligan á acostarse.—**Flujo por la nariz de mucosidades* líquidas, amarillentas y espesas ¯con olor pútrido.—Coriza fluente con catarro.

Cara.—*Color amarillo, pálido*, con ojeras.—*Calor fugaz de la cara*.—**Inflamacion erisipelatosa, é hinchazon de la cara* con erupcion de vesículas.—Tumor enquistado en la mejilla.—Sensacion contínua, como si la cara estuviera cubierta de telarañas.—**Parálisis semilateral y distorsion de los músculos de la cara*, con dificultad de hablar.—Dolores tractivos y dislacerantes en los huesos de la cara. **Erupcion en la cara*, de un aspecto como si la piel estu-

Digitized by

viera en carne viva.—*Costras y *granos exudantes en la cara.—°Efélides.—°Caida de los pelos de la barba.—**Ulceras en la cara interna de los labios.*—*Comisuras de los labios ulcerados.—Labios agrietados.—**Erupciones costrosas en la barba y alrededor de la boca.*—°Nudosidades dolorosas en la mandíbula inferior.—Hinchazon y dureza de las glándulas submaxilares.

Dientes.—*Odontalgia* por la tarde, ó *por la noche en la cama*, agravada por el calor, y á veces con calor de la cara é hinchazon de la mejilla.—Dolor en las muelas apretando las mandíbulas.—**Dolores de dientes lancinantes* y tractivos, sobre todo *despues de haber bebido cosa fria.*—Dolor de excoriacion en los dientes y en las encías durante y sobre todo despues de comer.—*Facilidad á sangrar las encías é *hinchazon de las mismas.*—Salida de una sangre negra y agria por los dientes.

Boca.—Sequedad de la boca por la mañana.—Olor pútrido y de orina en la boca, las encías y la nariz.—Dolor de excoriacion, vesículas y úlceras sobre la lengua.—Salivacion abundante y acumulacion de mucosidades en el paladar y la garganta.—Locucion impedida por parálisis de los músculos.

Garganta.—Dolor de garganta casi contínuo, al tragar, generalmente lancinante, con estrangulacion.—*Dolor de la garganta*, aun por la noche, *como si se hubiese introducido un cuerpo extraño*, ó como si los alimentos se hallasen detenidos en aquel punto.—Calambres en la garganta, con estrangulacion.—Aspereza y *como arañamiento en la garganta.*

Apetito.—Gusto amargo ó ácido, con acedías en la boca y la garganta.—Mucha sed por la mañana y despues de comer.—**Hambre inmoderada.*—**Repugnancia á los alimentos cocidos* y la carne, así como por las cosas saladas ó azucaradas.—**Debilidad de la digestion*, con gana de dormir, dolores de cabeza, de estómago, plenitud y *meteorismo de vientre despues de la comida.*

Estómago.—*Erutos* frecuentes y algunas veces abortados.—Erutos ágrios, con amargor de la boca.—Regurgitacion ágria de los alimentos.—Regurgitaciones amargas y verdes.—Hipo frecuente, sobre todo despues de comer.—**Náuseas*, *sobre todo por la mañana*, ó despues de cada comida, con gana de vomitar.—Flujo de agua.

Digitized by

como de pituitas, por la noche.—**Vómito tenaz* de los alimentos.—Vómitos despues del menor disgusto, con fuertes náuseas y pellizcos en el vientre.—Vomituricion de mucosidades.—Vómitos ácidos.—**Presion en el estómago* á veces con vómitos, aliviados acostándose y por el calor de la cama.—**Dolores calambroideos ó apretamiento como por garfios en el estómago.*—Por la noche, pellizcos en el estómago, y como si escarbaran en el pecho.—Dolor ardiente en el estómago que obliga á comer.

Vientre.—En los hipocondrios, tension, punzadas y latidos.—Dolores hepáticos, despues del desayuno, que obligan á acostarse.—*Plenitud y **pesadez en el vientre.* —*Vientre abultado, tirante, meteorizado.—°Dureza en el bajo vientre.—Dolor nocturno, calambroídeo en los intestinos, con falta de secrecion de las orinas.—*Encarcelacion y **acumulacion de flatuosidades* en el vientre. —**Expulsion inmoderada de gases* fétidos, precedidos de pellizcos.—* Sensibilidad dolorosa en las ingles.—Hinchazon dolorosa de las glándulas inguinales.—°Inflamacion erisipelatosa con gruesas vesículas, cerca del ombligo.

Deposiciones.—**Estreñimiento pertinaz* con *deposiciones duras* y dureza en la region hepática.—Deposiciones duras, nudosas, de una forma muy voluminosa é *insuficientes.—* *Cámaras muy blandas.*—Salida de muchas materias viscosas con las deposiciones.—Deposiciones de un olor pútrido, ácido, ó de mucosidades sanguinolentas.—Diarrea con tirantez de vientre.—Deposiciones de un excremento sumamente delgado, como una lombriz.—Lombrices y ascárides.—°Ténia.—Prurito, sensacion de excoriacion é hinchazon del ano.—* *Botones hemorroidales voluminosos* en el ano, con dolor de excoriacion, sobre todo despues de las deposiciones.—°Grietas dolorosas y ardientes entre los granos hemorroidales.

Orinas.—Conato urgente, doloroso y angustioso para orinar, con estrangurria.—Secrecion rara de una orina oscura, que se enturbia prontamente, con sedimento blanco ó rojizo.—Orina de un olor ácre, ácido.—Chorro de la orina delgado, como por estrechez de la uretra.—Emision involuntaria de las orinas.—**Emision de la orina por la noche.*—Miccion en la cama.—Al orinar dolor en el coxis.

Digitized by Google

Partes viriles.—Tension y dolores calambroídeos en las partes genitales con ideas voluptuosas molestas.—Erupcion de granos en el prepucio y en el miembro.—Hinchazon hidrópica en el prepucio.—*Hinchazon hidrópica de los testículos.—Irritaciones voluptuosas en las partes genitales.—*Adormecimiento ó *exaltacion desenfrenada del apetito venéreo*. —Falta de erecciones por la mañana.—°Evacuacion de esperma casi involuntaria sin ereccion.—Falta de la emision del esperma durante el cóito.—Poco placer durante la cópula.—En el tiempo que dura la excitacion de las partes genitales por el cóito, cólicos flatulentos.

Reglas. —Vesículas y granos en la vulva. —*Excoriacion en la vulva* y entre los muslos.—Hinchazon dolorosa de los ovarios.—Sensacion como si todo se dirigiese hácia las partes genitales.—**Reglas muy tardas, escasas y pálidas*.—**Supresion de las reglas*.— A la aparicion de las reglas dolores cólicos.—Durante las reglas, flujo de sangre por el ano, dolores en los miembros, agravacion de las úlceras, hinchazon de las mejillas y de los piés, catarro con ronquera y coriza, dolor en los dientes ó calambres y dolores cólicos violentos en el vientre, dolores de cabeza, náuseas, dolores en el pecho y debilidad. —*Leucorrea blanca, líquida *como agua* con tension de vientre. —°Leucorrea antes y despues de las reglas.—°*Cáncer de la matriz* con tubérculos y excrecencias como coliflores en el cuello de la matriz.—Sensibilidad dolorosa y *excoriacion de los pezones*, ¯con erupcion de flíctenas que exudan.—Infarto é induracion de las glándulas mamarias.

Laringe.—Sensibilidad de la laringe.—Aspereza catarral y ronquera con sensacion de excoriacion, dolor quemante y **picor en la garganta*, coriza y como estorbo en el pecho.—°*Voz débil* (para el canto).— Acumulacion de viscosidades en el pecho.—Tos producida por la ronquera.—**Tos por la noche*, ¯ó al anochecer en la cama, provocada al respirar profundamente con opresion de pecho.

Pecho.—*Dificultad en la respiracion y opresion de pecho.—**Accesos de sofocacion por la noche* al empezar el sueño, ó paseándose al aire libre.—Respiracion sibilante.— Dolor de pecho andando cuesta arriba, yendo á

Digitized by Google

caballo, bostezando ó poniendo la mano sobre el pecho. —Dolor presivo calambroídeo en el pecho.—°Espasmos en el pecho.—Punzadas en el pecho al menor movimiento.—*Palpitaciones de corazon* al menor movimiento.

Tronco.—*Dolores de contusion en los riñones*, ó dolores de riñones violentos como un apretamiento como con garfios, ó como por un perforante.—Dolor contractivo en el dorso.—Sensacion de hormigueo en el dorso.—Tirantez en la nuca.—**Dolor violento en la nuca* y espalda, bajando la cabeza y levantando los brazos, como una incision dislacerante.—Ampollas en el cuello.—*Hinchazon de las glándulas del cuello.—Dolores de dislaceracion en las glándulas del cuello.

Brazos.—Dolor dislacerante ó lancinacion en los hombros.—Sensacion de acortamiento en la articulacion del codo, extendiendo el brazo.—*Calambre y dolores dislacerantes en las manos.—Enflaquecimiento de las manos.—Erisipela, callosidades, piel seca y grietas en las manos.—Dolor de luxacion en la articulacion del pulgar.—Hinchazon é inflexibilidad, rigidez y *distorsion de los dedos*.—Erupcion granulosa y vesículas corrosivas en los dedos.—**Nudosidades artríticas en los dedos*.—**Excoriacion herpética entre los dedos*.—Espesor de las uñas.

Piernas.—Pesadez, laxitud y adormecimiento de las piernas al aire libre.—**Excoriacion entre las piernas*.—Dislaceracion artrítica en la articulacion coxo-femoral, los piés y los dedos.—**Torpeza y rigidez de los muslos y de los dedos*.—**Inquietud* en las piernas.—**Herpes en los muslos*, en las corvas y sobre la tibia.—Sensacion de *acortamiento en los tendones de la corva* y en el tendon de Aquiles.—Tension en las várices extendiendo las piernas.—*Rigidez y falta de flexibilidad en la rodilla*, que no permite ponerse en cuclillas.—Calambres y estremecimiento de los músculos de las pantorrillas.—Cargazon de sangre en las piernas y piés estando en pié.—*Ulceras en las piernas.—*Hinchazon* de las piernas y de los *piés*, con dureza y dolor lancinante.—Rigidez del empeine.—*Dolor lancinante*, como de una úlcera *en el talon*, en la planta de los piés, al levantarse del asiento.—**Piés frios aun por la noche en la cama*.—*Piés ardientes.—Sudor fétido en los piés.—Hinchazon y *distorsion de los dedos*.—*Piel callosa, *vesículas corrosivas y úlceras en los de-*

Digitized by Google

*dos.—Excoriacion herpética entre los dedos.—*Espesor y deformidad de las uñas de los dedos.*

95.—GRATIOLA OFFICINALIS.

GRAT.—Graciola.—Yerba del hombre pobre.—HARTLAUB Y TRINKS.—*Hist. nat y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 6, 9, 32, 50.—Medicamento aun poco conocido, y que hasta hoy no se ha empleado mas que contra: *Afecciones hipocondríacas*, algunos casos de *Gastralgia* y varias especies de *Estreñimiento*.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores de dislaceracion en los miembros.—*Tétanos*, con pleno conocimiento.—*El mayor número de sintomas aparecen por la noche*, igualmente estando sentado, al levantarse del asiento y al aire libre; el contacto los alivia.—Prurito con sensacion ardorosa despues de haberse rascado.—*Erupciones corrosivas y que exudan*, parecidas á la sarna.—*Mucha gana de dormir* con bostezos frecuentes y necesidad de acostarse, sobre todo *despues de medio dia*.—Mucha predisposicion á calofrios.—*Morosidad hipocondríaca* y mal humor.—*Caprichos histéricos*.—Ansiedad.—Humor grave, y se halla concentrado en sí mismo.—Excesiva locuacidad y alegria.

Cabeza.—Vértigos rotatorios en cerrando los ojos.—Vértigos leyendo y estando sentado como si la cabeza se balanceara.—Dolores de cabeza con ganas de vomitar y sueño.—Sensacion de plenitud en la cabeza.—*Dolores de cabeza presivos*, sobre todo en la frente y en el occipucio.—Dolores de cabeza lancinantes y pulsativos.—Sensacion como si la cabeza disminuyese de volúmen por una contraccion del cerebro.—Ruido sonoro en la cabeza que priva la vista y el oido.—Los dolores de cabeza se agravan levantándose del asiento durante el movimiento y con andar al aire libre.

Ojos y dientes.—Prurito, estremecimiento y sensacion de debilidad en los párpados.—Dolor ardoroso y *presion en los ojos*.—Ojos lagrimosos y abatidos en leyendo.—*Miopia en leyendo*.—Dislaceracion y punzadas en los oidos.—Estornudos frecuentes con punzadas en el lado izquierdo del pecho y de los hipocondrios.—*Obturacion de la nariz*.—Tension, hormigueo y *sensacion de hincha-*

Digitized by Google

zon en la cara.—Dislaceracion de un solo lado de la cara. —*Calor abrasador y rubicundez en la cara.*—Dislaceracion ó terebracion nocturna en las muelas.—Sensacion de frio en los dientes.

Boca y garganta.— Acumulacion abundante de saliva en la boca.—*Presion en la garganta* como por mucosidades espesas.—Acumulacion de mucosidades en la garganta.— Ronquera con hormigueo y arañamiento en la garganta.—*Sabor amargo en la boca* ó pastoso.— Aliento fétido por la mañana al despertarse.

Estómago.—*Erutos amargos* ó insípidos.—Esfuerzos inútiles de erutar, con presion desde el estómago hasta la garganta, que cortan la respiracion.—*Regurgitacion de una agua amarga.*— Hambre; á veces con *disgusto y horror á todos los alimentos.*—Sed aumentada.— *Náuseas continuas, con vomituricoin.*—Náuseas con frio en el vientre.— Vómitos con obturacion de la nariz.— *Vómitos biliosos* ó de materias ágrias ó amargas.— Malestar y *sensacion de plenitud en el estómago.*—**Presion en el estómago, despues de comer*, con náuseas.—Como si escarbaran en el estómago y sensacion de vacío en este órgano con ganas de vomitar.—Presion al epigastrio despues de la comida, como por una piedra.—*Los padecimientos del estómago y del epigastrio van acompañados frecuentemente de náuseas ó de esfuerzos inútiles para erutar.*

Vientre.— *Dolores lancinantes en el abdómen.*— Latidos en el hipocondrio izquierdo.— *Dolor de vientre presivo, con ganas de vomitar.*— Dolores de vientre con pellizcos, que obligan á doblarse sobre sí mismo.—Meteorismo duro por flatuosidades.— *Cólico flatulento y presivo con náuseas y erutos desagradables.*

Deposiciones.— Necesidad urgente é inútil de deponer. —**Estreñimiento.*— *Deposiciones duras, raras y tenaces*, expulsadas con grandes esfuerzos.—Diarrea mucosa por la noche, con tenesmo.—Dolor de excoriacion en el recto.— *Dolor quemante en el recto durante y despues de las deposiciones.*—Punzadas, prurito, escozor y latidos en el ano.— Hemorroides ciegas.

Orinas y partes genitales.—Disminucion de la secrecion de la orina.—Orina rojiza que se enturbia al posarse, con sedimento nebuloso.—Punzadas desde el cordon espermático hasta el pecho.—Despues de las po-

Digitized by

luciones, rigidez dolorosa del miembro.—Reglas muy adelantadas y de muy larga duracion.—Punzadas en los pechos.—Ninfomanía con escozor en las partes.

Pecho y miembros.—Tos seca, provocada por una sensacion de aspereza en el pecho, sobre todo por la mañana ó por la noche.—*Tos nocturna*, con dolor de excoriacion en la tráquea-arteria, opresion en el pecho y calofrios.—Sofocacion subiendo una escalera.—*Opresion de pecho*, con palpitaciones de corazon.—*Presion en el pecho*.—Punzadas en los costados, inspirando.—Granos en el pecho, que queman despues de haberlos rascado.—Palpitaciones de corazon.—*Punzadas en las piernas y en los piés*.

96.—GUAIACUM OFFICINALE.

GUAI.—Resina de Guayaco.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 0, 30.—*Duracion de accion*: hasta 20 dias en las afecciones crónicas.

COMPÁRESE CON: Graph. merc. n-vom.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—Afecciones reumáticas y artríticas; Contractura artrítica de los miembros; Aneurismas?; Malas consecuencias por abuso del mercurio; Jaqueca; Neumonia crónica (Tísis pulmonar?), etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores reumáticos en las articulaciones.—**Dolores artríticos en los miembros, con punzadas y dolores de dislaceracion*, y °contraccion de las partes afectas.—°Dolores osteócopos con hormigueo.—*Los dolores son provocados al menor movimiento y acompañados de calor en las partes afectas.—Adormecimiento de los miembros.—*Cansancio sumo y debilidad de los brazos y de los muslos*, con horror al movimiento.—Necesidad frecuente de bostezar y de estirar los miembros, lo que proviene de una sensacion de malestar general.—El mayor número de síntomas se manifiestan

Digitized by

estando sentado, así como por *la mañana despues de levantarse, ó por la noche antes de acostarse.*—Hinchazon de los huesos.—Consuncion.—°Mucha sensibilidad de las partes enfermas al tacto.

Sueño.—*Mucha gana de dormir despues de medio dia.*—Sueño tardío del que despierta muy temprano.—Se despierta con frecuencia asustado, á veces al empezar á dormirse.—Anhelacion inquieta por la noche.—Pesadilla estando acostado sobre la espalda.—*Por la mañana parece no haber dormido lo bastante.*

Fiebre.—Despeluzamiento, calofrios y horripilacion, aun estando cerca del fuego.—Calofrios sin sed, por la mañana y la tarde.—Sudor matutino.—*Sudor abundante*, sobre todo en la cabeza, durante el paseo al aire libre.—Pulso acelerado.

Moral.—Tenacidad.—Mucho deseo de vituperar y despreciarlo todo.—Pereza y horror al movimiento.—Debilidad de la memoria y excesivo *olvido*, sobre todo de los *nombres*.—Mirar fijo y falta de ideas, sobre todo por la mañana.

Cabeza.—Presion extensa y dolorosa ó traccion y dolores de dislaceracion en el sincipucio y las sienes.—Lancinaciones violentas y extensas en el cerebro.—**Dolores dislacerantes en un solo lado de la cabeza*, hasta la mejilla.—Pulsaciones, latidos (y punzadas) en las sienes, con sensacion como si la *cabeza estuviera hinchada*, y los vasos sanguíneos inyectados.

Ojos.—Cara.—*Sensacion de hinchazon ó *hinchazon real de los párpados*, °con sensacion, como si los ojos fueran á salirse de las órbitas, y los párpados fuesen muy cortos.—Pupilas dilatadas.—Amaurosis.—Granos en las cejas.—Dolores dislacerantes y **presion en los oidos*.—Punzadas en los pómulos y los músculos de las mejillas.

Dientes.—Apetito.—Dolor presivo en los dientes al apretarlos.—Estirones y dolores dislacerantes en los dientes, los que terminan por punzadas.—Dolor ardiente en la garganta.—Gusto soso, con falta de apetito y desgana para todo, acompañados de expuicion de mucosidades.—Erutos vacíos.—Hambre inmoderada.—°Náuseas provocadas por una sensacion como si la garganta estuviera llena de mucosidades viscosas.—°Repugnancia á la leche.

Estómago.—Orinas.—Sensacion de constriccion con an-

Digitized by Google

siedad en la region del estómago, que dificulta la respiracion.—Pellizcos en el vientre, como por encarcelacion de gases.—Sensacion de vacuidad con borborigmos y ruido sordo en el vientre.—Dolor como por una hernia en las ingles.—Estremecimiento de los músculos del vientre.—**Estreñimiento.*—Deposicion dura que sale en trozos.—*Gana continua de orinar, con emision abundante.*—Dolores incisivos en la uretra, orinando.—Conato inútil de orinar, con punzadas en el cuello de la vejiga.

Pecho y miembros.—Tos seca, con sensacion en el epigastrio como por falta de aire.—Tos con expectoracion de un pus fétido.—**Punzadas en el pecho* agravadas inspirando.—Presion en las vértebras del cuello.—Rigidez de la nuca.—Rigidez á lo largo del dorso de un solo lado.—Dolores de dislaceracion y punzadas en un solo lado del dorso.—Dolor contractivo entre los omóplatos.—Calofrios en el dorso.—Debilidad en los brazos.—Dolores dislacerantes y punzadas en los omóplatos y antebrazos.—**Dolores osteócopos presivos* y *con hormigueo*, en los muslos estando sentado.—Tension paralítica en los muslos en andando.—Debilidad en los muslos.

97.—HAMAMELIS VIRGINICA.

HAMAM.—Hamamelis de Virginia.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Se ha usado hasta aquí con buen éxito contra: *Reumatismos* tanto *musculares* como *articulares*, con excesivo dolor de las partes afectadas.—*Epistaxis*, con hemoptísis.—*Hemoptisis*, venosa, con sangre, que sin esfuerzo, viene á la boca como una corriente caliente, y con gusto de azufre.—*Disentería* con destilamiento de sangre, como una hemorragia, por pequeños coágulos de color oscuro, mezclados con mucosidades.—*Hemorróides*, con abundante sangre, ardor, dolor, plenitud, pesadez, excoriacion del ano y sensacion como si el dorso fuese á romperse.—*Ovaritis*, á consecuencia de un golpe tambien, con penoso dolor, esparcido por todo el vientre, ménstruos irregulares, muy dolorosos, retencion de orina, y agravacion de todos los sufrimientos con el retorno del período.—*Metrorragias pasi-*

Digitized by Google

vas con anemia.—*Amenorrea* con epistaxis ó hematémesis, tenaz estreñimiento y várices en las piernas.—*Dismenorreas* con violentos dolores, que atraviesan las caderas y el vientre hasta los muslos; sensacion de plenitud en los intestinos y el cerebro, con dolores violentos en toda la cabeza, seguido de estupor y sueño profundo.—*Pezones del pecho*, que dan sangre con dolor excesivo.

98.—HELLEBORUS NIGER.

HELL.—Eléboro negro.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 9, 12, 30.—*Duracion de accion*: 4 á 5 semanas en algunas afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. chin.

COMPÁRESE CON: Ars. bell. bry. chem. *chin.* dig. ign. op. phos. stann. stram. *verat.* —Sobre todo despues de: *Bell. bry. chin.*, es cuando el *eléboro* será mas eficaz si se halla indicado.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se podrá emplear este medicamento contra:—*Afecciones hidrópicas*, sobre todo algunas especies de *anasarca*, y principalmente las que provienen de la repercusion de exantemas, tales como la miliar purpúrea, la escarlatina, etc.; Coma?; Fiebres nerviosas lentas; Melancolía tranquila; Imbecilidad; Tiña con obstruccion de las glándulas del cuello; Hipocondría?; Encefalitis?; Hidrocéfalo agudo?; Ascitis; Hidrotorax, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores lancinantes y terebrantes*, en diversas partes, y sobre todo *en el periostio*, agravados por el aire frio, la fatiga corporal, el beber y el comer.—*Estirones y dolores de dislaceracion en los miembros.*—*Dolores lancinantes en las articulaciones.*—Relajamiento súbito de todos los músculos.—Los músculos se niegan al movimiento, y este no se realiza sino por una decidida voluntad del indivíduo; vacilacion al andar, ó deja caer los objetos que tiene en la mano, etc.—El sujeto se encuentra mejor al aire libre, y expuesto á él recibe la misma sensacion que si acabara de salir de una larga enfermedad, todo le parece rejuvenecido.—Con-

Digitized by Google

vulsiones.—Calambres.—Síncope.—*Hinchazones *hidrópicas*.—Caida de los cabellos y de las uñas.

Piel.—Palidez de la piel.—Erupciones miliares.—°Hinchazon leucoflegmática de toda la piel.—Descamacion de la piel de todo el cuerpo.

Sueño.—**Soñolencia*, con ojos medio abiertos y las pupilas vueltas hácia arriba.—Sueños confusos, ansiosos y de los que no se acuerda.—Insomnio.—Agitacion en la cama.

Fiebre.—Calofrios que alternan con dolores lancinantes en los miembros.—Frio en todo el cuerpo, y sobre todo en los miembros, con calor en la cabeza.—Calofrio general con la piel como carne de gallina, y sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo al tacto, ó moviendo la cabeza, estirones y dolores de dislaceracion en los miembros, lancinaciones en las articulaciones y falta de sed. —Por la noche, despues de haberse acostado, calor ardoroso por todo el cuerpo, y principalmente en la cabeza, con horripilacion interior y calofrios sin sed; las bebidas repugnan.—Sudor nocturno hácia la mañana.

Moral.—**Melancolía taciturna* con suspiros contínuos.—*Angustia excesiva y casi mortal.*—Nostalgia.—*Humor hipocondriaco.*—Pereza.—Llantos con sollozos.—Silencio tenaz.—Desconfianza.—*Estupidez.*—Estupidez é irreflexion con mirada fija en un punto.—Debilidad de la memoria. —Debilidad en la que el espíritu tiene menos imperio sobre el cuerpo; los músculos se niegan al movimiento desde el momento en que la atencion se dirige á otro punto.

Cabeza.—*Dolor estupefaciente y sensacion de contusion en la cabeza.*—Cefalalgia presiva con aturdimiento.—*Pesadez dolorosa en la cabeza*, con calor ardiente en ella, frio en los dedos y sensacion de calofrio general y palidez de la cara.—Calor abrasador en la cabeza con cara pálida.—Los dolores de cabeza se hacen mas insoportables, cuando se tiene cuidado ó se empeña uno en estar reposado dormitando tranquilamente.—*Sensibilidad dolorosa al exterior de la cabeza*, y sobre todo *al occipucio*, *como si estuviera contundido*, y en tocando ó moviendo la cabeza.—Estremecimiento en los tegumentos de la cabeza, durante el movimiento, bajándose ó subiendo una escalera.—°*Necesidad de hundir la cabeza en la almohada al dor-*

Digitized by Google

mir.—Tumores en la piel de la frente, con dolor de contusion.—Costras exudantes en la piel del cráneo.

Ojos y oidos.—Dolor en los ojos, como si tuviera un clavo metido en los bordes de las órbitas.—*Pesadez presiva en los ojos* de arriba abajo.—Fijeza involuntaria de la vista sobre un solo punto.—Fotofobia de dia.—Punzadas en los oidos dia y noche, con terebracion como si escarbaran.

Cara y dientes.—Cara pálida, algunas veces amarillenta.—*Hinchazon pálida y edematosa de la cara.—Frente arrugada.—Vesículas blancas en los labios con hinchazon.—Dolores osteócopos, sordos en el pómulo.—Odontalgia por la noche, con dolores lancinantes y de dislaceracion, agravados por el frio y el calor.

Boca.—Sequedad penosa en el paladar con dolor incisivo como si arañaran, durante la deglucion.—Acumulacion contínua de saliva en la boca y salivacion con excoriacion de la comisura de los labios.—Vesículas y aftas en la boca y sobre la lengua.—*Torpeza é hinchazon de la lengua*.—Gusto amargo en la garganta, aumentado en comiendo.

Estómago.—*Náuseas*, á veces con *hambre excesiva*.—*Repugnancia á los alimentos*, sobre todo á la carne, la grasa, legumbres verdes y la berza ácida (1).—Vómitos de color verde negruzco, con dolores de vientre.—*Pesadez, plenitud y meteorismo del estómago*.—Meteorismo del epigastrio, con dolor de ulceracion y dificultad de la respiracion.—*Sensacion de un malestar excesivo en el epigastrio*.—Presion dolorosa en el epigastrio á cada paso.—Sensacion de retraccion en la boca del estómago.—Dolor ardiente en el estómago hasta en la garganta.—Despues de cada comida, dolor de ulceracion en el estómago.

Vientre.—*Pellizcos en el vientre*.—Sensacion de frio en el vientre.—Pesadez en el vientre.—*Hinchazon hidrópica del vientre.—Borborigmos en el vientre, sobre todo respirando profundamente como si hubiera agua en los intestinos.—Ruido como de agua y borborigmos en el vientre.

Deposiciones.—*Tenesmo con evacuacion de mucosidades ge-*

(1) Alimento usado en el Norte, de donde es transportado á Europa. Es una composicion del repollo de mas fácil digestion que otras verduras. (*N. del T.*)

Digitized by Google

latinosas; precedido de pellizcos en la region umbilical. —*Diarreas* con dolores de vientre y náuseas.—Deposiciones acuosas y frecuentes.

Orinas y partes genitales.—Conato frecuente de orinar, con emision poco abundante.—Chorro de las orinas delgado.—Orinas oscuras.—Supresion del apetito venéreo, con flacidez de las partes genitales.

Pecho.—*Constriccion en la garganta y en la nariz con sofocacion*.—Tos corta, seca, con tension dolorosa en el hipocondrio izquierdo.—*Respiracion difícil*, como por hidrotorax.—Respiracion acelerada, ó profunda y lenta.—*Constriccion del pecho*.—Calor en el pecho.—Palpitaciones de corazon.

Tronco.—Dolor contractivo en los riñones.—Sensacion como si un gárfio estuviera clavado, y lancinaciones obtusas en la espina dorsal.—Dolor de contusion entre los omóplatos.—Rigidez y sensibilidad dolorosa del cuello y de la nuca, durante el movimiento.—Hinchazon de las glándulas del cuello.

Brazos.—Dolores de dislaceracion en los huesos y las articulaciones del brazo, como tambien en la parte superior de los dedos.—Estremecimiento en los músculos de los brazos.—*Terebracion y punzadas en las manos y en las articulaciones de los dedos*.—Falta de fuerza en las manos. —Contraccion espasmódica de los dedos.

Piernas.—Lancinaciones violentas y presion quemante en las caderas.—Falta de firmeza en las piernas con genuflexion de las rodillas.—Rigidez y tension en los muslos y en las corvas.—*Lancinaciones obtusas y terebrantes en las articulaciones de las rodillas y de los piés*.

99.—HEPAR SULFURIS.

HEP.—Higado de azufre.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. hom op. —*Dósis usadas*: 3, 30.—*Duracion de accion*: hasta 60 dias las altas diluciones, en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Acetum. bell.—*Se emplea como anti loto d.*: Ars. ant. bell. cupr. fer. io l. merc. nitr-ac. si. zinc.

COMPÁRESE CON: Amm. *ant.* arn. *ars. bell.* bry. *cham.* chin. cin. *cupr.* dros. *ferr. lach. merc. nitr-ac.* plumb. *spong. sil. zinc.*—Cuando el *hep.-sulf.* se mostra eficaz, siempre que se halle indicado, será sobre todo despues de: *Bell. lach. sil. spong. zinc.*—Despues de *hep-sulf.* conviene algunas veces: *Bell. merc. nitr-ac. spong. sil.*

Digitized by Google

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones artríticas, con hinchazon inflamatoria; *Funestos resultados del abuso del mercurio*; Infarto; Inflamacion y *supuracion de las glándulas*; Inflamaciones flegmonosas; Afecciones reumáticas; Atrofia de los niños?; Afecciones escrofulosas; Ictericia?; *Erisipelas simples, flegmonosas y vesiculosas*; Erupciones urticarias; *Herpes*, sobre todo en la cara; *Ragades*, sobre todo las que provienen del abuso del mercurio; Ulceras inveteradas, pútridas, carcinomatosas; *Sobreexcitacion nerviosa*, sobre todo la que es debida al abuso del mercurio; Jaqueca; Calvicie, en particular la producida por el abuso del mercurio, ó á consecuencia de graves enfermedades agudas, ó de dolores de cabeza histéricos, etc., etc.; *Tiña*; Herpes en las orejas; *Erupciones y herpes en la cara;* Oftalmías escrofulosas, artríticas, traumáticas, catarrales, etc.; Ulceras de la córnea; Otitis con otorrea purulenta; Hinchazon escrofulosa de la nariz?; Salivacion con ulceracion en la boca por el abuso del mercurio; Amigdalitis y otras anginas flegmonosas; Bubones escrofulosos; Diarreas y disenterías; Loquios morbosos; Cáncer en las mamas?; *Croup* (período exudatorio); Laringitis agudas y crónicas (tísis laríngea); Tísis pulmonar; Ragades en las manos; *Panadizos*, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores de dislaceracion ó *tirones* paralíticos *en los miembros*, sobre todo por la mañana al despertarse.—**Dolor de excoriacion ó de contusion al tacto* en diversas partes.—*Punzadas en las articulaciones.* —*Hinchazones artríticas, con calor, rubicundez y dolores de luxacion.—*Hinchazon, inflamacion y *ulceracion de las glándulas.*—**Aparicion ó agravacion de los dolores por la noche*, sobre todo *durante los calofrios.*—Sobreexcitacion nerviosa, excesiva, con sensibilidad dolorosa al menor contacto, así como al aire libre y que ocasiona muchos padecimientos.—**Enflaquecimiento*, °á veces con angustia, irritabilidad, calofrios en el dorso, rubicundez de las mejillas, insomnio, etc.—*Postracion física y temblor despues de haber fumado, °ó andando al aire libre, con calor y ansiedad.—*Accesos de desvanecimiento*, sobre todo *por la tarde, aun por dolores poco violentos.*

Digitized by Google

Piel.—**Inflamaciones erisipelatosas*, aun con hinchazon °y vesículas.—Color amarillento de la piel, sobre todo en la cara y en la esclerótica, con orinas de un color de sangre.—*Comezon quemante* del cuerpo con vesículas blancas despues de haberse rascado.—*Erupciones urticarias.—°Erupciones de granos y de tuberosidades, *dolorosas al tacto.*—**Piel enfermiza, toda lesion tiende á ulcerarse.*—**Grietas en la piel.*—*Ulceras* pútridas, que dan un olor como de queso añejo, y sangran fácilmente, con punzadas, sensacion de excoriacion (sobre todo por la noche), ó con dolores ardorosos y pulsativos.—Ulceras carcinomatosas.—°Tumefacciones calientes y rojas con dolor de excoriacion.—°*Supuracion.*—**Panadizos.*

Sueño.—Mucha *gana de dormir* por la mañana y por la tarde, *con bostezos convulsivos.*—*Sueño inquieto, con la cabeza vuelta hácia atrás.—*Sueño* prolongado, con aturdimiento, como en el coma vigil.—Insomnio á causa de una gran afluencia de ideas.—Ensueño de incendios, de enfermedades, de peligros, de descargas de fusil, etc.—**Por la noche padecimientos gástricos*, dolor de cabeza, agitacion, estremecimiento de los miembros, calor seco.—**Sobresaltos por la noche* durante el sueño, *como si faltase el aire*, con llantos y muchas angustias.

Fiebre.—**Horripilacion y calofrios*, sobre todo *al aire libre*, ó por la noche con dolores opuestos.—Calofrios con castañeteo de dientes y frio en los piés y las manos, seguidos de calor y de sudor, sobre todo en el pecho y en la frente, con poca sed.—Al principio amargor en la boca, despues calofrio con sed; una hora despues calor con sueño, y en seguida vómitos y cefalalgia.—**Calor seco por la noche*, con cefalalgia, sed y divagacion.—*Calor fugaz con sudor.—*Calor febril ardiente, con rubicundez de la cara y mucha sed.—**Excesiva disposicion á transpirar*, por el dia, al menor esfuerzo y al mas mínimo movimiento.—*Sudor nocturno.*—Sudor matutino.—Sudor viscoso, ácido.

Moral.—Tristeza y gana de llorar.—**Angustias* y aprensiones extremas, sobre todo por la tarde y á veces hasta el *punto de querer suicidarse.*—Mal humor, ni aun se quiere ver á los suyos.—Irritabilidad excesiva.—Despecho y arrebatos, con locucion precipitada y excesiva debilidad de la memoria.—Visiones por la mañana en la cama, mal humor hasta dominar á todos.

Digitized by

Cabeza.—*Vértigos moviendo la cabeza*, así como por el movimiento del carruaje, ó por la tarde con náuseas.—Vértigos con pérdida del conocimiento y oscurecimiento de la vista.—*Dolores de cabeza por la mañana*, provocados por un sacudimiento cualquiera.—Dolores de cabeza por la noche, en moviendo los ojos; parece que se abre la frente.—Dolor de cabeza, *como si hubiera un clavo introducido en ella.—Presion* en las sienes y *en el vértice* con palpitaciones de corazon por la tarde.—Tension por encima de la raiz de la nariz.—*Dolor de ulceracion en la cabeza, inmediatamente por encima de los ojos, todas las tardes ó bien por la noche en la cama.—*Punzadas en la cabeza*, sobre todo despues de haber estado al aire libre, y tambien al bajarse, ó por la noche, como si la cabeza fuera á abrirse.—**Terebracion en la cabeza* todas las mañanas, sobre todo en la raiz de la nariz.—**Caida de los cabellos y manchas de calvicie.*—Sudor frio en la cabeza.—**Tuberosidades en la cabeza con dolor de excoriacion al tacto.*—°Costras húmedas en la cabeza.

Ojos.—Dolor como si se hundiesen los ojos en la cabeza.—Movimiento doloroso y difícil de los ojos.—Ardor, *presion* y *punzadas en los ojos.*—Dolor de ulceracion, precisamente por encima del ojo, todas las tardes.—**Inflamacion de los ojos y de los párpados*, algunas veces aun *erisipelatosa*, *con dolor de contusion* y de excoriacion *al tacto.*—Granos por debajo de los ojos, y sobre los párpados.—°*Manchas y úlceras en la córnea.*—*Lagrimeo y aglutinacion nocturna de los párpados.—**Oclusion espasmódica de los párpados*, por la noche.—Ojos prominentes.—Oscurecimiento de la vista, en leyendo.—**Fotofobia* por el dia y á la luz artificial.—°Vista turbia por la tarde, á la luz de las bujías, la cual alterna con claridad de la vision.

Oidos.—Punzadas en los oidos, sonándose.—Calor, rubicundez y *prurito en las orejas.*—**Flujo por los oidos de un pus* que á veces es fétido.—°*Costras detrás y en las orejas.*—Dureza de oido con pulsacion y *zumbido en él*, sobre todo al principio de la noche en la cama.

Nariz.—*Inflamacion*, rubicundez é hinchazon de la nariz.—*Dolor de contusion y de excoriacion en la nariz, al tacto.*—Dolor de ulceracion ardoroso y costras en las ventanillas nasales.—*Epistaxis* por la mañana y despues

Digitized by

de haber cantado.—Falta ó *exaltacion del olfato*.—Coriza, principalmente en un solo lado, con aspereza en la garganta, hinchazon inflamatoria de la nariz, fiebre y cansancio sumo de todos los miembros.

Cara.—Cara amarilla, con círculos azules alrededor de los ojos.—**Cara ardorosa y de un rojo oscuro*.—Calor nocturno en la cara.—°Mucha palidez durante ejercicios considerables.—**Inflamacion erisipelatosa é hinchazon de la cara* y de las mejillas, con tension y sensacion de picoteo y °erupcion de vesículas.—Dolores tractivos y dislacerantes, los que partiendo de las mejillas se extienden hasta las orejas y las sienes.—**Dolores en los huesos de la cara al tacto*.—Granos en la frente, que se disipan al aire libre.—Hinchazon de los labios con tension y *dolores al tacto*.—*Ulceracion de la comisura de los labios.—Ampollas en los labios, en la barba y el cuello, *dolorosas al tacto*.—Vesículas en la barba.—Punzadas en la articulacion de la mandíbula, abriendo la boca.

Dientes.—*Odontalgia con dolores que causan estremecimiento*, y tractivos que se agravan apretando los dientes, comiendo y estando en habitacion caliente.—*Hinchazon é inflamacion de las encías, las que están dolorosas al tacto.

Boca.—Acumulacion de agua en la boca.—**Salivacion*.—*Estertor mucoso*.—°Palabra bronca y precipitada.—°Ulceras en la boca de fondo lardáceo.

Garganta.—**Ligera inflamacion de garganta, como si hubiese dentro una saeta* ó un tumor.—*Arañamiento doloroso en la garganta con dificultad de la respiracion al hablar y al tragar la saliva.—Punzadas en la garganta y hasta en los oidos, como por espinas, al tragar, al toser, al respirar y al volver la cabeza.—Fuerte presion en la garganta con peligro de sofocacion.—Deglucion difícil y solo posible á costa de grandes esfuerzos.—°Sequedad de la garganta.—°*Hinchazon de las amigdalas*.

Apetito.—Pérdida del gusto.—Amargor de la boca y de los alimentos.—*Gusto térreo* y amargo en la garganta, con gusto normal de los alimentos.—**Mucha sed*.—Bulimia.—Apetito, *solamente de cosas ácidas ó picantes*.—Repugnancia por la grasa.—Deseo de vino.—°Gran debilidad de la digestion, la que se trastorna con facilidad.

Estomago.—**Eructos* con sensacion quemante en la gar-

Digitized by Google

ganta.—*Accesos de náuseas, algunas veces con frio y palidez.—Náuseas con gana de vomitar por la mañana. —Vómitos ácidos, verdosos, biliosos, ó mucosos y sanguinolentos.—*Desarreglo frecuente y fácil del estómago.—*Presion en el estómago*, aun habiendo comido muy poco.—°Hinchazon de la region estomacal con dolores presivos.—Presion, *meteorismo* y sensacion como de un cuerpo pesado en el epigastrio, con imposibilidad de estar sentado, ó de sufrir los vestidos apretados.

Vientre.—°Sensacion de hinchazon y de estancacion de sangre en los hipocondrios.—Punzadas en el bazo.—Punzadas en la region hepática, sobre todo andando.—Dolor de contusion en el vientre, por la mañana.—*Calambres y *dolores contractivos en el vientre*.—Sensacion de una fuerte compresion en la region umbilical, con náuseas, ansiedad y calor en las mejillas.—*Dolores cólicos*.—Dolor de ulceracion en el vientre.—*Punzadas en el vientre, sobre todo en el lado izquierdo.—*Hinchazon y supuracion de las glándulas inguinales*.—°Encarcelacion y difícil emision de gases, sobre todo por la mañana.

Deposiciones.—*Deposiciones duras y secas*.—*Emision difícil de excrementos raros y blandos, con necesidad urgente y tenesmo.—Diarreas de materias estercoráceas, con dolores cólicos.—°*Diarrea blanquecina de olor ácido*, sobre todo en los niños.—**Deposiciones disentéricas*, verdosas ó de color de arcilla, con evacuacion de mucosidades sanguinolentas.—Despues de la deposicion dolor de excoriacion y evacuacion saniosa por el ano.—Salida de granos hemorroidales en el recto.—Sudor en el perineé.

Orinas.—Orinas tardas, turbias, con sedimento blanquecino.—°Debilidad de la vejiga, con evacuacion lenta de las orinas.—Secrecion abundante, de una orina pálida, con presion en la vejiga.—Orina ácre, corrosiva, ó pálida y acuosa, ó *de un rojo oscuro, y caliente.—*Emision de orina por la noche*.—°Se orina en la cama.—*Hematuria*, despues de haber orinado.—Rubicundez é inflamacion del orificio de la uretra.—°Flujo mucoso por la uretra.—Película de colores sobre las orinas.

Partes viriles.—Debilidad de las partes genitales.—Escozor, *excoriacion y resudacion entre los muslos y el escroto*.—Ulcera carcinomatosa en el prepucio.—Ereccio-

Digitized

nes dolorosas, calambroideas y tensivas.—*Falta de deseos venéreos y de erecciones.—Ereccion sin energía durante el cóito.—Excitacion de las partes genitales, como para la eyaculacion.—**Derrame de licor prostático, sobre todo despues de haber orinado,* y durante una deposicion difícil.

Reglas.—*Excoriacion en la vulva y entre los muslos.—Congestion al útero.*—Flujo de sangre fuera del tiempo de las reglas, con vientre meteorizado.—*Reglas muy retrasadas.—Leucorrea con escozor de la vulva.—°Ulcera carcinomatosa en un pecho.

Laringe.—Ronquera.—Dolor y excesiva sensibilidad en la laringe, con voz débil y bronca, enflaquecimiento, fiebre héctica é insomnio.—Dolor permanente en la laringe, agravado por la presion, la palabra, tosiendo y respirando.—Debilidad de los órganos de la locucion y del pecho, que impiden hablar en alta voz.—Tos provocada por una irritacion ó un dolor en la laringe.—*Tos* profunda, *sorda*, provocada por una dificultad en la respiracion.—*Tos con sofocacion, violenta, con vomituricion.—Tos parecida á la coqueluche.—Tos despues de haber bebido.—**Tos seca por la tarde*, despues de haber tenido frio en una parte del cuerpo ó estando echado en la cama.—**Golpes de tos por intervalos, seca, bronca y hueca con angustia y sofocacion, la que termina frecuentemente por llantos.*—°Tos como ladridos.—Tos con esputos de sangre.—*Tos con expectoracion abundante de mucosidades, estertor mucoso.—Durante la tos, resonancia y dolor en la cabeza, como si esta fuera á estallar.—Despues de la tos, estornudo.

Pecho.—°*Respiracion angustiosa*, ronca, *sibilante con peligro de sofocacion cuando se está acostado.*—°Accesos de sofocacion que obligan á echar hácia atrás la cabeza.—Respiracion corta.—Necesidad frecuente de respirar profundamente, como despues de haber corrido.—Punzadas en el pecho en respirando ó en andando.—Granos y forúnculos en el pecho con lancinaciones y *dolor de excoriacion al tacto.*

Tronco.—Dolor ardiente, lancinante en la region de los riñones.—*Dolor de contusion en los riñones* y hasta en los muslos.—*Punzadas y tirones en el dorso*, entre los omóplatos y en los músculos del cuello.—Tension nocturna

Digitized by Google

en el dorso al volverse en la cama.—°Sudor fétido en los sobacos.— *Supuracion de las glándulas axilares.*—Tumorcitos en el cuello, dolorosos al tacto.

Brazos.—*Dolor de contusion* en los huesos del brazo.—*Hinchazon artrítica* de la mano, de los dedos y de las articulaciones de estos con calor, rubicundez y dolor de luxacion durante el movimiento.—°*La piel de las manos esquebrajada*, áspera y seca.—Erupcion granulosa en las manos y muñecas.—°Erupcion urticaria en las manos y dedos.—Luxacion y dislocacion fácil de los dedos.—°Dedos como muertos.— *Panadizos.*

Piernas.— Dolor en las caderas al sentarse.— Forúnculos en las nalgas.—*Dolor de contusion* en los muslos.—Tension dolorosa en los muslos que impide el dormir.—Frecuentemente flojedad súbita en las piernas al andar.— *Hinchazon de las rodillas.*— Calambres en las pantorrillas, la planta de los piés y dedos.—Piés ardorosos.—Hinchazon de los piés y de los maléolos, con dificultad de la respiracion.— °Hinchazon roja, reumática en los maléolos, con dolor que aumenta por la noche.— *Grietas en los piés.*— Punzadas en los callos.

100.—HIPPOMANES.

HIPP.—Hippomanes.—**HERING.**— *Hist. nat. y prep.* Farmac. hom.— ***Estudios patogenéricos de la América del Norte.***

COMPÁRESE CON: Caus. oxal-ac.

CLINICA.—Examinando los síntomas característicos de este medicamento, se verán los casos en que podrá administrarse con éxito contra una ú otra de las afecciones siguientes:—Convulsiones y epilepsia de los niños; *Afecciones morales y mentales* con el carácter de depresion, sobre todo en la *edad de la pubertad*, ó con exaltacion del *apetito venéreo*; sufrimientos de las mujeres en la edad crítica; *Erupciones de diversa naturaleza*; *Dolores de cabeza*, que afectan sobre todo la moral y la inteligencia; Afecciones del corazon; *Parálisis de las manos*; *Dolores de luxacion en la articulacion de las manos*: (*Estrechez de la uretra?*; Hinchazon de la próstata?)

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—*Grande laxitud con necesidad de acostarse*, sin que se alivie; torpeza en los miembros; grande abatimiento y debilidad, con cara pálida; debilidad física é intelectual.—La mayor parte de los sufrimientos se presentan estando sentados. El costado izquierdo parece afectarse con preferencia.—Dolores dislacerantes en las extremidades superiores é inferiores, al extenderlas.

Piel.—Prurito, con sensacion agradable despues de haberse frotado, principalmente en el *pecho y entre las escápulas*.—Manchas urticarias muy pruritosas, en muchos sitios; granos y pequeñas pústulas; erupciones secas, como herpes; °excrecencias secas, tuberculosas; °forúnculos.—°Carcinoma.

Sueño.—Bostezo frecuente, casi espasmódico; *gana continua de dormir*, sin que alivie el sueño.—Insomnio nocturno.—*Ensueños frecuentes*; penosos; espantosos; lascivos.

Fiebre.—Escalofrios y grande disposicion á ellos, aun en el calor del estío; frio, que comienza en la espalda.—Calor febril hácia la tarde, con renovamiento de todos los sufrimientos.

Moral é inteligencia.—Humor desapacible, descontento, hipocondríaco; cólera hasta intentar dar golpes á todo el mundo; por la tarde agravacion del mal humor con calor; disgusto de la vida hasta el suicidio; °gemido por la noche, al agitarse en la cama.—Nostalgia.—Inquietud que obliga á correr de aquí para allí; miedo al porvenir; chochez.—Imaginacion lasciva.—*Horror al trabajo é incapacidad de meditar*; *debilidad intelectual y física*.—Sensacion de ligereza y hormigueo en la cabeza, hasta el punto de hacerse loco.—Facilidad de asustarse al menor ruido, con dolor de cabeza.

Cabeza.—*Dolor de cabeza con vértigos y estupor, precedido de calor en la misma*; despues escalofrios, flatuosidades; aversion al tabaco, sed; mal humor, gana de dormir y bostezos.—*Dolores de cabeza violentos, con pesadez*; *dolores presivos*, principalmente en la frente y en las *sienes*; hormigueo y latidos en la frente.—Dolores de cabeza contínuos, tanto en el recogimiento como al aire libre.—Agravacion de los dolores de cabeza al andar con la cara al sol; alivio á la sombra.—Por la noche, disposi-

Digitized by Google

cion á hundir la cabeza en la almohada.—La cabeza se encuentra mejor estando acostado del lado dolorido.—Sensacion de ligereza y hormigueo en la cabeza.—Sacudidas eléctricas, que atraviesan el cerebro.—Los cabellos se secan, blanquean y caen.

Ojos.—Dolor al mover los ojos, con cefalalgia; *ardor en los ojos* y lagrimeo.—Mirada fija.—La llama de la bujía parece azul; al andar por la calle, manchas rojas, azules, verdes, delante de los ojos; al entrar en la habitacion, oscurecimiento de la vista.

Oidos.—Sensacion como si fuese á fluir el oido (derecho), obligando á introducirse el dedo.—Punzadas, terebracion y dislaceracion en el oido (izquierdo).—El ruido asusta con facilidad.

Nariz.—Sensacion de frio en la nariz al respirar.—Epistaxis, por la mañana; expulsion de pequeños pedazos de sangre por la nariz y boca.—Vibraciones ligeras en su punta.

Cara.—Palidez.—Calor en la cara, con agravacion de los síntomas del moral.

Boca y garganta.—Dolor de excoriacion en la boca.—Saliva abundante, con dolor de cabeza y de garganta.—Lengua súcia con puntos rojos.—Sensacion dolorosa como por una pelota en la garganta, al hablar y al tragar; dolor de las amígdalas.—Por las mañanas mucosidades tenaces en la garganta.

Gastricismo—Gusto amargo en la boca.—*Desgana, repugnancia por el tabaco.*—Deseo de cosas ácidas, picantes, con repugnancia por las cosas azucaradas y lengua blanca.—*Náuseas*, cuando sobreviene una corriente de aire.

Estómago y vientre—Sensacion de frio glacial en la region del estómago y el costado izquierdo, en los costados y en el vientre.—Sensacion de vacío en el vientre y en la cabeza; vientre duro, sin alivio defecando; *Dolores violentos alrededor del ombligo*, con ó sin emision abundante de flatuosidades.—Muchos flatos.

Defecacion y ano.—Cámaras blandas, con estilicidio de licor (prostático?) por la uretra despues de orinar; cámaras duras, voluminosas, nudosas.—Espasmos del esfinter del ano.

Orinas.—Frecuente emision de una orina acuosa.—Dis-

Digitized by Google

tension del ano á lo largo de la uretra; chorro penoso de orina, como si estuviese detenido por un tumor.

Partes viriles.—Distension y hormigueo en los testículos.—*Grande aumento del apetito venéreo*, con erecciones y poluciones.

Reglas.—Muy pronunciadas en su época respectiva.—Reglas que se anticipan quince dias sin ningun sufrimiento.

Laringe y tos.—Laringe como desollada, como si el aire que se respira estuviese demasiado frio; cosquilleo en la garganta, al respirar, que obliga á toser.—Tos, durante el sueño, sin despertar; tos hueca.—Expectoracion mucosa.

Pecho y respiracion.—*Punzadas*, sobre todo en el *costado izquierdo* del pecho; dolores distensivos, de abajo arriba, en el costado izquierdo del pecho; presion y distension de abajo arriba, del hipocondrio derecho hasta la escápula izquierda.—Frecuentemente al andar dolor en el *corazon*, como si se arrancase este órgano; con frecuencia *pulsaciones duras y violentas* del corazon, sobre todo al levantarse.

Tronco.—Dolor en la espalda; como en la médula espinal; bajo el omóplato izquierdo; á lo largo del espinazo, entre los omóplatos; en la region de las vértebras lumbares; entre el omóplato izquierdo y la columna; al tragar, al respirar, profundamente y al encorvarse del lado izquierdo.—Debilidad de la nuca, que apenas permite tener derecha la cabeza.

Miembros torácicos.—Pesadez en la espaldilla izquierda, como si tuviese encima un peso; el brazo á veces como paralizado.—En la mano derecha, hormigueo y captacion; *debilidad paralítica*, *rigidez y torpeza de las articulaciones carpianas*, sobre todo por la *mañana en la cama*; grande debilidad en las manos, que no permite tener nada; sensacion de luxacion y lisiadura en la articulacion carpiana izquierda.

Miembros pelvianos.—Fatiga y laxitud dolorosa, sobre todo en los muslos.—Sensacion de luxacion y lisiadura en la *rodilla*; con grande laxitud sobre todo al tenerse en pié.—*Calambres y dolores calambrosos en la planta de los piés*; debilidad y sequedad en las articulaciones y la planta del pié, hasta el punto de temer apoyarse en él.

Digitized by

—Parálisis, tension y distension en la articulacion del pié (derecho).— Piés frios.

101—HYDRASTIS CANADENSIS.

HYDRAS.—Hydrastis.—Véase Hale, *Remedios americanos.*

Se ha usado con feliz éxito contra: *Viruela* y *Varioloides* con pronunciada hinchazon, rubicundez y fuerte prurito, con dolor de garganta violento.—(Tumores escirrosos, Lupus; Intertrigo, Grietas y otras *Dermatosis*).—*Escorbuto*, con grande postracion de fuerzas y úlceras en las piernas. —*Ictericia*, con catarro gastro-duodenal, sensacion de debilidad en el epigastrio y palpitaciones del corazon, violentas y tenaces.—*Ulceras en la garganta.*—*Catarro* gástrico agudo, con acedías, estreñimiento, dolor sordo en el estómago y sensacion de desfallecimiento en el epigastrio. —*Estreñimiento*, con dolor de cabeza, hemorróides, cólicos acompañados de desfallecimiento y de calor en los intestinos, y despues de cada cámara, dolor persistente en el ano y el recto.—*Gonorrea*, con sensacion de desfallecimiento, despues de cada deposicion.—*Leucorrea*, con estilicidio viscoso, erosiones ulceradas en el cuello del útero y en la vagina, sensacion de una grande postracion y violentos latidos en el corazon.—*Bronquitis de los viejos*, con grande debilidad, estado caquéctico, desgana y abundante expectoracion, espesa, amarilla y viscosa.—*Escirro en el pecho*, tumor duro, pesado, adherido á la piel, con punzadas como por cuchillos.

102—HYDROCYANI ACIDUM.

HYDROC.—Acido prúsico.—Hartlaub y Trinks.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—Compárese: Lauroc.

SINTOMAS GENERALES.—Rápido *abatimiento y debilidad* de los miembros, especialmente de los muslos; extremada debilidad y laxitud; debilidad nerviosa.—*Espasmos*; espasmos del dorso; espasmos de la cara y de

Digitized by Google

las mandíbulas; convulsiones.—*Parálisis* de las extremidades inferiores, despues de las superiores; pérdida de la sensacion, despues rigidez de estas partes; temblor y vacilacion; inmovilidad, insensibilidad, rigidez del cuerpo.—*Accesos cataléptico*s; gran flexibilidad de los miembros; pulsaciones de corazon gradualmente mas lentas, mas pequeñas, mas insensibles hasta el letargo; disminucion del calor vital.—*Excitacion* de la actividad de los sentidos, sensacion interior de bien estar; dulce languidez con sensacion de laxitud placentera.—*Embotamiento* de los sentidos é insensibilidad á las influencias exteriores; *desaparicion de todo dolor*; insensibilidad; pérdida del conocimiento.—*Aberracion de los sentidos*; calofrios y laxitud.

Piel.—*Prurito* en diferentes partes, sobre todo entre la barba y los labios.—Pequeñas *pústulas* rojas en la cadera; *vesículas* quemantes, pruritosas, en las extremidades superiores y en el cuello.—Sequedad de la piel.—Palidez general con color azulado.

Sueño.—*Bostezos* frecuentes, algunas veces con horripilacion y espasmos en la piel.—*Deseo de dormir*, algunas veces invencible ó bien despues de la comida; sueño pesado por la mañana, *gana continua de dormir*, *coma vigil*, somnolencia.—*Insomnio*; sueño difícil, casi imposible; despierta frecuentemente.—*Ensueños* vivos no interrumpidos, ansiosos, penosos, de muerte.

Fiebre.—*Mucha sensibilidad al frio*, *horripilaciones* frecuentes despues de media noche ó por la mañana; horripilacion con bostezos ó con sed.—*Frio* en los miembros; sensacion de frio interior y exterior.—*Fiebre*, horripilacion, despues calor quemante; alternativa de violentos calofrios y de calor abrasador; calor en la cabeza con las extremidades frias, calor y sudor por todo el cuerpo despues de medio dia; agitacion febril general con excitacion violenta; accesos de calor y palpitaciones de corazon muy ligeras; desordenadas.—Durante el *calofrio* aturdimiento en la cabeza y vértigo; durante la *horripilacion*, niebla delante de la vista.

Moral.—Postracion; decaimiento.—Angustia y opresion; angustia en la boca del estómago; temor de males imaginarios.—Mucha *irritabilidad*; humor importuno; humor triste; incapacidad para trabajar.

Digitized by Google

Cabeza.—*Pereza para pensar* con atontamiento en la cabeza, *imposibilidad de reflexionar* y de reunir sus ideas; memoria muy débil; repugnancia á toda fatiga moral.—Cabeza *atontada* y pesada, aturdimiento con decaimiento del cuerpo; aturdimiento algunas veces con sensacion de embriaguez.—*Oscurecimiento de los sentidos*, algunas veces con vacilacion de los objetos y un velo delante de la vista, y con dificultad de sostenerse sobre las piernas al enderezarse despues de haberse bajado, y levantándose de su silla, con agravacion al aire libre.—*Vértigo* algunas veces con vacilacion; sensacion como si alguna cosa se moviese en el aire *y le atrajera hácia sí*, ó como si todo rodara alrededor de sí.—Cefalalgia con vértigo; cefalalgia con atolondramiento, dolor sordo en la frente partiendo de las sienes.—Cabeza *pesada*, y embrutecimiento.—*Cefalalgia presiva* en la frente, ó bien en el occipucio, á la izquierda, hácia la region frontal; cefalalgia muy fuerte en el sincipucio y el occipucio, desde el vértice hasta la frente y las órbitas; cefalalgia *en el lado de la cabeza* (derecho ó izquierdo), especialmente en el vértice y en la frente; cefalalgia en diversas partes de la cabeza.—*Tension* en la region frontal; *punzadas* en varios puntos de la cabeza.

Ojos.—*Ojos* medio abiertos, vueltos hácia arriba, fijos, inmóviles; dificultad de mover el globo de los ojos.—*Pupilas* dilatadas é inmóviles; insensibilidad á la claridad.—Dilatacion de los *párpados*; inmóviles; como paralizados; estremecimiento espasmódico en los párpados superiores.—Oscurecimiento de la vista; turbacion y niebla en la vista; amaurosis.

Oidos.—*Presion* en el interior de los oidos, algunas veces con ruido y resonancia.—Dureza de oido.

Nariz.—*Escozor* en la punta de la nariz; dilatacion de las alas de la nariz las que tienen un color *azulado*.—Sequedad de la nariz.

Cara.—Abotagamiento de la cara; cara macilenta; *cara* avejentada, pálida y azulada; aspecto de color térreo y gris, expresion de beatitud en las facciones; retraccion de los ángulos de la boca; *trismus*; contracciones horribles de los músculos de la cara.

Boca.—Garganta.—Sequedad de la boca.—*Secrecion de saliva aumentada.—Lengua cargada*, algunas veces blanca,

Digitized by

despues oscura y súcia; contraccion en la raiz de la lengua; sensacion de frio en la lengua; sensacion de ardor en la punta de la lengua; *parálisis* y rigidez de la lengua, que á veces sale de la boca; pérdida de la palabra. —Dolores en el *paladar*; inflamacion del paladar.— *Espasmos en la faringe y el esófago*; arañamiento en la garganta y el gaznate; picor penoso en la garganta; ardor en la garganta y en el esófago; *sensacion de ardor* en el paladar, el gaznate y el esófago, *inflamacion* de la garganta y del esófago.

Síntomas gástricos.— *Gusto* dulce, fétido, ágrio é irritante; muchos gases hácia la boca, con gusto de ácido prúsico. —Anorexia, repugnancia á los alimentos.— Adipsia, con calor en todo el cuerpo; sed ardiente.— *Repugnancia*, gana de vomitar; vómitos de un líquido negro.

Estómago.—Deposiciones.—*Dolor de estómago*, sensacion de frio en el estómago, algunas veces con punzadas, presion y apretamiento en la boca del estómago, con fuerte opresion; contracciones espasmódicas en el estómago, ardor y sensacion de ardor, ó bien *inflamacion* del estómago y de los intestinos; dolores pulsativos en la region precordial.— Frio en todo el *vientre*, algunas veces alternando con sensacion de ardor; ruido sordo y borborigmos en el bajo vientre; hinchazon blanda del vientre; sin tension.— *Deposicion* involuntaria.

Orinas.—*Retencion de orina.*— Emision frecuente de orinas; emision abundante de una orina acuosa, pálida ó de un amarillo pálido, que deposita una nube turbia.— Orina, con sedimento espeso y rojizo.— Emision involuntaria de las orinas.—Sensacion de ardor en la *uretra.*

Laringe.—**Tos**.—Picor doloroso y sensacion de ardor en la laringe; *inflamacion* en la laringe; sensacion como de hinchazon en la laringe; *constricion* de la garganta; cosquilleo en la laringe; algunas veces punzadas y tirones; aspereza y enronquecimiento de la voz.— *Voz fuerte*; tusiculacion frecuente, por escozor en la laringe; hemoptisis.

Pecho.—Respiracion.—*Respiracion* estertorosa, dolorosa, lenta, muy difícil, con resuello mucoso; dificultad de la respiracion, á causa de punzadas en la laringe; necesidad de respirar profundamente; respiracion profunda,

Digitized by

frecuente y ruidosa; respiracion ansiosa, parálisis de los pulmones; *opresion de pecho, asma*, algunas veces penosa, sensacion de sofocacion, con dolores penosos en el pecho; fuerte opresion y *constricion de pecho.—Dolores* vivos en el pecho, presion en el lado derecho del pecho; *punzadas en el lado izquierdo*; encima del cartílago inferior del esternon ó cerca de esta parte, en el pecho, respirando profundamente.— En la *region del corazon*, dolores y presion; palpitaciones de corazon; movimientos irregulares del mismo órgano; pulsaciones débiles en el corazon.

103.—HYOSCYAMUS NIGER.

HYOS.—Beleño negro.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: 8 á 15 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Bell. camph. chin.—*Se emplea como antidpto de:* Bell. plumb.

COMPÁRESE CON: Acon. arn. *bell.* camph. cham. chin. dros. graph. ign. lach. *n-vom. op.* phos. plat. *plumb.* ruhs. rut. *stram. veratr.*—Sobre todo despues de. *bell.* es cuando el *hyosc.* conviene, si se ha la indicado.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra: —Afecciones á consecuencia de un enfriamiento, de un sobresalto con angustia, ó de una contrariedad; Convulsiones, calambres, espasmos histéricos, epilepsia; baile de San Vito y otras *afecciones espasmódicas*, principalmente en las mujeres embarazadas ó de sobreparto, así como en los niños á causa de las lombrices; Inflamaciones con síntomas nerviosos; *Sobreexcitacion nerviosa con insomnio*; Fiebre tifoídea, tambien cuando sobreviene á consecuencia del cólera; Fiebres intermitentes; Fiebre con afecciones verminosas?; Imbecilidad; Delirium tremens; Vesania, manía, rabia y otras *enajenaciones mentales;* Hidrofobia; *Encefalitis*; Hidrocéfalo agudo?; Jaqueca; Ambliopia amaurótica con hemeralopia; Presbiopia; Odontalgia debida á un enfriamiento; Hipo espasmódico; Dispépsia con vómito de los alimentos, tambien en los niños; Hematémesis, aun la que es producida á consecuencia de un enfriamiento; Gastritis?; Enteritis?; Cólicos espasmódicos; Diarrea, sobre todo en las mujeres recien pa-

ridas; Parálisis del esfínter del ano; Parálisis de la vejiga; Espasmos, diarrea y otras afecciones de las mujeres embarazadas ó recien paridas; Calambres de la matriz?; Fiebre puerperal; Convulsiones, vómitos y otras afecciones de los recien nacidos; Tos en los viejos, así como la que es consecutiva al sarampion; Tos convulsiva; Calambres de pecho; Neumonía con fenómenos nerviosos?; Tísis incipiente; Afecciones orgánicas del corazon, etc., etc.
Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dislaceracion incisiva y tirones sordos en los miembros y las articulaciones.—Miembros frios, temblorosos, adormecidos.—**Movimientos convulsivos* y sacudidas de algunos miembros ó de todo el cuerpo, á veces, *por poco que se intente tragar los liquidos*.—*Agitacion de los piés y de las manos.—*Ataques de epilépsia, algunas veces con *calor azulado y abotagamiento de la cara*, *emision involuntaria de las orinas*, *espuma en la boca*, retraccion de los pulgares, sensacion de hambre y como si royeran en la boca del estómago, *ojos prominentes*, gritos, rechinamiento de dientes, etc.—Convulsiones epilépticas, alternando *con accesos de congestion cerebral* (golpe de sangre).—*Convulsiones semejantes al baile de San Vito.—**Convulsiones con gritos*, *mucha angustia*, opresion de pecho y pérdida del conocimiento.—Despues de las convulsiones epilépticas sueño profundo con ronquido.—Accesos de desvanecimiento.—*Excesiva flojedad y debilidad*.—Hemiplegias y parálisis.—*Sobresaltos de los tendones.—La mayor parte de los síntomas y los principales se manifiestan despues de haber bebido ó comido, así como por la tarde.

Piel.—Piel seca y áspera.—Erupcion miliar.—Erupcion de granos secos, como una viruela confluente.—*Manchas parduscas en el cuerpo, de tiempo en tiempo.—Gruesos forúnculos, frecuentes.—Manchas y vesículas gangrenosas en diversas partes.—Sangran las úlceras.—*Pústulas como la viruela.

Sueño.—**Somnolencia* como un *coma vigil*.—*Sueño tardío ó *insomnio á consecuencia de sobreexcitacion nerviosa ó de mucha angustia*, algunas veces con convulsiones y sobresaltos.—*Sueño profundo, comatoso, con convulsio-

Digitized by Google

nes y movimientos involuntarios de los miembros, y sobre todo de las manos.—°Durmiendo, carfología, ó fisonomía risueña, ó sobresaltos con horror.

Fiebre. — Horripilacion desde los piés hasta la cabeza.—Calor ardoroso del cuerpo y especialmente de la cabeza. —*Fiebre con ataques de epilepsia, mucha debilidad, llamas delante de los ojos, y congestion á la cabeza; tipo cuartano ó cotidiano.—Pulso acelerado con hinchazon de las venas.—Frio general en todo el cuerpo, con calor de la cara.—Calor por la tarde, con sed y gusto pútrido. —Sudor durante el sueño.—°Sudores frecuentes y abundantes.

Moral.—*Melancolía.*—Antropofobia. —Desconfianza.—Angustia y miedo. —°Deseo de escaparse de casa por la noche.—*Miedo de ser engañado alevosamente ó envenenado.—*Deseo de burlarse de todo.*—Locuacidad.—°*Celos.*—Humor regañon y querelloso.—°*Furor con deseo de herir y de matar.*—*Estupidez con gritos lastimeros, especialmente al menor contacto, y apatía completa.— Pérdida de la memoria.—**Pérdida del conocimiento*, con los ojos cerrados y delirios acerca de sus ocupaciones.—**Delirios*, °algunas veces con temblor y accesos de convulsiones epilépticas.—Divagaciones.— Vesania, como por posesion del diablo.— Todas sus acciones son depravadas.— *Mania* con pérdida del conocimiento, ó con bufonadas y gestos ridículos.—*Mania* lasciva.—Risas y habladurías insensatas.

Cabeza. — Confusion y pesadez de la cabeza.—*Vértigo como por embriaguez ó con oscurecimiento de la vista. —Accesos de congestion cerebral con pérdida del conocimiento é hinchazon.— Dolor de cabeza, como por estremecimiento del cerebro.— *Dolor presivo y atolondramiento en la frente*, sobre todo despues de la comida.— Pesadez constrictiva en la frente.—Sensacion de fluctuacion ó de conmocion en el cerebro, sobre todo andando. —Calor y hormigueo en la cabeza.—Dolor de cabeza alternando con dolor en la nuca.—*Balanceo de la cabeza de un lado á otro.*

Ojos.—Ojos abatidos y empañados.—**Ojos encendidos, fijos, convulsos* y prominentes.— *Movimientos espasmódicos de los ojos.—Rubicundez de la esclerótica.—Hinchazon de los párpados.—*Estrabismo.*—**Oclusion espasmódica de*

los párpados.—*Pupilas dilatadas.—Turbacion de la vista. —Miopia ó *presbiopia.*—Errores de la vision.—*Diplopia.*—*Los objetos parecen mayores de lo que son en realidad*, ó bien teñidos de rojo.—°*Ceguera nocturna.*—Debilidad de la vista como por una amaurosis incipiente.

Oidos y nariz.—Zumbido en los oidos.—Dureza del oido como por aturdimiento.—Epistaxis.—Presion calambroídea en la raiz de la nariz.—Pérdida del olfato.

Cara.—**Cara* fria, pálida, azulada, ó *tumefacta y de un rojo como de color de sangre.*—Presion calambroídea en el pómulo.—Sequedad de los labios.—**Calambre en la mandíbula.*

Dientes.—**Dolores pulsativos y desgarradores en los dientes*, sintiéndose estos desde la mejilla hasta la frente, *sobre todo despues de un enfriamiento al aire libre*, ó por la mañana y frecuentemente con *congestion á la cabeza*, *calor y rubicundez de la cara*, hinchazon de las encías y espasmos en la garganta.—Dolores de dislaceracion en las encías, con zumbido y sensacion de vacilacion en los dientes.—*Apretamiento de los dientes.*—°Dientes cubiertos de mucosidades.—°Sensacion como de prolongacion de los dientes.

Boca y garganta.—Sequedad de la boca.—*Salivacion* de un gusto salado.—Saliva sanguinolenta.—**Espuma en la boca.*—Salida de un olor fétido por la boca, percibido por sí mismo.—Ardor y torpeza en la lengua, como si estuviera quemada.—°Lengua seca, cubierta de una capa pardusca.—**Rubicundez de la lengua.*—Parálisis de la lengua.—*Pérdida de la palabra.—Sequedad y calor ardiente en la garganta.—**Constriccion de la garganta é imposibilidad de tragar los liquidos.*—°*Hinchazon y estrechamiento de la garganta.*

Apetito y estómago.—Pérdida del gusto.—*Bulimia* con mucha sed.—Horror á las bebidas.—**Hipo*, sobre todo despues de la comida.—Despues de la comida, dolor de cabeza, embriaguez, mucha angustia y tristeza.—Convulsiones despues de haber bebido.—Náuseas comprimiendo el epigastrio.—*Vomituricion y vómitos, con dolores cólicos que obligan á gritar.—Vómitos acuosos, con vértigos.—**Vómitos de mucosidades (sanguinolentas) °y de sangre*, de un rojo oscuro, algunas veces con convulsiones, sofocacion, dolores en la boca del estómago,

mucha extenuacion y frio en los miembros.—**Vómitos de los alimentos*, inmediatamente despues de la comida, y algunas veces con dolores violentos en la boca del estómago.—*Calambres de estómago*, por accesos periódicos y aliviados por vómitos.—*Sensibilidad dolorosa del epigastrio al tacto.—Inflamacion del estómago con dolor ardiente.

Vientre.—°Dolores sordos en la region hepática.—*Vientre tenso, meteorizado, doloroso al tacto.—**Dolores calambroideos en el vientre*, y dolores cólicos, á veces, *acompañados de vómitos*, con dolor de cabeza y gritos.—Punzadas en la region umbilical andando y respirando.—°Dolor de excoriacion en los músculos abdominales al toser.

Deposiciones.—Estreñimiento por debilidad de los intestinos.—*Conato frecuente de deponer*, con emision poco abundante y poco frecuente.—*Diarreas acuosas*.—*Diarreas sin ningun dolor.—Diarreas mucosas.—**Deposiciones involuntarias*, por parálisis del esfínter del ano.

Orinas.—Retencion de orina.—*Gana frecuente de orinar*, con emision poco abundante.—Orina abundante y clara como agua.—Flujo de orina.—**Emision involuntaria de orinas*; como por parálisis de la vejiga.

Partes genitales.—Exaltacion del apetito venéreo.—Impotencia.—*Reglas mas abundantes*.—Supresion de las reglas.—*Metrorragias*, de sangre de un color encarnado vivo.—Durante las reglas, delirio, flujo de orina, sudor y temblor convulsivo.—Antes de las reglas, *calambres histéricos* y risas estrepitosas.

Laringe.—Catarro con acumulacion de mucosidades en la laringe y la tráquea-arteria, lo que hace percibir confusamente la voz y la palabra.—Tos contínua estando acostado, que cesa incorporándose.—Tos por acceso como en la coqueluche.—**Tos calambroidea nocturna*, sobre todo estando echado, °algunas veces con rubicundez del rostro y vómito de mucosidades.—°Tos seca, que conmueve, sollozante, con dolor de excoriacion en los músculos abdominales.—Expectoracion verdosa al toser.—Tos con expectoracion sanguinolenta y convulsiones.

Pecho.—Opresion de pecho y respiracion embarazosa y estertorosa.—Presion en el costado derecho del pecho, con mucha ansiedad y respiracion acelerada subiendo

una escalera.—*Espasmos de pecho*, con respiracion corta, obligando á incorporarse hácia adelante.—Punzadas en los costados del pecho.

Tronco.—Dolores en el dorso, y sobre todo en los lomos, con hinchazon en los piés.—Punzadas en los lomos y los omóplatos.—Manchas herpéticas en la nuca.

Brazos.—Temblor en los brazos y en las manos, sobre todo por la tarde, despues del menor movimiento.—Torpeza dolorosa y rigidez de las manos.—Hinchazon de las manos.—Puño cerrado, con retraccion de los pulgares (en los accesos convulsivos).—Carfologia.

Piernas.—*Calambres dolorosos en los muslos y en las pantorrillas*, que obliga á encoger las piernas.—Manchas gangrenosas y vesículas en las piernas.—Rigidez y abatimiento en las articulaciones de las rodillas.—Hinchazon de los piés.—Contraccion de los dedos, andando y subiendo una escalera.

104.—IATROPHA CURCAS.

IAT.—Piñon grande de la India, Higo infernal, Ricino de América.—Hering.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—Medicamento poco conocido.

CLINICA.—Al examinar los síntomas característicos de este medicamento, se verá los casos en que podrá consultarse con éxito contra las afecciones siguientes: Diferentes erupciones; contracturas; Dolores reumáticos en los miembros y las articulaciones; sordera; vómitos de las mujeres en cinta; Gastritis; Cólicos; Enteritis; Cólera asiático; Lombrices y Ascárides.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores en diferentes sitios; **dolores reumáticos en los músculos y las articulaciones*; dolores musculares que alternan con cólicos; dolores musculares en la posicion sentada; curvatura despues de andar.—Convulsiones; **espasmos tónicos, con vómitos y diarrea.*—Grande postracion de fuerzas.—Erupciones; hinchazones.—*Sufrimientos nocturnos*; angustias en el

pecho; latidos del corazon; ensueños abundantes; sequedad de la boca; sudor al dormir.—Frio general del cuerpo; frio en la espalda; horripilacion y escalofrios; frio en las vértebras lumbares; *sudor con debilidad*; sudores viscosos.—**El agua fria alivia.*—Angustia nocturna en el pecho; *grande ansiedad; arrebatos de cólera en los ensueños; éxtasis.

Cabeza.—Orejas.— Congestion en la cabeza; *Calor en la cabeza*; con pesadez, embarazo, orejas calientes, bostezos y desgana; *calor en el occipucio*, calor en el sincipucio; cabeza ardiente; con horripilacion en el dorso.—Zumbido en los *oidos*; en las orejas dolor, punzadas, ardor.— Prurito en la *nariz*, al comer.

Organos de la digestion.—*Boca seca, sin sed*, con calor y quemazon; sensacion como de quemadura, hasta en la garganta; saliva abundante, con náuseas.—**Vómito fácil y muy abundante de materias acuosas, como albuminosas*, con diarrea.—En el *estómago*: *calor*, *ardor*, *quemazon*, presion, contraccion calambrosa, dolor incisivo; *sensibilidad á la presion*; sensacion de debilidad en el estómago y la boca del estómago.—**Grande ansiedad en el estómago*; inflamacion del estómago y de los intestinos.—Vientre timpanítico y dolorido; dolores en la region umbilical, á la izquierda (hácia arriba) y á lo largo de la columna vertebral; borborigmos y dolores en el vientre; **Cloqueo como por líquidos*, antes, pero principalmente *despues de las cámaras diarréicas.—**Diarreas acuosas, saliendo como un chorro de agua*; antes de la deposicion diarréica, escalofrio en el interior de las vértebras lumbares.—En el *recto*, quemazon, punzadas, hormigueo, prurito.—Despues del calor umbilical y de las náuseas, calambres y punzadas en el cuello de la vejiga.

Pecho, tronco y miembros.— Dolor lancinante detrás del esternon; punzadas en la region del corazon, pulsaciones mas fuertes del corazon; dolor en la clavícula izquierda á lo largo del nervio ulnar.—En los músculos *lumbares*: presion, punzadas, rigidez; dolores que vienen del vientre.—En la *espina dorsal*: dolores; calor, que pasa á las vértebras; escalofrios en el interior de la espina.—Rigidez en la nuca.—En los *dedos*: dolor, prurito.—En las *rodillas*: laxitud, curvatura, presion, dis-

laceracion.—En las *pantorrillas*: **Calambres*; presion, distension, punzadas, rigidez, curvatura, pulsaciones. —*Dolores calambrosos* en las piernas, con distorsion de las pantorrillas hasta la tibia.—En los *piés*: dolores, distensiones, punzadas, hormigueo.—Prurito en los dedos gordos de los piés.

105.—IGNATIA AMARA.

IGN.—Haba de San Ignacio.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop, —*Dósis usadas*: 30 —*Duracion de accion*: hasta 9 dias algunas veces.

ANTÍDOTOS: Arn. camph. cham. cocc. coff. puls.—*Se emplea como antídoto de*: Cham. coff. puls. zinc.

COMPÁRESE CON: *Alum. arn.* calad. caps. *caus. cham.* cin. *cocc. coff.* croc. hyosc. *ipec.* mez. mosch. natr-m. n-mosch. *n-vom.* par. phos-ac. *puls.* rhus. rut. sabad sec. sep. s'ann. staph, sulf. tart. valer. veratr. *zinc.*—Sobre todo despues de *ipec.*, es cuando la *ign.* conviene algunas veces, si por otra par e se halla indicada.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en los que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones principalmente de *personas sensibles*, de un temperamento nervioso é inclinadas á concentrar en sí mismas los pesares que sufren; Afecciones del sexo femenino y sobre todo de las mujeres histéricas; *Consecuencias desagradables de una afliccion, de un pesar concentrado; de un amor desgraciado*, etc.; Malas consecuencias por el abuso del café ó de la camomila; Accesos de desfallecimiento y de debilidad histérica; Calambres, convulsiones; epilepsia y otras *afecciones espasmódicas*, sobre todo *debidas á un susto ó á una contrariedad*, y principalmente en las mujeres histéricas ó en los niños durante la denticion; Fiebres intermitentes; Fiebres catarrales y reumáticas; Fiebres lentas?; Melancolía y otras afecciones morales á consecuencia de una afliccion; Histerismo; Hemicráneas y cefalalgias nerviosas é histéricas; Cefalalgia y caida de los cabellos á consecuencia de disgustos; Oftalmía y fotofobia escrofulosas; Coriza crónico; Odontalgia, especialmente en las mujeres histéricas; Denticion difícil de los niños con convulsiones; Amigdalitis y otras anginas, aun las que son consecuencia de la escarlatina; Gastralgia; Gastritis, dispepsia y otras afecciones gástricas; Afecciones biliosas; Esplenalgia; Cólicos, sobre todo en

las mujeres histéricas, afecciones verminosas; Prolapsus del recto, tambien en los niños; *Dismenorrea;* Clorósis?; *Calambres de la matriz*; Convulsiones y otras afecciones espasmódicas de las mujeres recien paridas y de los recien nacidos; Excoriacion de los niños, sobre todo la que proviene del abuso de la camomila, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES. — *Dolores* simples y *violentos*, *únicamente al tacto*, en diversas partes. — *Presion incisiva ó aguda, y algunas veces dura* en los miembros y otros puntos.—Punzadas como por cuchillos.—**Sensacion de desviacion ó de constriccion* en los órganos internos.—Dolores dislacerantes artríticos en los miembros.—*Dolor de luxacion ó de relajacion en las articulaciones.*—*Dolores de contusion ó de magulladura, especialmente en el periostio, y principalmente estando acostado de lado.—Hormigueo como si escarbaran en los miembros.—Pesadez y *adormecimiento con hormigueo en los miembros.*—**Ataques de calambres y de convulsiones*, °algunas veces con ansiedad, *accesos de sofocacion*, *ranversamiento de cabeza*, cara azulada ó roja, espasmos de la garganta, pérdida del conocimiento, etc.—°Convulsiones epilépticas con espuma en la boca, *bostezos frecuentes*, ojos convulsos, retraccion de los pulgares, *cara encendida* ó alternativamente pálida y roja, etc.—°Movimientos involuntarios de los miembros, como en el baile de San Vito.—°*Despues de las convulsiones*, suspiros profundos ó sueño soporoso.—Mucha susceptibilidad al aire libre.—Convulsiones con gritos y risas.—Tétanos.—**Debilidad histérica y accesos de desvanecimiento.*—**Los síntomas se manifiestan sobre todo inmediatamente despues de la comida*, así como *por la noche despues de haberse acostado ó por la mañana cuando acaba de levantarse.*—*El café, *el tabaco*, el aguardiente y el ruido agravan considerablemente los dolores.—**Los dolores se disipan, ya en estando acostado sobre el dorso, ya en acostándose sobre la parte afecta ó sobre el lado sano*, pero siempre *por el cambio de posicion.*—*Dolores nocturnos que turban el sueño.

Piel. — *Prurito que se disipa fácilmente en rascándose.*—Sabañones.—**Excoriacion de la piel.*—Prurito en entrando en

Digitized by

calor al aire libre.—Erupcion urticaria en todo el cuerpo con prurito violento (durante la fiebre).

Sueño.—*Sueño profundo* y comatoso, no reparador, con respiracion ruidosa.—*Bostezos espasmódicos violentos*, especialmente por la mañana ó despues de la siesta.—Sueño muy ligero.—*Sueño agitado* con gemidos, lamentos, muchas palabras, pesadilla, ó sobresaltos y ensueños frecuentes.—Estremecimiento de los miembros en durmiéndose.—**Ensueños* con reflexiones y razonamientos, *ó con ideas fijas*.—Sobresaltos con espanto en durmiéndose.

Fiebre.—*Despeluzamiento febril*, sobre todo en el dorso y los brazos, *con sed* de agua fria, y algunas veces con náuseas y vómitos.—°Despeluzamiento, con agravacion de los dolores.—Alivio del frio por el calor exterior.—**Calor general*, sobre todo en la cabeza, *con rubicundez, principalmente de una de las mejillas* y *adipsia*, algunas veces con *horripilacion interior*, frio en los piés, punzadas en los miembros y dolor de cabeza.—Accesos súbitos de calor fugaz por todo el cuerpo.—Sensacion penosa de calor, algunas veces con sudor.—**Falta de sed durante el calor y la transpiracion* ó en la apirexia.—Calor y rubicundez de la piel, siendo insoportable el calor exterior.—°*Fiebres con dolores de cabeza, y en la boca del estómago excesiva fatiga, palidez de la cara* ó palidez y rubicundez alternadas, labios secos y esquebrajados, erupcion urticaria, lengua blanca, sueño profundo con ronquido, etc.—Sudor con punzadas y zumbido en los oidos.—Sudores durante la comida.

Moral.—*Tristeza y *pesar concentrado, con suspiros*.—Irresolucion.—Impaciencia.—**Mucha disposicion á asustarse*.—**Humor melancólico* y apesadumbrado: pensando á pesar suyo en cosas penosas y desagradables.—Descaro.—*Carácter tierno y conciencia delicada*.—Inconstancia.—*Alternativa de *alegria excesiva y de tristeza con lloros*.—**Laconismo*.—*Mucha debilidad de la memoria.—**Amor á la soledad*.—*Angustia, °sobre todo por la mañana, al despertar, ó por la noche, algunas veces con palpitaciones de corazon.—**Humor lloroso* é indiferente, con horror al trabajo.—*Pesadumbre roedora en el corazon.—¡*Desespera de su curacion.—La menor contradiccion irrita hasta la cólera y la furia, con rubicundez de la cara.—Miedo

Digitized by Google

de ladrones por la noche.—Gritos y decaimiento total por la menor cosa.—Humor excesivamente variable.

Cabeza.—*Vértigos, °con chispas delante de los ojos.—Mucha pesadez de la cabeza, como si estuviera llena de sangre.—*Dolor de cabeza presivo*, sobre todo encima de la raiz de la nariz, y frecuentemente acompañado de gana de vomitar, *agravado ó aliviado en bajándose.*—*Presion calambroídea en la frente y en el occipucio, °con oscurecimiento de la vista, rubicundez de la cara y lagrimeo.—**Sensacion de expansion dolorosa en la cabeza*, como si el cráneo fuese á estallar, en particular conversando mucho, *en leyendo ó en oyendo hablar.—Dolor de contusion en la cabeza, sobre todo por la mañana al despertar.—*Los dolores de cabeza se agravan bebiendo café, ó aguardiente, ó por el humo del tabaco, el ruido y los olores fuertes.—**Dolor de cabeza como si tuviera introducido un clavo en el cerebro.*—Dolores dislacerantes, terebrantes y lancinantes, profundos en el cerebro *y en la frente*, aliviados en acostándose.—*Dolor de cabeza presivo*, con estremecimiento.—°Temblor en la cabeza.—°*Opistótonos*.—*Caida de los cabellos.

Ojos.—**Presion en los ojos*, algunas veces como si hubiera arena introducida en ellos.—*Inflamacion de los ojos.—°Rubicundez de los ojos.—Aglutinacion de los párpados.—*Lagrimeo, °sobre todo á la claridad del sol.—Hinchazon del párpado superior, con infarto de las venas.—Inflamacion de la parte superior del globo del ojo.—*Movimientos convulsivos de los ojos* y de los párpados.—Fijeza de la mirada con dilatacion de las pupilas.—*Fotofobia*.—*Vista turbia, como á través de una niebla.

Oidos.—°*Hinchazon de las parótidas* con dolor lancinante. Rubicundez y calor quemante de *uno* de los oidos.—*Dureza de oido, °excepto para la voz humana.

Nariz.—Prurito en la nariz.—*Ventanillas nasales escoriadas*, ulceradas, con hinchazon de la nariz.—Epistaxis.—*Coriza seco*, dolor sordo de cabeza y sobreexcitacion nerviosa.—Sequedad de la nariz.

Cara.—°Cara pálida, roja ó azulada, ó de un color térreo, y macilenta.—Sudor únicamente en la cara.—°Alternativas de palidez y color encendido.—*Rubicundez y calor abrasador de una de las mejillas.—°*Estremecimiento convulsivo y distorsion de los músculos de la cara.*—Erup-

Digitized by

cion en la cara.—*Labios secos*, agrietados y que sangran. —Dolor de excoriacion en la cara interna del labio inferior.—Costras en las comisuras de los labios y en los labios.—Dolores en las glándulas submaxilares.—°*Estremecimiento convulsivo de los ángulos de la boca.*—*Apretamiento espasmódico de las mandíbulas.

Dientes. — Odontalgia, como si los dientes estuvieran quebrantados.—Vacilacion de los dientes.—Las odontalgias se reproducen hasta el fin de la comida y aun se agravan despues.

Boca.—Inflamacion de la boca y rubicundez de esta y del paladar.—*Mucosidades contínuas ó *acumulacion de una saliva ácida en la boca.*—*Se muerde fácilmente la lengua en mascando ó en hablando.—Lengua húmeda, cubierta de una capa blanca.—Punzadas en el velo del paladar hasta la oreja.—°Espuma en la boca.—Voz débil, temblorosa.

Garganta. —*Ligero dolor en la garganta* al tiempo de la deglucion, *como si hubiera dentro una espina.*—Velo del paladar encendido é inflamado, con sensacion como si lo que se traga pasara sobre un tumor ardoroso y excoriado.—*Punzadas en la garganta*, extendiéndose algunas veces hasta el oido, principalmente *fuera del tiempo de la deglucion.*—Inflamacion, hinchazon y endurecimiento de las amígdalas, con pequeñas úlceras.—*Dificultad para deglutir* (las bebidas).—Constriccion de la garganta, con erutos sollozantes.

Apetito.—**Repugnancia* á los alimentos y bebidas, especialmente *á la leche*, la carne, los alimentos cocidos y el *humo del tabaco.*—*Falta de apetito y pronta saciedad.—*Gusto soso como el de la creta.—Debilidad y dificultad de la digestion.—Gusto amargo y pútrido de los alimentos, sobre todo de la cerveza.—Repugnancia, ó mucho deseo de cosas ácidas.—Repugnancia al vino y el aguardiente.—*Despues de la comida, timpanitis dolorosa.*—Desea diferentes cosas de las que no hace caso despues que las ha obtenido.—Insipidez de los alimentos.—La leche que se ha tomado por la mañana deja mal gusto por largo tiempo.—Despues de haber fumado, hipo, náuseas, sudores y cólicos.

Estómago.—*Regurgitacion de los alimentos ó de serosidades amargas.—**Hipo todas las veces que se ha bebido ó co-*

mido.—Erutos ácidos.—Náuseas con agitacion y angustia.—*Vómito de los alimentos*, aun por la noche.—Vómitos de bilis y de mucosidades.—Accesos periódicos de *calambres en el estómago*, que turban el sueño de noche, y se agravan en comprimiendo la parte afecta.—Presion sorda ó punzadas en el epigastrio.—Frio ó sensacion de ardor en el estómago, sobre todo despues de haber bebido aguardiente.—*Sensacion de vacuidad y de debilidad en el epigastrio*.—Sensibilidad dolorosa de la boca del estómago al tacto.

Vientre.—*Sensacion de plenitud y timpanitis en los hipocondrios*, con dificultad en la respiracion.—*Dolor en el hipocondrio izquierdo*, agravado por la presion y el andar.—Punzada, sensacion de ardor y presion, ó hinchazon y dureza en la region del bazo.—Dolor expansivo en el vientre, como si los intestinos quisieran abrirse.—Timpanitis.—Dolores cólicos en la region umbilical.—Presion violenta en el vientre.—Borborigmos alrededor del ombligo.—Los dolores de vientre se agravan despues de haber tomado café, aguardiente ó cosas azucaradas.—Punzadas y *pellizcos en el vientre*, sobre todo en los lados.—Dolores calambroídeos periódicos en el vientre.—Presion calambroídea en la region inguinal.—Pulsacion en el vientre.—Ruido como el del agua y borborigmos en los intestinos.—*Cólicos flatulentos*, especialmente por la noche.—Sensacion de debilidad y temblor en el vientre con respiracion suspirosa.

Deposiciones.—*Deposiciones duras con deseo frecuente é inútil.—Deposiciones amarillas, blanquecinas*, de forma amoldada muy voluminosa y difícil de evacuar.—*Diarrea de mucosidades sanguinolentas*, con ruido como el del agua en el vientre.—Deposiciones mucosas, acompañadas de cólicos.—Evacuacion de sangre por el ano.—Prolapsus del recto durante las deposiciones.—*Prurito y hormigueo en el ano*.—Ascárides por el recto.—Encogimiento del ano.—*Dolor contractivo de excoriacion en el ano*, despues de las deposiciones.—Punzadas en el ano hasta lo interior del recto.—Escozor en el recto, durante las deposiciones diarréicas.

Orinas.—Emision frecuente y abundante de una orina acuosa.—Orina de un amarillo color de limon.—Emision involuntaria de las orinas.—Necesidad urgente ó

irresistible de orinar.—Necesidad contínua de orinar, despues de haber tomado café.—Al orinar, sensacion de ardor y escozor en la uretra.

Partes viriles.—Mucho prurito en las partes genitales y en el miembro, por la noche despues de estar acostado, que se disipa rascándose.—Dolor de *excoriacion* y de ulceracion en los bordes del prepucio.—Compresion y presion en los testículos, sobre todo por la noche despues de acostado.—Sudor en el escroto.—*Lascivia é imágenes voluptuosas, con debilidad de la potencia genital.*—Ausencia de apetito venéreo.—Ereccion con incomodidad dolorosa y presion en el púbis.—Erecciones durante todas las deposiciones.

Reglas.—*Reglas muy anticipadas y abundantes, de cada 10 á 15 dias.—La sangre de las reglas es negra, mezclada de cuajarones.—°Durante las reglas, pesadez, calor y dolor en la cabeza, fotofobia, cólicos con dolores contractivos, ansiedad, palpitaciones de corazon y mucha fatiga hasta el desfallecimiento.—**Dolores calambroideos y compresivos en la region del útero*, con sofocacion; la presion y el acostarse sobre el dorso alivian el dolor.—*Calambres de la matriz durante las reglas.—Leucorrea corrosiva y purulenta, precedida de presion, contractiva en la matriz.

Laringe.—Voz débil, imposibilidad de hablar alto.—Catarro, con coriza y dolor de cabeza.—Tos provocada por una sensacion de *constriccion en el hoyuelo del cuello*, como por el vapor del azufre.—*Tos nocturna*, tenaz.—*Tos seca, á veces con coriza fluente.*—Tos contínua, lo mismo de dia que de noche.—°Tos seca, bronca.—Tos espasmódica con estremecimiento.—Tos corta, *como si tuviera pelusa en la garganta*, tanto mas fuerte cuanto mas tose.—Tos bronca, seca, provocada por un cosquilleo por encima del estómago.

Pecho.—*Dificultad de la respiracion y opresion de pecho*, sobre todo por la noche.—*Respiracion difícil* como si hubiera sobre el pecho un peso que la impidiese.—Falta de aliento al andar, y tos cuando se queda tranquilo.—**Respiracion suspirosa*.—Sofocacion al correr.—Presion en el pecho.—*Constriccion en el pecho.*—Punzadas en el pecho y los costados, provocadas por flatuosidades.—*Palpitaciones de corazon*, por la noche, con punzadas en este ór-

Digitized by Google

gano, ó bien por la mañana al despertarse, é igualmente meditando y durante el reposo.—Latidos en el pecho.

Tronco.—Dolores violentos en los riñones, como punzadas, tirones, ó como si apretaran con un gárfio.—°Opistótonos (por las convulsiones).—Punzadas como por cuchillos, desde los riñones hasta los muslos.—Rigidez de la nuca.—Dolor presivo en las glándulas del cuello.—Glándulas infartadas en el cuello, como por nudosidades.

Brazos.—°*Dolores insoportables en los huesos y las articulaciones de los brazos*, como si la carne estuviera desprendida, ó con sensacion paralítica y dolor de luxacion.—°*Estremecimientos convulsivos en los brazos* y los dedos.—Dislaceracion en los brazos provocada por el aire frio.—Tension en la muñeca.—Sudor caliente en las manos.—Sensacion de torpeza y de hormigueo, por la noche en la cama, como si escarbaran en los brazos.

Piernas.—*Dolores de dislaceracion*, *incisivos*, en la cara posterior de los *muslos*, en fatigando los músculos.—Pesadez de las piernas y de los piés, con tension en las primeras y en las pantorrillas cuando se anda.—Calor de la rodilla con frio en la nariz.—°*Temblores convulsivos en las piernas*.—Rigidez de las rodillas y piés.—Sensibilidad dolorosa de la planta de los piés, andando.—Punzadas y dolor de ulceracion en la planta de los piés.—Sensacion de ardor en los talones por la noche, aproximando el uno al otro.—Sensacion de ardor en los callos.

106.—INDIGO.

IND.—Indigófera tinctoria; índigo.—Remedio aun poco conocido.—*Annales de* THINKS.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores que se disipan del todo, ó por lo menos aparecen muy disminuidos despues de haberse rascado, ó apoyado sobre la parte afecta.—Dolores lancinantes y de dislaceracion en los miembros, despues de medio dia y principio de la noche.—Forúnculos.—Gana de dormir por la tarde, y sueño agitado por la noche.—Despierta con ansiedad y sobresalto por la noche.—Ensueños angustiosos.—Predominio de

Digitized by Google

frio.—Está mal dispuesto, con un humor triste y perezoso.

Cabeza.—Deposiciones. —Sensacion como si la cabeza fuese muy voluminosa y ocupase mas espacio.—Dolores lancinantes y de dislaceracion hasta lo profundo del cerebro.—Ruido y latidos en la cabeza.—Calor y ebullicion en el occipucio, como producido por agua hirviendo.—Sensacion en el vértice, como si tiraran de los cabellos.—Estremecimientos convulsivos y temblor en los párpados, que impiden ver.—Dolores de dislaceracion en y detrás de las orejas, así como en la mandíbula inferior.—Dolores desgarradores, terebrantes y corrosivos en los huesos de la cara, y sobre todo en la mandíbula inferior.—Congestion á la cara con las mejillas ardorosas.—Epistaxis, con pérdida de la vista.—Dolores de dislaceracion é incisivos en los huesos y cartílagos de la nariz.—Torpeza en el interior de la boca, por la mañana despues de despertar.—Sensacion de quemadura en la lengua y en el fondo del paladar.—Esputos de saliva sanguinolenta.—Erutos vacíos.—Erutos con gusto de tinta.—Erutos insípidos.—Sensacion en el estómago como si se estuviera en ayunas.—Deposiciones diarréicas, con pellizcos en el vientre y gana de deponer.

Pecho.—Miembros.—Tos con sofocacion, por la noche antes y despues de acostarse, la que obliga á vomitar.—Ruido como el del agua y ruido sordo en el pecho á cada inspiracion.—Dolores lancinantes en los pechos y alrededor de ellos.—Dolores desgarradores en el antebrazo, desde el codo hasta los dedos, y que cambian de sitio por el movimiento.—Estremecimientos convulsivos en los brazos.—Venas de las manos rojas, tirantes y abultadas.—Dolores lancinantes y desgarradores en los miembros superiores.—Dolores dislacerantes en los miembros inferiores, sobre todo en los dedos.—Mucha laxitud de los miembros inferiores, por la tarde, la que se siente aun despues de acostado.

Digitized by Google

107.—IODIUM.

IOD.—Iodo.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* hasta 7 semanas en algunos casos.
ANTÍDOTOS: Ars.? camph. chin. coff. hep. phos. spong. sulf.
COMPÁRESE CON: Ars. cocc. coff. con. cupr. dig. *merc.* phos. spong. sulf.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se podrá consultar este medicamento contra:—Artritis inveterada; Malas consecuencias por el abuso del mercurio; Afecciones escrofulosas y linfáticas; Infarto é induracion de las glándulas; Atrofia de los niños escrofulosos; Afecciones raquíticas; Afecciones reumáticas; Herpes; Oftalmía y otitis escrofulosas; Blefaroftalmía; Cosra láctea?; Salivacion con úlceras en la boca, por abuso del mercurio; Tabes mesentérica; Tísis abdominal; Bubones escrofulosos y artríticos; Dispepsia; Amenorrea?; Flores blancas; Galactorrea; Laringitis crónica con ulceracion (tísis laríngea); Catarro crónico, Grippe; Coqueluche; *Hinchazon inflamatoria de la rodilla*; *Bócio*; Tumor blanco; Hidrartrosis, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores erráticos en las articulaciones.—**Dolores de dislaceracion* en los miembros, y sobre todo en las *articulaciones*, principalmente por la noche.—Sensacion de torpeza en los miembros.—*Estremecimientos convulsivos y saltos de tendones.*—*Desviacion de los huesos.—Dolores osteócopos nocturnos.—Esto medicamento obra de una manera excitante sobre el sistema glandular, el estómago, el hígado, etc., y provoca en estos órganos la secrecion.—**Hinchazon y dureza de las glándulas*, tambien despues de las contusiones.—*Hemorragia en diferentes órganos.—Fuerte sobreexcitacion de todo el sistema nervioso.—Ebulicion de sangre* y pulsacion en todo el cuerpo, aumentadas por el mas ligero esfuerzo.—*Temblor de los miembros.*—Vacilacion al andar.—**Excesiva endeblez*; con solo hablar se provoca el sudor.—Atrofia y *demacracion hasta el extremo de ponerse como un esqueleto.—Hinchazon edematosa* aun de todo el cuerpo.

Digitized by

Piel.—**Piel seca*, ¯ó viscosa, húmeda y de *un amarillo súcio.*—Herpes.—Panadizos.—Anasarca.

Sueño.—Ensueños agitados.—*Sudor nocturno.

Fiebre.—Despeluzamiento, aun en una habitacion cálida. —*Aumento del calor del cuerpo.*—Calor fugaz.—Transpiracion ácida por la mañana.—Pulso acelerado, pequeño y duro.—Fiebre consuntiva.—Sudor ácido por la mañana.

Moral.—*Disposicion á llorar y abatimiento moral.*—Melancolía, hipocondría, tristeza, opresion de corazon y ansiedad.—Aprension con angustia.—Agitacion con inquietud, que no permite estar sentado ni dormir.—*Sobreexcitacion moral; con mucha susceptibilidad.*—Ilusiones que impresionan.—Locuacidad y alegría inmoderadas.—Perplejidad é irresolucion.—Debilidad en la parte intelectual con mucha repugnancia á todo trabajo mental.—Fijeza é inmovilidad del pensamiento.—Delirios.

Cabeza.—Turbacion de la cabeza.—*Aturdimiento por la mañana.—*Dolor de cabeza por la impresion de un aire caliente*, así como tambien por el movimiento prolongado del carruaje ó por una marcha forzada, y agravado por el ruido y hablando.—Dolor de contusion en el cerebro, con falta de fuerzas en el cuerpo, como por parálisis.—Dolores presivos agudos en la frente.—*Congestion á la cabeza*, con *latidos en el cerebro.—°Cefalalgia como por una venda apretada.

Ojos.—Dolores en las órbitas.—Sensacion de debilidad por encima de los ojos, por la tarde y como si estos estuvieran profundamente hundidos.—*Dolor de excoriacion en los ojos.*—Inflamacion de los ojos, á veces despues de un enfriamiento.—Hinchazon de los párpados.—*Color amarillo súcio de la esclerótica.*—Lagrimeo.—Movimientos convulsivos y temblor de los párpados.—Vista debilitada.—Diplopia.—Chispas y centelleo delante de los ojos.

Oidos.—*Zumbido en los oidos.—*Dureza de oido.*—Sensibilidad al ruido.

Nariz.—Epistaxis.—Mancha roja, ardorosa en la nariz, encima del ojo.—Obturacion de la nariz, ó *secrecion muy abundante de mucosidades.*

Cara.—**Color pálido, amarillento, ó que se vuelve prontamente pardusco.*—Encendimiento frecuente y rápido de la cara, con sensacion de quemadura en las orejas.—

Semblante descompuesto con ojos abatidos.—Estremecimiento de los músculos de la cara.—Ulcera en la mejilla con hinchazon de las glándulas inmediatas.—*Hinchazon de las glándulas submaxilares.*

Dientes.—Dolores presivos en las muelas.—*Dientes amarillos y cubiertos de mucosidades*, por la mañana.—Hinchazon inflamatoria y hemorragia de las encías, con hinchazon de la mejilla.—**Reblandecimiento de las encias.*

Boca.—Aftas en la boca.—**Ulceras en la boca.*—Dolor ó hinchazon de las glándulas del interior de la boca.—Exhalacion de un olor pútrido por la boca.—**Salivacion.*—°*Lengua cubierta de una capa espesa.*

Garganta.—Irritacion de garganta con dolor presivo fuera del tiempo de la deglucion.—*Constriccion permanente* en la garganta, y dificultad de la deglucion.—Inflamacion de la garganta, con sensacion de quemadura y arañamiento.

Apetito.—Gusto desagradable, como de jabon, ó amargo salado.—*Sed aumentada.*—Apetito variable, tan pronto **bulimia*, como falta de apetito.—*Hambre no acostumbrada*, con mejoría despues de la comida.—Mucha debilidad de la digestion.

Estómago.—Erutos generalmente ácidos, con sensacion de ardor.—**Pirosis*, sobre todo *despues de tomar alimentos indigestos.*—**Náuseas* frecuentes.—*Vómitos* violentos, *que se renuevan comiendo.*—Vómitos de materias biliosas ó de mucosidades amarillentas.—Dolores de estómago de los mas violentos, con evacuacion biliosa.—*Presion en el estómago despues de cada comida.*—Dolores de estómago, calambroídeos, roedores y ardorosos.—Inflamacion de estómago.—Pulsacion en el epigastrio.

Vientre.—*Dolores abdominales que se renuevan despues de cada comida.*—Timpanitis.—*Grosor del vientre*, que no permite acostarse sin peligro de sofocacion.—Infarto del bazo.—Dolores calambroídeos en el vientre.—*Cólicos violentos.—Dolores en el vientre como los del parto.—Hinchazon é inflamacion de las glándulas del mesenterio.—Temblor como de frio en el vientre, desde la boca del estómago hasta la periferia, con aumento de calor.—*Hinchazon é induracion escirrosa de las glándulas inguinales.*—**Encarcelacion de gases.*

Deposiciones.—Deposiciones duras, nudosas.—*Estre-

Digitized by

ñimiento.— *Deposiciones diarréicas*, blandas, algunas veces blanquecinas, **alternando con estreñimiento.*— Deposiciones de la consistencia de papilla.— Diarreas violentas, espumosas ó de mucosidades sanguinolentas.— Cámaras disentéricas de mucosidades espesas ó purulentas, con retencion de materias estercoráceas.—Por la noche sensacion de quemadura en el ano.

Orinas.—*Supresion de la secrecion de la orina.*—Orinas abundantes y frecuentes.—**Emision de orinas, por la noche.*— Orinas de color oscuro, ó verde amarillento, ó lechosas, ó ácres y corrosivas.—Película de color del íris en las orinas.

Partes viriles.— *Apetito venéreo exaltado.*—Estirones dolorosos en la parte anterior del miembro.—*Inflamacion y dureza de los testículos.*—Dureza de la próstata.

Reglas. — *Reglas, unas veces retardadas, otras muy abundantes. — *Metrorragias.* — Debilidad, palpitaciones de corazon, y muchos padecimientos, antes, durante y despues de las reglas.—Induracion (y cáncer?) del útero. —*Leucorrea corrosiva.*—Flacidez y atrofia de las mamas.

Laringe. — *Ronquera* y hormigueo insoportables en la garganta, sobre todo por la mañana.—**Inflamacion de la garganta y de la tráquea-arteria*, con dolor contractivo de excoriacion.—*Secrecion mas abundante de mucosidades en la tráquea-arteria*, con estertor frecuente.—**Tos seca*, con presion, punzadas y sensacion de quemadura en el pecho.— **Tos matutina.*—*Tos con expectoracion de mucosidades abundantes y algunas veces sanguinolentas, °dolores en el pecho y fiebre.— °Tos semejante á la coqueluche, excitada por un cosquilleo insoportable en el pecho, con angustia, por accesos, y marasmo excesivo.

Pecho. — **Dificultad de la respiracion* y disnea.—Sofocacion.— °En respirando punzadas en el lado izquierdo.— °La respiracion se hace entrecortada, sobre todo subiendo una escalera.—Debilidad del pecho.—Congestion al pecho.— **Palpitaciones violentas del corazon*, calambroídeas, elevadas al mas alto grado por el menor esfuerzo.—Tension quemante, lancinante en los tegumentos del pecho.

Tronco.— Calambres en el dorso.— Tension en el cuello. —**Hinchazon al exterior del cuello.*—Hinchazon del cuello hablando.— **Hinchazon de las glándulas del cuello, de la*

nuca y de las axilas.—*Paperas duras y voluminosas.*—Sensacion de constriccion contínua en el bocio.—Manchas amarillentas en el cuello, y rubicundez como por equímosis.

Brazos.—Dolores osteócopos en los brazos, que turban el sueño, agravados echándose sobre ellos.—°Laxitud en los brazos, por la mañana en la cama.—Movimientos convulsivos y *temblor de los brazos*, *de las manos* y de los dedos.—°Adormecimiento de los dedos.—Dolores desgarradores en los dedos.—Salto de tendones en los dedos.—Panadizos.—°Frio contínuo en las manos, que se cubren de un sudor frio durante el trabajo.—Carfologia.

Piernas.—Dolor calambroídeo en las piernas, tan solo estando sentado.—Pesadez, hinchazon, temblor y parálisis de las piernas.—Estirones reumáticos en los muslos y en las rodillas.—*Hinchazon inflamatoria de la rodilla*, con dolores desgarradores y supuracion.—°Hinchazon hidrópica de la rodilla.—°Tumor blanco.—Calambres en los piés, sobre todo por la noche.—Saltos de tendones en los piés.—Sudor ácre y corrosivo en los piés.

108.—IPECACUANHA.

IPEC.—Ipecacuana.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 3, 9, 30. *Duracion de accion*: algunas veces hasta 5 dias.

ANTÍDOTOS: Arn. ars. chin.—*Se emplea como antídolo de:* Alum. arn. ars. chin. cupr. dulc. fer. laur. op. tabac. tart.

COMPÁRESE CON: Acon. *alum. arn. ars.* ca'c. carb-veg. *cham. chin.* cin. *cocc.* croc.? *cupr.* dros. dulc. *fer. ign. laur. n-vom. op. phos.* puls. sabin. sulf. *tart. veratr.*—Será sobre todo despues de: *Acon. arn. ars.* y *verat.*, cuando la *ipec.* prestará mejores servicios, si por otra parte se halla indicada. Despues de ipec. conviene algunas veces: Arn. ars. chin. cocc. ign. n-vom.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—Afecciones principalmente de los niños y de personas rubias (y de temperamento nervioso); Malas consecuencias por el abuso de la quina ó de la grasa de cerdo; Afecciones causadas por un enfriamiento, una in-

digestion, ó desórdenes de toda especie; Calambres y convulsiones, tétanos y otras afecciones espasmódicas, sobre todo en los niños y las personas histéricas; *Hemorragias*; Erupciones miliares (sobre todo en las recien paridas), y malas resultas de la repercusion de estas erupciones; Malos resultados de una apoplejía; *Fiebres gástricas* y biliosas; *Fiebres intermitentes*; Fiebres lentas; Jaquecas; *Embarazo gástrico, sobre todo á consecuencia de una indigestion* ó por el abuso del café ó de la grasa de cerdo; Cólera asiático y esporádico; Hematémesis; Melena; *Afecciones gástricas con vómitos* y diarrea; Enteritis?; Gastritis?; Espasmos abdominales histéricos; Diarrea, sobre todo en los niños; Afecciones gástricas de las embarazadas; Fiebre puerperal; Metrorragias; Laringitis?; Grippe?; *Tos convulsiva ó sofocante*; Coqueluche; Catarro sofocante; Asma de Millar y otras *afecciones asmáticas*; calambres de pecho, sobre todo los que provienen del vapor del arsénico ó del cobre, etc., etc.

Véase la nota, pag. 17.

SINTOMAS GENERALES.— Dolor de contusion en todos los huesos.— Hormigueo como de adormecimiento en las articulaciones.— *Accesos de malestar con repugnancia á todos los alimentos y debilidad excesiva y rápida.*—*Hemorragias por diversos órganos*, con sangre de un encarnado vivo.—°Mucha sensibilidad al frio y al calor.—°*Tétanos*, °*accesos de espasmos y convulsiones* de diferente naturaleza, °á veces con *inversion* de la cabeza °y distorsion de las facciones, ó con pérdida del conocimiento, cara pálida y abotagada, ojos medio abiertos; movimientos convulsivos de los músculos de la cara, de los labios, de los párpados y de los miembros, ó bien con gritos, conatos á vomitar y estertor mucoso en el pecho.— Enflaquecimiento excesivo.

Piel.—°Erupciones miliares.— Prurito violento en la piel (de los músculos y de los brazos).— Durante las náuseas hay necesidad de rascarse hasta que se efectúa el vómito.

Sueño.—Sueño, con los ojos medio abiertos.— *Sueño* agitado *con gemidos.*— Durante el sueño, estremecimiento

Digitized by Google

de los miembros.— Ensueños horribles, con sobresaltos frecuentes y sustos durante el sueño.

Fiebre.— Horripilacion con *frio en los miembros* y en la cara.—*Frio* sobre todo *en las manos y los piés*, con sudor frio y abundante de estas partes.— Agravacion de los calofrios por el calor exterior.— Antes de los calofrios malestar, pandiculaciones y laxitud con sudor frio en la frente, ó bien frio, ó calofrios en las orejas.— Calor instantáneo estando en la habitacion, con sudor y vértigos.—°*Sed tan solo durante los calofrios ó el frio.*—°*Fiebre* que se manifiesta por muchos calofrios, con poco calor, ó mucho calor con pocos calofrios; ó con náuseas, vómitos y otros *síntomas gástricos*, lengua limpia ó súcia y opresion constrictiva en el pecho.—°Fiebre por la tarde con mucha inquietud, calor seco y penoso, palmas de las manos ardorosas y sudor nocturno.

Moral.—Gritos y quejidos (en los niños).— Perplejidad y temor á la muerte.— *Terquedad con desprecio de todas las cosas.*— Humor desdeñoso.— Deseo de una multitud de cosas sin fijarse en ninguna.— Irritabil dad y disposicion á enfadarse — *Impaciencia.*— Lentitud en la comprension de las ideas.

Cabeza.— Vértigo andando, con vacilacion y vaivenes.— *Dolor como si el cráneo estuviera magullado, en todos los huesos de la cabeza, hasta la raiz de la lengua.— *Ataques de dolores de cabeza con náuseas y vómitos.*— Dolores de dislaceracion en la frente, provocados ó agravados por el tacto.— *Dolor de cabeza lancinante* con *pesadez de esta.*— Presion dolorosa en la frente.

Ojos y nariz.— Ojos rojos é inflamados.— Legaña en los ángulos de los ojos.— *Temblor de los párpados.*— Pupilas dilatadas.— Vista turbia.— *Epistaxis.*— Pérdida del olfato.—*Coriza con obturacion de la nariz.— Frio y calofrio en las orejas.

Cara y dientes.— **Color pálido*, térreo ó amarillento de la cara, que está abotagada y con ojeras.— °*Estremecimientos convulsivos en los músculos de la cara.*— Labios cubiertos de pequeñas aftas y de erupciones.— Dolores de excoriacion en los labios.—*Estremecimientos convulsivos de los labios.*—Rubicundez de la piel alrededor de la boca.— Odontalgia por accesos, como si arrancaran los dientes.

Boca y garganta.—Sensibilidad dolorosa en todas las

partes de la boca.—Abundante acumulacion de saliva en la boca.—*Lengua cubierta de una capa blanca ó amarillenta.—Irritacion en la garganta durante la deglucion, como por hinchazon de la faringe.—Deglucion difícil como por parálisis de la lengua y de la garganta.

Apetito.—*Gusto soso, pastoso ó °amargo, sobre todo por la mañana.—Gusto dulce como de sangre en la boca.—°Apetito solamente de golosinas y cosas azucaradas.—Adipsia.—Sabor insípido de la cerveza.—El humo del tabaco tiene un sabor nauseabundo y hace vomitar.—**Mucha repugnancia é inapetencia á todos los alimentos*.—°Pituitas del estómago.

Estómago.—**Náuseas* como si provinieran del estómago, con acumulacion de saliva abundante, prurito violento en la piel y erutos vacíos.—*Vomituricion, sobre todo despues de haber bebido frio, ó despues de fumar.—**Vómito* de las bebidas *y de los alimentos ingeridos*, ó bien de *materias biliosas*, *verdosas*, ó ácidas, ó mucosas, gelatinosas, frecuentemente con dolor de estómago, y á veces inmediatamente despues de la comida.—°Vómito de sangre.—Vómitos con sudor, calor, aliento fétido y sed.—*Vómito con diarrea*.—Vómito al bajarse.—°Vómito de materias negras como pez.—**Sensacion de un excesivo malestar en el estómago y en el epigastrio*.—*Sensacion como si *el estómago estuviera vacío y desmazalado*.—°Hinchazon de la region estomacal.—Pellizcos alrededor del epigastrio y en la region de los hipocondrios.—°Presion en el estómago con vómitos.

Vientre.—Pellizcos en el vientre, sumamente agravados por el ejercicio y mejorados con el reposo.—°Dolor de excoriacion en el vientre.—°Cólicos con agitacion, anhelacion y gritos (en los niños).—°Cólicos con dolores calambroídeos.—Dolores incisivos en la region umbilical con horripilacion.—Cólicos flatulentos.

Deposiciones.—**Deposiciones diarréicas semejantes á las materias en fermentacion*.—Diarreas tenaces.—*Deposiciones diarréicas verdosas, ó de *un amarillo color de limon*, de olor pútrido, ó *sanguinolentas*, biliosas y *mucosas*.—*Deposiciones diarréicas serosas.—°Diarrea con náuseas, cólicos (y vómitos).—**Deposiciones disentéricas* con copos blancos y seguidas de tenesmo.—°Evacuacion de materias negras como la pez.

Orinas.—Orinas turbias con sedimento de color de ladrillo.—Orina roja y rara.—*Orina sanguinolenta, °con dolores en la region vesical y en el ombligo, sensacion ardorosa en la uretra, gana de vomitar y dolor en los riñones y en la boca del estómago.—Flujo despues por la uretra con dolor mordicante.

Partes genitales.—Sensacion penosa como si todo afluyera hácia las partes genitales y hácia el ano.—**Metrorragias* ¯con flujo de una sangre de color rojo subido y coagulada.—Reglas muy adelantadas y copiosas.

Laringe.—**Tos*, sobre todo *por la noche*, con golpes dolorosos en la cabeza y el estómago, y con *inapetencia, vomituricion y vómitos*.—**Tos seca*, provocada por un cosquilleo compresivo en la laringe y hasta la extremidad de los bronquios, sobre todo estando echado sobre el lado izquierdo.—*Tos parecida á la coqueluche, con sangre por la nariz y la boca, y vómito de los alimentos.—Tos con esputos de sangre, provocada por el menor esfuerzo.—**Tos espasmódica*, seca, que produce estremecimiento, *con accesos de sofocacion*, rigidez del cuerpo y cara azulada.

Pecho.—*Respiracion ansiosa y corta*.—**Asma espasmódico* con *contraccion en la laringe* y respiracion estertorosa.—Estertor mucoso en el pecho.—*Respiracion suspirosa*.—Opresion de pecho y aliento corto como si se tragara mucho polvo.—*Falta de aliento al menor movimiento.—Espasmos de pecho.—Dolor de excoriacion en el pecho.—*Palpitaciones de corazon*.—Manchas rojas pruritosas en el pecho con sensacion de ardor despues de haberse rascado.

Tronco y miembros.—**Rigidez tetánica é inversion del dorso, bien sea hácia adelante, ó bien hácia atrás*.—Hinchazon y supuracion en el hoyuelo del cuello.—°*Estremecimientos convulsivos de las piernas y de los piés*.—Dolor de luxacion en la articulacion coxo-femoral, en cuanto uno se sienta.—Calambres nocturnos en los músculos del muslo.—Prurito violento en las pantorrillas.—Ulceras en las piernas con fondo negro.

109.—IRIS VERSICOLOR.

IRIS.—Iris de América.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

Usado hasta aquí con buen resultado contra: *Prosopalgia*, con dolor en la cabeza, las sienes y los ojos, y vómito excesivamente penoso de mucosidades dulces, mezcladas á veces de porciones de bilis.—*Gastritis*, con ardor violento en el epigastrio, quemazon en la boca, la faringe y el esófago, vómito, diarrea y grande postracion.—*Catarro intestinal*, con ardor en el recto y en el ano despues de cada deposicion, evacuaciones dolorosas, verdes y que se manifiestan cada noche, entre las dos y las tres.—*Cólera*, con ardor violento en el estómago alrededor del ombligo despues de cada evacuacion y agravacion periódica entre 2 y 3 de la madrugada.—*Spermatorrea*, con cara pálida; ojos hundidos, espíritu abatido, andar inseguro y fácil apetito venéreo.—*Grippe*, con estornudos contínuos, dolores violentos y constrictivos en las sienes y diarrea indolora, feculenta y de color claro.

110.—KALI BICHROMATICUM.

KAL-BI.—Bicromato de potasa.—*Duracion de accion?*—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.
ANTÍDOTOS: *Camph. coff. merc. nitr-sp.*
COMPÁRESE CON: *Ars. carb-veg. coff. lyc merc. natr-m. nitr-ac. phos. puls.*

SINTOMAS GENERALES.—Dolores de dislaceracion, estirones, terebracion y dolor de contusion en los miembros.—Dolores dislacerantes en los huesos largos de los miembros.—°*Reumatismos crónicos.*—Pesadez y fatiga en los miembros.—Mucha debilidad y aspecto enfermizo, caquéctico del rostro.—Mucha sensibilidad al aire libre.—**Dolores que pasan rápidamente de una parte á otra.*—Dolores en todo el cuerpo, sobre todo por la mañana,

al levantarse.—**Los dolores reumáticos alternan con los síntomas gástricos, y los dolores osteócopos con las afecciones de la garganta.*—**Muchos de los padecimientos se agravan por un tiempo cálido*; y otros aparecen ó aumentan principalmente por la mañana.— Demacracion general.

Piel y lesiones externas.— Piel caliente, seca y roja. — Erupcion como el sarampion.—**Pústulas varioloides,* á veces con costra negra en el centro.—**Prurito quemante en la piel.*—Forúnculos. — Erupciones pustulosas confluentes.—Pústulas, por el centro de las cuales pasa un pelo.—**Ulceras gangrenosas*, secas, ovoídeas, corrosivas en el interior, con aureola color de rosa é inflamada, bordes vueltos, *mancha negra en el centro*, que dejan cicatrices hondas. —*°Ulceras y erupciones sifilíticas*, con costras espesas y pus amarillo. —*°Pústulas ectimatosas.*— *°Eczema impetiginoso*, con úlceras varicosas.

Sueño.—Gana de dormir por la tarde temprano.—Sueño tardo por sobreexcitacion nerviosa.—Sueño no reparador.—Ensueños vivos horribles.—Sueños desordenados por muchos padecimientos, pero sobre todo por dolores de cabeza.

Fiebre.— Sensacion febril, por la noche y la mañana.— Horripilacion que se esparce por todo el cuerpo, empezando por las piernas.— Despeluzamiento en las extremidades inferiores, alternando con calor fugaz.—*°Fiebre reumática.*

Moral é inteligencia.—Abatimiento, *morosidad*, *pereza y horror al trabajo.*—**Mucha indiferencia.*—Melancolía y tristeza.—Irritabilidad irascible.—Antropofobia y morosidad hasta el punto de tener aversion á la vida.

Cabeza.—Accesos frecuentes de vértigos.—*Vértigos hasta hacer caer, con sensacion como si todo anduviese en derredor.*—Sensacion vertiginosa que atraviesa la frente.—*Vértigos con náuseas* y vómitos.—Cabeza atontada con náuseas, angustia y entorpecimiento.—Cefalalgia con dolores en los ojos.—*Cefalalgia semilateral*, principalmente *en la frente por encima de un ojo.*—Agravacion de los dolores de cabeza por el aire frio y el movimiento.—Dolor de cabeza en las sienes.—Ebullicion de sangre que sube á la cabeza.—Punzadas cortantes en la cabeza como por cuchillos.—°Jaqueca, dolores de cabeza histéricos, cefalalgia congestiva?—Dolor de excoriacion en el vértice

Digitized by Google

con erizamiento de los cabellos.—Tirones y sensibilidad en los huesos del cráneo.—Caida de los cabellos.

Ojos.—Presion en los ojos como por arena.—*Prurito y sensacion de ardor en los ojos con lagrimeo.—Inflamacion, hinchazon, prurito y rubicundez de los párpados*, con sensacion de rugosidad y espesor en la cara interna.—*Inflamacion de los ojos*, á veces con fotofobia, pérdida de la vista y flujo abundante de lágrimas.—Vista turbia como por un velo amarillo delante de los ojos.—Ambliopia amaurótica.—Manchas que revolotean y centelleo delante de los ojos.—Color amarillo de la esclerótica.—Manchas de color de rósa y equímosis en el blanco del ojo.—Manchas sanguinolentas y pústulas sobre la córnea.—Nube en la córnea.—°Oftalmías catarrales y escrofulosas.

Oidos.—Punzadas en los oidos hasta dentro de la cabeza y del cuello, con las glándulas infartadas.—Crujido y ruido en los oidos.—Oidos como tapados.

Nariz.—Sensacion de frio en las ventanillas nasales, al inspirar el aire.—Dolor de excoriacion en las ventanas de la nariz.—Pequeñas úlceras ardorosas á la entrada de las narices.—Sensacion de ardor y costras en las ventanillas nasales.—*Epistaxis* con frecuencia, de una sangre espesa de un rojo oscuro.—*Flujo abundante de serosidades por las ventanillas nasales*, con mucha sensibilidad de la nariz.—°*Secrecion abundante de un moco purulento*, con obturacion contínua de las ventanillas nasales.—°*Pólipos de la nariz.*—°*Ulceracion y destruccion del tabique de la nariz.*—*Sonándose se desprenden mucosidades duras*, verdosas, ó como tapones duros, elásticos, de un olor nauseabundo.—°Hinchazon de la nariz con dolor del tabique.—Dolor de los cartílagos de la nariz.—Latidos y pulsaciones en la raiz de la nariz, que parece caliente al tacto, con hinchazon sin rubicundez.—Sensacion de plenitud y de engrosamiento en la parte superior de la nariz, con necesidad frecuente de sonarse.—Pesadez de la nariz.—Sensacion en una parte del hueso lacrimal derecho.—Fetidez en la nariz.—Pérdida del olfato.—Excoriacion, *sensacion de ardor y sequedad penosa de la nariz.*—°*Obturacion frecuente ó tenaz de la nariz.*—Estornudos frecuentes, violentos y con estremecimiento.—*Coriza seco*, con las ventanillas nasales ulceradas, estornudos frecuentes y accesos de tos.

Cara.—Color pálido, enfermizo, amarillo, térreo ó pardo ceniciento de la cara.—Ojos hundidos y ojerosos.—Dolores de magulladura y sensibilidad de los huesos de la cara.—Tension en los músculos de la cara.—Erupcion, como escorbútica en la cara.—Prurito y sensacion de ardor en la piel de la cara y de la frente.—Prurito en el sitio de las patillas.—Erupcion de vesículas en los labios, con fuerte prurito en secándose.—°*Costras sifilíticas en la mejilla*, desde la raiz de la nariz hasta el labio.—Sudor en el labio superior.—Labio inferior hinchado y esquebrajado.

Dientes.—Odontalgia con salivacion abundante.—Dolor de dislaceracion tractiva en los dientes del lado izquierdo, á veces hasta el oido, la sien, el cuello y la cabeza, con infarto de las glándulas del cuello, y seguida de hinchazon de las encías.—Inflamacion y ulceracion de las encías.—Encías lívidas.

Boca.—Mucha sequedad de la boca y de los labios.—Vesículas, aftas y úlceras en la superficie interna de la boca.—Lengua blanda, roja y agrietada.—Ulcera dolorosa sobre la lengua, de larga duracion.—*Lengua cubierta de mucosidades espesas, amarillentas*.—Saliva amarillenta.—Abundante acumulacion de agua en la boca.—Sensacion como de un cabello en la raiz de la lengua y en el velo del paladar.—*Ulceras costrosas en el paladar*, dejando una cicatriz deprimida.

Garganta.—Mucha sequedad de la lengua, obligando á tragar saliva contínuamente.—Punzadas presivas en la garganta, al tragar y al hablar.—Durante la deglucion de sustancias secas, sensacion contínua, como si quedara alguna cosa en la garganta.—*Sensacion como si hubiera un cuerpo extraño en la garganta*, algunas veces hasta en el estómago, como si los alimentos estuvieran detenidos, sobre todo en erutando.—Picor y rugosidad en la garganta.—Sensacion de ardor en la garganta y el esófago.—*Rubicundez cobriza ó eritematosa, tenaz, de la garganta y del paladar*.—Reblandecimiento de la pared posterior de la faringe, con rubicundez oscura, lustrosa, vasos inyectados y pequeñas grietas que dan sangre.—Rubicundez é hinchazon dolorosa de las amígdalas y de la epiglotis, seguida de una ulceracion como sifilítica.—*Ulceras en la garganta*, velo del paladar y de la epiglotis,

con aureola roja y supuracion amarillenta.—*Ulceras sifilíticas en la garganta.*

Gusto y apetito.—*Gusto dulce, metálico, cobrizo*, particularmente en fumando.—*Gusto ágrio de la boca*, amargo ó salado.—Gusto desagradable del agua.—*Falta de apetito*, sobre todo *por la mañana.*—*Repugnancia á los alimentos*, la carne y el humo del tabaco.—Sed pronunciada, contínua y hasta inextinguible.—Deseo de cerveza ó de bebidas aciduladas.—*Despues de haber comido con placer, sensacion como si la digestion fuese nula y que los alimentos pesaran sobre el estómago.*—Padecimientos de estómago, aun por la mas ligera cantidad de comida.—*Padecimientos por el uso del té de China.*

Gastricismo.—*Eructos de aire frecuentes.*—Hipo frecuente.—*Náuseas frecuentes y continuas*, particularmente *en andando por la noche, ó por la mañana*, con sensacion de pesadez en la cabeza y los ojos.—El comer disminuye las náuseas, pero los líquidos parece las aumentan.—*Pirosis*, sobre todo despues de haber tomado té.—*Náuseas con vómitos*, lo mas frecuentemente *mucosos*, ó biliosos, amargos y amarillentos.—Vómitos de mucosidades y de sangre.—*Vómito de los alimentos ingeridos*, particularmente tambien despues de desayunarse.—Durante los vómitos, vértigos, sensacion de ardor en el estómago y sudor de angustia.

Estómago.—*Presion, plenitud y timpanitis del estómago*, sobre todo despues de comer.—*Excesivo malestar en el estómago*, con disgusto, inquietud, náuseas y calor.—Gastralgia nocturna.—*Inflamacion* de la mucosa del estómago, con placas rojas parduscas.—Ulceras, supuraciones y desorganizaciones gangrenosas en el estómago.

Vientre.—Presion y punzadas en la region hepática.—Inflamacion y reblandecimiento del hígado.—Fuertes punzadas en la region esplénica.—Cólico calambroídeo, constrictivo, con náuseas, y seguido de deposiciones en forma de papilla.—Como rodeo y remolino en el vientre por la menor corriente de aire.—Cólicos con dolores como si horadaran los intestinos.—*Vientre timpanítico*, tenso.—Flatuosidades abundantes.—Inflamacion, úlceras, supuracion y reblandecimiento de la mucosa de los intestinos.

Deposiciones y ano.—*Estreñimiento tenaz*, á veces *con*

Digitized by Google

cólicos.—Deposiciones raras, duras, nudosas, con prolapsus del recto.—Deposiciones pálidas, color de arcilla, con dolores hepáticos.—Diarrea acuosa como un torrente, seguida de tenesmo y vomituricion violenta, con sensacion de ardor en el vientre.—*Deposiciones disentéricas*, con evacuaciones sanguinolentas, ó con deposiciones acuosas, parduscas y espumosas, acompañadas de tenesmo, vomituricion y cólicos.—*Tenesmo frecuente en el esfinter del ano*, mejorándose por la expulsion de gases.—Dolores violentos como por una saeta en el ano.—Dolor de excoriacion en el ano, muy sensible al andar.

Vías urinarias.—Sensacion de ardor en la uretra, durante y fuera del tiempo de la miccion.—Inflamacion, reblandecimiento, ulceracion, supuracion y otras lesiones orgánicas de los riñones.—Gana frecuente de orinar.—Miccion nocturna, abundante.—*Orinas rojas*, á veces con dolores que atraviesan hasta el dorso.—Depósito blanquecino, ó espeso y mucoso, en las orinas.—Emision de orinas completamente suprimidas, hasta poner á las puertas de la muerte.

Partes viriles.—Prurito en los pelos, con erupcion de pequeñas pústulas, muy unidas en un punto circunscrito.—Costras en el glande.

Reglas y partes genitales de la mujer.—Dolor de excoriacion, rubicundez eritematosa é hinchazon de la vagina.—Reglas anticipadas con vértigos, disgusto, sensacion febril y dolor de cabeza.—Leucorrea amarillenta, espesa, con dolor y debilidad en los riñones, y malestar en el epigastrio.

Laringe.—*Ronquera y carraspera*, particularmente al despertar, así por la noche como por la mañana.—Dolor de excoriacion en la laringe.—*Mucho calor en la garganta con excitacion á toser*.—*Tos por cosquilleo en la laringe*, las mas de las veces *con expectoracion espesa, abundante*, ó con esputos de sangre.—*Expectoracion espesa, blanca*, ó de un blanco azulado, por la tos.—Tos excitada por la comida, —°Bronquitis crónica á consecuencia de respirar vapores arsenicales.—°*Tos matutina*, con expectoracion viscosa.—°*Tos tenaz con expectoracion mucosa y estertor en el pecho*.—Antes de la tos, meteorismo en el estómago y náuseas.—Al toser, dolor en los costados y los lomos.—Expectoracion amarillenta de un gusto dulce.—Despues de

Digitized by Google

haber tosido vértigos violentos, con dolor en el sincipucio.—Acumulacion de *excrescencias carnosas ó de otra naturaleza* en los bronquios.—Falsas membranas en la laringe y la tráquea-arteria.—Tos con dolor en un punto del pecho como por una úlcera.

Pecho.—*Disnea*, á veces con dolores de pecho y tos fuerte.—Respiracion corta como por constriccion del epigastrio que corta la respiracion.—Dolor del pecho respirando profundamente.—*Presion y pesadez sobre el pecho como por un peso*, particularmente al *despertarse*.—*Presion en la region del corazon*.—Dolor fijo en la punta del corazon.—Palpitaciones violentas del corazon, con presion penosa.—Hipertrofia del corazon.

Tronco.—*Dolores violentos en el coxis*, así como *en los lomos y el sacro*, aumentados á veces por la tos, la respiracion y el movimiento.—Punzadas en la region renal.—Pústulas y forúnculos en el dorso.—Rigidez de la nuca.—*Dolor de dislaceracion y estirones en un lado del cuello*, proviniendo de la cabeza.

Extremidades superiores.—Dolores reumáticos en la espalda.—*Pústulas en los brazos*.—Sensacion de ardor en el antebrazo como por agua hirviendo.—Dolor de dislaceracion y estirones en los huesos del antebrazo y de la mano.—Excesiva debilidad, como paralítica en las manos.—Dolores reumáticos en los dedos.—Pústulas en la raiz de las uñas, extendiéndose por el dorso de las manos y dedos.

Extremidades inferiores.—*Dolores reumáticos en las caderas*, sobre todo *durante el dia y el movimiento*.—Dolores muy fuertes en las articulaciones de las rodillas.—Dolor de dislaceracion en las piernas con estremecimiento en los miembros.—Dolores osteócopos en la tibia.—Hinchazon del tendon de Aquiles.—Dolor de luxacion en la articulacion del dedo.—Dolor en el talon andando.—Ampollas que se forman andando.—Sensacion de ardor en los piés sobre todo en las plantas.—Dolor de excoriacion en el dedo pulgar, en el punto que la uña toca la carne.

111.—KALI CARBONICUM.

KAL.—Subcarbonato de potasa, sal de tártaro.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmcopea homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 30 dias en algunos casos de enfermedades cronicas.

ANTÍDOTOS: Camph. coff. nitr.-spir.

COMPÁRESE CON: Amm. amm-m. *ars.* bov. bry. calc. camph. carb-veg. cham. chin. coff. graph. *laur.* magn. *natr-m. nitr.-ac.* n-vom. *phos. puls.* rhus. sil. sulf.—El kali se mostrará eficaz, sobre todo despues de *Lyc. natr-m. nitr-ac.* siempre que por otra parte se halle indicado.—Despues de kali conviene á veces: *Carb-veg. phosph.* y otros muchos.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede consultar este medicamento contra:—Afecciones hidrópicas; Anasarcas; Afecciones reumáticas y artríticas; Parálisis; Infarto de las glándulas; Accesos de desvanecimiento y de debilidad histérica; Debilidad por pérdidas debilitantes; Fiebres lentas?; Jaqueca; Tiña; Lúpias en la cabeza?; Oftalmía; Ambliopia amaurótica; *Parotitis*; Dureza de oido; Otitis y otorrea; Prosopalgia; Dispepsia aun con vómito de los alimentos; Gastralgia; Dolores hepáticos (hepatitis crónica?); *Tisis hepática*; Cólicos espasmódicos; *Ascitis*; *Amenorrea y dismenia de las jóvenes* (despues de natr. mur.); *Pleuresía; Tisis tuberculosa*; Hidrotorax; Hemoptísis; Asma espasmódico; Dolores de riñones producidos por una caida; *Prodromos y malas resultas de un aborto*; Afecciones de corazon.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Sensibilidad dolorosa de los miembros, cualquiera que sea la posicion que se les haga tomar.—Dolores presivos en las articulaciones.—*Contraccion espasmódica de algunas partes.—**Dolores tractivos y desgarradores* en los miembros, sobre todo durante el reposo, con hinchazon de las partes afectas y mucha debilidad, y con calofrios despues de los accesos.—*Dolores lancinantes en las articulaciones, los músculos y los órganos internos.*—Hinchazon y dureza de las glándulas.—**Padecimientos hidrópicos* de los órganos internos, ó de toda la piel.—*Los dolores se manifiestan frecuente-

mente hácia las dos de la mañana y entonces son mas fuertes que entre el dia durante el movimiento.—Agrava mucho los padecimientos el permanecer al aire libre (sobre todo los síntomas febriles), mientras que algunos otros se alivian en este caso.—Accesos de espasmos y *estremecimientos convulsivos* de los miembros y de *los músculos*.—Ataques de epilepsia por accesos nocturnos.—Facilidad á resentirse de los riñones.—*Disposicion de los miembros á adormecerse* cuando se está echado sobre ellos.—*Parálisis*.—Sensacion general de vacuidad en todo el cuerpo, como si estuviera hueco.—Pesadez y pereza.—*Debilidad* como si fuese á perder el conocimiento y *temblor*, sobre todo despues de dar un paseo.—*Accesos de debilidad con náuseas*, sensacion de calor y laxitud en la boca del estómago, vértigos y aturdimiento.—*Fuerte ebullicion de sangre*, con latidos en todas las arterias.—Excesivo horror al aire libre y á las corrientes de aire.—**Mucha disposicion á resfriarse*, sobre todo despues de un ejercicio que ha aumentado el calor.

Piel.—Sensibilidad dolorosa de la piel, como si estuviera ulcerada.—*Piel seca con imposibilidad de transpirar*.—*Sensacion de ardor ó prurito quemante y lancinante* en la piel.—**Manchas pruritosas ardorosas*, amarillas ó rojas, en *el cuerpo*, á veces con exudacion despues de rascarse.—Miliar urticaria.—Vesículas corrosivas.—Sabañones de un azul rojizo.—*Verrugas.—Herpes.—Las úlceras dan sangre, sobre todo por la noche.

Sueño.—**Mucha gana de dormir por el dia y por la noche muy temprano*.—Sueño incompleto por la noche.—*Tarda en conciliar el sueño*.—**Durante el sueño estremecimientos*, llantos, palabras y sobresaltos con espantos.—*Sueño *agitado con ensueños frecuentes*, *ansiosos* y horrorosos.—Ensueños de ladrones, de muertos, de peligros, de serpientes, de enfermedades, de espectros, de diablos, etc.—Por la noche accesos de angustia, *padecimientos gástricos*, dolor en el estómago y la region precordial, cólicos, flatuosidades, diarrea, erecciones y frecuentes poluciones, *padecimientos asmáticos*, pesadilla y calambres en las pantorrillas.

Fiebre.—*Calofrios por la tarde* con sed, que van acompañados frecuentemente de dolores de muelas.—Calofrio inmediatamente despues de los dolores.—*Horripilacion*

Digitized by

frecuente por el dia.—Calor por la mañana en la cama con dolores en los riñones y en el pecho.—*Supresion de la transpiracion é imposibilidad de efectuarse esta*; ó bien mucha propension á transpirar durante un trabajo intelectual, ó andando.—*Sudores nocturnos.*

Moral.—Tristeza con llantos.—Aprension con ansiedad é inquietud, sobre todo por su salud, con temor de no curarse.—Irresolucion, timidez y carácter perezoso.—Miedo por la nòche en la cama.—Humor adusto, descontentadizo é impaciente.—Humor variable, tan pronto amable y tranquilo, como arrebatado y colérico.—**Disposicion á asustarse.*—**Humor irascible y colérico.*—*Pérdida de la memoria.—Equivoca las palabras y las sílabas.—Pérdida repentina del conocimiento.

Cabeza.—**Embarazo* y pesadez de la cabeza.—*Vértigos* por la mañana, la tarde y despues de comer, así como volviendo prontamente la cabeza y el cuerpo.—Vértigos con vacilacion.—°Vértigo que parece provenir del estómago.—**Dolor de cabeza por el movimiento del carruaje,* en estornudando, tosiendo ó por la mañana.—**Cefalalgia* semilateral *con náuseas* y vómitos, agravada por el mas leve movimiento hasta el punto de hacerse insoportable.—Dolor de cabeza violento á través de los ojos.—**Dolores de cabeza presivos* en el occipucio, sobre todo durante el paseo, con irritabilidad, ó bien en la frente con fotofobia.—Dolores desgarradores y tractivos en la cabeza.—*Dolores de cabeza lancinantes*, principalmente en las sienes.—**Congestion á la cabeza* con latidos y zumbido.—Cabeza temblorosa y sensacion como si hubiera en ella alguna cosa movible.—Los dolores de cabeza se alivian apoyando la frente.—Sensacion como de un golpe en la cabeza, que hace caer de lado con aturdimiento.—*Mucha disposicion á resfriarse la cabeza.—Tumores dolorosos y purulentos en la piel del cráneo.—°Erupcion costrosa en la piel del cráneo.—*Caida y *sequedad de los cabellos.*—°Por la mañana sudor en la frente.—Se presenta una mancha grande, amarillenta y furfurácea en la frente.

Ojos.—Dolor presivo y desgarrador en los ojos.—Sensacion mordicante, escozor, *sensacion de ardor y *punzadas en los ojos.*—°Sensacion de frio en los párpados.—Rubicundez é inflamacion de los ojos con dolores en leyendo á la luz artificial.—**Hinchazon de los ojos* y de los

párpados, con dificultad para abrirlos. — *Hinchazon como una bolsa encima de los ojos, entre las cejas y los párpados.— Excoriacion y supuracion en los ángulos de los ojos.— **Aglutinacion de los párpados, sobre todo por la mañana.* —*Lagrimeo. — Ojos empañados, abatidos.— Propension á mirar fijo.—**Manchas que revolotean delante de la vista* en leyendo ó en mirando á lo alto de la atmósfera.— Colores de arco íris, manchas y chispas delante de la vista.— Claridad viva y dolorosa en los ojos cuando están cerrados, la que se extiende profundamente en el cerebro por la noche despues de acostado. —Fotofobia.—**Deslumbramiento en los ojos por la luz,*

Oidos.—*Punzadas en los oidos*, algunas veces *de dentro á fuera*. —°Frialdad en las orejas.— Hinchazon inflamatoria de los oidos con flujo de pus ó de cerúmen líquido.— Ulcera en las orejas.—Excoriacion y supuracion detrás de las orejas.— **Inflamacion é hinchazon de las parótidas*.—Excesiva agudeza de oido, por la noche al acostarse.—**Audicion débil y confusa*.—Canto, retintin y zumbido en los oidos.

Nariz.—Hinchazon de la nariz, con rubicundez y dolor quemante.—Nariz roja cubierta de granos.—**Ulceracion en el interior de la nariz*.— Epistaxis por la mañana.— **Olfato embotado*.—*Coriza y *obturacion de la nariz*, algunas veces con secrecion de mucosidades de un verde amarillento, y falta continua de aire por la nariz.—Coriza fluente con secrecion de mucosidades sanguinolentas. —Secrecion de mucosidades purulentas por la nariz.—Sequedad de la nariz.

Cara.—**Color amarillo de la cara*, °ó pálido y enfermizo, ojos abatidos y con ojeras. — Excesivo encendimiento del rostro, alternando con palidez.—*Dolor tractivo en la cara.— Dolores de dislaceracion en los huesos de la cara.— **Calor fugaz á la cara.—Abotagamiento de la cara.* — Erupcion de granos en la cara, con hinchazon y *rubicundez de las mejillas*. — *Hinchazon entre las cejas y los párpados.—°Granos en las cejas.—°Verrugas en la cara.—Efélides.— Labios gruesos y ulcerados.— Labios esquebrajados y que se esfolian.—Labios pálidos.—Sensacion calambroídea en los labios.—Calambres en la mandíbula.— Hinchazon de la mandíbula inferior y de las glándulas submaxilares.

Dientes.—**Odontalgia únicamente cuando se come*, ó por la mañana al despertarse, ó bien provocada por tomar cosas frias (el agua).—*Odontalgia con dolor de los huesos de la cara*, y dolores tractivos, estremecientes ó desgarradores, sobre todo al principio de la noche en la cama. —**Dolores de muelas lancinantes*, ¯con hinchazon de la mejilla.— Como si escarbaran, terebracion, sensacion de picoteo y como si royeran en los dientes.—Hinchazon inflamatoria y ulceracion de las encías.

Boca.— Exhala un olor fétido por la boca.—Sensacion de sequedad en la boca, con acumulacion abundante de saliva.— Excoriacion y vesículas en el interior de la boca y sobre la lengua.—Hinchazon de la lengua.

Garganta.—*Irritacion de garganta con dolor lancinante*, al tragar.— Deglucion impedida, como por inercia de los músculos de la garganta.—**Acumulacion de mucosidades abundantes en el paladar* y en la garganta.—**Ruido estrepitoso de mucosidades.*

Apetito.—**Gusto amargo*, ó ácido.—*Mal gusto de boca como por desarreglo del estómago.—Sabor pútrido, dulce, ó como si se tuviera sangre en la boca.—Bulimia.— **Mucho deseo de azúcar* y ácidos.— Horror al pan negro, que hace peso en el estómago.—La leche no sienta bien. — Despues de la comida, deseo de dormir, palidez del rostro, calofrio, *dolor de cabeza*, mal humor, *náuseas*, erutos ácidos y pirosis, cólicos, *timpanitis* y flatuosidades. — Despues de haber tomado alimentos calientes (sopa ó de pastelería), pellizcos é inquietud en el vientre.

Estómago.— Erutos frecuentes.—**Erutos* y regurgitaciones *ágrias*. — Pirosis.—*Náuseas*, hasta hacer perder el conocimiento, algunas veces durante la comida.—**Náuseas angustiosas con deseo de vomitar*, ¯sobre todo despues de la comida, ó de una emocion moral.— Vomituricion por la tarde.— Vómito de alimentos y de sustancias ácidas, con postracion de fuerzas como si fuese á caer en desfallecimiento.— Vómito nocturno de los alimentos. —**Plenitud de estómago*, sobre todo *despues de la comida*.— Presion en el epigastrio.— °Tension por encima del estómago.—*Calambres de estómago*, contractivos, renovados por todos los alimentos y bebidas, ó bien por la noche con vómitos.— *Pellizcos, ¯como si escarbaran y *punzadas en el estómago.— Lancinaciones en el epigastrio é hipo-*

condrios, que suspenden la respiracion.—Pulsaciones en el epigastrio.

Vientre.—°Dolor en el hígado bajándose, como si estuviera comprimido.—Dolor quemante, *presion y punzadas en el hígado.—Presion y punzadas en la region renal.*—Dolores de vientre con erutos frecuentes.—**Presion en el bajo vientre*, °*sobre todo bajándose.—Mucho meteorismo*, sobre todo despues de la comida.—°Inquietud y **peso en el vientre.*—Espasmos abdominales contractivos.—*Cólicos semejantes á los dolores de parto*, algunas veces con dolores de riñones.—Punzadas en todo el vientre.—°Inercia y *frio en el vientre.—°*Hinchazon hidrópica del vientre.*—Traccion y *punzadas en las ingles.*—°Produccion abundante y **retencion de gases.—°Emision suprimida de gases ó **inmoderada*, á veces precedida de dolor presivo en el recto.

Deposiciones.—**Estreñimiento*, á veces cada dos dias.—**Compresion del vientre* y evacuacion difícil de *excrementos de una mole muy voluminosa.—***Inactividad del recto.*—Conato inútil de deponer y deposicion insuficiente.—*Diarrea*, frecuentemente por la tarde y por la noche con dolores cólicos y mucha postracion física.—Evacuacion de mucosidades ó de sangre durante las deposiciones.—Salida del ténia y de lombrices.—Angustia antes de la deposicion.—**Prurito en el ano.*—Dolores desgarradores, lancinantes, incisivos y quemantes en el ano (y en el recto), sobre todo despues de las deposiciones.—**Granos hemorroidales en el ano*, dolorosos, que sangran y con dolor lancinante.—Excoriacion y erupcion pustulosa en el ano.

Orinas.—**Gana frecuente de orinar y emision poco abundante de una orina inflamada.*—*Emision frecuente de orina dia y noche.—Dolores incisivos en la vejiga de derecha á izquierda.—*Sensacion que causa ardor en la uretra*, sobre todo *al orinar*.

Partes viriles.—Tension, dolores dislacerantes y estirones en el glande y el miembro viril.—Prurito y dolor de contusion en el escroto.—*Hinchazon caliente de los testículos y del cordon espermático.—*Exaltacion excesiva ó ausencia del apetito venéreo.*—*Repugnancia al cóito.—*Falta de erecciones, ó *muy frecuentes y dolorosas.*—*Falta de poluciones, ó *poluciones inmoderadas.—***Des-**

pues del cóito y las poluciones, *debilidad* en todo el cuerpo, °pero especialmente en los ojos.

Reglas.—Repugnancia al cóito en la mujer.—Durante el cóito, pellizcos y dolor de excoriacion en la vagina.—*Sensacion continua como si todo se dirigiese y pesase sobre las pârtes genitales*.—Dolor quemante y *punzadas en la vulva*.—°Erosion, *prurito y como si royeran en las partes genitales internas y externas.—*Reglas muy abundantes ó muy débiles*.—**Supresion de las reglas*.—Flujo de sangre en las embarazadas.—*Sangre menstrual corrosiva. —*Durante las reglas, erupcion pruritosa y excoriacion entre los muslos.—Síntomas gástricos y sueño agitado y angustioso, durante las reglas.—**Leucorrea*, °algunas veces con dolores de riñones violentos y dolorosos como los del parto.— Leucorrea amarilla con prurito y sensacion de quemadura en la vulva.

Laringe.—**Ronquera y carraspera en la garganta*, con estornudos violentos.—Afonía.—Facilidad á atragantarse. —Sensacion como si hubiera alguna cosa detenida en la laringe.— Tos moviendo los brazos (tocando el violin). —*Tos provocada por un cosquilleo*.—*Tos seca, sobre todo por la noche* y la tarde; por la mañana con expectoracion.— Tos calambroídea, con vomituricion y vómitos, sobre todo por la mañana.—En tosiendo, punzadas en la garganta ó en el pecho.—Expectoracion difícil por la tos.— *Expectoracion purulenta por la tos*.—Coqueluche.

Pecho.—*Respiracion difícil.—Respiracion corta por la mañana. —**Respiracion difícil*, °andando de prisa ó *por la mañana*.—°Asma espasmódico.—Opresion angustiosa en el pecho.—La respiracion se hace entrecortada por la noche.—°Silbido en el pecho.—°*Opresion en el pecho como por hidrotorax*.—Dolor en el pecho, hablando.— *Calambre en el pecho °algunas veces tosiendo.—Sensacion en el pecho, como por contraccion del corazon.— Presion, dolor quemante y *punzadas en el pecho*, algunas veces respirando.— Dolores incisivos en el pecho.—Palpitaciones de corazon (algunas veces con angustia) sobre todo por la mañana al despertarse, con ebullicion de sangre.

Tronco.—**Dolores de riñones*, °aun despues de una caida. — Dolor de contusion en el dorso durante la comida.— **Dolor tractivo en el dorso*, que frecuentemente parece

provenir de los riñones.—*Rigidez entre los omóplatos. —**Rigidez de la nuca.*—°Debilidad de los músculos del cuello.—°*Bocio.*—*Hinchazon dura de las glándulas axilares y de las del cuello.*—Sudor en las axilas.

Brazos.—Hinchazon en el hombro, con dolores.—*Presion sobre el hombro.—Tension, dislaceracion, estirones, en los músculos y en las articulaciones de la espalda, de los brazos, de las manos y de los dedos.—Frio. rigidez y **adormecimiento de los brazos*, ¯sobre todo al frio, ó despues de un ejercicio violento.—**Falta de energía en los brazos*, ¯y en las manos, °sobre todo por la mañana en la cama.—Estremecimiento frecuente en los brazos.—*Rigidez en la articulacion del codo.—°Dolor paralítico en la muñeca.—Punzadas en la muñeca y los dedos durante el movimiento.—*Temblor de las manos escribiendo.—Las manos están frias.—Piel de las manos, áspera y agrietada.—Torpeza y adormecimiento de la punta de los dedos.—Dolor ardoroso en la punta de los dedos.—Vesículas corrosivas en los dedos.—Estremecimiento en los dedos, cosiendo.

Piernas.—**Tirones agudos*, sobre todo por la noche, en las articulaciones y los huesos de las caderas, de las piernas, de los piés y dedos.—**Tirones presivos y desgarradores en las piernas.*—Estremecimiento de los músculos en las nalgas y los muslos.—**Dolor quemante y punzadas en las piernas y piés.*—Inquietud en las piernas, por la tarde.—Torpeza y adormecimiento de las piernas.—°Horripilacion con hormigueo en la tibia.—°Hinchazon de las piernas y *de los piés.—*Rigidez de la articulacion del pié.—Punzadas en las articulaciones del pié.—**Frio en los piés*, aun al anochecer en la cama.—Adormecimiento de los piés despues de la comida.—**Sudor °fétido de los piés.*—Dolor quemante y **punzadas* en la parte carnosa del dedo pulgar.—*Callos en los piés, dolorosos al tacto.

Digitized by Google

112.— KALI CHLORICUM.

KAL-CH.—Clorato de potasa; muriato oxigenado de potasa.—*Archivos de* STAPF. —*Hist. nat. y prep.*—Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 1, 5, 30?*Duracion de accion*: muchas semanas en algunas afecciones crónicas.
ANTÍDOTOS: Bell.? Puls.?
COMPÁRESE CON: Amm. arn. *bell.* calc. cocc. kal. natr-m. *nitr.*

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá en los casos que se pueda consultar este medicamento contra: —Afecciones escorbúticas; Obstrucciones de las vísceras abdominales y padecimientos hemorroidales?; *Prosopalgias*; Melancolía?; Padecimientos asmáticos?, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SÍNTOMAS GENERALES.—Tirones y dolores desgarradores en los miembros.— Estremecimientos frecuentes en el cuerpo, y sobre todo en la cabeza.—Mucha flojedad y laxitud.—Prurito por todo el cuerpo, sobre todo por la noche en la cama.—Erupciones miliares.—Granos pruritosos.—*Mucha disposicion al frio, calofrios contínuos*, y horripilacion, á veces con rigidez de las manos.—Frio contínuo en los piés.—*Pulso frecuente* y acelerado.—*Sueño agitado*, á veces con ronquido ruidoso, mucha dificultad de la respiracion y decúbito supino.—*Sueños pesados, con ansiedad*, ó penosos.—Ensueños pronosticando la muerte, ó de una muerte á consecuencia de una fiebre tifoídea; ensueños lascivos, con poluciones.—Mal humor y ansiedad, con tension en la region precordial, mejorado despues de haber salido sangre por la nariz.—Humor triste, apático, con disgusto de la vida y despeluzamiento, *sobre todo por la tarde.*

Cabeza.—Nariz. — *Cabeza atontada y pesada.* — Vértigos con congestion de sangre á la cabeza, despues de ejercicios forzados.—La cerveza y el vino embriagan fácilmente; es lo bastante un vaso para hacer perder la razon.— Dolores de cabeza contínuos sobre todo por la

Digitized by Google

tarde.—Dolor de cabeza, con vértigos.—Dolores en las sienes y en el occipucio, los que se propagan á veces hasta las mandíbulas.—*Tension en la frente*, seguida algunas veces de coriza y estornudos.—*Congestion de sangre en los ojos.*—Presion, punzadas en los ojos y calambres.—Llamas y chispas delante de los ojos, en tosiendo y estornudando.—*Coriza violento* con *estornudos frecuentes*, y secrecion abundante de mucosidades.—*Salida de sangre por la nariz*, aun por la noche.

Cara.—Dientes.—*Dolores tractivos, calambroideos, tensivos, presivos y tirantes en los músculos y los huesos de la cara.*—Punzadas en la cara.—Calor pasajero en la cara.—Erupciones de granos en la cara, en la frente y entre los labios y la barba.—*Hinchazon de los labios.*—Dentera.—Dolor de las muelas de la mandíbdla superior.—Hemorragia de las encías.—Encías de un color rojo pálido.

Boca.—Estómago.—Sensacion de frio en la lengua y en la garganta.—*Lengua cubierta de una capa blanca.*—Secrecion abundante de saliva y de mucosidades en la boca.—Saliva acidulada.—Sequedad, aspereza y opresion en la garganta.—Deglucion difícil.—Gusto ácido de la boca, amargo, salado, ó empireumático.—Accesos de bulimia, aliviados á veces bebiendo agua fria.—Erutos de aire, frecuentes.—Erutos ácidos.—*Presion en el estómago y en la region precordial*, á veces con necesidad de erutar ó con humor apático y despeluzamiento.—Sensacion de calor ó de frio en el estómago.—Dolores incisivos en la region epigástrica.

Vientre.—Partes genitales.—Movimientos frecuentes en el vientre, con disposicion á la diarrea.—Flatuosidades abundantes.—*Deposiciones tardas, duras y secas.*—*Deposiciones liquidas diarréicas*, á veces mucosas.—Diarreas dolorosas.—Conato frecuente de orinar.—*Orinas turbias.*—Erecciones frecuentes, violentas.—Poluciones frecuentes con ensueños lascivos.—Prurito en el escroto y en la uretra.

Pecho.—Miembros.—Ronquera.—Tos violenta á veces con coriza.—Tos como provocada por el vapor del azufre con sequedad en la garganta y en el pecho.—*Opresion de pecho*, con sensacion de constriccion.—Congestion de sangre al pecho.—*Palpitaciones violentas de corazon*, á veces con opresion de pecho y frio en los piés, ó

Digitized by Google

con sensacion de frio en la region del corazon.— Dolores tractivos y dislacerantes en los antebrazos y en las muñecas.— Frio extraordinario en el brazo.— Padrastros inflamados en la raiz de las uñas.—Flíctenas y granos pruritosos en el dorso de las manos.— Dolores lancinantes violentos en las rodillas.

113.—KALI HYDRIODICUM.

KAL-H.—Hidriodato de potasa.—HARTLAUB Y TRINKS.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—Medicamento todavía muy poco conocido.

SINTOMAS GENERALES.— Dolores de dislaceracion en los miembros.— La mayor parte de síntomas se manifiestan durante el reposo y se disipan por el movimiento. — Bostezos muy frecuentes.— *Insomnio.*— Pasa las noches inquietas ; se despierta sobresaltado y asustado.— Predominio de *frio ó calofrios* , con sed.— Inquietud por la tarde con gana de llorar, como si se esperase alguna gran desgracia.— Disposicion á asustarse. — Irascibilidad , arrebatos y humor querelloso.

Cabeza.— Nariz.— Pesadez de cabeza con humor triste; no se sabe dónde descansar la cabeza.— Violentos dolores de cabeza , compresivos ó expansivos , con sensacion de frio en la parte dolorida, que sin embargo está caliente.— Cabeza como hueca , ó pulsacion de un solo lado de la frente.— Dolor de ulceracion en la piel del cráneo, en rascándose.—Dolor quemante en los ojos con fotofobia.— Vision confusa.— Otalgia , con dolores lancinantes , desgarradores y mucha sensibilidad del oido. — Dolores desgarradores en la cara , con hinchazon en la mejilla.— Palidez del rostro.— Herpes secos, pruritosos de la mejilla.— Mucha sensibilidad de las ventanillas nasales.— Dolores dislacerantes , y dolor quemante en las ventanillas de la nariz.— *Epistaxis.*— Obturacion de la nariz , con secrecion de serosidades corrosivas y ardientes.

Cara.—Apetito.— Labios secos , agrietados y cubiertos por la mañana de mucosidades viscosas.— Dolor de ul-

Digitized by Google

ceracion en los dientes por la noche.—Odontalgia agravada por el contacto de alguna cosa fria y aliviada con tomar cosas calientes.—Encías hinchadas con dolor de ulceracion lancinante.—Vesículas quemantes y dolorosas en la lengua.—Saliva sanguinolenta, con la boca enferma.—Exhala por la boca un olor fétido, como de cebolla.—Irritacion de garganta lancinante durante la deglucion, unas veces con presion y otras con dolor de ulceracion.—Amargor, ó un sabor amargo dulce en la boca.—Gusto rancio despues de tomar cualquier alimento ó bebida; insipidez de los alimentos.—Disposicion contínua á echar agua por la boca, como de pituitas, con repugnancia á todos los alimentos.

Estómago y vientre.—Sensacion de vacío y de desfallecimiento del estómago, el que no se mejora por el alimento.—Cloqueo, especie de gritos y borborigmos en el estómago.—Presion quemante en el estómago que no se alivia con los erutos.—Dolores abdominales, ardorosos, incisivos, en la region umbilical, con sensacion de angustia y erutos en el estómago, despues de pasear al aire libre.—Timpanitis dolorosa.—Borborigmos en el vientre, como por alguna cosa viva.—Presion y sensacion como si todo se precipitase hácia las ingles, ó apretamiento, como por gárfios en estas partes, ó como si alguna cosa quisiera salir por la vagina.—Traccion en la region lumbar, y sensacion como si hubiera alguna cosa viva.

Deposiciones.—Reglas.—Deposiciones duras, tenaces, difíciles de evacuar.—Diarrea con dolor de riñones como de quebrantamiento, ó como si las reglas quisieran presentarse.—Conato urgente de orinar, con emision abundante dia y noche.—Reglas mas abundantes que de ordinario.—Leucorrea ácre, que excoría la piel.

Laringe y miembros.—Tos seca, provocada por una irritacion contínua en la tráquea-arteria, con carraspera.—Tension y sensacion de hinchazon en las espaldas, así en el estado de movimiento como en el de reposo.—Contraccion de los dedos.—Dolor en las caderas, que hace cojear, con punzadas á cada paso.

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA.

II.

Tetuan de Chamartin, 1876 —Imp. de C. Bailly-Bailliere.

Digitized by Google

NUEVO MANUAL

DE

MEDICINA HOMEOPÁTICA

PRIMERA PARTE

MANUAL DE MATERIA MÉDICA

Ó

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES EFECTOS DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS CON INDICACION DE LAS OBSERVACIONES CLÍNICAS

Por

EL DOCTOR G. H. G. JAHR

Tercera edicion castellana,

ARREGLADA Á LA OCTAVA FRANCESA POR EL DECANO DE LOS HOMEÓPATAS ESPAÑOLES

D. PEDRO RINO Y HURTADO

Doctor en medicina y cirugía.

Tomo Segundo.

MADRID

CARLOS BAILLY-BAILLIERE

LIBRERÍA EXTRANJERA Y NACIONAL, CIENTÍFICA Y LITERARIA

Plaza de Sta. Ana, num. 10.

Paris, J. B. Bailliere. || Londres, Bailliere.

1876.

Digitized by Google

MATERIA MEDICA HOMEOPATICA.

114.—KALMIA LATIFOLIA.

KALM.—Kalmia de hojas anchas,——*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop. - Hering, *Estudios patogenésicos de la América del Norte.*

CLINICA.—Examinando los síntomas característicos de este medicamento, se verán los casos en que se le podrá consultar con éxito contra las afecciones tales como:—*Enfermedades del corazon, que alternan con reumatismos, ó que deben su origen á estos últimos*; Hipertrofia del corazon; engrosamiento de las válvulas; Tiña; Herpes; Afecciones sifilíticas secundarias de la piel; *Gota y reumatismo, sobre todo en los paises del Norte de Europa*; Fiebres intermitentes ó *remitentes*, que tienen un carácter gástrico ó tambien tifoídeo, etc.; *Pulso y pulsaciones del corazon demasiado frecuentes* *Véase la nota*, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores en los músculos de los miembros, que frecuentemente cambian de sitio*; °Dolores de los miembros á consecuencia de una luxacion ó de una lisiadura.—Laxitud y entorpecimiento en los miembros, aumentados por el movimiento; desaparicion por la posicion acostada.—*Los sufrimientos de la cabeza y del tronco afectan de preferencia el costado derecho*; los de los *miembros*, el *izquierdo*; los miembros *superiores* son tambien mas afectados en el *izquierdo*; los *inferiores* en el *derecho*.—Muchos dolores se dirigen tambien de arriba abajo.

Piel.—Picotazos en la piel; manchas rojas, inflamadas, pruritosas; erupciones erisipelatosas, como las que produce el *rhus*.

Sueño.—Sueño agitado, con cambio frecuente de sitio; durmiendo, se levanta y se pasea en la habitacion; habla durmiendo.—Ensueños desagradables; otros fantásticos.

Digitized by Google

Síntomas febriles.—Horripilaciones y escalofrios.—Calor y ardor con dolores lumbares.—Sudor frio.

Cabeza.—*Vértigos*: á cada conato de movimiento: *durante los dolores en la cabeza y los miembros.*—Cabeza embarazada y dolorida, durante los dolores de los miembros, ó bien por la tarde principalmente.—*Cefalalgia frontal, por la mañana, al despertar*; agravacion de los síntomas de la cabeza hácia la tarde.—Dolor de cabeza con vértigos y náuseas.

Ojos.—*Oscurecimiento frecuente de los ojos*, sobre todo mirando hácia abajo, con náuseas y erutos.—Vista turbia.—Presion, punzadas y prurito en los ojos; los ojos sufren mas por la tarde.

Oidos.—Punzadas en los oidos.—Retintin en los oidos.

Nariz.—Nariz frecuentemente tapada, sobre todo por la tarde.—Estilicidio de la nariz con frecuentes estornudos y muy sensible olfato.

Cara.—Palidez de la cara.—Piel rugosa de las mejillas, cada verano; por la noche prurito en la cara.—*Dislaceracion y punzadas en los huesos de la cara y las mandíbulas*; °prosopalgia de Fothergill.—*Labios*: secos é hinchados, rígidos, por la mañana; agrietados, con sequedad de la piel del cuerpo.

Dientes.—Dolores sobre todo en los dientes superiores: dolores que de la cabeza pasan á los molares superiores y á las órbitas.

Boca y garganta.—Lengua blanca, seca.—Punzadas en la lengua.—Inflamacion de las glándulas sublinguales; aumento de saliva; poco despues de comer, hormigueo en las glándulas salivales, con fermentacion en la garganta.—En la *faringe*: contínua ascension de mucosidades; sensacion de una bola que sube ó de una hinchazon; picazon y apretamiento, con dolor al tragar y latidos en las amígdalas; presion con náuseas y punzadas en los ojos; *deglucion difícil*, á veces con la garganta seca y sed.

Gastricismo.—Náuseas; con vértigos y dolor de cabeza; *con oscurecimiento de los ojos*; durante el dolor de la garganta, flatuosidades encarceladas, opresion de pecho y dolores en los miembros.—Regurgitacion como una especie de rumia con mucha bílis.—Contínua vomitericion (sufrimientos gástricos y delirio).

Estómago.—Estómago embarazado, con sensacion de calor interior, picotazos en la piel, sudor moderado, despues gana de dormir, vértigo y oscurecimiento de la vista; sensacion de contraccion en el estómago, y de una bola, que sube á la garganta, con erutos; ardor en la region estomacal.—En la *boca* del estómago, presion, agravada por estar sentado encorvado y mejorada por estar sentado derecho, con *sensacion como si, por cima del cardias, estuviese alguna cosa espachurrada.*

Vientre.—En la region *hepática*, dolor y presion.—Dolores en el hipocondrio derecho del vientre.—Encarcelacion de flatuosidades con náuseas.—Sensacion de debilidad en el vientre, como en la matriz, que sube hasta la garganta y alguna vez desaparece por los erutos.

Defecacion y ano.—Cámaras blandas.—°Diarreas?—°Disenterías?

Orinas.—Frecuente emision de orinas amarillas, poco abundantes.

Reglas.—Ménstruos insuficientes y tardíos, con dolores en la espalda, los lomos y los muslos.—Leucorrea amarilla.

Laringe.—Cosquilleo en la tráquea; ruido al respirar, como por un espasmo en la glotis.—Tos dia y noche, excitada por picazon en la garganta; con expectoracion mucosa por la tarde; con expectoracion fácil de materias grises, lisas como la grasa, de gusto pútrido y salado, y que caen en pedazos al extenderse.

Pecho.—*Opresion de pecho y disnea*, sobre todo durante los dolores reumatismales ó las náuseas; opresion de pecho que fuerza involuntariamente á suspirar.—Punzadas en la parte inferior del pecho.—°Afecciones crónicas y agudas de los pulmones.—*Latidos del corazon, hipertrofia del corazon*, con engrosamiento de las válvulas por consecuencia de reumatismos agudos.

Tronco.—Sensacion de parálisis dolorosa en la region sacra, por de noche en la cama.—°*Dolores violentos en el dorso*, los lomos, la espina dorsal y las vértebras.—Presion, punzadas y distension, en los lados del cuello; dolor en las vértebras de la nuca.

Miembros torácicos.—Dolores, presion, dislaceracion en los brazos, las escápulas, las manos, sobre todo la

izquierda; *dolor paralítico en la mano*, tanto la izquierda como la derecha.

Miembros pelvianos.—Dolor en las rodillas y alrededor.—Dolor de relajacion en los piés.—Punzadas en la planta de los piés y en los dedos gordos.

115.—KREOSOTUM.

KRE.—Creosota.—WAHLE.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.— *Dósis usadas*: 6, 30.—*Duracion de accion*: 4 á 5 dias.

ANTÍDOTOS: N-vom iod.? Cham.

COMPÁRESE CON: Ars. cham. chin. hep. iod. merc. mur-ac. nitr-ac. n-vom. petr. phos-ac. puls. sil. sulf.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones reumáticas y artríticas, aun con hinchazon?; *Afecciones escrofulosas*: Hemorragias; Erupciones sarnosas?; Supuraciones?; Ulceras gángrenosas, carcinomatosas, pútridas, etc.?; Heridas?; Excoriaciones?; Ulceras por decúbito?; *Herpes farináceos y pustulosos*; Tiña?; Plica-polaca??; Blefaroftalmías; *Oftalmias*; Acné rosa; Herpes faciales; *Odontalgias*; Afecciones escorbúticas de las encías; Hemorragias nasales y bucales?; Anginas con ulceracion??; Anginas sifilíticas??; *Mal de mar*; Dispepsia?; Gastralgia?; Disenterías?; Orinarse en la cama á consecuencia de un sueño muy profundo; Náuseas de las mujeres embarazadas; Padecimientos á consecuencia de un cáncer de la matriz; Metrorragias; Dismenorreas; *Leucorreas*; Disposicion al aborto; Catarros crónicos, principalmente en las personas de edad avanzada; Grippe; Padecimientos tísicos?; Hemoptísis?; Tísis laríngea?; Enfermedades del corazon?; Dolor de riñones; Coxalgia, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolor de excoriacion y de ulceracion*; sensacion paralítica dolorosa; dolores tirantes y lancinantes.—Dolores como si pellizcaran y *punzadas sobre todo en las articulaciones.—Laxitud, torpeza y *cansancio sumo en todos los miembros*, sobre todo en las

Digitized by Google

piernas.—Sacudidas en los miembros, sobre todo por la noche durmiendo.—*Dolores nocturnos.—Accesos de desvanecimiento, por la mañana al despertarse.—Disposicion á desmayarse en una habitacion caliente, con calor en la cara y respiracion corta.—Accesos de entorpecimiento, con palidez y frio en muchas partes que entonces se hallan como muertas.—*Dolores de contusion ó de magulladura.*—Sobreexcitacion de todo el cuerpo.—°Inquietud por todo el cuerpo, sobre todo durante el reposo.—Los dolores aparecen mas fuertes durante el reposo.

Piel.—Prurito violento por todo el cuerpo, sobre todo hácia la tarde y con sensacion ardorosa en los brazos y en las piernas, despues de haberse rascado.—Prurito quemante nocturno y calor en todo el cuerpo.—Erupciones urticarias.—Erupciones de tuberosidades semejantes á las de las picaduras de chinches, con prurito violento, sobre todo por la tarde.—°Herpes farináceos y pustulosos, secos ó húmedos, pero con prurito violento en casi todas las partes del cuerpo.

Sueño.—*Mucha gana de dormir con bostezos frecuentes*, ¯*á veces* con gusto pútrido en la boca, y falta de apetito.—Bostezos por accesos, con calofrios, lagrimeo, dolores presivos en la frente, ó laxitud.—*Necesidad continua de dormir.—Dificultad para dormirse*, á consecuencia de inquietud en todo el cuerpo, ó de una sensacion de fatiga con dolores en los miembros.—*Sueño agitado*, ¯con anhelacion.—Se despierta frecuentemente por la noche.—Sueño no reparador, con sensacion paralítica en todos los miembros al despertar.—Por la noche dolores de riñones, calofrios interiores, pulsacion en la cabeza, inquietud en todo el cuerpo, dolores presivos y ardorosos en los ojos, aglutinacion de los párpados, etc.—Cuando se está durmiendo sobresaltos con espantó.—*Ensueños frecuentes*, ¯*angustiosos*, ensueños de nieve, de caidas, de persecuciones, de envenenamientos, de enflaquecimiento, de incendios, de erecciones, de gana de orinar, y de ropas súcias y asquerosas.

Fiebre.—Sensacion febril por todo el cuerpo, con buen apetito.—*Predominio de frio*, ¯despeluzamiento fácil y *calofrios frecuentes, á veces con calor en la cara, rubicundez de las mejillas*, frio en los piés, sensacion de peso en los

brazos, y excesivo mal humor; ó con epistaxis, ó dolores de riñones, dolor en la cabeza y en los ojos, tos con sensacion de dolor, etc.—Sed con los calofrios.—*Calor febril con rubicundez de las mejillas*; despues sudor seguido de dolor de riñones.—Pulsacion por todo el cuerpo, sobre todo durante el reposo.—Pulso pequeño y suprimido.

Moral.—Inquietud estando sentado; con despeluzamiento y necesidad frecuente de respirar profundamente, lo que sin embargo es imposible.—*Mucha disposicion á llorar*; á veces con morosidad ó con humor melancólico.—Sobreexcitacion contínua con caprichos y disposicion á enfadarse.—*Mal humor.—Hácia la tarde abatimiento moral y desesperacion de curarse.—Dulce melancolía, con deseo de la muerte.—Facilidad á olvidar las ideas.—**Debilidad de la memoria*.—Ausencia frecuente de entendimiento y estupidez.

Cabeza.—Vértigo con facilidad á caer, á veces por la mañana al aire libre.—Dolores de cabeza, como despues de la embriaguez.—Dolores de cabeza á causa de emociones morales.—Dolores de cabeza con gana de dormir y traccion de los párpados, ó *rubicundez de la cara*, *laxitud* (sobre todo en las piernas), gusto amargo, mal humor y disposicion á llorar.—Sensacion de tension, peso y plenitud en la cabeza, á veces *como si todo quisiera salir por la frente*, *sobre todo al bajar la cabeza*.—Sensacion de peso en el occipucio, como queriendo obligar á hacer caer la cabeza hácia atrás.—Presion y compresion dolorosas, sobre todo en el vértice, en las sienes y en la frente.—**Dolores pulsativos y latidos en la cabeza*, *sobre todo en la frente*.—Dolores tractivos, tirones agudos y punzadas en la cabeza que á veces se extienden hasta las mandíbulas y los dientes.—Los dolores de cabeza comienzan algunas veces desde por la mañana al despertar.—Punzadas á un lado de la cabeza, con pérdida de las ideas.—°Zumbido sordo en la cabeza.—Dolor de la piel del cráneo al tacto.—*Caida de los cabellos.—Granos miliares en la frente.—°Granos en la frente como los de los borrachos.

Ojos.—Ojos rojos y húmedos, como despues de haber llorado.—Ojos abatidos y empañados.—*Prurito en los ojos con escozor despues de haberlos frotado, rubicundez

Digitized by Google

inflamatoria de la esclerótica y presion como por arena. —*Calor y sensacion quemante continuos en los ojos y lagrimeo frecuente*, aun por la mañana al despertar, y sobre todo mirando al sol.—Oftalmía catarral, con flíctenas.—*Los ojos están constantemente como inundados de lágrimas.* —*Lágrimas ardientes y corrosivas.*—*Aglutinacion nocturna de los párpados.—Rubicundez é *hinchazon de los párpados*, °y de los bordes de estos.—*Herpe furfuráceo en los párpados.—Estremecimiento de los párpados.—**Vista turbia como á través de un velo*, ó como si los ojos estuviesen cubiertos de pelusa.

Oidos.—Calor y rubicundez quemante en las orejas.—*Hinchazon inflamatoria de la oreja* con dolores tensivos, ardorosos, ó con rigidez dolorosa del cuello ó del lado afecto; dolores hasta el hombro y el brazo, calor en la frente y presion por encima de los ojos.—Tirones y punzadas en los oidos, ó dolores calambroídeos presivos y expansivos.—Zumbido de oidos y dureza de estos que alternan con retintin y silbido en la cabeza.—°Herpes húmedos en las orejas.

Nariz.—Mal olor y fetidez de la nariz, á veces con falta de apetito.—La nariz está constantemente húmeda.—Salida de sangre de la nariz aun por la mañana; la sangre es de un color rojo claro ó seroso, ó espesa y negra.—**Estornudos frecuentes*, °sobre todo *por la mañana*.—Coriza fluente con sensibilidad dolorosa de las rosas nasales al respirar.—Coriza con sensacion de escozor en el esternon.—*Coriza seco con estornudo frecuente.

Cara.—*Calor frecuente y aun continuo de la cara*, á veces con pulsacion en las mejillas y la frente, y con rubicundez oscura de toda la cara, y gana frecuente de orinar. —°Acné rosa.—Color pardusco, térreo, de la cara.—Herpes furfuráceos en las mejillas, en los párpados y alrededor de la boca.—Dolor tractivo agudo, en el lado derecho de la cara, desde la mandíbula hasta la sien.—Sequedad de los labios como por un calor interior.—Granos pustulosos en la barba y en la mejilla; los que se cubren de costras amarillentas.

Dientes.—**Dolores tractivos y tirones sucesivos en los dientes*, aun por la mañana al despertar, y á veces con dolores en el lado enfermo de la cara hasta la sien.—Dentera.—Rubicundez inflamatoria de las encías.

Digitized by Google

Boca y garganta.—Lengua pálida y lácia con acumulacion de una saliva serosa en la boca.—Sequedad contínua en la garganta con sed ardiente y frecuente.—Picor y aspereza en la garganta.—Dolor de excoriacion ó presion en la garganta al tragar.—Sensacion de estrangulacion dolorosa en el fondo del gaznate, que se propaga hast a el pecho y el dorso.

Apetito y estómago.—*Gusto amargo, sobre todo en la garganta* y al tragar los alimentos.—Sabor insulso de la boca.—Pérdida total del apetito, á veces con lengua pálida y lácia, acumulacion de saliva en la boca y sed ardiente.—Erutos de aire y ágrios.—Náuseas con gana de vomitar, salivacion y calofrio por todo el cuerpo, ó con sensacion quemante en la boca.—**Vomituricion, sobre todo por la mañana en ayunas, como en la preñez*, y á veces con vómitos de agua y de mucosidades, sequedad de la nariz, calor y dolor presivo en la frente, sed y frio en las manos y en los piés.—Vómitos de aguas dulces por la mañana en ayunas.—Opresion en el estómago y en el epigastrio, que no permite sufrir la presion de los vestidos.—°*Dureza en la region del cardias, con sensibilidad dolorosa al tacto.*—Pulsacion en la region estomacal que recorre hasta toda la parte superior del cuerpo, sobre todo durante el movimiento.

Vientre.—Dolores lancinantes y presivos en la region hepática.—Sensacion de plenitud y dolor de contusion en el hígado.—*Dolor de ulceracion en el vientre*, al respirar y durante el movimiento; los dolores quitan á veces el sueño de noche.—Sensacion dolorosa de frio en el vientre con orinas muy raras.—*Meteorismo y tension de vientre*, á veces con respiracion entrecortada.—Dolor contractivo en el vientre, aun por la noche, y hácia la mañana, con sensacion como si en la region umbilical hubiese una masa dura y contraida.—Punzadas en el vientre, las que á veces se propagan hasta las partes sexuales.—*Cólicos semejantes á los dolores de parto*, á veces con gana frecuente de orinar, mal humor, irascibilidad, calofrios despues del acceso, y á veces tambien flujo lechoso por la vagina.

Cámaras y orinas. — Deposiciones duras, secas, difíciles y que solamente se efectúan cada tres ó cuatro dias. —*Muchas deposiciones por dia.*—Tirones, dolores tracti-

Digitized by Google

vos agudos y calambroídeos en el recto.—*Disminucion ó aumento excesivo de la secrecion de la orina.*—**Conato frecuente y urgente de orinar aun por la noche.*—Orinas de color oscuro, turbias.—Orinas fétidas sin color.—*Sedimento rojizo* ó blanquecino en las orinas.—Orinas ardientes, corrosivas.

Reglas.—*Reglas muy adelantadas, de mucha duracion y muy abundantes de una sangre negra.—Antes de las reglas, espasmos abdominales, flores blancas, irritacion é inquietud, vómitos mucosos ó erutos espumosos y meteorismo.—**Durante las reglas dureza de oido*, ¯emision de gases fétidos, estreñimiento y encarcelacion de flatuosidades, *zumbido y ruido en la cabeza, ¯con dolores presivos, cólicos, retortijones, dolor de riñones, calofrios contínuos, ó sudor en el dorso y en el pecho.—Despues de las reglas, espasmos abdominales, presion en las partes genitales, flores blancas y °otros muchos padecimientos.—°Metrorragias.—*Flores blancas*, corrosivas ó benignas, á veces seguidas de agotamiento de las fuerzas y de fatiga, ¯sobre todo en las piernas.—Dolores calambroídeos en las partes genitales externas.—Excoriacion con dolores que producen escozor entre las partes genitales y los muslos.—Punzadas en la vagina, como producidas por la electricidad.—Prurito voluptuoso en la vagina.—Deseo del cóito en la mujer, sobre todo por la mañana.—Despues del cóito dolor de excoriacion y nudosidad dura en el cuello de la matriz, ó hinchazon de las partes genitales (del hombre y de la mujer), con dolores quemantes.—Descenso de la vagina.—Tirones y *punzadas en las glándulas mamarias.

Laringe.—*Picor y aspereza en la garganta con voz ronca y bronca.—*Tos seca* excitada por una picazon en la garganta, ó por un cosquilleo en los bronquios.—*Tos seca, sibilante.—*Tos con la respiracion como asmática.—°Tos por la noche, °en la cama.—Tos contínua con sueño y calofrios, seguidos de calor seco.—°*Tos convulsiva con vomituricion*, ¯sobre todo por la mañana —*Tos contínua, áspera y hueca, excitada por una acumulacion de mucosidades en la garganta, y con expectoracion fácil de mucosidades blanquecinas, °ó amarillentas y espesas.—Las mucosidades expectoradas tienen á ve-

Digitized by Google

ces un gusto dulce.—*Al toser, emision involuntaria de orinas y conmocion en el vientre.

Pecho.—**Estado asmático, á veces con sensacion de peso en el pecho y necesidad de respirar profundamente, ó con dolor de contusion en el pecho al respirar.**—*Respiracion difícil, angustiosa.—**Punzadas violentas en el pecho, en la region del corazon**, en los costados y en los músculos intercostales, á veces al respirar, ó con suspension de la respiracion; estas punzadas se manifiestan aun por la noche.—Dolor quemante en el pecho, como despues de haber bebido aguardiente; el dolor se extiende desde el centro del pecho hasta la garganta y lengua, y va acompañado de calor, rubicundez y tension en la cara.

Tronco y miembros.—**Dolor de riñones espasmódico como los del parto**, con mucha gana de orinar y de deponer, ó con flores blancas.—Dolores de ulceracion en las vértebras lumbares.—*Dolores nocturnos en el dorso, los que son mas fuertes durante el reposo.—Punzadas en los músculos y las articulaciones de la espalda.—Dolor de contusion en los brazos.—Sensacion paralítica, dolorosa en los antebrazos y los dedos.—Dolores calambroídeos en los codos y en los antebrazos.—Las manos están rígidas y la piel como agrietada.—Granos en las manos, con prurito violento, sobre todo al anochecer en la cama.—°Herpes en los codos, en las manos y en los dedos.—Dolores de luxacion en los pulgares.—Dedos como muertos.—Adormecimiento de los dedos.—Dolores de fatiga en las caderas y piernas.—Dolores tractivos y lancinantes en los muslos agravados por el movimiento.—Dolores de contusion y manchas amarillentas en los muslos.—Dolores en las corvas, como por acortamiento de los tendones.—Pesadez de las piernas.—Dolores tractivos y lancinantes en las piernas alternando con padecimientos de los ojos.—Dolor de luxacion en las articulaciones de las rodillas y de los piés.—En la corva, piel roja, áspera como un herpe.—Tension y calambres en las pantorrillas.—*Dolores de ulceracion y sensacion de ardor en la planta de los piés.—*Hinchazon edematosa en los piés, desde los dedos de estos hasta las pantorrillas.—Frio en los piés —Sudor de piés.—°Herpes en los tobillos.

116.—LACHESIS.

LACH.—Veneno dentario del reptil llamado Trigonocéfalo con *losanges.*—Hering. —*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usádas:* 30.—*Duracion de accion:* muchas semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

Antídotos: Alum. *ars. bell. caps.* cham. chin. cocc. hep. merc. natr-m. nitr. n-mos. n-vom. phos-ac. rhus. samb. veratr.—*Contra los resultados de la mordedura del Lachesis:* Ars. bell. caps. natr-m. samb

Compárese con: *Alum. ars. b ll.* bry. *caps. carb-v.* caus. cham. cocc. *con. dulc. hep.* hyos. lyc. *merc. natr-m.* nitr-ac. n-mos. *n-vom. phos-ac. puls.* rhus. *samb.* selen. sulf. veratr.—Cuando el Lachesis será mas útil estando indicado, es sobre todo despues de: *Ars. con. hep. lyc. merc. nitr ac. n-vom.*—Despues de Lachesis conviene algunas veces: *Alum. ars. bell. carb-v. caus. con. dulc. m rc. n-vom. phos-ac.*

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que puede ser consultado este medicamento contra:—Afecciones de personas demacradas, aniquiladas, de una complexion melancólica ó colérica con aspecto enfermizo; Padecimientos causados por un tiempo cálido y húmedo, así como por los cambios de temperatura y por el viento; Malos resultados de un pesar, de una afliccion (una pena), y de un susto?; *Padecimientos de los borrachos*; *Padecimientos por el abuso del mercurio*; Reumatismos agudos y crónicos; Afecciones artríticas; Dolores osteócopos; Parálisis; *Debilidad por pérdida de humores* (poluciones, hemorragias)?; *Accesos de desvanecimiento*; Síncope y asfixia?; Atrofia; Aneurisma; Convulsiones y ataques de tétanos, principalmente en los niños y los jóvenes; Epilepsias crónicas; Hemorragias; *Aneurisma*; *Sarna*; Lepra; *Erisipelas simples*, *flemonosas* y vesiculosas; Escarlatina maligna?; *Panadizos*; Ulceras carcinomatosas; Gangrena?; *úlceras mercuriales*; Fiebres de los niños; *Fiebres cotidianas y tercianas*; *Melancolía*; Manía religiosa?; Enajenacion mental á consecuencia de estudios contínuos; Imbecilidad?; *Hidrofobia?*; Ataques de apoplejía (en la edad viril); Congestion cerebral con pérdida del conocimiento; Afecciones cerebrales de los niños; Encefalitis?; Hidrocéfalo?; Consecuencias de una insolacion?; Fatiga nerviosa por trabajos mentales; Cefalalgias nerviosas, histéricas, congestivas; Oftalmías agudas y crónicas?; Oscurecimiento y úlceras de la córnea;

Ambliopia amaurótica?; Ozena?; *Coriza crónica con obturacion de la nariz*; Coriza suprimida por emociones morales?; *Erisipela de la cara*, Prosopalgias y odontalgias congestivas y nerviosas (principalmente en las niñas); *Anginas agudas* (con especialidad en los niños); *Anginas mercuriales*, con ulceracion; Bulimia; Dispepsia con vómito de los alimentos; Afecciones gástrico-biliosas?; Hematémesis?; Vómito de las embarazadas, de los borrachos?; Cólera?; Afecciones hepáticas, tambien en los borrachos; Abcesos hepáticos; Reblandecimiento del hígado; *Ictericia*; *Fiebre amarilla*; Cólicos espasmódicos; Cólicos de las embarazadas?; Timpanitis?; *Disposicion crónica al estreñimiento*; Diarreas de varias especies; *Disenterías?*; Lientería?; Afecciones verminosas de los niños; *Cólicos hemorroidales*; Hemorróides fluentes ó con flujo mucoso; Induraciones del vientre con deposiciones purulentas, sanguinolentas; Hemorragia intestinal?; Impotencia?; *Dismenorrea y otras afecciones de la edad crítica*; Padecimientos histéricos?; Aborto?; Induracion y ulceracion de los ovarios; Afecciones catarrales (é inflamatorias) de las vias aéreas; Coqueluche?; Group?; *Disnea*; *Padecimientos asmáticos*; Asma de Millar?; Asma tímico de Kopp?; *Pleuresía;* Neumonía?; Grippe?; Tísis?; Hemoptisis; Hidrotorax?; Ortofnea paralítica?; *Palpitaciones crónicas de corazon*, principalmente en las jóvenes; Aneurismas, pólipos, inflamacion y otras enfermedades del corazon?; Cianosis?; Coxalgia?; Ulceras en las piernas; *Panadizos*, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores voluptuosos, horrorosos ó fuertemente presivos, en muchas partes de cuerpo.—Sensacion de luxacion y de parálisis en las articulaciones.—*Rigidez y *tension en los músculos*, *como si estos fuesen demasiado cortos*.—*Dolores osteócopos.—**Dolores reumáticos vivos y tractivos en los miembros*; ó dolores corrosivos, con sensacion de contusion al tiempo de moverlos.—°Dolores nocturnos, insoportables, que no permiten estar en la cama.— Los dolores afectan alternativamente uno ú otro lado del cuerpo, ó bien los miembros, otras el cuerpo, y se presentan frecuentemente en cruz.—**Padecimientos intermitentes y periódicos*,

Digitized by Google

padecimientos acompañados de peligro de sofocacion*, y sufrimientos con necesidad de acostarse.—Agravacion y renovacion de los padecimientos despues de haber dormido*, ó por la noche, y principalmente antes de media noche, ó *algunas horas despues de la comida*, ó por un tiempo húmedo y cálido, como tambien por los cambios de temperatura y de viento; á veces se alivian muchos de los padecimientos al aire libre.—Las emociones morales, tales como las contrariedades, el miedo y el espanto, etc., renuevan frecuentemente todos los padecimientos.—*Parálisis con torpeza y rigidez de los miembros, *parálisis semilateral.—**Mucha debilidad de cuerpo y de espíritu*; ¯falta de fuerzas como despues de una gran pérdida de sangre; *caida rápida de las fuerzas*; relajacion de las musculares.—**Accesos de desfallecimiento, con disnea, náuseas, sudor frio, ¯vértigos, palidez de la cara*, vómitos, aturdimiento, oscurecimiento de la vista, dolores y punzadas en la region del corazon, convulsiones y epistaxis.—**Accesos de asfixia y de síncope*, ¯con pérdida del sentido y del movimiento, insensibilidad como en la muerte, contraccion de los músculos maseteros, rigidez é hinchazon del cuerpo, pulso trémulo y sin latido de la arteria.—Temblor de los miembros, palpitaciones musculares y estremecimientos en muchas partes del cuerpo.—**Ataques de convulsiones y de epilepsia, con gritos, movimientos de los miembros*, caida sin conocimiento, ojos convulsos, espuma en la boca, los puños cerrados; *antes del ataque, pies frios, eructos, palidez del rostro, vértigos*, cabeza pesada y dolorida, palpitaciones de corazon, hinchazon del vientre por gases; despues de los accesos, sueño.—Ataques de tétanos con distorsion de los miembros.—**Hemorragias y ¯extravasacion de sangre en diferentes órganos.*

Piel.—Equímosis; *Fácil y abundante evacuacion de sangre de las heridas y úlceras*; dermatorragia.—Tumores varicosos.—Anasarca general.—Tumefacciones duras y pálidas.—**Piel amarilla, ¯verde, aplomada, ó rojo-azulada, ó negruzca*, principalmente alrededor de las llagas y las úlceras.—**Manchas amarillas, rojas, cobrizas*.—Manchas pálidas, lívidas con accesos de desfallecimiento.—*Sarna seca*; *miliar*, con erupcion de *gruesas vesículas, amarillas, ó de un negro azulado*, con hinchazon de las partes afec-

tas y dolores que conducen á la desesperacion.—Erupcion miliar que en seguida se hace semejante á las erupciones urticarias, á la escarlatina, al sarampion.—*Erisipela* ¯*y erupciones vesiculosas*, con aureola roja.—Placas excoriadas, con dolores ardorosos al tacto.—Ulceras rodeadas de granos, de vesículas y de otras pequeñas úlceras.—**Ulceras superficiales de fondo súcio*, con aureola roja.—*Ulceracion carcinomatosa* (de las heridas), ó putrefaccion de la carne que se desprende de los huesos y cae en fragmentos.—*Gangrena de las úlceras*, con fiebre inflamatoria, pulso débil, acelerado é intermitente; desfallecimiento, náuseas, vómitos espasmódicos y biliosos, convulsiones y sudores frios.—Pápulas, verrugas; *tumores duros.—**Panadizos*.—Tumores pequeños, y tuberosidades rojas y pruritosas.

Sueño.— *Excesiva gana de dormir durante el dia* y soñolencia, *principalmente despues de la comida.—Insomnio*, con especialidad antes de media noche, *con mucha excitacion nerviosa*.— Soñolencia é insomnio alternando cada dos dias.—**Sueño ligero con desvelo frecuente y fácil, agitacion y anhelacion, gemidos y suspiros*, ¯sobresaltos y espanto. —**Ensueños continuos y frecuentes*, ¯tan pronto poéticos y meditativos como voluptuosos; ensueños de querellas, de cosas horribles, de espectros y de muertos.—**Por la noche calor, agitacion, sensacion de ardor en la palma de las manos y en la planta de los piés*, ¯dolores osteócopos ó reumáticos, diarrea, emision de orina, exaltacion mental, y otros muchos padecimientos.—*Despues del sueño, sensacion de rigidez y de cansancio sumo en los miembros; erecciones* con deseos venéreos, dolores en el dorso y los riñones, congestion de sangre, torpeza y dolor de cabeza, presion en el estómago, ligera inflamacion de la garganta, bostezo nervioso y *agravacion de todos los padecimientos*.

Fiebre.—*Frio glacial de la piel ó de los miembros* ó solo *de los piés con mucho deseo de calentarse*, y á veces con pérdida del sentimiento, sudor viscoso, debilidad y excesiva frecuencia del pulso.—*Calofrios*, algunas veces, solo *parciales*, frecuentemente con *dolores en los miembros*, en los riñones, agitacion y anhelacion, cólicos, trismus y movimientos convulsivos de los miembros, dolor en el pecho, sed, castañeteo de dientes.—*Horripilacion du-

rante el calor y principalmente levantando la cubierta de la cama.—Calofrios, con especialidad despues de comer, ó en la siesta.—*Calor seco, principalmente por la noche* ó por la tarde, y sobre todo *en los piés y en las manos, acompañado frecuentemente de agitacion y de anhelacion, de dolor de cabeza, delirios, sed inextinguible, erutos*, vómitos biliosos, gritos, gemidos, ¯sequedad de la boca y de la garganta, °y deposiciones frecuentes.—**Calor que alterna con frio*, calofrios ú horripilacion.—**Fiebres nocturnas ó vespertinas*, por accesos *cotidianos, tipo terciana, °ó cuartana, y **acompañados frecuentemente de cefalalgia, caida rápida de las fuerzas, y debilidad que obliga á acostarse*, ¯falta de apetito, hipo, vómitos, sensibilidad del cuello al tacto, palpitaciones de corazon, angustia, orinas amarillas, diarrea, dolores en los miembros, en el dorso, los riñones, bostezos nerviosos y espasmódicos, pandiculaciones, hinchazon del cuerpo, manchas y úlceras.—*Fiebres crónicas; ¯*fiebres lentas*; **fiebres tifoideas*.—°Renovacion de las fiebres por los alimentos ácidos.—**Sudor febril, principalmente despues del calor hácia la mañana*; ¯sudores abundantes; sudores fétidos; **sudores frios*; sudores sanguinolentos.—**Pulso intermitente, ó débil y frecuente*, ¯ó irregular, ¯ó apenas perceptible, ó trémulo.

Moral.—Excesiva angustia, ansiedad insoportable é *inquietud que obliga á salirse al aire libre*.—Temor y presentimiento de la muerte.—**Abatimiento moral y melancolia*, con *aprensiones, inquietud sobre su enfermedad, muchisima propension á entregarse al pesar, á verlo todo en el peor sentido*, y á creerse perseguido, aborrecido y despreciado de los suyos.—*Tristeza y disgusto de la vida.—*Desconfianza, sospechas y gran disposicion á tomarlo todo á mal, á contradecir y á criticar.—*Celos frenéticos*.—Pereza con **aversion é ineptitud á cualquier trabajo de cuerpo ó de espíritu*.—**Carácter perezoso*, con *incertidumbre é indecision*.—**Mucha apatia, y extraordinaria debilidad de memoria*; ¯todo lo que se oye queda desde luego como borrado; no se acuerda ni aun de la ortografía, y aun se olvida de lo que va á decir.—Se equivoca cuando habla y escribe, así como tambien acerca de las horas del dia y de los dias de la semana.—*Imbecilidad y pérdida de todas las facultades intelectuales.—**Sobreexcita-*

cion y mucha irritabilidad nerviosa, con disposicion á asustarse, *estado de éstasis y de exaltacion hasta el punto de llegar á llorar*, necesidad de meditar y de componer trabajos mentales, °pero con una especie de orgullo.—*Locuacidad frenética* con discursos sublimes, palabras escogidas é *ideas que pasan rápida y constantemente de un sujeto á otro.*—*Delirios nocturnos con mucha locuacidad, ó con murmullo.—Demencia y pérdida del conocimiento.

Cabeza.—°La cabeza se halla fatigada por trabajos intelectuales.—**Vértigos*, *principalmente por la mañana al despertar*, así como por la noche despues de haberse acostado, andando al aire libre, levantando los brazos, y frecuentemente *con desfallecimiento*, *palidez del rostro*, ¯*náuseas*, vómitos, *congestion á la cabeza*, epistaxis y laxitud en los miembros.—Embriaguez, estupor y pérdida del conocimiento.—**Ataques de apoplejía*, ¯con rostro azulado, movimientos convulsivos de los miembros, y extravasacion de sangre en el cerebro.—Reblandecimiento del cerebro y de sus membranas.—Dolor violento de cabeza con color amarillo del rostro y rubicundez de las mejillas.—**Cefalalgia con congestion de sangre, presentándose chispas delante de la vista*, soñolencia, calofrios y necesidad de acostarse, ¯ó con náuseas y vómitos; °cefalalgia por el calor del sol; *dolores profundos en el cerebro, ¯ó en las órbitas, *ó *encima de los ojos*, ó en el occipucio con ¯rigidez de la nuca.—Dolor de contusion en el vértice, ó *sensacion de terebracion, con *golpes y latidos* al mover la cabeza.—**Pesadez y presion en la cabeza*, como si fuera á estallar; ó *tension como por hilos tirados desde el occipucio hasta los ojos, ó *punzadas como por cuchillos* en diferentes partes de la cabeza y hasta en los ojos.—Dolores desde el interior de la cabeza, los que se propagan hasta los oidos, la nariz y cuello.—**Dolores de cabeza todas las mañanas al despertar, ó todas las siestas*, ¯ó bien á todo cambio de tiempo.—Hinchazon de la cabeza; palpitaciones musculares en las sienes, tension en el occipucio hasta la nuca, sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo, con prurito penoso, mucha descamacion y caida de los cabellos.

Ojos.—*Ojos amarillos* ó turbios, tiernos y abatidos, ó *bri-*

Digitized by

llantes y convulsos, con mirar fijo.—*Pupilas muy dilatadas.*— Equímosis y hemorragia de los ojos.—*Sequedad de los ojos como si estuvieran llenos de polvo*; ó *secrecion de lágrimas que algunas veces parecen frias.—Fotofobia. —Prurito y *punzadas como por cuchillos* en los ojos; ó *presion violenta como si el globo fuera á saltar de la órbita*, agravado con solo mover los ojos.—*Ojos inyectados de sangre*, inflamados con rubicundez de la conjuntiva y de la esclerótica, calor quemante y lagrimeo.—Sensacion como si los ojos fueran mas voluminosos y las órbitas mas pequeñas.— Hinchazon é inflamacion de los párpados ó de los bordes.—Convulsiones, pesadez y parálisis de los párpados.— *Debilidad de la vista* y presbiopia.—Confusion de los caractéres leyendo.—Vista turbia como por un velo.— Oscurecimiento y pérdida de la vista.— Llamas y chispas ó un velo azul delante de los ojos, ó cercos azules alrededor de la llama de la bujía. —Ojos pequeños y sin expresion.

Oidos.— Las orejas están frias, sensibles al aire.— Hinchazon dolorosa en el interior del oido.— *Sequedad de los oidos.—*Cerúmen poco abundante, muy duro y descolorido, ó como papilla, y *blanco con disminucion de la audicion.*— Pulsaciones muy desagradables, °sonoridad, *ruido confuso*, retintin, estallido, zumbido y ruido como de carruajes, ó eco como de tambores en los oidos.— Los oidos como si estuvieran tapados.—Sensibilidad excesiva ó *dureza de oido.*—Hemorragia por los oidos.— Hinchazon de las parótidas.— °Excoriacion y costras detrás de las orejas.

Nariz.— Dolores nocturnos en el dorso de la nariz.— *Obturacion de la nariz como por hinchazon en el interior*, principalmente *por la mañana*, ó con coriza.—*Hinchazon, *rubicundez y excoriacion de los bordes de la nariz*, con *costras en las ventanillas nasales.*—Moco de sangre al sonarse.— *Hemorragia abundante por la nariz*, de una sangre de color rojo claro, ó espesa y negra.—*Secrecion abundante de pus por la nariz.—*Coriza seca*, crónica, con obturacion de la nariz, ó *fluente* con *evacuacion abundante de mucosidades serosas*, lagrimeo, *estornudo frecuente* é inflamacion y erosion de las ventanillas nasales. —°*Coriza incompleta* con muchos padecimientos de la cabeza y del espíritu, *que todos desaparecen en el momento*

Digitized by Google

que se establece el flujo catarral.—*Granos crónicos rojos en la nariz.

Cara.—**Cara pálida*, enfermiza, desfigurada, cadavérica, *de color aplomado* ó *térreo*, *descolorida*, *amarilla.*—**Rubicundez circunscrita de las mejillas*, con color amarillo de la cara.—Cerco azul alrededor de los ojos.—Venas pequeñas en las mejillas de un color rojo.—Abotagamiento, algunas veces considerable, tension é *hinchazon roja de la cara.*—Calor y rubicundez de la cara (durante el delirio).—**Erisipela de la cara*, algunas veces con prurito, granos ó vesículas, grietas y exudacion corrosiva, dolores quemantes é hinchazon.—Miliar y granos en el rostro.—°Herpe con costras gruesas en la region de las patillas.—Dolores tensivos y con hormigueo, en la cara; dolores en los huesos de la cara; prosopalgia con vómito de los alimentos.—Labios secos y abultados; granos en los labios; temblor de los labios.—Debilidad y parálisis de la mandíbula inferior con distorsion de las facciones.—*Trismus* con apretamiento y rechinamiento de dientes; castañeteo de dientes.

Dientes.—*Dolores terebrantes en los dientes cariados*, principalmente *despues de comer*, y algunas veces con hinchazon de las mejillas y sensacion como si los dientes estuviesen demasiado largos.—*Odontalgias todas las mañanas despues de despertar*, *ó todos los dias despues de comer*, con dolores de dislaceracion, tractivos y lancinantes en la raiz de los dientes (de la mandíbula inferior).—*Odontalgia con dolores de cabeza, calofrios, calor y pesadez de las piernas.—*Los dolores de dientes se propagan hasta los oidos.*—Dentera y vacilacion de los dientes; *los dientes cariados se reblandecen y se mellan.*—Hinchazon y sensibilidad dolorosa de las encías.—Las bebidas calientes y frias renuevan los dolores.

Boca.—Hinchazon inflamatoria de la cavidad bucal.—La boca y el paladar están excoriados y muy doloridos.—*Sequedad de la boca y de la lengua, ó *acumulacion de agua en la boca y *salivacion.*—Lengua lustrosa, roja y resquebrajada, ó inflamada, hinchada, pardusca ó negra.—Rigidez, inmovilidad y parálisis de la lengua.—Afonía, ó palabra confusa, indistinta; voz gangosa; dificultad de pronunciar tal ó cual letra, y tal ó cual pa-

Digitized by Google

labra; voz mas alta y mas precipitada la pronunciacion que lo que se quiere.—Tartamudez.

Garganta. — *Cosquilleo continuo en la garganta*, como por una miga de pan ú otra cosa semejante detenida en aquel punto.—**Sequedad parcial ó general de la garganta*, la que se extiende algunas veces hasta los oidos, la nariz y el pecho.—Sensacion de ardor y *dolor de excoriacion en la garganta*, principalmente al tragar.—**Excoriacion dolorosa é hinchazon inflamatoria de la garganta* con rubicundez de las partes afectas, como por el cinabrio.—°Hinchazon de las amígdalas.—Grandes y **pequeños tumores en la garganta* que impiden la deglucion.—**Necesidad continua de tragar*, ¯y sensacion al deglutir, *como si en la garganta hubiera un tumor, un estorbo ó un tapon*.—Sensacion de estrechez, de estrangulacion y de constriccion en la garganta.—La garganta está como tirante y paralizada.—Convulsiones y espasmos en la garganta.—**Impedimento en la deglucion*, ¯con *horror á las bebidas*, las que frecuentemente salen por las ventanillas de la nariz. —Hidrofobia.—*Agravacion de los dolores de garganta por el mas ligero contacto y la menor presion del cuello*, así como *despues de haber dormido* y al deglutir la saliva; *se alivian en comiendo*.—*Dolores de garganta que no afectan sino *una pequeña parte*, ó por el contrario se propagan *hasta los oidos*, la laringe, la lengua y las encías, frecuentemente *con disnea y peligro de sofocacion*, *salivacion* y ruido estrepitoso de mucosidades.—**Abundante acumulacion de mucosidades tenaces en la garganta*.—°Dolores de garganta que alternan con obturacion de la nariz ó con padecimientos al hablar.—°Ulceras en el paladar, en la cámara posterior de la boca, con olor fétido, supuracion abundante y vivos dolores al tragar los alimentos.

Apetito.—Gusto desagradable ó azucarado, ácido, áspero, astringente ó metálico.—**Falta de apetito y de hambre*; inapetencia completa de los alimentos y de las bebidas.—*Repugnancia al pan*, el que no se puede deglutir.—*Apetito *irregular*, tan pronto anorexia como bulimia.—**Hambre morbosa*, con náuseas, bostezos convulsivos, y accesos de desfallecimiento, si no se come en seguida, ó con presion corrosiva en el estómago, que se renueva despues de haber comido.—*Sed inextinguible*.—*Deseo de vino* ó de leche, aunque sin embargo ambas cosas incomo-

Digitized by Google

dan.—**Despues de haber comido presion en el estómago, erutos, vértigos, flatuosidades, gana de vomitar, ó vómito de los alimentos*, debilidad de las rodillas, dejadez y pesadez del cuerpo, fatiga del espíritu, malestar, regurgitacion, diarrea, dificultad de la respiracion, cefalalgia y odontalgia, y *exacerbacion de todos los padecimientos.*

Estómago.—Hipo despues de haber bebido ó fumado.—Erutos vacíos, violentos, con peligro de sofocacion.—**Erutos que alivian los padecimientos.*—Erutos ácidos con sabor á los alimentos.—Pirosis desde la garganta, como si el esófago estuviera lleno de cosas rancias.—*Náuseas y gana de vomitar*, principalmente por la mañana, ó despues de la comida, como tambien á consecuencia de otros muchos padecimientos.—*Vómitos violentos* y *convulsiones de todo lo que se ha tomado*, ó de materias biliosas, amargas, verdosas.—Vómitos de sangre pura, ó de mucosidades sanguinolentas.—Vómitos con diarrea, oscurecimiento de la vista, dolores de estómago y diuresis.—**Sensibilidad excesiva en la region precordial al menor contacto*; los vestidos apretados le son insoportables, y *la menor presion es muy dolorosa.*—*Excesiva debilidad de estómago, que no soporta, ni los alimentos, ni las bebidas.—Sensacion como si alguna cosa obstruyese el cardias é impidiese la deglucion.—*Presion en el estómago* que sube hasta el pecho, y sensacion como si un gusano se moviera ó royera en él.—(Todas las tardes) *calambres y dolores violentos en el estómago*, con erutos, vomituricion y vómitos de viscosidades.

Vientre.—*Dolores hepáticos*, quemantes, tractivos ó incisivos.—Inflamacion ó reblandecimiento del hígado.—Abcesos hepáticos.—*Dolores y punzadas dolorosas en la region esplénica*, algunas veces yendo en carruaje ó andando.—Abultamiento de vientre en las jóvenes.—*Sensacion de vacio en el vientre.*—°Dolores abdominales debidos á una derrengadura.—**Dolores en la region umbilical generalmente presivos*, algunas veces, con dificultad de la respiracion, agravándose una hora despues de la comida y aliviados por los erutos.—*Dolores cólicos violentos* que turban la razon, ó **tirones agudos con contraccion del vientre.*—Sensacion de ardor en el vientre con presion en la vejiga.—Inflamacion de los intestinos.—Extravasacion de sangre en el peritoneo.—**Vientre timpanítico, duro, con*

cólicos flatulentos, °dolor en el dorso, vómitos, diarrea y diuresis.—Emision frecuente de gases; estos penetran algunas veces en el anillo inguinal.—Dolor como si fuera á formarse una hernia.

Deposiciones.—Deposiciones tardas.—**Estreñimiento pertinaz, con deposiciones duras, difíciles*.—Pequeñas deposiciones insuficientes y tenaces.—*Estreñimiento alternando con diarrea.—*Diarreas con cólicos violentos*, náuseas, vómitos, angustia, dolores en el recto durante el paso de las deposiciones, tenesmo y excoriacion del ano.—*Deposiciones diarréicas, principalmente por la noche, ó despues de la comida, °ó por un tiempo cálido (y húmedo), ó por haber tomado frutas y ácidos.—Deposiciones involuntarias y sin sentirlas.—*Evacuacion de materias fétidas*, ó deposiciones blandas, de la consistencia de papilla, ó líquidas, ó viscosas, como la pez, °ó sanguinolentas y purulentas, ó de materias no digeridas, *ó de sangre pura, ó de mucosidades sanguinolentas.—Durante las deposiciones, dolor, tenesmo y sensacion de ardor en el ano; y despues congestion de sangre á la cabeza, vértigos, debilidad, dolores y latidos en el ano.—Constriccion dolorosa del ano y del recto.—*Prolapsus del recto durante la deposicion*.—Salida de mucosidades y de sangre por el recto, algunas veces con cólicos violentos.—**Hemorróides con cólicos*, ó con sensacion de ardor y dolores cólicos en el recto, ó con congestion sanguínea en el ano, y diarrea.—**Hemorróides que sangran*.

Orinas.—**Presion en la vejiga con gana de orinar*, *ó con dolores cólicos y sensacion de ardor en el vientre.—**Gana frecuente de orinar con emision abundante aun por la noche*.—Dolor violento, como si una bola rodase en la vejiga, y de aquí pasara á la uretra.—Tenesmo violento con orinas poco abundantes.—Parálisis de la vejiga.—*Punzadas incisivas continuas*, en la uretra.—Un tumor pequeño en la uretra, con retencion de orina.—**Orinas turbias y pardas*, ó rojas, ó de color amarillo oscuro, y algunas veces con emision frecuente, pero poco abundante, ó con sedimento pardo y arenoso, ó rojo, ó color de ladrillo.—Orinas espumosas.—Emision involuntaria, é inadvertida de las orinas.—Durante la necesidad de orinar, dolores en el dorso y los riñones.—**Al orinar sensacion de ardor en la uretra*, y otros muchos padecimientos, que

vuelven á aparecer por el movimiento del carruaje, y despues de haber bebido vino.—Dolor de excoriacion en la uretra y en el glande.—Miccion despues de la deposicion y de haber orinado.

Partes viriles.—Presion en los testículos como si fuera á salir una hernia, cuando se hacen esfuerzos para orinar.—Granos en las partes cubiertas de vello.—*Muchos deseos venéreos sin necesidad física, y con flacidez del miembro.—Erecciones* sin deseos venéreos.—Poluciones nocturnas y diurnas, algunas veces con debilidad y sudor. —Derrame de licor prostático al tiempo de orinar ó despues de haber orinado.—Esperma de un olor penetrante. —En el cóito, la eyaculacion tarda ó falta del todo.—Secrecion abundante detrás del glande.—Manchas y granos rojos en el glande y su corona.—Adelgazamiento del escroto y dureza de los testículos.—Condensacion del prepucio.

Reglas.—Sensacion como de una bola que sube del vientre al pecho, como en el histerismo.—°Dolores desde el ovario hasta el útero, con evacuacion de pus durante las deposiciones.—Tumefaccion de las partes genitales, con prurito y deseos venéreos.—**Reglas débiles, tardas* y de muy corta duracion, frecuentemente con hemorróides y otros muchos padecimientos.—**Espasmos abdominales durante las reglas.*—Antes de las reglas dolores y latidos en la cabeza, vértigos, epistaxis, presion en el estómago, eructos, dolores cólicos en el hipogastrio, evacuacion mucosa abundante por la uretra, y calambres de pecho. —Antes y despues de las reglas, diarrea con fuertes cólicos.—*A la aparicion de las reglas dolores de riñones*, con dolor de quebrantamiento en las caderas y en el pecho. —°Durante las reglas, dolores de riñones, como los del parto, °latidos en la cabeza y dolores cólicos.—Aborto. —La leche de las personas mordidas por esta serpiente se hace venenosa y se coagula.

Laringe.—Catarro con tos, coriza, dolores lancinantes en la cabeza, rigidez de la nuca y afeccion de pecho.—*Ronquera continua*, con sensacion *como si hubiera alguna cosa en la garganta, que no se puede desprender* y que impide hablar.—Estrangulacion y constriccion de la laringe, con sensacion de hinchazon y de tension.—*Sensibilidad dolorosa de la laringe y del cuello, al tacto y á la mas li-*

Digitized by Google

gera presion, con peligro de sofocacion titilando la garganta y volviendo la cabeza.—Sensacion de pulsacion y de sofocacion entre la laringe y el pecho.—Sequedad, sensacion de ardor y dolor de excoriacion en la laringe.—Sensacion como de una bola en la laringe.—*Voz débil, hueca*, nasal.—**Tos* frecuentemente *fatigosa, y que todos los esfuerzos no son suficientes á hacer desprender cosa alguna*, excitada con frecuencia por un *cosquilleo en la laringe*, en el pecho y en la boca del estómago, ó por la presion de la garganta; como tambien por la conversacion, la marcha y todo lo que puede aumentar la sequedad de la garganta.—**Tos continua despues de haber dormido*, ó por la noche, *durmiendo*, ó *al principio de la noche*, despues de haberse acostado, como tambien al levantarse variando de posicion.—**Tos seca y corta*, con sofocacion y grasnido, algunas veces con vómitos.—Esputos mucosos, tenaces ó ácidos, ó de un sabor desagradable, ó sanguinolentos.—Hemoptísis.—Al toser, acumulacion de agua en la boca, dolores vivos en la boca del estómago, sacudidas en la cabeza y tension en los ojos.

Pecho.—Respiracion corta, frecuente, ó convulsiva, ó estertorosa, bronca y crascitante, ó suspirosa, profunda y con gemidos.—Frecuente necesidad de respirar profundamente.—**Disnea* y opresion de pecho, con muchos esfuerzos para respirar.—**Respiracion corta*, principalmente *despues de la comida*, andando, despues de un esfuerzo de los brazos, y algunas veces con tristeza, ó con tos asmática.—**Ataques de asma* y dificultad de la respiracion, principalmente *despues de haber comido*, ó por la noche al acostarse, ó en la *noche durante el sueño*, y algunas veces con angustia, sed, náuseas, vómitos, desfallecimiento y sudor frio.—**Accesos de sofocacion*, sobre todo *estando echado por la tarde*, ó *por la noche* en la cama, y principalmente cuando se coloca alguna cosa delante de la nariz ó de la boca.—Ortofnea paralítica.—Aliento de un olor muy desagradable.—*Presion en el pecho como por un peso*, ó como por un enfisema, y principalmente por la *noche*.—Dolores violentos con grande angustia y movimientos contínuos en el pecho.—Sensacion de ardor y dolor de excoriacion en el pecho, como si todo estuviera en carne viva, principalmente despues de la comida.—Punzadas en el costado y en el pecho, agravadas al res-

Digitized by

pirar, y algunas veces con tos y esputos sanguinolentos. —Extravasacion de sangre en los pulmones.—Gangrena de los pulmones.—**Palpitaciones de corazon con ansiedad*, °excitadas algunas veces por dolores calambroídeos, con tos y accesos de sofocacion.—°Espasmos del corazon (con aneurisma de la carótida derecha) y pulsacion desagradable en los oidos.—Punzadas en la region del corazon con respiracion corta, accesos de desvanecimiento y sudor frio.

Tronco.—Tumefaccion é hinchazon de los tegumentos del pecho.—Prurito, chapas rojas y erupciones miliares en el pecho.—*La nuca y cuello excesivamente sensibles á la menor presion.*— Rigidez reumática de la nuca y del cuello.—Punzadas en el dorso y en las espaldas.—Un pequeño tumor cerca de la espina dorsal.—Sensacion de ardor en el dorso.—Espasmos de los músculos del dorso. —**Rigidez dolorosa desde los riñones hasta la cadera, como si los músculos estuvieran demasiado cortos.*—°Dolores nocturnos, insoportables, en el dorso, en los riñones, en la cadera y en la rodilla.—°Falta de fuerzas en el dorso y en las rodillas, que obliga á andar encorvado.—Dolor de luxacion en los riñones, como despues de haber hecho esfuerzos.—Pápulas, vesículas, herpes, granos y manchas de color escarlata en el dorso y en los omóplatos.

Brazos.—Dolores reumáticos, artríticos y osteócopos en los brazos, las manos, los dedos y las muñecas.—°Ulcera maligna en la parte superior del brazo.—Tension como por acortamiento de los tendones, desde el codo hasta los dedos.—Inflamacion erisipelatosa en el codo.—Ampollas en los brazos, despues de haberse rascado.—Sensacion de fatiga ó de parálisis, y dolor de luxacion en los brazos.—Parálisis de las manos.—**Temblor de las manos.*—Manos secas y ardorosas.—Las puntas de los dedos están adormecidas, dolorosas.—°*Picor en la punta de los dedos.—Prurito, *erupciones sarnosas,* ¯chapas rojas, con vesículas, forúnculos, excrescencias y verrugas en las manos y en los dedos.—°Hinchazon con un color amoratado, azulada, dura y fria, en el dorso de las manos y de los dedos.—°Hinchazon dura de la mano hasta el codo, con dolores excesivos.—**Panadizos.*

Piernas.—**Sensacion de acortamiento y acortamiento real de los tendones de la corva.*—Dolores nocturnos en la cadera

Digitized by

y en el muslo.—Dolores vivos y tractivos en las piernas, durante los cambios de temperatura y por un tiempo ventoso.—Forúnculos en los muslos.—Sensacion de peso, de parálisis, de adormecimiento, y temblor en los muslos y en las rodillas.—*Rodillas como dislocadas, rigidas y débiles.*—Calambres y dolores en las pantorrillas.—Ampollas rojas en los muslos y en las piernas despues de haberse rascado.—°Chapas excoriadas y úlceras superficiales en las piernas de un fondo súcio.—**Hinchazon dolorosa, roja y azulada de los piés y de las piernas.—Pesadez, entorpecimiento, frio glacial y sudor de los piés.*—Prurito, **erupciones sarnosas*, pápulas y manchas como de quemadura en los piés y en las piernas.—*Grietas y ragades entre los dedos de los piés.—Abscesos en los talones.*

117.—LACHNANTHES TINCTORIA.

LACHN.—Lachnanthes —Véase, HALE, *Remedios americanos.*

SINTOMAS GENERALES.—La mayor parte de los sufrimientos se agravan en la posicion horizontal y se alivian al andar; Agravacion de la mayor parte de los síntomas al medio dia y de la fiebre por la noche á la una ó las dos.—Sensacion de una grande debilidad, como á consecuencia de pérdida de humores.—Soñolencia con bostezos y pesadez de los párpados.—Frio en la espalda, entre los omóplatos, como si allí hubiese un terron de nieve, despues sensacion de una sacudida con frio por todo el cuerpo y carne de pollo, renovándose todo por el movimiento; fiebre con delirio violento, rubicundez circunscrita de las mejillas, ojos centelleantes y agravacion desde las seis de la tarde á la media noche; fiebre con soñolencia; sudor frio, en la frente sobre todo.—Prurito y ardor por toda la piel del cuerpo, mas fuerte despues de haberse rascado.—Grande locuacidad, seguida de estupidez é irritabilidad.

Cabeza.—Cara.—*Vértigo*, con frio glacial en la frente, ó bien con calor en el pecho y alrededor del corazon y sudor.—Sensacion como si el cráneo estuviese prolongado

é impulsado hácia arriba.—Cefalalgia con ojos como impelidos hácia fuera.—Sensacion como si la cabeza fuese mas voluminosa y se hendiese con una cuña de fuera á dentro, con frio glacial del cuerpo, cara amarilla, cabeza quemante.—Dolores que hacen gemir, con fuerte sed; dislaceracion dolorosa en el sincipucio, al aire libre; sensacion como si los cabellos se erizasen, sobre todo en el occipucio.—Granos rojos, prominentes en la frente; dolor del cuero cabelludo al tacto; arrugas en la frente que parten del ángulo izquierdo del ojo.—Oscurecimiento de la vista como por una nube, no permitiendo ver nada por la noche.—Presion en los ojos como por arena, con secrecion mucosa blanquecina; por la mañana fuerte lagrimeo, con ardor en los ojos y sensacion de sequedad; sensacion de frio en los ojos; párpados superiores y cejas levantados con mirada fija.—Retintin en los oidos, al pasearse al aire libre; sordera casi completa (durante la fiebre).—Epistaxis abundante, con sangre pálida.—Cara abultada, con coloracion rojiza y ojeras; color pálido y enfermo, cara y labios morados; ojos abatidos, con sensacion como si estuviesen gruesos y frios; rubicundez de la cara; cara macilenta; hinchazon y tirantez en los labios.

Boca.—Estómago.—Vientre, etc.—Dolor en todos los dientes al tomar bebidas calientes; todos los dientes parecen demasiado largos y vacilantes; mas pronunciado todo en la cama.—Sensacion en la boca como de excoriacion é hinchazon.—Garganta muy seca, sobre todo al despertar por la noche, con tos frecuente.—Mucha sed; hipo en la cama, sensacion de náuseas, por cima del ombligo, al pasearse al aire libre; pulsacion en la boca del estómago, como si un martillo golpease en él sobre un sitio ulcerado.—En el vientre, fermentacion y borborigmos, con ventosidades.—Ganas frecuentes de ir al sillico, sin resultado; muchas ventosidades con la defecacion; contínuas punzadas en el recto.—Presion sobre la vejiga, al orinar.

Partes sexuales.—En el escroto, ardor violento, del lado izquierdo, que se extiende hácia el derecho; sudor y prurito en el escroto y en el pene.—Reglas muy anticipadas, con sangre viscosa, mezclada de mucosidades; reglas abundantes, sangre roja clara; durante las reglas

Digitized by

vientre como meteorizado, con sensacion de un hervidero dentro.

Pecho y corazon.—Ardor en el costado derecho de la laringe; tos seca, como proveniente de la laringe, con expectoracion estriada de sangre y violentos dolores en el pecho; tos agravada por la noche, despues del sueño. —Sensacion de calor en el pecho, con opresion y sudor general; sensacion de plenitud en el pecho, obligando á respirar profundamente; punzadas como de golpes de cuchillo, en el costado derecho del pecho.—Hervidero en la region del corazon, con ascension hácia la cabeza, vértigo y sudor; sensacion de calor en la region del corazon; punzadas en el corazon, con inquietud; palpitaciones frecuentes y violentas; cada golpe es doble, el uno duro y lleno, el otro blando y pequeño; temblor del corazon, con grande debilidad.

Tronco y miembros.—En la nuca rigidez y dolor, que se esparce por toda la cabeza hasta la nariz, con sensacion como si las narices estuviesen contraidas; sensacion de luxacion de la nuca al volver ó inclinar atrás la cabeza; rigidez del cuello, que inclina á un lado la cabeza (como á consecuencia de la *escarlatina* ó *de la difteritis*).—*Sensacion de frio entre las escápulas*, como si hubiese allí un pedazo de hielo, ó que se hubiese enfriado el sudor; quemazon en la region del riñon derecho, que se extiende hácia el lado derecho; ardor en el *hueso sacro*.—Dislaceracion: en las articulaciones de los codos; en los cóndilos de los dedos, ó desde las escápulas hasta las articulaciones de los dedos.—Dislaceracion en la rodilla derecha; ardor y punzadas por cima, por debajo y dentro de la rótula; pequeñas vesículas sobre las nalgas, que dejan exudar un humor acuoso despues de haberse rascado; hormigueo en las dos extremidades inferiores, agravado por el calor; ardor en las plantas de los piés y la palma de las manos; calambres en los piés por la noche.

118.—LACTUCA VIROSA.

LA TUCA.—Lechuga venenosa.—*Diario* F. A. M. L. II, 1.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Duracion de accion?* 24 horas.

ANTÍDOTOS: Los ácidos vegetales y el café.

N. Los síntomas seguidos de una (s) pertenecen al lactucarium, preparado con el jugo de la *lactuca sativa.*

SINTOMAS GENERALES.— *Este medicamento dirige con preferencia su accion sobre los órganos del aparato respiratorio.—Tirones* en los miembros y en el dorso, ó bien periódicos y en diversas partes (s); *dolores dislacerantes que pasan* al principio desde las aponeurosis escapulares hasta el codo derecho; despues se presentan, ya en las muñecas, ya en las rodillas, el muslo, la articulacion del pié con la pierna, en la nuca, en las sienes, etc.; sensacion dolorosa como de hervidero en los miembros, despues de medio dia, en estando sentado tranquilamente; estremecimiento agudo, calambroídeo, cerca de las articulaciones (en la nuca, los hipocondrios, los codos, las caderas), con mas frecuencia por la tarde en el reposo, agravado por la mañana, á veces y particularmente en los músculos extensores; dolores calambroídeos, que reaparecen bien en otras partes, ó imposibilitando el movimiento de estas (sobre todo en los codos, en las manos, en los dedos y en las piernas); quebrantamiento de todos los miembros, que obliga á estar acostado.—*Marcha insegura ó vacilante con tropiezo al andar* (s); convulsiones peligrosas en las mujeres (s).—*Abatimiento general*, algunas veces con laxitud é inmovilidad; *mucho cansancio y laxitud* (s); algunas veces con necesidad de dormir, ó bien por la mañana despues de levantarse con inaptitud para el trabajo; despues de la menor ocupacion, irritacion y laxitud como despues de haberse fatigado mucho.—*Sensacion de indecible ligereza en el cuerpo* (s); sensacion de una fuerza que parece vivifica en una persona histérica (s); necesidad de estar derecho cuando se está sentado.—*Al aire libre* mejoría, y sobre todo el pecho mas libre; ligereza de cuerpo no habitual (s); suspension de los síntomas, sobre todo por el movimiento al aire libre; deseo de estar al aire.

Digitized by Google

Piel.—Pellizcos lancinantes y escozor subcutáneo en varios puntos, así como igualmente punzadas.—Inflamacion y erupcion (por aplicaciones de este medicamento sobre partes delicadas de la piel).—*Hinchazon edematosa general*, con afecciones asmáticas, atontamiento de cabeza, posicion decúbita dorsal, horripilacion, falta de apetito, tos corta y pulso pequeño y lleno.

Sueño.—*Bostezos frecuentes*; bostezos y pandiculaciones (s); *soñolencia* por el dia (s); con fatiga y laxitud, y con bostezos frecuentes (s) por la tarde temprano, obligando á acostarse; sueño invencible (s), se duerme aun trabajando; *coma*, algunas veces con disgusto (s), y gana de dormir sin poderlo conseguir, *sueño profundo por muchas horas*, algunas veces con pulso frecuente.—*Sueño nocturno, apacible, reparador* (s); sueño tranquilo, ó con ensueños, ó sin ellos, con secrecion de poluciones desapercibidas (s); *sueño nocturno con aturdimiento* y con dificultad de despertar por la mañana; *sueño agitado no reparador* (s); sueño prolongado, agitado (s), despertando frecuentemente casi cada cuarto de hora.—°Imposibilidad casi completa de echarse sobre el dorso (á causa de los síntomas asmáticos), y al mismo tiempo con tension en la boca del estómago, así como tambien decúbito lateral derecho y la cabeza en alta posicion.—*Por la noche en la cama* fuerte opresion en el pecho que obliga á despertar y á sentarse, con ansiedad, sensacion y cansancio sumo por la mañana (s); dificultad de la respiracion con dolores presivos y cortantes en el pecho, que impiden dormir; °respiracion difícil que no permite coger el sueño, con dolor pulsativo en la cabeza, y al mismo tiempo palpitaciones de corazon, seguidas de dolores desgarradores en la cabeza, con pesadez y aturdimiento doloroso de esta; tos espasmódica y calor febril con ensueños, de los que no recuerda cosa alguna.—*Ensueños* fantásticos durante un sueño agitado; ensueños vivos y algunas veces *angustiosos* (como de suicidio por un arma de fuego), *durante un sueño profundo; hácia la mañana* ensueño singular como si describiese un círculo girando con el pié; sueño toda la noche con multitud de ensueños.—*Por la mañana al despertar* sensacion como de vacío en la cabeza, dificultad para despertar, mucha laxitud con opresion despues de un sueño agitado (s).

Digitized by

Fiebre.—*Frio que recorre frecuentemente el dorso y la cabeza* (s), algunas veces con calor de la cara (s), ó bien con calofrios en estando en una habitacion caliente, y frio en los piés y manos; fácil *calofrio* durante el dia, aunque esté en una habitacion caliente; *horripilacion*, la que algunas veces parece se introduce debajo de los cabellos.—*Fiebre* con fuertes dolores de cabeza, sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo al tacto, dolores dislacerantes en las articulaciones de los miembros (como en la nuca y cara), mucha pesadez de cabeza por la tarde que obliga á inclinarse hácia adelante, *calor angustioso y seco en la cabeza y en la parte superior del cuerpo*, con frio glacial de los piés é igualmente ardor y lagrimeo en los ojos, accesos de tos seca, sofocante y espasmódica, con angustia violenta en el pecho y la cabeza, y contracciones espasmódicas y dolorosas en las regiones lumbares y en los hipocondrios.—Sensacion de *calor*, de sequedad insoportable, sobre todo en las piernas, las que están doloridas como despues de haber corrido mucho, de 3 á 6 de la mañana.—*Pulso lento* (s); lento y tirante; *raro*, hasta el punto de dar diez ó doce pulsaciones (s).—Traspiracion abundante; *sudores excesivos* (s); sudor nocturno general y benigno (s).

Moral.—Humor melancólico, desazon; tendencia á favorecer la tristeza con ideas exaltadas y exageradas, de modo que de la cosa mas insignificante, teme consecuencias terribles y le inspiran inquietud; despues de un disgusto, dolor en la frente con aturdimiento y contracciones violentas en la garganta por la tarde, y con deseo contínuo de llorar.—Angustia y agitacion interior.—Excesivo *mal humor* á la menor contrariedad; *humor triste con inaptitud al trabajo* é imposibilidad de estar en la cama; *humor colérico*; la menor cosa es lo bastante á excitarle.

Cabeza.—Dificultad de reflexionar (s), inaptitud para los trabajos intelectuales; parece que se confunden las ideas de tal modo que no es posible tomar la idea general; busca por todos lados como para hallar alguna cosa.—*Turbacion en la cabeza por la mañana*, algunas veces con pesadez como por plenitud; pesadez *en la frente*, algunas veces con sensacion de calor en esta parte, ó en la fosa del hueso frontal derecho y otras (exteriormente)

en el izquierdo, con punzadas que atraviesan al bajarse; sensacion de aturdimiento y de vértigo; confusion en la cabeza, algunas veces por la mañana al levantarse.—*Sensacion como si la cabeza estuviese hueca*, con un estado de atontamiento como si no hubiese dormido bastante, con vértigo hasta el punto de hacer caer; *por la mañana* vértigos como despues de un desarreglo por la noche, ó con presion que parece quiere abrirse la frente y sus órbitas.—Estado como de embriaguez.—*Vértigo* (s) rotatorio con pesadez en las piernas y cargazon de la cabeza, sobre todo en el occipucio, con tristeza en la vista, confusion de los hilos al coser; vértigo en una habitacion caliente, con plenitud de la cabeza y sensacion como si esta se anegase de agua en la cama, é igualmente con sensacion como si la cabeza hubiese aumentado de volúmen por un movimiento rápido del cuerpo.—*Dolores en el vértice* á veces en un punto circunscrito, como el *clavo histérico* (en una jóven); dolor en varios puntos de la cabeza, sobre todo en el occipucio; cefalalgia por la tarde.—*Dolor sordo* en la frente; *dolor en toda la cabeza*, con mucho abatimiento y pereza, y tambien en la region temporal izquierda, moviendo fuertemente la cabeza (lavándose la cara) y agravados todas las veces que la mueve.—*Pesadez en la cabeza y en el occipucio*, con dolor sordo, ó bien *con presion*, ó por la tarde; pesadez en la frente con punzadas, sobre todo en la fosa del hueso frontal izquierdo.—*Cefalalgia presiva*, á veces con sensacion como si el cerebro ondulase, ó bien agravada con el calor de la habitacion, ó lancinante, ó como por instrumentos obtusos, ó (por la tarde) quemante con ardor exterior en la frente; cefalalgia muy sensible entre las cejas; cefalalgia sumamente aguda en un lado de la cabeza, como si fuera en el hueso; dolor en el occipucio, tensivo, con ardor en la frente y frio en las manos.—*Presion en la frente* por la mañana al despertarse, ó bien despues del mas ligero trabajo intelectual, extendiéndose hasta los ojos, *como si estos quisieran salirse por las sienes*, sobre todo el izquierdo, y cuya presion recorre á veces toda la cabeza.—*Compresion* dolorosa en el occipucio.—*Dolor tirante* en las sienes hasta la frente; dolor de dislaceracion en la region temporal derecha; sacudidas sordas en la cabeza.—*Sacudimiento* doloroso en la cabeza

por poco que se tosa, con ondulacion y presion que dura mucho tiempo despues.—Estremecimiento y pulsacion en la cabeza durante el reposo, zumbido en los oidos con sensacion de plenitud en la cabeza, por la mañana ruido en el lado derecho de la frente.—*Al exterior de la cabeza dolor en un punto fijo*, cerca del vértice, agravado por la presion; dolor sordo y fijo en un punto circunscrito del hueso coronal, en el lado izquierdo; dolor tirante en un punto circunscrito del hueso coronal del lado derecho con dolor al tacto.

Ojos.— Prurito encima de las cejas; presion con sensacion de separacion en el globo del ojo derecho; *escozor en los ojos*, sobre todo en los ángulos externos; agravado frotándolos, ó bien solo en el ángulo interno izquierdo; *sensacion de ardor* en los ojos, sobre todo *en los párpados* (algunas veces durante el dia escribiendo, ó en el ojo derecho, con turbacion de la vista y pupilas dilatadas).—*Rubicundez* de la conjuntiva con aumento de la secrecion mucosa en las personas de una edad avanzada, con plétora abdominal.—Párpados cubiertos de *legañas*.—*Pupilas dilatadas* (s).—*Vista turbia*; *vista débil*, á veces con ardor en los ojos; vista débil y turbia (s); *vista impedida* como por una nube ó velo, la que se disipa fijándose con atencion en un objeto; impresion como si volaran moscas delante de los ojos, al bajarse, despues de la comida.

Oidos.—Tirones en los oidos; punzadas seguidas de tension en la aurícula izquierda.—Zumbido en los oidos; resonancia en los oidos, al principio de la noche en la cama.

Nariz.—Sensacion como de separacion en la punta de la nariz.—*Olor* específico en la nariz, y gusto análogo en la boca.—*Estornudos frecuentes*, con agravacion de los síntomas del pecho, ó bien con *dolor del mismo* (algunas veces como si hubiera una excoriacion que se trasforma despues en presion).—*Coriza* que deja excoriacion y sequedad en la nariz.

Cara.—Mal semblante (s); cara pálida, descompuesta; calor en la cara con temblor y sensacion de hinchazon en los labios (s).—Hormigueo tensivo en la cara; tirones con picoteo desde la glándula submaxilar derecha hasta el oido y la lengua; punzadas en la barba, desde

la salida del nervio submaxilar.—*Temblor de los labios*; despeluzamiento; hinchazon de los gánglios linfáticos.

Dientes.— Dolor rápido en las muelas del lado izquierdo de la mandíbula inferior, como si esta se moviese.— Duele una *encía* al masticar en el sitio donde habia un diente.

Boca.—Sensacion de tension en el fondo de la boca y en el paladar, que obliga á salivar constantemente, *acumulacion abundante de saliva en la boca*, algunas veces de un sabor acídulo; sequedad de la boca sin sed.—*Lengua cubierta de una capa blanca* (s); con mucosidades espesas (s), dolorida como si estuviera quemada en su punta; contraccion debajo de la lengua.

Garganta.—*Ligera sensacion de ardor en la garganta*, algunas veces por la tarde; sensacion en la garganta como si esta parte estuviese expuesta al calor de un fuego muy vivo.—*Deglucion difícil*, con sensacion como si la campanilla estuviera excoriada, con sensacion de ardor, ó bien como si los músculos constrictores de la faringe estuvieran paralizados.—*Acumulacion de mucosidades en la garganta*; mucosidades viscosas en la garganta por la mañana (s).

Apetito.—Gusto.—*Sabor* soso en la boca (s); sabor amargo, algunas veces despues de comer tostadas con manteca; °sabor amargo como de bílis en la garganta.—*Falta de apetito* (s); *inapetencia al medio dia*; repugna toda clase de alimentos, pero especialmente el pan y la carne. —*Apetito aumentado* (s) algunas veces, y sobre todo al medio dia.—*Sed aumentada.*—°Despues de comer, sensacion de plenitud en el estómago.

Síntomas gástricos.—*Erutos frecuentes*, repetidos, que alivian la opresion del pecho; **erutos en seco*, °á veces ruidosos, ¯con sabor de extracto; erutos repugnantes con sensacion de frio en la laringe, y amargor persistente en la boca; erutos *ácres*, algunas veces tambien ácidos.—*Disgusto* (s); *náuseas* (s), algunas veces con opresion en la boca del estómago.—Vómitos y desgana (s).

Estómago.—*Contraccion de la boca del estómago con dolores en él, y agravados con la presion*; sensacion en la boca del estómago y en el esternon, como si se hubiera estado encorvado mucho tiempo estando sentado; *opresion en el epigastrio con verdadera angustia precordial*; sen-

Digitized by Google

sacion de flojedad en el estómago.—*Presion en el estómago* (s), con plenitud como si fuera á estallar, seguida de hormigueo debajo del pecho derecho, con sensacion, como si se formase una vesícula; sensacion como si todo se agolpase al exterior en una extension del grandor de la palma de la mano, seguida de tenesmo; presion en el píloro; presion y plenitud en la boca del estómago; la presion en la boca del estómago se cambia en angustia, con una especie de gorgoteo en el estómago, con borborigmos, erutos y expulsion de gases que alivian; la angustia se siente más debajo del esternon, y que alterna con sensacion de ardor ó de frio.—*Sensacion de frio* en el estómago (s); sensacion de hormigueo en el estómago y en la boca de este, con erutos frecuentes, *como si hubiera hielo en la garganta y el estómago*, seguida de una sensacion de calor en este último, y con regurgitacion y sabor soso en la base de la lengua.—Punzadas en el píloro.—*Mejoría* de los dolores de estómago, inclinándose hácia adelante, estando sentado, ó bien por la emision de gases fétidos.

Hipocondrios.— Golpes sordos, ó bien punzadas en los hipocondrios, sobre todo en el derecho.—*En la region hepática*, como quebrantamiento, por la mañana; tirantez periódica; dolor como si escarbaran; *presion*, algunas veces por la tarde; *en la region hepática*, *punzadas* á veces despues de comer, ó bien extendiéndose hasta el dorso, ó asimismo con sensacion de peso; *tumefaccion del hígado*, algunas veces con presion, ó bien con tension apoyándose sobre él.—*En la region esplénica*, punzadas rápidas, apretamiento, sobre todo durante el reposo.

Vientre.— Sensacion como de laxitud en el vientre.—*Pellizcos en el vientre*, durante y despues del desayuno, con necesidad de deponer, aun cuando solo expele gases; *pellizcos en la region umbilical*, agravados cruzando las piernas, igualmente en el *epigastrio* por la mañana en la cama, ó bien con dolores cólicos, que se agravan durante y despues de comer hasta obligar á encogerse.—*Dolores incisivos en el vientre* (dolores cólicos): en diversas partes, con pellizcos; dolores cólicos en todo el vientre, con borborigmos dolorosos y seguidos de una deposicion diarréica mucosa.— Sensacion de *calor* desagradable en el vientre; ruido como de ebullicion ó hervor fre-

cuente que se extiende desde el vientre al pecho.—*Sensacion de peso* que comprime el epigastrio, despues del desayuno; sensacion, como si hubiera un cuerpo pesado sobre el vientre, principalmente en el ombligo y la boca del estómago, agravada estando de pié.—**Afecciones del sistema de la vena porta* ?—*Ascitis* (á consecuencia de una fiebre intermitente con constipacion), con hinchazon de vientre y edema de los piés y de la cara, °ó bien con induracion del hígado y asma.—*Sensacion de plenitud en el vientre*, á veces con borborigmos y emision de gases; *sensacion de plenitud en el lado derecho*, con dificultad de la respiracion y aliviándose por los erutos y emision de gases (s); *tension* de vientre por la tarde, sobre todo en la region hepática.—*Meteorismo; borborigmos abundantes*, algunas veces durante la comida, ó *bien despues* (con punzadas debajo del epigastrio, ó con pellizcos en el vientre), principalmente en la region umbilical; *abundante emision de gases*, algunas veces fétidos (á consecuencia de borborigmos), ó bien por la tarde precedida de pellizcos.

Deposiciones y Ano.—*Estreñimiento*; deposicion dura desde el segundo dia ó despues; °disminucion de un estreñimiento habitual.—Deposiciones solamente á consecuencia de esfuerzos y pellizcos; necesidad de deponer, con sensacion de cansancio sumo, ó bien con evacuacion difícil y rara; deposicion precedida de tenesmo, dura y expelida á costa de muchos esfuerzos, con dolor constante como de contusion en el ano; deposicion insuficiente.—*Deposiciones duras*; duras y tardas, *secas, duras, difíciles* y con muchos esfuerzos; deposiciones duras, nudosas con sensacion de ardor en el ano á consecuencia de una retencion de dos dias; deposiciones mas raras y firmes.—*Deposiciones fáciles* (s?); deposiciones blandas, ó bien como de papilla los primeros dias; evacuaciones frecuentes en la misma forma (s); *diarrea* (s); á veces diarrea alternando con constipacion (s).—*Durante la deposicion*, laxitud general, fatiga hasta el punto de dormirse, bostezo y acumulacion de agua en la boca; *despues* de la deposicion (blanda), presion en el ano.—*En el ano:* tirones, comezon hácia la tarde; *granos hemorroidales* alrededor del ano, con tenesmo en el recto y una evacuacion líquida á cada acceso de tenesmo.

Vias urinarias. — Necesidad de orinar, con tirones frecuentes en el glande que recorren el cuerpo.—*Secrecion de orina aumentada* (s); *emision de orina mas frecuente y mas abundante, obligando á levantarse por la noche para orinar*; presion en la vejiga hácia la mañana, por acumulacion de orinas, la que es mas abundante.—*Orina clara como agua* y á la par con mas abundancia y frecuencia; orina de un amarillo claro, con olor de violeta; orina oscura, caliente y quemante al paso por la uretra. —*En la uretra*, sensacion contínua estando sentado, como si corriese una gota, y con ardor en el orificio.—*En la region vesical*, presion como por necesidad de orinar.

Partes genitales.—*En el miembro*, infarto de un gánglio linfático, á consecuencia de erecciones matutinas; tirones en la raiz del miembro, así como en el cordon espermático derecho y á lo largo de la cara interna del muslo. — Disminucion del apetito venéreo; atormenta la lascivia y los ensueños voluptuosos (s); *erecciones* dolorosas en el sueño de por la mañana; *poluciones* algunas veces durante los ensueños lascivos por la mañana muy temprano, ó bien dos poluciones en una noche sin sentirlas, durante un sueño profundo.—*Reglas precoces* de cuatro ó seis dias de duracion (con dolores calambroídeos en el vientre).—Este medicamento favorece las reglas (s).— *Aumento de leche en los pechos* (s).

Laringe.— **Tos**.— *Voz* mucho mas extensa.— *Aspereza en la garganta*, despues de leer en alta voz; igualmente en la faringe, la laringe, obligando á respirar profundamente, con picor en la garganta (s); sequedad y picor en la faringe y en los bronquios; *ronquera* por la tarde, ó bien por la mañana; con aspereza en la garganta; sensacion de plenitud en la laringe, disminuida inclinándose hácia atrás; necesidad frecuente de toser; °*sensacion contínua de plenitud en la laringe*, con irritacion á consecuencia de una tos sofocante, sensacion penosa al hablar y tos frecuente con expectoracion.—*Tos por cosquilleo en la garganta*, á veces con sensacion de opresion en el pecho, y de sequedad quemante en la garganta; tos seca, frecuente de tiempo en tiempo, ó bien por *ligeros movimientos con cansancio en el pecho*, vientre y occipucio; tos seca, *perruna*, dolorosa, procedente de una

tos antigua, con expectoracion y facilidad á desprender los esputos; tos espasmódica, profunda, y seca, ó bien *fuerte y fatigosa provocada por un cosquilleo en la garganta*; °la tos seca proviene de una tos antigua y que se reproduce, sobre todo segun las variaciones atmosféricas, ó que desaparece completamente.— Excrecion de *mucosidades* por la tos (que antes era seca?) y movimientos mas vigorosos y largos; expectoracion abundante de mucosidades por una tos corta.—*Durante la tos* agravacion de los dolores del pecho; °*tos sofocante, seca*, en una persona histérica, con insomnio persistente y sensacion de escozor y frio en el estómago.

Pecho y respiracion.—*Disnea*; respiracion corta, difícil (s); *dificultad de la respiracion*, con punzadas en el pulmon izquierdo, ó bien con presion en la boca del estómago; respiracion rápida por afluencia de mucosidades en el pecho, y estertor; *necesidad frecuente de respirar profundamente*, sobre todo estando sentado y doblado sobre sí mismo; respiracion corta andando y estando de pié, á causa de una constriccion espasmódica en las regiones umbilical y precordial, con necesidad de respirar profundamente; sensacion como si el pecho no se dilatase lo bastante al inspirar fuertemente.—*Asma*, disnea (s), *como si la base del pecho fuese estrecha, con temor de respirar profundamente, en cuyo caso se experimenta una sacudida*; *por la noche, acceso de asma que hace despertar y obliga á sentarse rápidamente en la cama con angustia* (s); *asma frecuente con peso en el pecho y necesidad de respirar profundamente*, con alivio momentáneo, bostezando y estirándose; asma por la noche en la cama como por exhalaciones corrosivas, con tos sofocante, profunda, °ó con necesidad contínua de recogerse sobre sí mismo estando sentado, sin lo cual todo incomoda, como si estuviera muy estrecho; *asma como si el torax estuviera comprimido y apretado*, particularmente estando sentado y encogido sobre sí mismo, ó bien con frecuente constriccion en la base del pecho; sensacion de constriccion espasmódica en los hipocondrios, sobre todo en el derecho.—*Opresion en el pecho ó dificultad de la respiracion* (s), *que obliga á respirar profundamente* (s), á veces con necesidad de bostezar, y ansiedad, ó bien aliviada al levantarse y estirarse; opresion con dolor sordo debajo del es-

ternon; fuerte opresion con dificultad de respirar en puntos circunscritos del pecho; ligera opresion en los dos costados y debajo del esternon, seguida de sensacion de calor en la pared posterior del pecho.—*Sensacion de plenitud en el pecho*, angustiosa, agravada hácia la tarde; plenitud debajo del esternon y hácia la clavícula izquierda, con necesidad de respirar profundamente; plenitud en todo el pecho con ligeros estremecimientos y dolor como de quebrantamiento.—*Sensacion de peso en el pecho* con dificultad de respirar, *como si hubiera un gran peso sobre el pecho*, *con necesidad hasta de quitarse los vestidos*; sensacion de peso por la tarde, con sensacion de plenitud en la faringe, paseando al aire libre, como si hubiera un cuerpo extraño sobre el pecho; presion periódica que aumenta y disminuye con apretamiento, opresion y aumento de calor en el pecho.—Los síntomas del pecho *se alivian sentándose en la cama*, *aflojándose toda la ropa* (porque apretada esta, dificulta la respiracion).—°*Asma convulsiva*, á veces sintomática de una afeccion orgánica del corazon; °*accesos de sofocacion* como en un hidrotorax; °*hidrotorax*, con hinchazon general, ansiedad, disnea estando echado, y que obliga á sentarse en la cama, tos corta, seca, mucha debilidad, soñolencia despues de medio dia, y disminucion de las orinas.—*Dolores* sordos *en el pecho* que obligan á respirar profundamente, primero en el *costado izquierdo*, despues en el derecho, donde permanecen, y que se agravan respirando profundamente.—*Dolor presivo en el pecho*, en su parte media, debajo del esternon, comprimiendo sobre el mismo; dolor presivo en los costados por la mañana, agravado inspirando, y en el apéndice sifóides, por el movimiento, con tension; dolor presivo en la parte superior del pecho, despues de pasearse al aire libre, con debilidad hasta el punto de rendirse; *presion* en diversas partes del pecho, ó bien y principalmente en la superior, con opresion, necesidad de bostezar y extender el cuerpo.—*Punzadas en el pecho y en el costado derecho*, con sensacion continua de estremecimiento espasmódico, ó bien en la parte inferior del pecho ó hácia el dorso (s), ó en los cartílagos de las costillas falsas, dolor agudo debajo de las pequeñas costillas izquierdas; dolor pleurítico hácia el medio del esternon; dolor com-

presivo en la parte superior de la mama izquierda, con opresion en todo el pecho; dolor sordo desde el costado izquierdo hasta el omóplato.—*Tirones* en el pecho, por la mañana en la cama, agravados despues de levantarse.—*Ruido como de ebullicion en el pecho*, con opresion y necesidad forzosa de respirar aceleradamente, ó á veces *con opresion* despues de un ejercicio moderado; ó bien seguido de dolores calambroídeos en el exterior del pecho.—*Pulsacion* dolorosa quemante en la cavidad derecha del pecho, en un punto limitado.—*Sensacion de descaecimiento* en el pecho, desde medio dia hasta la noche; *sensacion de frio* en el interior del pecho (s).—*Dolor como de fatiga*, despues de un ejercicio corporal, en la base y en las paredes del torax, sobre todo en la izquierda por la mañana y despues de despertar.—*Al exterior* dolor rápido en los músculos del pecho y el deltóides, que se extienden hácia la espalda durante el reposo.

Dorso y riñones, etc.—En los *riñones*, tirantez hácia las ingles.—En el *dorso*, dolores en la médula espinal hasta la *cola de caballo*; dolor calambroídeo que recorre el dorso en diversas direcciones; cansancio en la region lumbar.—*En la nuca*, dolor al toser; tirones y tension (algunas veces simultáneamente en el dorso y músculos del cuello); picotazos subcutáneos que se llegan á fijar bajo el omóplato derecho.—*Tension en los músculos del cuello*, algunas veces espasmódica en el lado derecho.—*En los sobacos* punzadas como por instrumento puntiagudo, agravadas levantando el brazo y apoyando el dedo.

Extremidades superiores.—Dolores en la *espalda* (s); sensacion de parálisis en la articulacion escápulo-humeral.—*En los brazos*, *tirones*, partiendo desde la articulacion cúbito-humeral, ó bien con estremecimientos; dolores dislacerantes erráticos como en los huesos, en las articulaciones del hombro y del codo derecho, y despues ya en las muñecas, ya en otras partes; punzadas agudas debajo del derecho.—Mucha debilidad del brazo derecho.—*En la parte superior del brazo*, tirantez y sensacion de debilidad; dolor calambroídeo en la extremidad inferior; dolor de luxacion en el músculo triangular izquierdo, solamente cuando se dobla el brazo.—*En el codo*, tirantez sorda.—*En el antebrazo derecho*, dolores dislacerantes, seguidos de sensacion paralítica en el

Digitized by

dedo pequeño.—*En las manos*, estremecimientos dolorosos, y *en la izquierda tirones*, á veces espasmódicos en la articulacion; temblor de las manos (s).—*En los dedos*, sensacion de calor seguida de debilidad permanente de estas partes; dolores dislacerantes en el metacarpo de las manos; prurito con hormigueo en los dedos de la mano izquierda.

Extremidades inferiores.—En las *piernas*, mucho cansancio, temblor y laxitud; *pesadez*, á veces y sobre todo andando, con tension en las corvas; *adormecimiento frecuente de las piernas*, á veces estando sentado.—En los *muslos*, quebrantamiento con tension en las corvas al levantarse de su asiento; temblor en el muslo izquierdo.—*Sensacion como de congestion de sangre* en las *piernas*, á veces estando sentado, con pesadez, ó solamente en la derecha, durante el reposo y con tirones; dolor tensivo en la derecha con sensacion de rigidez que á veces se extiende hasta la cadera; temblor en la pierna izquierda por la tarde; calambre en la pantorrilla izquierda al andar.—*En los piés*, dolor en la planta del izquierdo durante el reposo, como si hubiera saltado sobre una piedra, el que se disipa apoyando el pié; frio en los piés.—*En los dedos*, prurito con hormigueo (en el pié izquierdo); dolor en el dedo pulgar izquierdo, como si estuviera vuelto hácia atrás, apoyando el pié; dolor como de ulceracion subcutánea debajo de la uña (del cuarto) dedo.

119.—LAUROCERASUS.

LAUR.—Laurel real.—Hrtlaub y Trinks.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeopática.—*Dósis usadas:* 5, 30.—*Duracion de accion*: 6 á 8 dias; algunas veces.
Antídotos: Camph. coff. ipec. op.
Compárese con: Amm. canth. chin. *coff. ipec.* kal. *merc.* n-vom. *op.* rhus. sec. *spig.* veratr.

CLINICA.—Hasta ahora no se ha empleado este medicamento sino contra: *Cianosis* (?); *Tisis incipiente y Cólera.*

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Estremecimientos convulsivos y espasmos por accesos.*—Inflamacion de los órganos in-

ternos.—Temblor, sobre todo en las manos y en los piés durante el ejercicio al aire libre.—*Debilidad súbita, con postracian nerviosa y excesiva.—(Apoplejia con parálisis de los miembros).*—Desvanecimientos.—Dolores tractivos y de dislaceracion en los miembros.—Falta de energía de la fuerza vital.—Convulsiones epilépticas con espuma en la boca.—Tétanos.—Agravacion de los padecimientos por la tarde; mejoría por la noche y al aire libre.

Sueño.—*Bostezos frecuentes*, acompañados generalmente de horripilacion, con la piel con carne como de gallina. —Irresistible gana de dormir por el dia y muy temprano por la noche.—*Soñolencia*, á veces como un coma vigil. Insomnio por sobreexcitacion y accesos de calor.—*Ensueños penosos y agitados.*

Fiebre.—*Despeluzamientos y calofrios febriles* que no se disipan ni al calor del fuego, ni al de la cama.—Horripilacion con carne como de gallina, seguida de calor quemante.—*Frio por todo el cuerpo*, pero sobre todo en los piés, principalmente al aire libre.—Falta de calor natural.—Pulso débil, lento, é irregular.

Moral.—Abatimiento moral.—*Mucha ansiedad, aprension y agitacion* que no permite permanecer en parte alguna, ni *dormirse por la tarde*, pero que se disipan al aire libre. —Repugnancia á los trabajos mentales.—Prontitud y precipitacion moral.—*Debilidad de la memoria.*—Incapacidad intelectual.—*Inteligencia obtusa y pérdida del conocimiento.*

Cabeza.—*Aturdimiento* con caida y pérdida del conocimiento.—*Embriaguez y vértigo* con gana de dormir.—*Vértigos* que se presentan al incorporarse despues de haberse bajado, ó al levantarse del asiento, con un *velo que ofusca la vista, ó con sensacion como si todos los objetos dieran vueltas en derredor.—Dolor de cabeza estupefaciente* y gravativo, con sensacion *como si al bajar la cabeza el cerebro cayese hácia adelante y golpease contra el cráneo.*—Cefalalgia presiva muy violenta en la habitacion.—Frio contínuo en la cabeza.—*Congestion en la cabeza con calor* y *latidos.*—Los dolores de cabeza se disipan por una sensacion de frio en el vértice, en la frente, la nuca y hasta en los riñones.

Ojos.—Dolor quemante en los ojos.—Sequedad de los ojos. —*Ojos súmamente abiertos* ó *medio cerrados, convulsos, pro-*

minentes y fijos.—Pupilas dilatadas, inmóviles.—Oscurecimiento de la vista.—*Todos los objetos parecen mas abultados* de lo que son realmente.

Cara.—*Rostro pálido*, *descolorido y gris.*—Rostro macilento ó abotagado é hinchado.—Distorsion de los rasgos de la cara.—*Calambres de la mandíbula.*—Estremecimiento de los músculos de la cara.—Erupcion alrededor de la boca.

Boca.—*Boca seca* y pastosa.—*Espuma en la boca.*—Sensacion de frio en la lengua.—*Afonía.*

Garganta.—Ligera inflamacion en la garganta con sensacion dolorosa como si estuviera tirada hácia abajo, durante y despues de la deglucion.—*Calambres en la faringe y esófago.*—Ruido que hacen las bebidas al tiempo de descender al estómago.—*Deglucion impedida* ó difícil.—Sensacion de frio ó calor y dolor quemante en la garganta y en la boca.

Apetito.—Gusto de un dulce insípido ó ácre y excitante.—*Sed ardiente* con sequedad de la boca.—Falta de apetito, con repugnancia á todos los alimentos.—Hambre excesiva.

Estómago.—Eructos violentos, vacíos, ó con gusto á los alimentos.—*Mucha desgana, náuseas y vómitos*, aun de los alimentos.—Vómito de materias negras.—Presion en el estómago.—*Dolores de estómago hasta el punto de hacer caer en desvanecimiento.*—Mucha angustia en la region precordial.—Sensacion de frio ó de *ardor en el estómago* y epigastrio.—(Inflamacion del estómago).

Vientre.—Dolores cólicos por debajo del ombligo, como si se cortaran los intestinos.—Sensacion de hinchazon como de un cuerpo de la magnitud de una nuez, en el lado izquierdo del bajo vientre.—*Dolores cólicos*, *calambres y contracciones en el vientre.*—Sensacion de frio, ó *calor y ardor en el vientre.*—(Inflamacion de los intestinos).—Cólicos flatulentos.—Borborigmos, ruido sordo y ruido como el que hace el agua en el vientre y en el estómago.—Pellizcos en la region umbilical.

Deposiciones.—*Estreñimiento.*—Deposiciones duras, tenaces, con esfuerzos.—*Diarreas con tenesmo*, dolores incisivos y sensacion de ardor en el ano.—Diarreas de mucosidades verdosas con contraccion en las ingles.—*Deposiciones involuntarias.*—Parálisis del esfínter del ano.

Digitized by

Orinas.—*Retencion de orina.*—Orina acuosa, amarilla, pálida.—Orina espumosa, ácre.—Sedimento espeso, rojizo en las orinas.—*Emision involuntaria de orinas.*—Parálisis de la vejiga.—Durante la emision de las orinas dolor en la region del estómago.

Partes genitales.—Exaltacion del apetito venéreo.—Gangrena en las partes genitales.—*Reglas muy anticipadas* y muy abundantes.—Durante las reglas, dolores dislacerantes en la cabeza, odontalgia y retortijones.

Laringe.—*Ronquera, escozor y como aspereza en la garganta y faringe.*—Sensacion de hinchazon en la faringe.—Voz grave; ó voz de bajo.—*Constriccion espasmódica de la tráquea-arteria.—Pequeña tos corta*, provocada por un cosquilleo y una especie de aspereza en la garganta.—*Espectoracion gelatinosa*, abundante, con estrías de sangre.

Pecho.—*Respiracion lenta, débil, angustiosa.—Respiracion estertorosa*, con ronquido.—La respiracion parece ser detenida desde la region del estómago.—*Respiracion asmática*, como si los pulmones no pudiesen dilatarse lo suficiente, ó como por parálisis de estos.—Presion en el pecho.—*Constriccion en el pecho*, con opresion.—Sensacion de ardor y *punzadas en el pecho.*—Dolores en la region del corazon.—*Latido del corazon irregular y lento.*

Miembros.—Tirones agudos y punzadas en la espalda y en los brazos.—Sensacion ardorosa en las manos con hinchazon de las venas de estas partes.—Temblor de las manos.—La piel de entre los dedos está seca y áspera.—Tirones agudos y punzadas en las rodillas.—Adormecimiento de los pies.

120.—LEDUM PALUSTRE.

LED.—Romero silvestre.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 15, 30.—*Duracion de accion*: 6 á 7 semanas, en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph.

COMPÁRESE CON: Alum. ars. *bry.* canth. cham. lyc. merc. *puls.* rhus. sep. thui.—Este medicamento conviene algunas veces despues de lyc.—Despues de ledum, conviene algunas veces: Chin. sep.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento

contra: —*Afecciones artríticas y reumáticas*; Nudosidades artríticas; Afecciones hidrópicas; Herpes y otras erupciones crónicas; Anasarca; Forúnculos; Coma soñoliento?; Cefalalgia congestiva ó reumática?; Oftalmías reumáticas y artríticas?; Dureza de oido (por enfriamiento de la cabeza, debido á haberse cortado el pelo inoportunamente); Herpes y otras erupciones en la cara; Hemorragia nasal y bucal?; Ascitis?; Diabetes?; Gonorrea crónica?; Laringitis crónica (tísis laríngea)?; Tos convulsiva; Coqueluche?; Tísis pulmonar?; Neumonía crónica?; Gota?; etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores artríticos*, *presivos y tirantes*, *agudos*, ó simplemente presivos, en los miembros, *agravados al principio de la noche con el calor de la cama*.—Adormecimiento y sensacion de torpeza en algunos miembros.—*Dolores en las articulaciones*, dislacerantes y lancinantes, pulsativos y paralíticos, *agravados por el movimiento*.—Los dolores de las articulaciones son los que se agravan únicamente por el movimiento; no sucede así con los demás.—Nudosidades gotosas en las articulaciones.—*Hinchazones duras*, calientes, tensas, *con dolores dislacerantes*.—*Edema ó anasarca general ó parcial.—*Frio y falta de calor vital.—El calor de la cama se hace insoportable*, y provoca calor y sensacion de ardor en los miembros.

Piel.— Prurito y corrosion en la piel, con sensacion de ardor despues de haberse rascado.—*Comezon corrosiva*, como si hubiera piojos.—Erupciones miliares.—Erupciones parecidas á la viruela del ganado lanar, con descamacion.—Manchas azuladas en el cuerpo, como petequias.—*Herpes secos, furfuráceos, excesivamente pruritosos.—**Forúnculos*.—*Mucha propension á dormir en el dia, como si se estuviese embriagado*; *especie de soñolencia*, con mucho deseo de acostarse.—*Insomnio nocturno*, con agitacion inquieta, estremecimiento, *visiones é imágenes fantásticas en cerrando los ojos*.—Ensueños agitados, angustiosos.—Ensueños lascivos con emision de esperma.

Fiebre.—*Calofrios violentos y horripilacion con frio en los miembros*.—Calor en los piés y en las manos por la tarde.—Fiebre por la tarde con dolor en la cabeza y en los

ojos.—°Sensacion de mucho calor, alternando con sudor.—*Sudor excitado fácilmente por la marcha*, sobre todo en la frente, y á veces de un olor ácido.

Moral.—Ansiedad.—Propension á asustarse.—Disposicion á enfadarse y á encolerizarse.—Seriedad imperturbable.—*Humor moroso y apesadumbrado*.—Misantropía.—Demencia.

Cabeza—*Embriaguez*.—*Vértigos con desvanecimiento*, capaz de hacer caer hácia adelante ó hácia atrás, agravados en bajando la cabeza, ó paseándose al aire libre.—La cabeza está atolondrada, con conmocion dolorosa del cerebro, si se da un paso en vago.—**Dolores de cabeza estupefacientes*.—Cefalalgia presiva, como si hubiera un peso dentro del cráneo que deprimiese todo el cerebro.—Dolor de dislaceracion en la cabeza y en los ojos, los que están inflamados, con fiebre por la tarde.—*Violentos dolores pulsativos en la cabeza.—Imposibilidad de soportar cualquiera clase de adornos en la cabeza.—Comezon como si bulleran piojos por la piel del cráneo y la frente.—Se enfrian fácilmente los tegumentos de la cabeza.

Ojos.—Prurito en los ángulos internos de los ojos.—*Presion en los ojos*, sobre todo por la tarde, á veces con sensacion de ardor.—*Inflamacion de los ojos*, con aglutinacion y dolores dislacerantes.—*Lagrimeo quemante en los ojos*.—*Pupilas dilatadas*.—Vista turbia, con deslumbramiento.

Oidos.—Ruido en los oidos.—*Retintin en los oidos*.—**Dureza de oido*, como por obturacion de estos.

Nariz.—Nariz dolorosa al tacto.—Violenta sensacion de ardor en la nariz.—Epistaxis.

Cara.—Palidez del rostro.—°Cara abotagada, tan pronto roja como pálida.—*Rubicundez y *erupcion tuberculosa en la cara y en la frente*, como en los embriagados, con dolores lancinantes al tacto.—**Herpes secos y furfuráceos en la cara*, con sensacion de ardor al aire libre.—*Granos y *forúnculos en la frente*.—Dolores violentos y dislacerantes en la cara, por la noche, alternando con lancinaciones en un diente, y terminado por horripilacion, seguida de un sueño profundo.—Infarto de las glándulas submaxilares.

Boca y garganta.—Exhalacion de un olor fétido por la

boca.—Hemorragia bucal.—Irritacion de la garganta con dolor lancinante, durante y despues de la deglucion.—Sensacion como si hubiese en la garganta un obstáculo, con punzadas en el acto de la deglucion.

Apetito.—Gusto como de moho, ó amargor de la boca.—Deseo de agua fria.—Falta de apetito y pronta saciedad.—En deglutiendo de priesa, dolor contractivo en el esófago.—*Náuseas*, con gana de vomitar al expectorar.—*Evacuacion de agua por la boca, como pituitas*, con dolores calambroideos en el vientre.

Estómago.—Orinas.—*Presion en el estómago por poco que se haya comido.*—Dolores de vientre como si los intestinos estuviesen contundidos.—Dolor tractivo en el vientre.—Retortijones en el vientre por la tarde.—*Disentería.*—Frecuente expulsion de gases.—Estreñimiento.—Diarrea de excrementos mezclados de mucosidades y de sangre.—*Conato frecuente de orinar, con emision poco abundante.*—Disminucion de la secrecion de las orinas.—*Emision frecuente y abundante de orinas.*—Hinchazon de la uretra.

Partes genitales.—Erecciones violentas y de larga duracion.—*Poluciones* de esperma sanguinolento ó seroso.—Inflamacion del glande.—*Reglas muy adelantadas* y muy abundantes.

Laringe.—Cosquilleo en la laringe.—*Tos precedida de suspension momentánea de la respiracion.*—Tos espasmódica, fatigosa, parecida á la coqueluche.—*Tos con expectoracion purulenta*, sobre todo por la *mañana* ó en la noche.—Expectoracion verdosa y de olor fétido, ocasionada por la tos.—*Tos bronca, con estremecimiento y *expectoracion de una sangre de color rojo vivo.*

Pecho.—Respiracion difícil y dolorosa.—*Respiracion espasmódica y con sollozos*, como despues de haber llorado amargamente.—Dificultad en la respiracion al subir una escalera.—**Opresion constrictiva de pecho*, agravada por el movimiento y la marcha.—Dolor en el pecho al respirar, y sensacion como si hubiese dentro alguna cosa viva.—Punzadas en el pecho, sobre todo al levantar el brazo ó al moverlos.—Erupcion en el pecho que se asemeja á la viruela del ganado lanar.—*Comezon corrosiva en el pecho, con manchas rojas y miliar.—*Dolor de excoriacion debajo del esternon.

Tronco.—*Rigidez dolorosa en el dorso y en los lomos despues de haber estado sentado.*— Dolores de dislaceracion desde los riñones hasta el occipucio, sobre todo por la tarde.— Dolor violento calambroídeo, por encima de las caderas, por la tarde, con suspension de la respiracion.

Brazos.—*Dolores dislacerantes y estirones presivos en los brazos.*— Punzadas en el hombro, levantando los brazos ó moviéndolos.—*Dolor presivo en las articulaciones del hombro y del codo, agravados por el movimiento.*—Erupcion en los brazos como la viruela del ganado lanar.— Dolores desgarradores en las manos y en los dedos.— *Nudosidades artríticas en las articulaciones de las manos y de los dedos.*— Humedad en la palma de las manos.—Miliar pruritosa en la muñeca.—Temblor de las manos en moviéndolas ó cogiendo algun objeto.

Piernas.—*Dolor reumático, paralítico en la articulacion coxo-femoral.—*Dolor como de rotura y excoriacion en el periostio* del muslo y de las rodillas.—*Rigidez tensiva de la rodilla*, con crujido y genuflexion al andar.—Tension calambroídea en las rodillas, las pantorrillas y los talones.—Debilidad y temblor de las rodillas, estando sentado é igualmente andando.—**Hinchazon dura y tirante de la rodilla, con punzadas y dolores nocturnos, presivos y desgarradores*, y dureza de toda la pierna.—*Hinchazon de la pierna*, por encima y debajo de la rodilla, con calor y dolor lancinante, tractivo.—Rigidez de los piés. —Dolor en la planta de los piés andando, como si estos estuvieran acorchados.—**Hinchazon inflamatoria y hasta edematosa de las piernas y de los piés.*— Dolor incisivo en los dedos por la noche durante el sueño.—*Hinchazon de la parte carnosa del dedo pulgar*, con dolor en apoyándose sobre el pié.

121.—LEPTANDRA VIRGINICA.

LEPT.— Leptandra.—Véase HALE, *Remedios americanos.*

AVISOS CLINICOS.—Las principales afecciones contra las que este medicamento, todavía poco conocido en sus

síntomas, ha sido hasta aquí recomendado ó empleado con buen resultado, son las siguientes: *Gastralgia*, con retortijones violentos en la parte inferior del epigastrio, que vienen por accesos, á mas del dolor contínuo, sordo y penoso en la misma parte, que se agravan por las bebidas frias, así como al levantarse, y que se acompañan de una gana apremiante de defecar, que es imposible detener un solo instante.—*Hepatitis* y otras *afecciones del hígado*, con *cámaras muy oscuras, casi negras*, orinas oscuras, dolor en la region del hígado, lengua cargada de una capa amarilla, náuseas y vómitos.—*Atrofia aguda*, *amarillenta*, *del hígado*, con delirio, grande postracion, piel seca y caliente, extremidades frias, cámaras fétidas y como de pez, lengua cargada con una capa espesa, con una faja negra en medio.—*Ictericia*, con dolor y sensacion de plenitud en la region de la vesícula biliosa, calor y dolor en el hígado hasta la espina dorsal, frio por el dorso y cámaras como arcilla.—*Diarrea* por resfriamiento, durante un frio limitado, evacuaciones acuosas, abundantes, con violentos retortijones en los intestinos delgados.—*Hemorróides* que sangran con frecuencia, con estreñimiento y violentos dolores por bajo del sacro.

122.—LYCOPODIUM.

LYC.—Licopodio, pié de lobo.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeopática.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en muchos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. puls.

COMPÁRESE CON: Ambr amm. *ars.* bell. *bry. calc.* canth. caps. carb-veg. caus. cham. cic. *con. graph. iod.* magn. mag-m. *mang. merc. mur-ac.* natr-m. *nitr-ac.* n-vom. plat. *phos. phos-ac. puls.* rhod. *rhus. sep. sil.* staph. sulf. thui. —Cuando este medicamento conviene, si se halla indicado, es sobre todo despues de *Calc.* y *silic.*—Despues del licopodio conviene algunas veces: *Graph. led. phos. puls. silic.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser *consultado* este medicamento contra:—Afecciones principalmente de personas (y sobre todo de las mujeres) de un carácter dulce, con propension á la melancolía, ó de una constitucion linfática, ó aun leuco-flemática, con predisposicion á corizas, ca-

tarros pulmonares y otros flujos mucosos; *Infarto de las glándulas;* Malas consecuencias por abuso del mercurio; Afecciones reumáticas y artríticas, aun con hinchazon y nudosidades gotosas; Inflamaciones agudas y crónicas; calambres y convulsiones?; Epilepsia?; Afecciones escrofulosas y raquíticas; Inflamacion, desviacion, cáries y otras enfermedades de los huesos, aun las que proceden por abuso del mercurio; Parálisis?; *Afecciones hidrópicas*; Atrofia (de los niños escrofulosos); Excoriacion de la piel; Herpes y otras erupciones crónicas de diferentes especies; Ulceras inveteradas y fistulosas; Anasarca; Várices; Aneurismas; *Ulceras por el abuso del mercurio;* Forúnculos; *Fiebre tifoidea;* Cefalalgia, aun á consecuencia de un arrebato de cólera; *Cefalalgia reumática*; Jaqueca?; *Tiña*; Calvicie; Oftalmías escrofulosas?, reumáticas?, artríticas?; Ambliopia amaurótica; Fungus medular en los ojos?? *Coriza crónico ó agudo*; *Otitis y otorrea*, sobre todo á consecuencia de la escarlatina; ó en indivíduos escrofulosos; Neuralgia facial; Disposicion á las erisipelas de la cara; Herpes y otras erupciones faciales; Costra láctea?; *Anginas crónicas*, aun con ulceracion y sobre todo despues de haber ábusado del mercurio; Odontalgias reumáticas; Fístulas de las encías?; Dispepsia, gastralgia, y otras *afecciones gástricas*; *Escirro* (cáncer?) *del estómago*; Hepatitis crónica; Cólicos flatulentos; Ascitis?; *Inercia de los intestinos y estreñimiento tenaz*; Cálculos renales y arenillas; Hematuria; Incontinencia de orina; Orquitis; Induracion de los testículos?; Gonorrea secundaria?; Dismenorrea; Padecimientos cloróticos; Várices y estreñimiento en las mujeres embarazadas; Disposicion al aborto con várices en las partes genitales?; Excoriacion y estreñimiento de los recien nacidos; *Catarro crónico*; Grippe; *Neumonia crónica*; *Padecimientos de los tísicos*; (Tísis tuberculosa); Hemoptisis; *Afecciones orgánicas del corazon*, sobre todo *hipertrofia*; Bocio; Gota en las manos; Gonitis artrítica ó escrofulosa; Tumor blanco?, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Traccion y dolores dislacerantes* en los miembros, lo mas frecuentemente por la *noche* y *durante el reposo*, algunas veces tambien despues

de medio dia, cada dos dias, y sobre todo durante un tiempo de mucho viento ó lluvioso, aliviados por el calor.—**Dolores lancinantes* en las partes internas y externas.—*Rigidez dolorosa de los músculos y de las articulaciones, frecuentemente con *torpeza é insensibilidad de los miembros.*—*Adormecimiento de los miembros.—°*Mucha facilidad á derrengarse*, que frecuentemente es seguida de rigidez de la nuca.—**Calambres y contraccion de los miembros.—Extension y retraccion espasmódicas* é involuntarias de algunos músculos ó de algunos miembros.—**Sacudidas y estremecimientos de algunos miembros ó de todo el cuerpo*, durante el sueño y la vigilia.—Calambres en las partes internas y externas, aun por la noche.—Ataques de epilepsia, algunas veces con gritos, espuma en la boca y mucha angustia en el corazon.—°*Hinchazones hidrópicas* é inflamatorias.—°*Várices.*—**Nudosidades artríticas.*—Infarto de las glándulas.—°*Inflamacion de los huesos con dolores nocturnos.*—Desviacion y reblandecimiento de los huesos.—°Ulceracion de los huesos.—Los síntomas se agravan por lo regular hácia las cuatro de la tarde, y se mejoran hácia las ocho de la noche, excepto la debilidad.—Afecciones periódicas.—Ebullicion de sangre por todo el cuerpo, sobre todo por la tarde, con agitacion y temblor.—Sensacion como si la circulacion de la sangre se hubiese suspendido.—*Debilidad interior.*—Mucha susceptibilidad nerviosa.—*Debilidad y *laxitud de los miembros*, sensible principalmente *durante el reposo*, ó por la mañana al despertar.—Despues de un corto paseo, siente fatiga, sobre todo en las piernas, y sensacion quemante en los piés.—Temor al movimiento y deseo contínuo de estar acostado.—°Postracion total de fuerzas, con la mandíbula caida, ojos empañados y medio cerrados, y respiracion lenta.—**Excesivo enflaquecimiento*, aun en los niños.—*Accesos de desfallecimiento*, sobre todo por la tarde, y algunas veces aun estando acostado, con pérdida de los sentidos, oscurecimiento de la vista y mucha indiferencia.—Temblor de los miembros.—**Falta de calor vital.*—*Mucho deseo ó repugnancia excesiva al aire libre*, con suma sensibilidad al aire fresco.—*Mucha propension á constiparse.*

Piel.—*Corrosion *y prurito por el dia calentándose*, ó por la noche antes de acostarse.—Disposicion en la piel á for-

marse grietas fácilmente.—*Erupciones dolorosas.—Erupciones urticarias.—Manchas rojas en la piel de mucha magnitud.—*Manchas hepáticas* pruritosas.—**Efélides abundantes.*—°*Herpes* insensibles de un pardo amarillento, arrugados ó *húmedos*, *purulentos*, llenos de hendiduras profundas y de costras gruesas.—**Forúnculos* muy gruesos que se reproducen periódicamente.—°*Ulceras* que sangran fácilmente con dolor lancinante y sensacion de ardor mientras se curan, ó con dolores dislacerantes nocturnos, y prurito.—Ulceras fistulosas con bordes callosos, rojos, vueltos y lustrosos, algunas veces con inflamacion é hinchazon de la parte afecta.—**Chapas excoriadas en la piel*, en los niños.—**Verrugas*, °sobre todo de las que son muy prolongadas.—Sabañones.—*Mucha sequedad de la piel.—°*Anasarca con inactividad de los intestinos y de la piel.*

Sueño.—*Bostezos frecuentes, algunas veces abortados.—**Gana de dormir por el dia* ¯y por la noche muy temprano, con *sueño tardo* por afluencia de ideas y mucha sobreexcitacion nerviosa.—*Sueño agitado é inquieto, con ensueños angustiosos, espantosos, de los que frecuentemente se despierta* asustado.—Ensueños voluptuosos, vivos, tristes; ensueños de muertos ó de las ocupaciones del dia, etc.—Estremecimiento, gritos, sabresaltos con espanto ó carcajadas, ó lloros y gemidos durante el sueño.—*Por la noche *estremecimiento é inquietud* en las piernas, dolor de cabeza, ¯*angustia*, pesadilla, *ebullicion de sangre y palpitaciones de corazon*, dolor de estómago, cólicos, padecimientos asmáticos, etc.—Dificultad de estar echado sobre el lado izquierdo, á causa de los latidos del corazon y de las punzadas.—Imposibilidad de estar echado por la noche, porque no se halla bien en ninguna posicion.

Fiebre.—*Calofrio por la tarde*, algunas veces de un solo lado, ó cada dos dias, con calor ó seguido de sudor sin calor.—*Falta de calor vital.—°Fiebre terciana, con vómitos ácidos y abotagamiento de la cara y las manos despues del calofrio.—*Calor fugaz.*—Calor quemante, con respiracion corta.—°Fiebre maligna con malicia y mal humor al despertarse, ó con sobreexcitacion nerviosa, sin calor en la cabeza ni encendimiento del rostro, rubicundez circunscrita de las mejillas, mucha de-

bilidad, sudores que no alivian, lengua roja, seca y estreñimiento.--°Fiebre lenta con sudores nocturnos, viscosos.—°Fiebre con postracion, mandíbula inferior caida, ojos empañados y medio abiertos y respiracion lenta, con la boca abierta.—Sudor, *principalmente en la cara*, *fácil á excitarse* por el dia *al mas ligero ejercicio.*—Sudor febril por el dia.—*Sudor nocturno*, regularmente fétido ó glutinoso, principalmente en el pecho y en el dorso.

Moral.—**Melancolía* taciturna y humor *apesadumbrado*, ó desesperacion de la salvacion eterna.—**Angustia*, sobre todo en la region del epigastrio con *melancolía y disposicion á llorar*, sobre todo despues de haberse enfadado ó *al acercársele otras personas.*—Misantropía.—*Temor de estar solo.—**Irritabilidad y susceptibilidad con llantos.*—Irascibilidad.—**Terquedad.*—Enajenacion y furor que se manifiesta por la envidia, las infamias, la arrogancia y el despotismo.—°*Carácter dulce*, *sumiso.*—Indiferencia completa.—Aversion á la conversacion.—*Fatiga provocada por esfuerzos intelectuales ó *imposibilidad de entregarse á trabajos* de este género.—Aturdimiento.—Imposibilidad de expresarse correctamente; equivoca las palabras y las sílabas.—Locucion embrollada.

Cabeza.—Aturdimiento y vértigos como por embriaguez.—**Vértigo* rotatorio, sobre todo *al bajarse*, ó estando en un aposento abrigado, con gana de vomitar.—°Dolor de cabeza á causa de una emocion desagradable.—°Cefalalgia con disposicion á desvanecimientos y mucha agitacion.—*Dolor de cabeza con vértigos.—*Pesadez de cabeza.—Dolor de cabeza, sacudiéndola y volviéndola, como igualmente á cada paso que se da.—Cefalalgia supraorbitaria inmediatamente despues del desayuno.—Dolor de cabeza semilateral por la tarde, agravado por el trabajo intelectual hasta el punto de hacerse insoportable.—**Dolores de cabeza presivos*, algunas veces como si se introdujese un clavo en la cabeza, ó con tension que se aumenta estando acostado.—**Dolores de cabeza desgarradores*, sobre todo *despues de medio dia ó por la noche*, principalmente *en la frente*, pero mas comunmente en toda la cabeza, los ojos, la nariz y hasta en los dientes, con necesidad de acostarse.—Dolores lancinantes en la cabeza.—Latidos en la cabeza por la noche despues

Digitized by Google

de acostarse.—**Congestion á la cabeza*, con calor de esta parte, algunas veces por la mañana al incorporarse en la cama.—Conmocion y resonancia en el cerebro á cada paso que se da.—Terebracion, estallido y *dolores dislacerantes* en la piel del cráneo, sobre todo por la *noche*.—Movimientos involuntarios y temblor convulsivo en la cabeza.—Mucha disposicion á resfriarse la cabeza.—**Erupcion en la cabeza*, *°con supuracion* abundante y fétida, *algunas veces con infarto de las glándulas de la nuca y cuello.—Los cabellos se vuelven grises.—**Calvicie.*

Ojos.—**Presion en los ojos.—*Sensacion de ardor corrosivo y penetrante en los ojos* (y en los párpados), sobre todo por la *noche* á la luz artificial.—*°Escozor en los ojos.*—Sensacion de frio en los ojos por la tarde.—**Inflamacion de los ojos* y de los párpados.—Orzuelo.—**Aglutinacion de los párpados*, *sobre todo por la noche y lagrimeo*, principalmente por *el dia* y á un aire frio.—*Legaña en los ojos que impide ver.—*Estremecimiento de los párpados.—*Turbacion de la vista*, como si esta estuviera cubierta por una pelusilla.—Miopia ó **presbiopia.*—Hemiopia vertical.—Confusion de los caractéres al leer.—*Oscuridad, manchas negras, chispas y ráfagas luminosas delante de los ojos.—*Deslumbramiento é irritacion de los ojos, por la tarde á la luz.

Oidos.—Otalgia al aire libre.—Congestion en los oidos.—Ulceracion en las orejas.—*Flujo por los oidos.—*Excesiva sensibilidad del oido* al menor ruido; los sonidos suaves de la música fatigan.—*Retintin y murmullo *en los oidos.—*Dureza de oido.—°*Costras que exudan en y detrás de las orejas.

Nariz.—**Ventanillas nasales ulceradas*, costrosas, obstruidas por mucosidades, por la noche.—Hinchazon de la nariz con secrecion mucosa, ácre, fétida y corrosiva.—Movimientos convulsivos de los músculos de la nariz.—Mucosidad de sangre al sonarse y *epistaxis.—*Excesiva sensibilidad del olfato.—*Coriza*, casi *de todas especies.—*Coriza* seca, *con obturacion de la nariz*, atontamiento de cabeza y dolor quemante en la frente.—**Obturacion de las ventanillas nasales*, sobre todo por la noche, que no permite respirar mas que por la boca.

Cara.—*Palidez de la cara* aumentada por la tarde.—**Cara*

amarilla, *térrea*, *con arrugas profundas*, círculos azules alrededor de los ojos y labios azulados.—°Rubicundez circunscrita en las mejillas.—Cara encendida, abotagada, con erupciones y manchas rojas.—°Hinchazon y tension de la cara.—Dolores dislacerantes en los huesos de la cara.—°Sensacion dolorosa de frio en el rostro.—Estremecimientos y movimientos convulsivos en los músculos de la cara.—**Accesos frecuentes de calor fugaz en el rostro.*—**Erupciones en la cara*, á veces con prurito.—*Efélides.—**Herpes en la cara*, furfuráceos y de fondo amarillento.—°*Pequeñas nudosidades muy blancas*, *en la mejilla izquierda.*—°*Labios pálidos y azulados.*—Movimientos convulsivos de la boca y distorsion de los ángulos de la misma.—Hinchazon del labio superior.—Erupcion y excoriacion de los labios y de las comisuras de estos.—Ulceras en la parte roja del labio inferior.—Erupcion pruritosa alrededor de la barba.—*Hinchazon de las glándulas submaxilares.*

Dientes.—Odontalgia solo por la noche, aliviada por las bebidas calientes y el calor de la cama.—**Dolores sordos en los dientes*, con *hinchazon de la mejilla y de las encias.*—Traccion calambroídea, dolores dislacerantes y *sacudidas* ó pulsaciones *en los dientes*, *sobre todo durante* ó despues *de comer.*—Rechinamiento de dientes.—Los dientes se ponen amarillos.—(Fístula en las encías).—Hinchazon de las encías con sacudidas, dolores dislacerantes y punzadas.—Ulceras en las encías.

Boca.—**Sequedad de la boca sin sed*, con tension de esta parte, lengua pesada y palabra indistinta.—Torpeza en el interior de la boca y en la lengua.—*Exhalacion de un olor pútrido por la boca.*—Hemorragia bucal.—*Lengua sucia.—Movimientos involuntarios de la lengua.—°*Tartamudez*, *solo para la última palabra de cada frase.*

Garganta.—Sensacion de estrangulacion en la garganta, con imposibilidad de deglutir.—**Sequedad de la garganta* —Dolor de excoriacion en la garganta.—*Dolor quemante en la garganta con sed nocturna.—°Sensacion como si una bola ascendiese desde la boca del estómago á la garganta.—*Inflamacion de la garganta y del paladar con dolor lancinante*, que impide la deglucion.—Hinchazon y supuracion de las amígdalas.—Ulceras semejantes á los chancros en las tonsilas.—**Ruido estrepitoso de mucosida-*

Digitized by

des.—°*Costra lardácea que cubre todo el velo del paladar y el mismo paladar, con ó sin causa sifilítica evidente.*—°*Herpes sifilíticos en la garganta.*

Apetito.—Pérdida del gusto.—**Boca* pastosa ó *amarga*, sobre todo *por la mañana*, frecuentemente con náuseas.—**Acedías en la boca*, sobre todo por la mañana, ó gusto ágrio de los alimentos.—Falta de sed, ó sed ardiente.—*Sed nocturna.*—**Pérdida del apetito*, algunas veces al primer bocado.—*Hambre excesiva.—*Bulimia.*—*Repugnancia á los alimentos cocidos ó calientes, al pan de centeno, á la carne, al café y al humo del tabaco.—°*Apetencia excesiva por cosas dulces.*—°Imposibilidad de digerir los alimentos pesados.—*Despues de la comida, dolores hepáticos, opresion y *plenitud en el pecho y en el vientre*, náuseas, calor en la cabeza, *rubicundez de la cara*, pulsacion y temblor en todo el cuerpo, manos calientes, palpitaciones de corazon, cólicos, etc.—*Despues de haber tomado leche, acedías y diarrea.

Estómago.—*Erutos violentos despues del medio día.—**Erutos ágrios*, ardientes, grasos ó amargos.—*Regurgitacion ágria de los alimentos, sobre todo de la leche.—**Pirosis*, sobre todo despues de la comida.—*Hipo violento por accesos*, sobre todo despues de comer.—*Náuseas* estando en la habitacion, que se disipan al aire libre, y *vice-versa.*—**Náuseas frecuentes, continuas*, sobre todo por la mañana con amargor de la boca.—°Náuseas por el movimiento del carruaje.—°Sensacion de desabrimiento en el estómago por la mañana.—**Pituitas en el estómago*, algunas veces cada dos dias, con secrecion de una agua amarga.—**Vómitos* de alimentos y de bílis, sobre todo por la noche ó por la mañana en ayunas.—*Vómito de materias verdosas ó amargas.—Vómitos de sangre.—Dolores de estómago con calofrios, y manos como muertas despues de haberse enfriado ligeramente.—Dolores de estómago periódicos, los que se alivian con el calor de la cama.—**Presion en el estómago* por la tarde y *despues de cada comida*, algunas veces con amargor de boca.—Dolores compresivos y contractivos en el estómago.—Los dolores de estómago se manifiestan principalmente por la mañana al aire libre, despues de la comida, ó despues de haber bebido vino; los que disminuyen algunas veces por la tarde, y van acompañados frecuen-

temente de calambres de pecho y dificultad de la respiracion.—**Hinchazon en el epigastrio*, con sensibilidad dolorosa al tacto.—Los vestidos incomodan alrededor del estómago.

Vientre.—*Tension alrededor de los hipocondrios, como por una faja muy apretada.—*Presion y tension en el higado.*—Dolor calambroídeo en el diafragma y dolor como de relajacion en el hígado al bajarse.—Dolores hepáticos despues de haber comido hasta la saciedad.—Dureza del hígado.—Dolores abdominales presivos.—**Plenitud y timpanitis del estómago y del vientre.*—Pesadez en el vientre.—Dureza en el vientre.—Ascitis.—Dolores calambroídeos contractivos en el vientre con tension.—*Dolores dislacerantes, traccion, tension y *pellizcos en el vientre.*—*Traccion como por gárfios en el bajo vientre con suspension de la respiracion.—**Dolores cólicos*, sobre todo por encima del ombligo.—Dolor al tacto por encima del ombligo.—Dolor quemante en el vientre.—Punzadas desgarradoras, pulsacion y presion en el anillo inguinal, como si fuera á formarse una hernia.—Dolores calambroídeos en los músculos abdominales, sobre todo por la noche.—**Encarcelacion de flatuosidades.*—**Falta de espulsion de gases.*—**Desarrollo de gases y borborigmos en el vientre*, sobre todo en el lado izquierdo.

Deposiciones.—**Estreñimiento de larga duracion.*—**Estreñimiento tenaz*, á veces con deseo inútil de defecar, y evacuacion difícil.—°Estreñimiento ó diarrea en las embarazadas.—Deposiciones pálidas, de olor pútrido.—Flujo de mucosidades ó de sangre durante las deposiciones.—Lombrices.—Dolor en el ano despues de comer y despues de las deposiciones.—Despues de la deposicion meteorismo.—**Prurito y tension en el ano.*—*Dolores incisivos, punzadas y dolor de excoriacion en el recto.—Espasmos del recto.—Granos hemorroidales en el ano y el recto, con procidencia de este.—Erupcion pruritosa en el ano.

Orinas.—**Conato urgente de orinar y emision muy frecuente.*—Orina de color oscuro, con sedimento amarillo, ó rojizo.—°Cálculos urinarios y arenillas.—*Hematuria, °á veces con parálisis de las piernas y estreñimiento.—**Incontinencia de orina, °tenaz, á consecuencia de un sobresalto durante el cóito.*—Escozor al orinar.—*Prurito en la uretra.

Partes viriles.—Punzadas, traccion y dolores incisivos en el glande.—*Gonorrea bastarda*, con ampollas de un color rojo oscuro y escozor detrás del glande.—*Excoriacion entre el escroto y los muslos.—Hinchazon hidrópica de las partes genitales.—°*Sarcocele inveterado.*—**Exaltacion inmoderada ó falta de apetito venéreo.*—°Repugnancia al cóito, ó suma facilidad á ser excitado.—**Impotencia* de larga duracion.—*Debilidad ó falta total de erecciones.—*Poluciones inmoderadas ó °falta de estas.—°Durante el cóito eyaculacion muy pronta ó *muy tarda.—Se queda dormido durante el cóito.—Despues del cóito y las poluciones laxitud.—Secrecion de licor prostático.

Reglas.—Prurito, *sensacion de ardor y corrosion en la vulva.—°Presion hácia el exterior por encima de la vulva, hasta la vagina en bajándose.—°Expulsion de gases por la vagina.—°*Sequedad crónica de la vagina.*—*Dolores lancinantes en los labios de la vulva al echarse.—Excoriacion entre los muslos y la vulva.—Durante y despues del cóito dolor quemante en la vagina.—**Reglas* (muy anticipadas), *muy abundantes y de muy larga duracion.*—°Reglas que se suprimen con facilidad por mucho tiempo á consecuencia de un susto.—**Antes de las reglas*, calofrios, *tristeza*, *melancolía.*—Durante las reglas, delirios con llantos, dolores de cabeza, acedías en la boca, dolor de riñones, hinchazon de los piés, desvanecimiento, vómito de materias ácidas, retortijones, dolores cólicos y dolores en el dorso.—**Leucorrea* lechosa, amarillenta, rojiza y corrosiva, °algunas veces precedida de dolores cólicos en el bajo vientre.—Tumefaccion en las mamas con nudosidades.—°Excoriacion y costras que exudan en los pezones.

Laringe.—Picor con hormigueo en la tráquea-arteria por la noche.—°*Catarros bronquiales muy tenaces, con expectoracion de mucosidades de un amarillo color de limon y amargas.*—Ronquera con aspereza y dolor de excoriacion en el pecho despues de haber hablado.—Acumulacion de viscosidades en el pecho con estertor mucoso.—°Voz lánguida y apagada.—*Tos despues de haber bebido.—*Tos á la madrugada, tenaz y seca.—**Tos nocturna*, que conmueve la cabeza, el diafragma y *el estómago.*—*Tos seca dia y noche.—**Tos provocada por un cosquilleo*, ó como

Digitized by

producida por el vapor del azufre, ó *excitada respirando profundamente*, en lo general *con expectoracion gris, amarillenta y salada*, °algunas veces con mucha debilidad de estómago, fiebre, sudores nocturnos y enflaquecimiento.—*Tos con expectoracion abundante de materias verdosas.—**Expectoracion abundante de pus*, á consecuencia de la tos.—**Tos con expectoracion de sangre.*—*En tosiendo punzadas en la cabeza, respiracion corta, escozor y conmocion en el pecho, ó dolores en la region estomacal.

Pecho.—*Respiracion corta que dura casi todo el tiempo que se trabaja*, aun *en los niños.*—**Opresion de pecho* contínua, agravada por el paseo al aire libre,—°Estertor mucoso y ronquido al respirar.—Al respirar estremecimientos y punzadas en el pecho y los costados.—°Dolor de contusion en el pecho.—**Presion continua en el pecho.*—Peso en el pecho.—Tension en la parte anterior del pecho.—**Lancinaciones en el pecho, sobre todo en el costado izquierdo*, y y principalmente al estornudar, al toser, al reir y al mas ligero movimiento, algunas veces con imposibilidad de estar echado sobre el lado enfermo, y dificultad de la respiracion.—°Dolor de excoriacion en el pecho, sobre todo despues de haber hablado.—°Punzadas en el costado, que alternan con odontalgia, y dolores en los miembros.—**Palpitaciones de corazon*, sobre todo *durante la digestion*, ó por la noche en la cama, algunas veces angustiosas y con temblor.—Erupciones dolorosas y manchas hepáticas en el pecho.

Tronco. — Dolores violentos en los riñones estando sentado, los que no permiten ponerse en pié.—*Dolores en el dorso y en los riñones, sobre todo moviéndose, bajándose, ó levantando del suelo algun objeto, acompañados frecuentemente de dolores constrictivos en el vientre.—*Punzadas en los riñones enderezándose, despues de haber estado encorvado.—**Dolores tractivos dislacerantes, punzadas en el dorso y en los riñones*, con dificultad en la respiracion, principalmente estando sentado, y aun *por la noche.*—°Desviacion de la columna vertebral.—°Traccion y contraccion desde la nuca hasta el occipucio.—**Rigidez de la nuca*, °algunas veces debida á una derrengadura.—Manchas hepáticas en la nuca.—°Herpes en la nuca y en las axilas.—Forúnculos en los sobacos.—Rigidez, hinchazon é induracion de un lado

del cuello.—**Hinchazon de las glándulas del cuello y de la espalda*, con dolor lancinante.—Debilidad y parálisis de los músculos del cuello.—Erupcion dolorosa en el cuello. —°Bócio.

Brazos.—Dolores dislacerantes y punzadas en las articulaciones del hombro y del codo.—**Dolores osteócopos nocturnos en los brazos* y el codo.—*Dolor tractivo en los brazos.—**Estremecimientos en los hombros y en los brazos,* aun durante la siesta. —*Debilidad paralítica de los brazos.—**Adormecimiento fácil de los brazos y de los dedos*, aun por la noche ó solamente levantándolos.—Prurito corrosivo y manchas hepáticas en los brazos.—°Rigidez artrítica del codo y de la muñeca.—Herpes en los brazos. —Inflamacion erisipelatosa en el antebrazo, con supuracion.—**Sequedad de la piel de las manos.*—Sensacion quemante en la palma de las manos.—Tumefaccion roja é indolente de las manos.—Verrugas en las manos y en los dedos.—Torpeza de los dedos y de las manos, los que están como muertos.—Temblor involuntario de las manos.—**Hinchazon roja y dolores dislacerantes artríticos en las articulaciones de los dedos.*—*Nudosidades artríticas y rigidez de los dedos.—Rigidez de los dedos trabajando. —Contraccion y *sacudidas en los dedos*.—Sabañones.

Piernas. — Dolores periódicos cada cuatro dias desde la articulacion coxo-femoral hasta el pié.—**Dolores dislacerantes en las piernas y en las rodillas*, que se propagan á la tibia y al empeine, sobre todo *por la tarde y por la noche*.—Inquietud, sacudidas y temblor de las piernas y de los piés, sobre todo por la tarde y la noche.—Sacudidas involuntarias en las piernas, ó separacion y aproximacion alternativa de los muslos.—°Prurito quemante y corrosivo en las piernas, sobre todo en las corvas.—*Cansancio sumo y *rigidez de las rodillas.*—**Hinchazon de las rodillas.*—*Hinchazon de las piernas, con manchas rojas, quemantes, extensas y dolorosas, que no permiten apoyarse sobre el pié.—°Parálisis de las piernas, con hematuria y estreñimiento. — Herpes en las piernas y en las pantorrillas.—°Tumor blanco de las rodillas.—*Calambres y *dolores calambroideos en las pantorrillas*, sobre todo *andando*, y por la noche.—°Dolor quemante en las piernas.—*°Ulceras en las piernas*, con dolores dislacerantes nocturnos, prurito y dolor quemante.—*Dolor en la

planta de los piés andando.—*Calambres en los piés y en los dedos.—°*Hinchazon de los piés* y de los maléolos, ó de la planta de los piés (con dolor lancinante). — *Piés frios.—**Sudor frio en los piés*, á veces abundante y con excoriacion de la piel. —°Flexibilidad de los dedos al andar.—*Contraccion de los dedos.—**Callos en los piés*, algunas veces *con dolor lancinante*.

123.—MAGNESIA CARBONICA.

MAGN.—Magnesia carbonatada, Sub-carbonato de magnesia. — HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 3).—*Duracion de accion*: hasta 50 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

COMPÁRESE CON: Bar. bell. bry. *ca'*. cham. con. *graph. kal. lyc. magn-m.* nitr-ac. n-vom. phos. puls. rhus. sil. sulf.

CLÍNICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá *consultarse* este medicamento contra:—Afecciones principalmente de los niños, y de las *mujeres*, y sobre todo dismenorrea de las mujeres histéricas; Afecciones escrofulosas?; Epilepsia; Atrofia de los niños?; Infarto de las glándulas?; Herpes?; Jaqueca; Cefalalgia histérica?; Oftalmías escrofulosas?; Catarata; Oscurecimiento de la córnea; Dureza de oido; Odontalgias reumáticas y las de las mujeres embarazadas; Neuralgia facial?; Gastralgia; Acedías de los niños; *Diarreas*, sobre todo de los niños; Diabetes??; Cólicos espasmódicos; *Espasmos abdominales histéricos*; Odontalgia de las mujeres embarazadas; *Calambres de la matriz*; *Dismenorrea*; Leucorrea; Hernia escrotal, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo.—Traccion y dolores dislacerantes en los miembros.—Sacudidas dolorosas en diversas partes.—°*Caida frecuente*, *sin pérdida del conocimiento*, andando ó estando de pié.—°Ataques de epilépsia.—Descaecimiento de todo el cuerpo.—*Laxitud*, *principalmente* en los piés, y *cuando se está sentado*.—Se fatiga en seguida durante el paseo.—

Digitized by Google

Por la tarde inquietud en los miembros despues de haber estado largo tiempo sentado.—*Los síntomas se manifiestan* ó se agravan, *por la noche durante el reposo.*—Los síntomas que se manifiestan estando sentado, se mejoran con el movimiento.

Piel.—**Mucho prurito* y excesiva sequedad de la piel.—Nudosidades voluminosas subcutáneas, con dolores lancinantes.—*Pequeños herpes rojos, sin dolor, que concluyen por esfoliarse.* — Vesículas corrosivas. — Pequeños forúnculos.

Sueño.—Bostezos frecuentes y violentos.—**Gana de dormir de dia.*—**Insomnio*, algunas veces por opresion en el bajo vientre, ó por agitacion ansiosa y calor interior, con mucho temor de descubrirse.—*Afluencia de ensueños angustiosos*, con palabras, gritos y sobresaltos con espanto. —Ensueños de incendios, de diluvios, de bandidos, de pendencias, de riquezas, de placeres, de desgracias, etc. —Sueño por la noche no reparador, con fatiga así por la mañana, como por la noche antes de acostarse; despierta muy temprano y le es difícil volverse á dormir.

Fiebre.—Calofrios por la tarde.—Por la mañana sensacion de calor, sin transpiracion y sin sed.—*Sudor nocturno*, generalmente fétido y pegajoso.—Sudor ácido.

Moral.—Inquietud y miedo con temblor y calor.—Mal humor por la tarde.

Cabeza.—Por la tarde vértigo, con desvanecimiento.—Cabeza fatigada por trabajos intelectuales.—Dolores de cabeza por la noche, en la cama, aun durante el sueño, que se alivian sentándose.—*Dolor presivo en el vértice de la cabeza*, durante un trabajo intelectual ó en medio de una reunion.—Tension y tirantez en el occipucio como por rigidez de la nuca.—Tracciones en la frente con náuseas.—Dolor de cabeza tembloroso con sensacion de torpeza despues de un acceso de cólera.—*Dolores lancinantes en la cabeza*, aun por la noche, en el lado sobre que se está acostado.—Congestion á la cabeza, con calor interior, sobre todo fumando.—Descamacion de la piel del cráneo, con picazon, sobre todo cuando el tiempo está lluvioso.—Caida de los cabellos.

Ojos.—*Inflamacion de los ojos*, con rubicundez, punzadas, sensacion de ardor y *turbacion de la vista*.—Tumefaccion del globo del ojo.—**Aglutinacion de los párpados* por la

mañana.—Sequedad de los ojos ó mucho lagrimeo.—°*Oscurecimiento de la córnea.*—*Se ven manchas negras.—°Oscurecimiento del cristalino.

Oidos.—Inflamacion del conducto auditivo externo, con rubicundez y dolor de ulceracion.—Mucha susceptibilidad del oido al menor ruido.—**Dureza de oido*, con ruido en el mismo, sobre todo estando en la habitacion.—Retintin, murmullo y sensacion como si en el oido hubiera un pájaro y sacudiese las alas.

Nariz.—Epistaxis por la mañana.—Erupcion vesicular en la nariz, con dolor presivo.—*Obturacion de la nariz.*—*Coriza seco, que no permite respirar sino por la boca.

Cara.—*Rostro descompuesto*, pálido, térreo,—Rubicundez y palidez alternativas de la cara.—Maneras toscas.—Tension en la cara, como si estuviera cubierta de clara de huevo seca.—*Dolores nocturnos en los pómulos*, y *como si escarbaran*, *terebrantes*, *dislacerantes é insoportables durante el reposo*, y que obligan á andar de un punto á otro.—Tumefaccion de los pómulos con dolor pulsativo.—**Hinchazon de la cara*, y °abotagamiento tuberoso.—Erupcion herpética alrededor de la boca.

Dientes.—Odontalgia producida por el movimiento del carruaje.—**Dolores nocturnos en los dientes*, que obligan á levantarse y á pasearse, *insoportables durante el reposo*, y generalmente ardientes, terebrantes, ó como de ulceracion, ó dislacerantes, tractivos y con estremecimiento, que se extienden hasta las sienes, con tumefaccion de la mejilla del lado afecto, rigidez de la nuca y del cuello, y estremecimiento en los dedos y los piés.—Pulsaciones y *punzadas en las muelas*, despues de la comida.—Odontalgias agravadas por el frio.—Vacilacion de los dientes.

Boca.—*Sequedad de la boca*, *sobre todo por la noche* y por la mañana.—Salivacion sanguinolenta.—Erupcion vesicular en la boca y en la lengua.—Pequeñas tuberosidades en la boca, que sangran y producen una sensacion de ardor al mas ligero contacto.

Garganta.—*Irritacion en la garganta con dolor lancinante*, en hablando y al deglutir.—Dolor quemante en la garganta y en el paladar, con sequedad y aspereza, como si hubiera barbas de espiga que se movieran dentro.

Apetito.—Pérdida del gusto.—Gusto amargo con la len-

gua blanca, y mucosidades viscosas en la lengua y en los dientes.—*Gusto ácido en la boca.*—*Mucha sed* (de agua), sobre todo por la tarde y por la *noche*.—Mucho deseo de comer legumbres con repugnancia á la carne y *viceversa*.

Estómago.—Erutos ácidos.—*Erutos frecuentes*, con dolores de estómago.—Náuseas y vértigos durante la comida, seguidos de vomituricion y de vómitos de una serosidad amarga ó salada.—*Dolor presivo y contractivo en el estómago*, algunas veces con erutos ágrios.—*Sensacion de desfallecimiento y de vacío en el estómago, con náuseas y gana de vomitar.*—Dolor de ulceracion en el estómago.

Vientre.—Induracion y dolores lancinantes en la region hepática.—*Timpanitis excesiva y tension del vientre*, con sensacion de peso.—*Calambres abdominales*, seguidos de flores blancas.—Pellizcos, retortijones y tirones agudos en el vientre.—°Hernia inguinal.

Deposiciones.—**Estreñimiento.*—Necesidad frecuente é inútil de deponer, con evacuaciones poco abundantes, ó solamente con emision de gases.—*Diarreas verdosas, espumosas y mucosas*, con retortijones.—°Diarrea de olor ácido.—Expulsion de ascárides y de lombrices.—Punzadas en el ano y en el recto, sobre todo durante el tenesmo.

Orinas.—Secrecion mas abundante que de ordinario de una orina pálida ó verdosa.—Emision frecuente de orinas aun por la noche.—Emision involuntaria de orinas.—Sensacion de quemadura y excoriacion al orinar.

Partes viriles.—*Disminucion del apetito venéreo.*—*Falta de erecciones.*—Secrecion de licor prostático durante la emision de gases.—°Hernia escrotal.—Poluciones frecuentes.

Reglas.—Sensacion como si todas las vísceras del vientre se dirigiesen hácia las ingles, como al quererse presentar las reglas, con retortijones.—**Reglas muy atrasadas*, ó completamente suprimidas, ó reglas muy tardas, acompañadas de muchos padecimientos.—Reglas de una sangre oscura, espesa, glutinosa y como pus.—Antes de las reglas, dolores de riñones, cólicos, bulimia, erutos frecuentes y náuseas.—*Durante las reglas*, postracion, calofrios, dolores de cabeza, *palidez del ros-*

Digitized by Google

tro, dolores de riñones, dolores calambroídeos, presivos, en el vientre, que suprimen la menstruacion.—*Evacuacion de mucosidades blancas y corrosivas* por la vagina, algunas veces precedidas de calambres en el vientre.

Laringe.—Tos provocada por un cosquilleo en la garganta, con expectoracion serosa y salada.—*Tos calambroídea nocturna*.— Tos matutina, con expectoracion de un pus amarillento.—*Expectoracion de sangre* causada por la tos.

Pecho.—Opresion de pecho con sensacion de constriccion.— Opresion de pecho con respiracion corta, sobre todo al andar.— Presion y sensacion de peso, ó dolores incisivos y lancinantes en el pecho.— Dolor de excoriacion y punzadas en el costado izquierdo del pecho y en la region del corazon.

Tronco.— *Dolores de quebrantamiento en los riñones y en el dorso, por la noche.—*Rigidez de la nuca*.—Punzadas en los riñones.— Dolores dislacerantes y tirones sucesivos en la nuca.

Brazos.—Dolor de luxacion en la articulacion escapular, durante el movimiento.—°*Accesos de dislaceracion en la espalda*, °*sobre todo por la noche*, con hormigueo que se extiende hasta los dedos, é imposibilidad de mover los brazos por ser tan vivo el dolor.—Dolor tractivo en los brazos y en las manos.—°Grietas en la piel de las manos.— *Vesículas corrosivas en las manos y en los dedos*, con dolor lancinante.— Tension calambroídea en las articulaciones de los dedos.— Calor en los dedos.— *Hinchazon roja é inflamatoria de los dedos*.

Piernas.— Inquietud en las piernas.—Dolor tractivo en las piernas y en los piés.— Comezon en las nalgas con manchas rojas despues de rascarse.— Hinchazon dolorosa en las corvas.—Calambres en las pantorrillas por la noche.—Chapas quemantes en la tibia.—°Forúnculos en las piernas.

Digitized by

124.—MAGNESIA MURIATICA.

MAGN-M.—Muriato ó hidroclorato de magnesia.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 7 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. ars.?

COMPÁRESE CON: Bar. bry. *calc.* cham. con. *graph. magn.* nitr-ac. n-vom. phos. puls. sulf.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones principalmente del sexo femenino, y *sobre todo de las mujeres histéricas*; *Ataques de espasmos y de debilidad histéricos*; Glándulas infartadas?; Cefalalgias histéricas, reumáticas y nerviosas?; Ozena escrofulosa; Neuralgia facial?; Denticion difícil de los niños; Padecimientos gástricos; Hepatitis crónica; Cólicos espasmódicos; *Espasmos abdominales histéricos*; *Calambres de la matriz*; Náuseas de las embarazadas; Estreñimiento de los niños, durante la denticion; Induracion escirrosa del útero; *Leucorrea*, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores terebrantes ó contractivos calambroídeos.—*Tracciones y dislaceraciones paralíticas en los miembros.—*Ataques de espasmos y de debilidad histérica.*—Disposicion á constiparse.—*Debilidad de cuerpo que algunas veces parece procede del estómago.—Sensacion de malestar y de cansancio sumo en todo el cuerpo, con mucha sensibilidad al menor ruido.—*La mayor parte de síntomas se manifiestan estando sentado*, ó por la noche, y se alivian generalmente por el movimiento.

Piel.—Hormigueo en diversas partes de la piel.—Granos pruritosos con dolor quemante despues de haberse rascado.—Erupcion de pústulas.—Erupcion de pequeñas pápulas rojas.—Forúnculos.

Sueño.—*Mucha disposicion al sueño, de dia*, con bostezos y pereza.—Sueño tardo é *insomnio* á causa *del calor*, con

Digitized by

sed, y *mucha agitacion en todo el cuerpo*, en cerrando los ojos.—Ensueños angustiosos y horribles con palabras y gritos durante el sueño.—Sueño no reparador.—Sacudidas en el cuerpo por la noche estando despierto.—Pesadilla.

Fiebre.—*Calofrios por la tarde*, los que se disipan despues en la cama.—Sudor despues de media noche.

Moral.—Inquietud y humor lloroso.—Humor desapacible y apesadumbrado.—Aversion á la conversacion.—Repugnancia al trabajo.—°Mucha impresionabilidad nerviosa, con facilidad á llorar.

Cabeza.—Torpeza en la cabeza, turbacion como en la embriaguez.—Vértigos por la mañana al levantarse y durante la comida, los que se disipan al aire libre.—*Pesadez de cabeza*, con aturdimiento hasta hacer caer.—Dolores que se alivian abrigando la cabeza.—Sensacion de torpeza en la frente.—**Presion* tensiva, *en la frente y en el sincipucio*, ¯con confusion y oscurecimiento en la cabeza, principalmente al despertarse.—Compresion como por un garfio, y ruido en las sienes, al principio de la noche en la cama, con sensacion como si fuera á acometer un vértigo, y á perderse el conocimiento.—Dolores dislacerantes, con estremecimiento, ó lancinantes y pulsativos en la cabeza.—Congestion á la cabeza, con calor, zumbido y fluctuacion dolorosa.—*Dolores de cabeza cotidianos.—Tirones neurálgicos en la cabeza, en la cara y hasta en los dientes, con sensacion de entorpecimiento en la cabeza.

Ojos.—*Inflamacion y dolor quemante en los ojos*, con rubicundez de la esclerótica.—Lagrimeo y sensacion de ardor en los ojos, mirando algun objeto á la luz del dia.—*Aglutinacion nocturna de los párpados.*—Color amarillo de la esclerótica.—Aureola verde alrededor de la luz artificial.

Oidos.—**Pulsacion en los oidos.*—Torpeza y dureza de oido, como si alguna cosa le cubriera.—Punzadas, tirones agudos, y terebracion en los oidos.—Zumbido en los oidos.

Nariz.—**Costras en las ventanillas nasales*, algunas veces con sensibilidad dolorosa de la nariz al tacto.—*Excoriacion de las ventanillas de la nariz.—°Secrecion de serosidades corrosivas por la nariz.—Obturacion de la nariz con dificultad de respirar.—Dolor de excoriacion y

Digitized by

de quemadura en la nariz.—*Hinchazon, rubicundez, endurecimiento y calor de la parte inferior de la nariz con agravacion por la mañana.—Sequedad penosa de la nariz.—Obturacion nocturna de la nariz.—*Coriza con pérdida del gusto y del olfato*, y expulsion de mocos, al sonarse, amarillentos y fétidos.— Pérdida del olfato.

Cara.—*Rostro de color pálido, amarillento* ó térreo.— Dolores tractivos en los nervios de la cara.— Tension de la cara con dolor calambroídeo en los huesos de esta.—°*Erupcion en la cabeza.*— Grietas en los labios.—Sensacion de aspereza en la cara interna de los labios, cuando se los toca con la lengua.— Ampollas gruesas y trasparentes en la parte roja de los labios.

Dientes.— Padecimiento de dientes, el que llega al mas alto grado, por el contacto de los alimentos.—Sensacion de prolongacion de los dientes incisivos superiores.— Hinchazon dolorosa de las encías, *que sangran fácilmente.*

Boca.— Sequedad de la boca por la noche.— Abundante acumulacion de saliva serosa en la boca.— Sensacion como de quemadura en la parte interior de la boca.— Sensacion de ardor en la lengua, como por el fuego.

Garganta.— Sensacion como si esta estuviese excoriada y en carne viva, con agravacion por la tarde y por la noche.—*Mucosidades viscosas y espesas en la garganta*, mezcladas frecuentemente de sangre, difíciles de expeler.

Apetito.— *Sed frecuente.*— Bulimia y sensacion de hambre en el estómago, seguida de náuseas.—*Hambre sin saber qué alimento apetece.*—Deseo de golosinas.

Estómago.— Regurgitacion de los alimentos durante el ejercicio.— Estando comiendo y despues *hipo violento* que pone dolorido el estómago.— Sensacion como de *una bola que sube* del vientre al esófago, que se disipa erutando.— Náuseas, sobre todo por la mañana en el momento de levantarse de la cama.—Náuseas frecuentes, con desvanecimiento dia y noche.—**Náuseas continuas*, °con color térreo de la cara, y mucha excitacion nerviosa, con facilidad á llorar.— Presion en el estómago con náuseas.—Tension y *dolor de ulceracion y de contusion en el estómago*, con excesiva sensibilidad al contacto.—Sacudidas dolorosas en el estómago andando y apoyándose sobre un pié.

Vientre.—Tension y *punzadas en la region hepática.*—*Do-*

Digitized by Google

lores presivos en el hígado, así al andar como al apoyar la mano sobre la parte, los que se agravan acostándose sobre el lado derecho.—Vientre duro y tirante.—**Timpanitis muy intensa y continua*, con estreñimiento.—**Induracion dolorosa del vientre, y sobre todo del lado derecho.* —*Dolores calambroideos en el vientre, sobre todo por la tarde y á veces seguidos de leucorrea.—Retortijones, pellizcos y *tirones agudos en el vientre.*—Punzadas con hormigueo en los músculos abdominales.

Deposiciones.—**Deposiciones duras, difíciles, lentas é insuficientes.*—**Deposiciones caprinas, como el excremento del cordero.*—Excesivo tenesmo, con deposicion poco abundante, ó solo emision de gases.—**Disposicion crónica á la diarrea.*—Diarreas violentas de mucosidades y de sangre.—Deposiciones verdosas, amarillas ó parduscas.—Evacuaciones cubiertas de mucosidades y de sangre.—*Salida del ténia.

Orinas.—Conato urgente de orinar dia y noche con emision poco abundante.—Emision de orinas posible solo por contraccion de los músculos abdominales.—Entorpecimiento de la uretra.

Partes viriles.—Mucho prurito en las partes genitales y en el escroto.—Erecciones frecuentes.—Despues del cóito sensacion de ardor en el dorso.

Reglas.—*Reglas muy anticipadas y muy copiosas.*—Sangre negra y coagulada durante los ménstruos.—*Durante las reglas palidez de la cara*, dolores de riñones y abatimiento. —*Calambres de la matriz*, algunas veces con dolores hasta en los muslos y con leucorrea.—*Leucorrea*, sobre todo durante el movimiento, ó precedida de calambres en el vientre.—°Induracion escirrosa del útero.

Laringe.—Ronquera con aspereza y sequedad de la garganta.—*Tos seca*, por la tarde y por *la noche*, con dolor quemante y sensacion de excoriacion en el pecho.—*Tos calambroidea nocturna* con cosquilleo violento en la garganta.

Pecho.—*Opresion* de pecho en la region del corazon.—Pesadez repentina en el pecho con suspension de la respiracion mientras se come.—Tension y contraccion en el pecho.—Punzadas en el corazon que suspenden la respiracion.—*Palpitaciones de corazon* estando sentado, que se disipan durante el movimiento.

Digitized by

Tronco.—Dolores contractivos y calambroídeos en los riñones.—Punzadas dislacerantes y dolor quemante en el dorso.— Hinchazon de las glándulas del cuello.

Brazos.— *Traccion y dolores dislacerantes paralíticos en la articulacion del hombro, que se extienden hasta los brazos y las manos, y se agravan por el movimiento. —**Entorpecimiento de los brazos por la mañana al despertarse*, ó al principio de la noche en la cama.

Piernas.— Mucha laxitud en las piernas, aun estando sentado.— Torpeza en las piernas.— Dolores dislacerantes y tirones en las caderas.—Inquietud y tension en los muslos.— Dolor presivo ó tiron paralítico en la rodilla. —Calambres en las pantorrillas por la noche.—Dolor quemante en la planta de los piés por la tarde.—°*Sudor de piés.*

125.— MAJORANA.

MAJOR.— ***Origanum majorana.*** Mejorana vulgar.— ***Hist. nat. y prep.*** Farmacopea homeop.

ANTÍDOTOS: Camph.

Este medicamento, casi desconocido hasta hoy, promete no obstante llegar á ser un dia de grande importancia; por eso le hemos colocado en este *Manual*, á pesar de los pocos síntomas prácticos que podemos presentar.

SINTOMAS.—La piel de las piernas cubierta de pequeñas pápulas, describiendo sobre una pierna una línea horizontal y sobre la otra una vertical con costras escamosas que caen mas tarde.

Sueño frecuentemente interrumpido por necesidad de orinar.—*Ensueños vivos*, ansiosos, fantásticos, sensuales.

Moral.—Tristeza, con desesperacion; disgusto de la vida, descontento de su suerte; afluencia de ideas, excesiva vivacidad y necesidad de ejercicio y de movimiento al aire libre.—**Ideas sensuales, lascivas, en mucha abundancia.—Ideas de matrimonio* con alegría loca, y abatimiento corporal.

Cabeza caliente, con inquietud interiormente; dolores en las sienes; vértigos por la noche en acostándose.

Digitized by Google

Nariz que sangra fácilmente; sensacion de contraccion y de cosquilleo en la punta de la nariz.

Apetito.— Pérdida del apetito; hipo; sed excesiva por la noche.

Estómago y vientre.— Alternativamente violentos dolores en el estómago y vientre, sobre todo por la noche, y durante esta interrumpen el sueño.— **Apetito venéreo considerablemente exaltado.—*Deseo violento del cóito.—*Mucha sobreexcitacion sexual.*

Pezones hinchados, con prurito.

Miembros imposibilitados por dolores reumáticos en los piés, en la planta de estos, en el muslo, los dedos y la articulacion del brazo.

126.— MANCINELLA.

MANC.—Hippomane mancinella.— Manzanillo venenoso.— *Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.

ANTÍDOTOS?

SINTOMAS GENERALES. — *Debilidad general con mucha necesidad de acostarse y de permanecer echado.— *Punzadas en diferentes partes.* — Convulsiones.— *°Consecuencias de la escarlatina.*— Aumento de los síntomas por un arrebato de cólera, así como despues de haber comido, ó por la noche mejoría estando acostado, así como por el calor.— Piel roja.

Sueño profundo por el dia; *estado comatoso y somnolencia continua*; insomnio nocturno, ó despierta con frecuencia.— **Sueño interrumpido por sacudidas como eléctricas en la parte superior de la garganta sobre la laringe*; ensueños de espectros, de fantasmas, ó despierta en una especie de estupor.— *Fiebre nerviosa, tifoidea, con timpanitis y dolor del epigastrio, aumentados en bebiendo agua; *calor fugaz con sensacion como si salieran llamas del epigastrio; las manos y los piés frios*; sudor nocturno; sudor en la palma de las manos.

Moral.— Tristeza, melancolía; *todo cansa y fastidia*; ternura y piedad profundas; **timidez y taciturnidad*; buen humor con gana de cantar; *torpeza en las manos*; mucha

actividad y disposicion al trabajo; °*al levantarse para coger cualquier cosa, pérdida de la memoria, y se olvida de lo que va á buscar*; °*pérdida repentina de las ideas*; facilidad á amedrentarse.

Cabeza.—*Atolondramiento y vértigos*, sobre todo fijándose por mucho tiempo en cualquier cosa, ó en leyendo en alta voz.—**Sensacion como de vacío y de ligereza en la cabeza, en °andando por la habitacion.*—Cefalalgia con náuseas y dolor debajo de los hipocondrios, especialmente del derecho.—*Cefalalgia gravativa, con gana de vomitar y necesidad de acostarse.*— Punzadas violentas en la cabeza.—Sensacion como si hubiera un *clavo* metido en el vértice.— Prurito en el vértice.

Ojos.—**Nariz**.—*Ojos* con ojeras por un círculo azulado; punzadas sordas ó dolor cortante en el globo del ojo; **fuerte inflamacion de los ojos con fotofobia*; °*sensacion de ardor en los ojos y cefalalgia por la accion de la luz de las bujías;* afecciones de los ojos alternando con dureza de oido.—Orejas rojas y calientes; *zumbido y ruido confuso en los oidos.*—Nariz cubierta de manchas rojas; olor de cuerno quemado ó de estiércol en la nariz; °*voz nasal.*

Cara.—**Cara amarillenta °y abotagada*, ó con la piel del cuerpo roja.—Entumecimiento de la cara, con comezon, llamaradas ardientes, *erupciones de pequeñas vesículas amarillentas*, en fin descamacion, *numerosos granos en la barba* y alrededor de la boca; labios pálidos; caida del labio inferior.

Boca y garganta.—*Sequedad, calor*; *sensacion de ardor é inflamacion de la cavidad bucal y de la lengua*, no permitiendo comer nada.—Sangre en la boca.—°*Lengua cubierta de una capa blanca como de aftas, ó con chapas cubiertas de este barniz.*—**Salivacion fétida*, amarillenta.—Sensacion de ardor, excoriacion y *ampollas en el paladar.*—*Mucha sequedad, calor y sensacion de ardor en la garganta.*—°Epiglotis muy dilatada.—°*Frecuente tumefaccion de las amígdalas, con peligro de sofocacion y respiracion sibilante.*—°*Angina escarlatinosa*, aun *maligna.*—*Ulceras quemantes, amarillo-blanquecinas*, en las amígdalas y en la faringe.—Sensacion de encogimiento y dolor de ulceracion en la garganta, disminuidas por bostezos.—°*Sensacion de opresion en la garganta, subiendo desde el estómago, con es-*

fuerzos inútiles para erutar, palabra impedida, debilidad y palpitaciones de corazon.

Gusto.—Apetito.—Gastricismo.—*Gusto de sangre ó *mucho amargor en la boca.—*Falta de apetito*; °*repugnancia á la carne*; *deseo de manzanas cocidas.*—Sed con repugnancia al vino y bebidas alcohólicas, pero con **deseo de agua fria*, °*que la opresion* en la garganta impide, sin embargo, tragar.—Malestar despues de haber bebido.—*Erutos secos*, *frecuentes*, como bocanadas de aire; regüeldos ruidosos y con sollozos.—*Vómitos verdosos*, acuosos ó negros.—*Vómito de alimentos seguido de violentos retortijones y de deposiciones abundantes.*—°*Vómitos de materias ágrias y grasas.*—Vómitos por la nariz y la boca, precedidos de una sensacion que sube desde el estómago, y seguido de mejoría en los dolores de cabeza.

Estómago.—**Sensacion de ardor en la cavidad del epigastrio.*—°*Sensacion como de una bola que parece limitarse al epigastrio.*—**Hinchazon del epigastrio*, *con mucha sensibilidad al tacto.*

Vientre.—Punzadas en los hipocondrios.—°Dolor en el hipocondrio izquierdo que obliga á comprimirle con las manos.—°*Ruidos como de agua*, *muy desagradables*, *y borborigmos en el vientre*, *durante la respiracion y á cada movimiento.*—°Dolores erráticos en el vientre.—°*Dolores de vientre despues de haber bebido agua.*—Punzadas en los intestinos.—**Cólicos con diarrea.*—Emision frecuente de gases.—Dolores de excoriacion y de contusion en los tegumentos del vientre.

Deposiciones y ano.—**Estreñimiento.*—Evacuaciones diarréicas negras y muy fétidas.—°*Diarrea con sensacion de ardor en el vientre y ano.*—**Deposiciones diarréicas sumamente frecuentes*, *con cólicos y evacuacion de sangre*, ó de materias verdosas.—*Antes de las deposiciones*, cara roja.—Despues de cesar la diarrea, dolor de contusion en las extremidades inferiores.—*Despues de las deposiciones dolor en el ano.*—Plenitud en el recto, con sensacion de vacuidad en la cabeza.—El esfínter del ano, como paralizado.—Hinchazon y *color azulado* de las hemorróides.—Flujo de una sangre hemorroidal oscura, muy fétida y que se coagula fácilmente.

Orinas.—Miccion rara.—*Orinas blanquecinas*, mas ó menos abundantes.—°*Orina oscura que se vuelve blanca en mo-*

Digitized by Google

viéndola.—Antes de la emision de las orinas, punzadas en la vejiga.

Partes genitales de la mujer.—La sangre de las reglas es pálida.—Antes de las reglas, congestion á la cabeza; y á su aparicion dolores agudos.—Durante las reglas, tristeza y calambres en el hipogastrio.

Laringe.—Tension en la laringe y sensacion como de dolor cortante en lo interior.—Tos violenta al menor esfuerzo.—**Tos despues de haber bebido* ó *muy fuerte por la noche.*—Tos con expectoracion de mucosidades sanguinolentas y gusto dulce en la boca.—Expectoracion blanca.—°*Necesidad* de expectorar, con náuseas.

Pecho.—°*Aliento fétido que lo percibe el mismo.—Estertor mucoso durante la inspiracion.*—**Opresion de pecho*, °*disminuida por la expectoracion.*—Dificultad de la respiracion y *ahogos*, en el acto de hablar, de reir ó de dormirse.—Sensacion de picoteo como por agujas que atraviesan el corazon.—Palpitaciones despues de haber comido, ó por la tarde.—Calambres en el corazon.—°*Dolor y punzadas en medio del esternon*, aumentados comprimiendo dicho punto.—Manchas amarillas en el pecho, contraccion espasmódica en las paredes del pecho.

Tronco.—°*Sensacion de debilidad y como de relajacion en los riñones*, con necesidad de rascar estas partes, pandiculacion, calofrio y frio en las extremidades, seguidos de calor quemante, sed y necesidad de abrigarse mucho.—°*Sensacion de rigidez en la articulacion del sacro*, y en *las de los dedos*, *que casi no permite doblarlas.*—Hormigueo en el dorso, como por insectos.—Debilidad en los músculos del dorso.—°*Rigidez dolorosa en la nuca*, sobre todo al despertar.—Dolor reumático en el omóplato.

Miembros superiores.—Herpe en el brazo derecho.—Rigidez y temblor en el brazo.—Miliar roja, muy pequeña y pruritosa, en el antebrazo.—Dolor constrictivo en las muñecas y el metacarpo.—Rubicundez de las manos con tumefaccion de las venas.—Temblor paralítico de la mano.—°*Manos pesadas*, adormecidas y *como tumefactas*, al despertar.—Las uñas azuladas.

Miembros inferiores.—**Accesos de temblor como vibrátiles y con estremecimiento en las extremidades inferiores.*—Temblor en las piernas.—**Punzadas en las rodillas.*—Costras sobre la tibia y dolor de excoriacion.—°*Sensacion de*

ardor y de sequedad, con punzadas en los talones.—°Descamacion de la planta de los piés, despues de la fiebre.

127.—MANGANUM CARBONICUM.

MANG.—Manganeso.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 7 semanas en algunas afecciones crónicas.
ANTÍDOTOS: Coff.
COMPÁRESE CON: Amm. coff. con. *lyc.* plat. puls. thui. veratr.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra: —*Afecciones artríticas*; Reumatismo articular; Dolores osteócopos; Jaqueca; Anginas agudas y crónicas; Odontalgias; Catarro crónico; *Laringitis crónica* (Tísis laríngea), etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Punzadas sordas, con estremecimiento*, en diversas partes del cuerpo.—*Dolores dislacerantes y tirones*, sobre todo *en los miembros*.—Traccion y tension en los miembros y las articulaciones, como por acortamiento de los tendones, sobre todo extendiendo la parte.—°*Dolores artríticos en las articulaciones*, con punzadas, estremecimiento y *como si escarbaran*, agravados *por la tarde*, regularmente semilaterales ó en cruz. —°*Hinchazon* roja y lustrosa *de las articulaciones*, algunas veces á *consecuencia de un enfriamiento*.—°*Inflamacion de los huesos, con dolores como si escarbaran, é insoportables por la noche*.—Postracion y temblor, sobre todo de las articulaciones.—Sensacion de malestar general, pero sobre todo en el estómago con humor apesadumbrado. —Sensibilidad de todo el cuerpo por el mas ligero contacto, como si estuviera ulcerado.—*La mayor parte de síntomas se manifiestan durante la noche*.—Los síntomas que se han presentado estando en la habitacion, se mejoran al aire libre y *vice-versa*.—*Muchos síntomas se agra-*

van ó se alivian segun el cambio de tiempo de bueno á malo ó vice-versa.

Piel.—Sensacion de ardor por toda la piel, por la noche y al levantarse de la cama.—Herpes pruritosos.—Piel enfermiza; toda lesion de la piel tiende á ulcerarse.—*Excoriacion y grietas en el pliegue de las articulaciones.*

Sueño.—Mucha laxitud, soñolencia hácia las ocho de la noche.—*Afluencia de ensueños muy vivos, angustiosos, de que se conserva un recuerdo completo.*—*Bostezos frecuentes.

Fiebre.—Despeluzamiento por la tarde; con dolor de cabeza lancinante, sin se l.—Calofrios con calor fugaz en la cabeza.—Calor febril en el pecho y en las mejillas, con sensibilidad dolorosa de todo el cuerpo al tacto.—Sudor nocturno, algunas veces tan solo en el cuello y en las piernas, que obliga á rascarse.

Moral.—*Humor apesadumbrado, taciturno*, con concentracion *en si mismo.*—Distraccion.—°Embotamiento de los sentidos.

Cabeza.—Cabeza como pesada y entorpecida, con sensacion como si hubiera aumentado de volúmen.—Dolores quemantes y presivos en la cabeza, que se disipan al aire libre.—*Dolores de cabeza tensivos, lancinantes* y tractivos al aire libre, que se alivian en la habitacion.—*Congestion á la cabeza*, con pulsacion como si fuese á supurar el cerebro, mejorándose al aire libre.—*Sacudimientos dolorosos del cerebro durante el movimiento.*—Los dolores de cabeza que se han declarado estando en la habitacion, se alivian al aire libre y *vice-versa.*

Ojos.—Presion en los ojos cuando se les fatiga, y tambien á la luz artificial.—**Calor quemante y sequedad de los ojos.* Párpados tumefactos y dolorosos cuando se los mueve.—°Aglutinacion de los párpados por la mañana.—Pupilas dilatadas ó contraidas.—°Vista turbia.—*Vista corta (miopia).*

Oidos.—*Otalgia.*—Dolores tractivos en los oidos, que provienen de otros órganos.—*Punzadas en los oidos hablando*, deglutiendo, riendo y andando con lentitud.—*Dureza de oido como por obturacion del conducto auditivo*, que se disipa sonándose, y *se agrava ó se mejora segun las mutaciones del tiempo.*—Zumbido y ruido sordo en los oidos.—*Detonacion en los oidos al sonarse y tambien al deglutir*; cuando se bosteza, estallido.

Nariz.—Coriza seca y *obturacion en la nariz*.—Coriza con pérdida del olfato y secrecion de mucosidades espesas. —Rubicundez, excoriacion é inflamacion de la nariz durante la coriza.

Cara.—*Cara pálida, abatida, macilenta*.—Dolores dislacerantes, violentos y compresivos entre la raiz de la nariz y las cejas.—Punzadas con estremecimiento de la mandíbula inferior hasta las sienes, al reirse.—Labios excesivamente secos.—*Erupciones y úlceras en las comisuras de los labios*.—Calambres de la mandíbula inferior despues de la comida.

Dientes.—Sensibilidad dolorosa de los dientes.—*Dolores violentos en los dientes que pasan rápidamente á otras partes*.—Dolores de dislaceracion en las muelas y en las partes adyacentes, con mucho abatimiento é inquietud, sobre todo por la mañana y por la tarde.—Dolores de ulceracion en los dientes, agravados hasta el punto de hacerse insoportables por el contacto de alguna cosa fria.

Boca y garganta.—Por la mañana, olor á greda en la boca.—Tubérculos y vesículas quemantes en la lengua. —*Ligera irritacion en la garganta, con dolor incisivo y de excoriacion, fuera del tiempo de la deglucion*.—Punzadas sordas en los dos lados de la faringe, que se extienden hasta los oidos al deglutir.—Sequedad y picor en la garganta, con sensacion como si una hoja de una planta cualquiera obstruyese la laringe.

Apetito y estómago.—Sabor soso y aceitoso.—*Adipsia*. —°Repugnancia á los alimentos por sensacion de saciedad.—Sensacion de acedía ardiente, que asciende desde el estómago, como pirosis.—Calor y *sensacion de ardor en el estómago*, que sube hasta el pecho, á veces con mucha agitacion.—Tirones en la region del estómago, como si el epigastrio se dilatase, acompañados de náuseas.

Vientre.—Presion en los hipocondrios.—Vientre timpanítico.—Dolor presivo de excoriacion en el vientre y en el epigastrio.—Contraccion con sensacion de calor, desde la mitad del vientre hasta el pecho, con náuseas.—Dolores cólicos en la region umbilical respirando profundamente.—Conmocion en el vientre como si los intestinos se chocasen mútuamente.—°Emision bastante abundante de gases.

Digitized by Google

Deposiciones.—*Estreñimiento.*—*Deposiciones difíciles, secas y caprinas.—*Deposiciones en gran número durante el dia, de consistencia de papilla.—Ruido sordo, frecuente en el recto.—Durante las deposiciones, cólicos y dolores incisivos en el recto.—Tirones sucesivos y dislacerantes en el recto.—Dolores contractivos en el ano.

Orinas.—*Conato urgente de orinar.*—Sedimento color de violeta, térreo en las orinas.—Lancinaciones en la uretra fuera del tiempo de la emision de las orinas.—Dolores incisivos en la region de la vejiga.

Partes genitales.—Sensacion de debilidad en las partes genitales con ardor y *tracciones con estremecimiento en el cordon espermático* y hasta en el glande.—Prurito en la corona del glande.—Reglas muy adelantadas.—Presion en las partes genitales.—Leucorrea.

Laringe.—**Ronquera y aspereza tenaces*, sobre todo por la mañana al aire libre, como por inflamacion crónica de la laringe.—Sensacion como si la laringe estuviera cerrada.—*Catarro con coriza y ronquera.—Tos con ronquera.—*Tos seca,* provocada por la lectura en alta voz ó por la conversacion seguida, con sequedad penosa y aspereza en la laringe.—Por la mañana expectoracion abundante de pequeños grumos de mucosidades verde-amarillentas, casi sin tos.—Esputos de sangre.

Pecho y tronco.—Aliento cálido y quemante, con calor desagradable en el pecho.—Punzadas en el pecho y en el esternon, que lo atraviesan de arriba á abajo.—Latidos en el pecho.—**Golpes súbitos en el corazon* y en los costados del pecho de arriba á abajo.—Dolores dislacerantes en toda la extension de la espina dorsal, durante el reposo y el movimiento.—Rigidez de la nuca.

Brazos.—Traccion y *dislaceraciones*, que, partiendo de la espalda, se extienden hasta los *brazos*, *las manos y los dedos.—Dolores tensivos en las articulaciones de los brazos y de las manos.*—Terebracion y como si escarbaran en los huesos de los brazos, como si fuese en la médula.—Tension en la articulacion del codo, como si los tendones fuesen demasiado cortos.—Herpe pruritoso en el antebrazo.—Dolores calambroídeos en las manos.—Hinchazon inflamatoria y ulceracion del dedo pequeño.—Grietas en el doblez de las articulaciones de los dedos.

Piernas.—Estremecimiento de los músculos de las pier-

Digitized by Google

nas al menor movimiento.—Tracciones calambróides ó punzadas temblorosas en los muslos.—Dolor de rigidez tensiva en las piernas.—Dolores dislacerantes alrededor de la rodilla.—Falta de firmeza y temblor de las rodillas.—Hinchazon é inflamacion de los maléolos, con punzadas que se propagan hasta las piernas.—Sensacion de ardor en la planta de los piés.—Excoriacion entre los dedos.

128.—MENYANTHES TRIFOLIATA.

MEN.—Trébol acuático.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—Medicamento todavía poco conocido y que hasta ahora no se ha empleado sino contra algunas *Fiebres intermitentes*, *Otorreas*, á consecuencia de exantemas, y *Afecciones espasmódicas*.

SINTOMAS GENERALES.—Estremecimiento de los músculos en diferentes partes, principalmente estando en reposo.—*Dolores lancinantes y pellizcos* en los miembros y en las articulaciones.—Excesiva debilidad general, sobre todo al andar, y frecuentemente acompañada de calofrios.—La mayor parte de padecimientos se agravan durante el reposo y hácia la tarde, y se alivian por el movimiento, ó apoyando la mano sobre la parte afecta.—Sueño agitado con ensueños vivos, de los que no queda recuerdo alguno.

Fiebre.—Predominio de frio.—Horripilacion en la parte superior del cuerpo ó en las piernas, con erizamiento de los cabellos, como despues de haber andado mucho, ú oido alguna historia horrorosa.—Sensacion de frio, sobre todo en los dedos.—**Fiebre con frio en el vientre.*

Moral.—Ansiedad y aprensiones.—Indiferencia para todo.—Tristeza con llantos.—Bufonería y excesiva alegría.

Cabeza.—*Pesadez permanente de la cabeza.—Cefalalgia compresiva*, ó presiva, con sensacion, al subir una escalera, como si un gran peso cargara sobre la frente, y se alivia apoyando la mano sobre la cabeza.—Cabeza aturdida y pesada estando en la habitacion, con lentitud en concebir las ideas, mejoría al aire libre.—Dolores de cabeza

tensivos.—Corrosion exterior en el vértice de la cabeza.—Dolores quemantes en la piel de la frente.

Ojos.—Oscurecimiento de los ojos leyendo.—Rigidez espasmódica y frecuente de los párpados.

Oidos.—Retintin de oidos, crujido en el oido al masticar.—°Ortofnea.—Punzadas en los oidos.

Nariz.—Olor nauseabundo en la nariz, como de huevos podridos.—Tension en la raiz de la nariz.

Cara.—Rubicundez y calor de la cara durante el sueño.—Calor de la cara con frio en los piés.—Estremecimientos visibles de los músculos de la cara y de los párpados.

Boca y garganta.—Sensacion de parálisis en el lado izquierdo del paladar, cuando se bosteza ó tose.—Sequedad y aspereza en la garganta, que impide la deglucion de la saliva.—Deseo de la carne y repugnancia al pan y la manteca.

Apetito y estómago.—Amargor dulce é insípido en la boca, frecuentes erutos en seco.—Despues de la comida pesadez de cabeza penosa.—Bulimia, algunas veces despues de haber comido.—Calambres de estómago contractivos.—Ruido contínuo en el estómago, como si estuviera vacío.—Calor en el estómago, seguido de hambre intensa.

Vientre y deposiciones.—**Sensacion de frio en el vientre*, sobre todo oprimiendo dicha parte.—Dolor de excoriacion en los tegumentos del vientre.—Timpanitis por acúmulo de gases.—Pellizcos en el vientre.—Estreñimiento.—Deposiciones duras con pellizcos en el vientre.

Orinas y partes genitales.—Conato frecuente de orinar con evacuacion poco abundante.—Exaltacion del apetito venéreo, sin excitacion de la imaginacion, ni erecciones.

Laringe y pecho.—Voz ronca y gangosa, con obturacion de los oidos, como si se hubiera introducido alguna cosa en ellos.—Constriccion espasmódica de la laringe, con excitacion á la tos, haciendo esfuerzos para respirar.—*Compresion lancinante en los costados del pecho.*—Dolor penoso de quebrantamiento en los riñones, *estando sentado* y bajándose.—Punzadas sordas y terebrantes en el omóplato izquierdo.—Dolores de dislaceracion entre los omóplatos.—*Rigidez y pesadez de los músculos del cuello y de la nuca.*

Digitized by

Miembros.—Dolores dislacerantes paralíticos y tracciones calambroídeas en los brazos, las manos y los dedos. —Rigidez espasmódica del brazo, con retraccion involuntaria de los dedos. —Estremecimientos dolorosos en el brazo y en el dedo auricular.—*Dolor de quebrantamiento en los muslos.*—°Sacudidas y movimientos convulsivos en los muslos.

129.—MEPHITIS PUTORIUS.

MEPH.—Jugo fétido del veso, animal cuadrúpedo. — Hering.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop. *Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion*: poco tiempo.
Antídotos: *Camp.*, alivia poco tiempo.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores reumáticos.*—Dolores que cambian de sitio, con necesidad urgente de orinar. Algunas veces sensacion como si estuviera tocado por chispas eléctricas.—*Sensacion de parálisis*, sobre todo durante los dolores.—Mucho abatimiento y laxitud, y durante este tiempo los músculos están doloridos al tacto y al movimiento.—*Pereza con necesidad de extenderse y pandiculaciones.*—Agitacion interna en todo el cuerpo, con sensacion de un malestar indecible.—*Ligera vibracion de los nervios*, como hasta el interior de los huesos. —°Muchos de los síntomas se manifiestan por la mañana.

Sueño.—Mucho deseo de dormir hasta el punto de hacerlo en sociedad.—Soñolencia durante el dia, durmiendo bien en la noche.—Bostezo frecuente que hace correr las lágrimas.—*Ensueños muy vivos de los que se conserva recuerdo.*—Ensueños de inundaciones, de incendios, de pérdida de bienes, de esputos de sangre, etc.—*Pesadilla.*—Desvelo por la noche con *congestion de sangre y calor en las piernas.*—*Adormecimiento soñoliento por la mañana*, con sensacion de ardor en los ojos y dislaceraciones en los miembros; considerable alivio cambiando de posicion.—*Despierta con frecuencia °y muy temprano*, frecuentemente con sensacion de bienestar.

Fiebre.—Frio por la tarde, con necesidad de orinar y cólicos, como para presentarse una diarrea.—Calor en la cabeza, en las partes genitales y en las piernas por la

noche.—*Aumento de calor, sobre todo por la mañana*, con piel menos sensible al frio y al agua fria.—Las lociones frias parecen muy agradables.

Moral.—Mal humor por bagatelas ó por pesares imaginarios.—Inaptitud para los trabajos intelectuales, á causa de una excesiva vivacidad de la imaginacion.—Excesiva locuacidad, como si se hubiera excedido en la bebida.—Excitacion con calor en la cabeza.

Cabeza.—Vértigos al bajarse de pronto, estando sentado, cuando se mueve la cabeza, volviéndose en la cama, ó por la tarde.—*Turbacion sorda de la cabeza*, como si estuviera mas voluminosa, acompañada de mal humor y de náuseas.—Violentos dolores de cabeza, con sensacion de plenitud, como una pesadez ó presion, sobre todo en el occipucio; sensacion en diversas partes, como si en estas se introdujese el dedo.—*Dolor por enclema de los ojos.*—Dolores de cabeza por el movimiento del carruaje, ó bien por la tarde.

Ojos.—*Lancinaciones en los ojos*, como por puntas de alfileres.—Dolores en los ojos al volverlos, como si algun objeto se hubiera introducido en ellos, ó como si se los hubiera fatigado mucho.—Calor, *sensacion de ardor* y presion en los ojos, sobre todo por la mañana y por la tarde.—Presion en los párpados y sensacion de ardor en sus bordes, como si fuera á aparecer un orzuelo.—Inyeccion de las venas de la esclerótica.—°*Rubicundez de la conjuntiva*, como por equímosis.—Miopia.—*Confusion de los caractéres al leer.*—Vista turbia.—°Imposibilidad de leer caractéres pequeños.—Ceguera nocturna.—Generalmente durante la debilidad de la vista, dolores en los ojos ó en la cabeza.—Es principalmente por la tarde cuando los ojos se afectan.

Oidos.—Dientes.—Dolores dislacerantes en los oidos ó en la mandíbula y en la dentadura.—Otalgia.—Prurito, calor, rubicundez y erisipela en el exterior de la oreja (derecha).—Sequedad de la nariz.—Epistaxis.—Necesidad prolongada de estornudar.—Coriza fluente, con dolor de excoriacion en el pecho.—*Dolores en las muelas cariadas*, sobre todo las de la mandíbula inferior.—Sacudidas rápidas en las raices de los dientes.—Tracciones y dislaceraciones en los dientes.

Apetito.—Estómago.—*Náuseas* con picor en la garganta

y sensacion como si la cabeza estuviese hinchada, en ayunas.—Erutos con sollozos.—Erutos que se alivian por la emision de gases.—Facilidad á atragantarse, en bebiendo ó hablando,—Necesidad penosa é inútil de expectorar,—Gusto metálico.—°Deseo de alimentos salados.—Apetito alternativamente violento ó nulo.—*Por la mañana falta de apetito*, y repugnancia aun al humo del tabaco.—Despues de la comida cansancio sumo y gana de dormir.

Vientre.—Dolores en los hipocondrios; dolores reumáticos (del lado derecho), ó como por gases (en el lado izquierdo).—*Presion en el estómago con cólicos*.—Sensacion de vacuidad en el estómago y náuseas.—Cólicos como por una diarrea, que no son seguidos de deposiciones.—Presion y movimiento en el vientre como á consecuencia de un enfriamiento, con sensacion de frio, temblor y necesidad de orinar; mejoría acercándose al fuego.—Dolores de vientre por la tarde.

Deposiciones.—**Partes genitales**.—*Deposiciones poco frecuentes y liquidas*.—Diarrea.—Gana frecuente de orinar, sobre todo por la noche, con emision de orina clara.—Despues de un acceso de fiebre por la tarde, orina turbia con sedimento.—Prurito en el escroto.—Calor en las partes genitales.—Excoriacion de las partes genitales en la mujer, é hinchazon de los grandes labios.

Laringe y pecho.—Tos en leyendo en alta voz, hablando, y despues de haberse atragantado bebiendo.—°Tos por la mañana con expectoracion á consecuencia de un catarro.—°Mucosidades arrojadas por un acceso de tos todas las mañanas.—°Padecimientos catarrales.—Dolores en las costillas (izquierdas), al tacto y á la presion, pero sobre todo en tosiendo ó estornudando.—Dolor de excoriacion en la parte posterior de las costillas y en el pecho, respirando profundamente y en moviendo el dorso.

Tronco y brazos.—Dolores en un lado (derecho) del cuello.—Tension en los músculos de la nuca.—Dolor y una especie de parálisis en el dorso y en todos los miembros.—Lancinacion en la espina dorsal durante el movimiento.—Quebrantamiento en los riñones por la mañana.—*Dolores reumáticos en los brazos*, con tracciones paralíticas, las que se alivian por el movimiento.—Do-

lores dislacerantes ó sensacion de rotura en los huesos. *Inquietud en el brazo*, el que está como insensible.—Temblor en los brazos apoyándose en ellos.—°Estremecimiento de la mano.—Sensacion penosa en la primer falange del dedo, la que obliga á extenderle y hacerle crujir.

Piernas.—Dolores tractivos y reumáticos en los muslos, en la cadera y en el pié, pero principalmente en la pierna.—Dolor de quebrantamiento en la rodilla.—Dolor calambroídeo y repentino en el pié, que obliga á andar á saltos.—°*Inquietud en las piernas*, como si estas fueran á adormecerse.—Lancinaciones en el pié.—Dolor en el talon como el de la gota.—Comezon ó sensacion de pellizcos en el dedo pulgar.—Sensacion de ardor en el dedo auricular.—*Dolores* contínuos é igualmente *sensacion de ardor en los callos.*

130.—MERCURIUS.

MERC.—Mercurio.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas:* 3, 12, 30.—*Duracion de accion*: 3 á 4 semanas, en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Arn. asa. *bell.* camph. carb-v. *chin.* dulc. electr. *hep.* iod. *lach.* lyc. mez. nitr-ac. op. sass. sep. sil. sulf.—*Se emplea como antídoto de*: Aur. bell. *ant.* chin. coff. cupr. diad. dulc. fer. lach. mez. op. sulf. valer.

COMPÁRESE CON: Acon. amm. *ant.* arg. *arn. ars. asa.* aur. bar. *bell.* bry. calc. *carb.* caus. cham. *chin.* clem. coff. colch. con. cupr. dig. *dulc.* euphorb. guai. *hep.* iod. *lach.* laur. lyc. mez. *nitr-ac.* n-vom. *op.* phos-ac. *puls.* rhus. sass. selen. *sep. sil. staph.* stront. *sulf. thui. valer.* veratr.—Cuando el mercurio conviene siempre que se halle indicado, es sobre todo despues de: *Bell. hep. lach.*—Despues del mercurio conviene algunas veces: *Bell. chin. dulc. hep. lach. nitr-ac. sep. sulf.*

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas* se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Padecimientos á consecuencia de un enfriamiento, principalmente por la frescura de la tarde; Afecciones reumáticas y artríticas con hinchazon inflamatoria; Inflamaciones locales; *Padecimientos sifilíticos, escrofulosos*, raquíticos, hidrópicos; *Afecciones principalmente de los sujetos linfáticos*, pletóricos, ó de personas de una constitucion leucoflegmática, *de una nutricion morbosa*, de-

bilidad física y moral, propensas á constiparse y á transpirar fácilmente, con temperamento flegmático, inclinadas á la melancolía; Accesos de convulsiones?, de epilepsia?; Caquexias por el abuso de la quina ó del azufre; Padecimientos crónicos por el abuso del vino ó del café, como tambien á consecuencia de excesos venéreos ó del onanismo; Congestiones sanguíneas y hemorragias: Exóstosis, necrosis, cáries y otras enfermedades de los huesos; *Artrocace? Hinchazon é inflamacion de las glándulas*; Erupciones sarnosas, miliares, urticarias, purulentas y pustulosas; Herpes secos, furfuráceos, ó vivos, costrosos y supurantes; *Erisipela simple y flegmonosa*; Manchas y úlceras sifilíticas y otras *ulceraciones y supuraciones*; *Ictericia*; *Escarlatina maligna*; *Viruela en el periodo de supuracion.—Fiebres inflamatorias con disposicion á transpirar abundantemente;* Fiebres tifoídeas con carácter mucoso, ó bilioso, ó pútrido; Atrofia de los niños escrofulosos; Melancolía; Nostalgia?; Embriaguez; Congestion cerebral con vértigos; Cefalalgia *reumática* ó catarral; Cefalalgia nerviosa?; Apoplejía sanguínea? serosa?; Conmocion del cerebro; Encefalitis; Hidrocéfalo agudo?; *Tiña*; Alopecia; *Oftalmias escrofulosas*, *reumáticas*, catarrales (y artríticas?); *Oftalmia sifilitica*; Ulceras de la córnea; Ambliopia amaurótica; Hemeralopia?, Blefaroftalmía; Ectropion?; *Otitis*; *Otalgia reumática y catarral*; Dureza de oido despues de un enfriamiento, ó á consecuencia de anginas tonsilares; Otorrea; Pólipos en la oreja; Ozena; *Erisipela flegmonosa de la nariz*; Costra láctea y herpes faciales; Denticion difícil de los niños con fiebre; *Prosopalgias y odontalgias reumáticas con fluxion*; Trismo; Balbuceo?; *Estomacace*; *Aftas de los niños*; *Glositis*; Ránula; Anginas tonsilares, faríngeas y palatinas con flemon; Ulceras sifilíticas en la garganta; Salivacion; Afecciones gástrico-mucosas y biliosas con vómito, diarrea y fiebre; Cólera?; *Hepatitis*; Tabes mesentérica; *Ictericia*; *Enteritis*; *Peritonitis*; *Ascitis*; *Cólicos con diarrea*; Diarrea despues del sarampion ó en los niños de pecho.—Diarrea durante la denticion; *Disenteria*; Cólera asiático con deposiciones disentéricas; Prolapsus del recto; Padecimientos por las lombrices; *Diarreas mucosas* ó biliosas; *Hematuria*; *Diabetes sacarina?*; Uretritis y gonorrea; Orquitis; Chancros; *Bubones escrofulosos y sifilíticos;* Erisipela del escroto; Procidencia de la vagina; Inflama-

Digitized by Google

cion é hidropesía de los ovarios?; Peritonitis puerperal?; *Metritis*; Cáncer del útero?; Dismenorrea; Leucorrea; Esterilidad; Erisipela; Excoriacion y ulceracion de los pechos; Afecciones catarrales é inflamatorias de las vías aéreas y de los pulmones; Afonía; *Grippe*; Tísis?; Asma húmedo?; Hidrotorax; Calambres de pecho por el vapor del arsénico ó del cobre; Coxalgia; Panadizos.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores dislacerantes y tractivos* ó lancinantes en los miembros, principalmente *por la noche con el calor de la cama, que hace los dolores insoportables.*—°Hinchazones inflamatorias de un rojo lustroso.—**Dolores osteócopos nocturnos.* — *Agravacion de los padecimientos por la noche*, ó por la tarde, como tambien por el aire frio (de la tarde).—Latidos, sensacion de luxacion y **dolores artríticos en las articulaciones*, con hinchazon.—**Dolores reumáticos*, con *sudor abundante, pero que no alivia.*—Por la mañana, con el reposo, y principalmente estando acostado, se encuentra mucho mejor que estando sentado ó andando.—**Todo el cuerpo está como molido, con quebrantamiento de todos los huesos.*—Principalmente por la tarde, *mucha agitacion en los miembros,* con dolores en las articulaciones.—**Mucha fatiga, debilidad y postracion rápida de las fuerzas*, con excesivo malestar físico y moral.—*Ebullicion de sangre y temblores frecuentes* aun por el menor esfuerzo.—*Congestiones sanguíneas y hemorragias.—Mucha propension de los miembros á adormecerse.—Calambres, **movimientos convulsivos* y °ataques de epilepsia nocturnos, con gritos, rigidez del cuerpo, timpanitis, prurito en la nariz y sed.—Espasmos tónicos y tétanos.—Rigidez cataléptica del cuerpo.—*Accesos de desvanecimiento.*—Parálisis de muchos miembros.—*Enflaquecimiento y atrofia de todo el cuerpo.*—**Mucha excitacion y excesiva excitabilidad de todos los órganos.*

Piel.—**Color amarillo de la piel*, con transpiracion que tiñe el lienzo de amarillo.—**Infarto, inflamacion y ulceracion de las glándulas*, con dolores pulsativos y lancinantes, hinchazon dura, roja, lustrosa, ó sin alteracion notable de la piel.—**Erupciones miliares*, urticarias; granulosas,

ó *pustulosas y purulentas*.—Granos con prurito, y sensacion de ardor despues de rascarse. —**Erupciones que se semejan á la sarna y que sangran con facilidad*.—°Las heridas se ulceran fácilmente, ¯(y llegan hasta gangrenarse).—*Inflamacion erisipelatosa*.—Manchas rojas, prominentes, ó hepáticas, ó semejantes á las manchas escorbúticas.—*Granos pequeños muy pruritosos, que se ulceran* y se cubren de una costra.—°Manchas herpéticas, excoriadas con exudacion, ó **herpes secos, con prurito, y farináceos*.—Descamacion de la piel.—**Ulceras fagedénicas*, ¯ó azuladas, fungosas y que sangran fácilmente, ó superficiales y como roidas por insectos, ó que segregan un pus icoroso y corrosivo.—**Ulceras cancerosas*.—*Prurito violento y voluptuoso* por todo el cuerpo, principalmente por la tarde *ó por la noche, aumentado por el calor de la cama*, y algunas veces con sensacion de ardor en la parte que se rasca.—Engrosamiento del periostio; **exóstosis y cáries*; abcesos en las articulaciones; gran fragilidad de los huesos.

Sueño.—**Excesiva disposicion al sueño dia y noche: sueño profundo y prolongado*.—Gana de dormir sin poderlo conseguir.—**Por la noche, sueño tardío, ¯y por la mañana despierta muy temprano*.—*Sueño muy ligero y agitado, ¯del que despierta con frecuencia, sobresaltos y espanto.—*Insomnio por sobreexcitacion nerviosa*.—*Ensueños frecuentes, angustiosos, horribles*, fantásticos, históricos, vivos, voluptuosos; ensueños de bandidos, de perros que muerden, de turbulencias, de inundaciones, de tiros de fusil, etc., etc.—**Por la noche*, inquietud, ansiedad, *agitacion y desasosiego*, malestar, dolores, calor ó sudor, ebullicion de sangre, gritos, llantos, palpitaciones de corazon, vértigos y otros muchos padecimientos.—Al querer dormirse agravacion de los dolores, sobresaltos y fantasmas espantosos que se cree estar viendo, durante el sueño, palabras, gemidos, suspiros, respiracion corta con la boca abierta y las manos frias; **al despertarse sudor*, gritos, llantos y palabras incoherentes.

Fiebre.—*Frio, calofrios y horripilacion por todo el cuerpo*, principalmente *despues de haber dormido* por el dia ó por la noche, como tambien por *la noche* ó por *la tarde* y por *la mañana en la cama*, y algunas veces con color azulado de la piel, *frio glacial de las manos* y de los piés, palpita-

Digitized by Google

ciones musculares, movimientos convulsivos de la cabeza, de los brazos, de las piernas; sensacion de quebrantamiento en los miembros y necesidad de acostarse; temblor de los miembros, dolores vivos de cabeza, gana de orinar, soñolencia, etc.—*Calor en la cara y la cabeza, con rubicundez y sensacion de ardor en las mejillas, y frio ó calofrios, ú horripilacion por todo el cuerpo*; ó *calor mezclado de calofrios* ó de sudores.—*Durante el calor sed inextinguible*, mucho deseo de beber leche, y agravacion de los dolores descubriéndose.—*Accesos febriles por la noche* ó por la tarde; fiebre con síntomas inflamatorios ó con un estado pútrido; fiebres lentas y hécticas.—*Pulso irregular ó acelerado*, fuerte é intermitente, ó débil, lento y trémulo.—*Sudores abundantes, excesivos y debilitantes, tanto por el dia como por la noche, por la mañana*, por la noche despues de acostado, y por la tarde despues de comer, y algunas veces *fétidos* ó *ácidos*, ó grasientos que tiñen el lienzo de amarillo.—*Sudor con náuseas y conato al vómito, mucha fatiga*; sed, ansiedad, suspension de la respiracion, punzadas en el costado, etc.

Moral.—*Excesiva angustia, inquietud y agitacion*, con temor de perder la razon, ó con *pena interior excesiva*, principalmente por *la tarde* ó por *la noche en la cama*, como si hubiera cometido algun crímen.—Abatimiento moral, *con mucha indiferencia, desaliento*, horror al trabajo y repugnancia á la vida.—Aprensiones.—Mal humor, *disposicion á enfadarse y á encolerizarse*, mucha susceptibilidad de carácter, *humor querelloso*, desconfianza y sospechas.—Morosidad y repugnancia á la conversacion.—Gemidos.—Sobreexcitacion y mucha irritabilidad moral con disposicion á asustarse fácilmente.—Distraccion, inadvertencia, concepcion difícil de ideas.—*Inaptitud á toda meditacion*, y fácilmente se equivoca al hablar.—*Debilidad de la memoria.*—Instabilidad en las ideas, de las cuales una rechaza constantemente á la otra.—Chocheces.—*Accesos de manía y de demencia* con disposicion á llorar.—Pérdida del conocimiento y del habla.—Furor con horror á los líquidos.

Cabeza.—*Obnubilacion*, embriaguez y aturdimiento, principalmente *por la mañana* al despertarse ó al levantarse.—*Vértigos*, principalmente al *levantarse* ó al *enderezar la cabeza*, ó *estando sentado* ó acostado sobre el

Digitized by Google

dorso, como tambien durante y despues del paseo al aire libre, ó por la tarde, y frecuentemente con *náuseas*, oscurecimiento de la vista, calor angustioso y necesidad de acostarse.—Pesadez; *plenitud y presion en la cabeza* como si *la frente estuviera apretada por una venda*, ó *como si el cráneo fuera á estallar*.—(Por la tarde), sensibilidad dolorosa en el cerebro con incomodidad en la cabeza por el ruido, mejorada en apoyando la cabeza sobre el brazo.—*Excesivos dolores de cabeza* que obligan á comprimirla con las dos manos.—*Calor y sensacion de ardor, ó *dolores dislacerantes y tractivos*, ó *punzadas en la cabeza*, que ocupan frecuentemente *un solo lado* y se propagan *hasta el oido*, *los dientes* y el cuello.—Ebullicion, terebracion y como si escarbaran, golpes y latidos en la cabeza.—Dolores de contusion en el cerebro por la mañana en la cama.—*Cefalalgia nocturna*.—Dolores osteócopos en la cabeza, y *exóstosis en el cráneo.—Hinchazon de la cabeza; **dolor en la piel del cráneo*; dolores vivos y quemantes en los tegumentos del cráneo.—Erupcion seca en la cabeza; pequeñas costras entre los cabellos, algunas veces con prurito quemante; **costras con exudacion y con excoriacion de la piel del cráneo*, y destruccion de los cabellos.—*Alopecia*.—Sudor en la cabeza y la frente, algunas veces frio y viscoso.

Ojos.—Vista turbia, empañada, con ojeras.—**Presion en los ojos*, como por arena, °principalmente cuando se esfuerza en fijarlos sobre un objeto.—Punzadas, **prurito, comezon y sensacion de ardor en los ojos*, principalmente *al aire libre*.—**Ojos rojos, inflamados con rubicundez de la conjuntiva*, ó de la esclerótica, é inyeccion de las venas de esta membrana, ó del ángulo externo de los ojos.—**Lagrimeo abundante*, principalmente por la tarde.—**Excesiva sensibilidad de los ojos á la luz artificial y al resplandor del fuego*.—°Pústulas en la conjuntiva y úlceras en la córnea.—**Párpados rojos, inflamados, hinchados*, °ulcerados en sus bordes y *cubiertos de costras*.—*Sensacion como si debajo del párpado hubiera un instrumento cortante.—Tumor en el párpado, como un orzuelo.—*Aglutinacion nocturna de los párpados.—*Oclusion espasmódica de los párpados, con dificultad de abrirlos.—°Costras alrededor de los ojos.—**Ambliopia y vista turbia como por una niebla*; *pérdida momentánea de la

vista; **puntos negros, como moscas que revolotean*, ¯llamas y chispas delante de los ojos.—Movilidad de los caractéres cuando se lee.

Oidos.—**Dolores dislacerantes, lancinantes* y tractivos *en los oidos*, á veces con *sensacion de frio*, como si hubiera hielo en la oreja, *aumentados por el calor de la cama.—La oreja y el conducto auditivo están como inflamados*, con dolores calambroídeos y lancinantes.—*Excoriacion y ulceracion de la concha.—**Otorrea purulenta* y °excrecencias fungosas en el oido, *con *dolores de dislaceracion* en el lado afecto de la cabeza y de la cara.—Flujo de sangre por el oido.—Secrecion de cerúmen.—Tumor subcutáneo y granos furfuráceos con exudacion en el lóbulo de la oreja.—**Dureza de oido*, algunas veces con *obturacion de estos*, que cesa deglutiendo ó sonándose, ¯ó con retintin extraordinario de todos los sonidos en el oido.—Retintin, **ruido* y *zumbido* en los oidos, ¯principalmente *por la tarde.*—Sensibilidad dolorosa é hinchazon inflamatoria de las parótidas.

Nariz.—*Hinchazon de los huesos de la nariz, con sensibilidad dolorosa al tacto.—Prurito en la nariz.—Tension, presion y sensacion de peso en la nariz.—°Color negruzco de la nariz.—*Hinchazon inflamatoria y rubicundez lustrosa en la nariz*, con prurito.—Costras en las ventanillas de la nariz.—Flujo de un pus fétido y corrosivo por las ventanillas nasales.—**Epistaxis frecuente y abundante*, aun durante el sueño, y algunas veces tosiendo.—Obturacion y °sequedad de la nariz.—*Estornudo frecuente.*—°Coriza seco con obturacion de la nariz, ó **coriza fluente*, °con evacuacion abundante de serosidades corrosivas.—Olor pútrido por la nariz.—Pústula dolorosa en la nariz.

Cara.—**Rostro de un color pálido*, °ó *amarillento*, ¯ó aplomado, °ó *térreo.*—Semblante descompuesto, consumido.—Círculo de un rojo azulado alrededor de los ojos.—Calor febril y *rubicundez de las mejillas.*—**Abotagamiento é hinchazon de la cara*, ¯principalmente alrededor de los ojos.—*Hinchazon de la mejilla.—**Dolor de dislaceracion en los huesos y en los músculos* (de un lado) *de la cara.*—Presion y punzadas en el hueso cigomático.—Sensacion de tension en la piel de la cara y de la cabeza.—Sudor en la cara.—Manchas rojas y herpéticas en la

cara.—*Costra amarillenta en la cara*, que exhala un humor fétido, prurito contínuo dia y noche, y facilidad á sangrar despues de haberse rascado.—*Labios arrugados, secos y °negruzcos con sensacion de ardor al tocarlos.— Hinchazon y *ulceracion de los labios*.—*Costras amarillentas*, ¯pústulas purulentas y úlceras pequeñas en los labios y alrededor de la barba.—*Grietas, ragades y ulceracion de los ángulos de la boca.— Distorsion de la boca y movimientos convulsivos de los labios.—*Apretamiento é inmovilidad de las mandibulas*, ¯con hinchazon inflamatoria de la inferior y *tension en los músculos del cuello.—°*Infarto* é *hinchazon inflamatoria de las glándulas submaxilares*, con dolores lancinantes ó pulsativos, ó sin dolores.— Cáries de la mandíbula.

Dientes.—**Dolores dislacerantes*, *lancinantes*, ó pulsativos en los dientes cariados, ó *en las raices de los dientes*, los que se propagan frecuentemente *hasta los oidos y toda la mejilla* del lado afecto, algunas veces *con hinchazon dolorosa de la mejilla* ó de las glándulas submaxilares, salivacion y calofrios.—**Aparicion ó agravacion ¯de las odontalgias*, principalmente *por la tarde*, *ó por la noche*, *con el calor de la cama*, *donde se hacen insoportables*; renovacion por el aire frio, como igualmente *comiendo* ó tomando alguna cosa caliente ó fria.—*Dentera. ¯ennegrecimiento, *vacilacion y caida de los dientes*.—*Prurito y rubicundez de las encías.— Encías fungosas y que sangran fácilmente.—**Desprendimiento é hinchazon de las encías*, principalmente *por la noche*, con dolor quemante y *sensacion de excoriacion al tacto y en comiendo*.—*Encías lívidas, descoloridas y muy sensibles.—**Ulceracion de las encías*.

Boca.—**Olor fétido, cadavérico, de la boca*.— Color azulado, excoriacion, é **hinchazon inflamatoria en el interior de la boca*.— Dolor quèmante, vesículas, ampollas, **aftas y úlceras en la boca*.—Sensacion de sequedad en la boca y en el paladar, ó **acumulacion de mucosidades tenaces*.— Ulceracion del orificio de los conductos salivales y **flujo abundante de una saliva excesivamente fétida*, ¯y algunas veces hasta *sanguinolenta*.—**Lengua húmeda*, *cubierta de mucosidades blancas y espesas*, *ó seca*, °parda ó negruzca.—*Dureza, *hinchazon inflamatoria y ulceracion de la lengua*, con dolores lancinantes.—Rigidez, in-

sensibilidad é inmovilidad de la lengua.—*Sensacion en la lengua, como si estuviera quemada.—Temblor de la lengua.—*Locucion acelerada y balbuciente; **pérdida completa del habla.*—Ulceracion y cáries del paladar.

Garganta.—**Sequedad dolorosa de la garganta* que impide hablar.—*Dolor de excoriacion y de escozor en la garganta, ó *sensacion de calor que empieza desde este punto.*—**Dolores lancinantes en la garganta y en las tonsilas*, principalmente *al deglutir.*—*Prolongacion é hinchazon de la úvula.—*Supuracion de las amígdalas.—Presion y dolor de excoriacion y de ulceracion en el esófago.—**Hinchazon inflamatoria y rubicundez de la parte posterior de la boca y de la garganta.*—°Acumulacion de mucosidades espesas y tenaces en la garganta.—*Sensacion, *como si hubiera en la garganta algun tumor ó un cuerpo estraño* que excitase la deglucion.—**Necesidad continua de deglutir.*—**Deglucion dolorosa*, *difícil*, y algunas veces hasta *espasmódica*, con peligro de sofocacion.—**Imposibilidad de tragar la menor cantidad de líquido, el que sale por las ventanillas nasales.*—*Las afecciones de garganta se extienden ordinariamente *hasta los oidos*; las parótidas, las glándulas submaxilares y las del cuello; *se agravan, por lo general deglutiendo en seco involuntariamente*, así como por *la noche* al aire frio y en hablando, y frecuentemente *van acompañadas de salivacion.*

Apetito.—**Sabor pútrido, salado, ¯dulce* ó metálico.—*Gusto amargo*, principalmente por *la mañana* en ayunas.—Gusto amargo ó dulce de pan de centeno.—**Gusto ácido y mucoso* durante y despues de la comida.—**Sed violenta, ardiente, dia y noche*, con deseo de *bebidas frias*, y principalmente de *leche* y de cerveza.—*Deseo de vino y de aguardiente.—**Apetito y hambre insaciables*, con insipidez de los alimentos.—*Bulimia* con mucha debilidad.—**Falta de apetito.*—Ningun deseo de alimentos, los que, sin embargo, son agradables y de buen gusto al comerlos.—Sed mas pronunciada que el apetito.—Saciedad pronta cuando se come.—*Disgusto de todos los alimentos*, principalmente *de los sólidos*, *de la carne*, de los azucarados, de los alimentos cocidos y del café.—*Excesiva debilidad de la digestion*, con hambre contínua y *presion en el estómago, erutos frecuentes*, pirosis y otras muchas inco-

modidades despues de la comida.— El pan hace peso en el estómago.

Estómago.—**Náuseas y excesiva gana de vomitar*, frecuentemente *con dolores incisivos y presivos en el estómago, el pecho* y el vientre, ansiedad é inquietud, dolor de cabeza, vértigos, oscurecimiento de la vista y calor fugaz. —*Las náuseas se aumentan frecuentemente despues de la comida*, y van acompañadas de una sensacion á la garganta, *como si se hubiesen comido cosas azucaradas.*—*Erutos*, principalmente *despues de haber comido*, y frecuentemente de un *sabor pútrido* ó *amargo*, ó ágrio y rancio.— **Erutos violentos vacios.*— Regurgitacion despues de haber comido ó bebido.— Pirosis, regurgitacion de líquidos rancios é *hipo durante y despues de la comida.*—*Vomituricion y *vómitos de materias mucosas*, *amargas*, ó de bilis.—Vómitos violentos con movimientos convulsivos. —Sensacion de ardor, dolor violento y **sensibilidad excesiva del estómago y de la region precordial.*—*Tension, plenitud y **presion como por una piedra en la boca del estómago*, principalmente durante ó *despues de la comida* por poco que se coma.—Dolor vivo, constrictivo en la region precordial.—Dolores calambroídeos en el estómago por poco que se haya comido.

Vientre.—**Sensibilidad dolorosa de la region hepática*, con *dolores lancinantes*, quemantes, aumentada por cualquier movimiento del cuerpo ó de las partes afectas.— *Hinchazon y dureza del hígado.—**Ictericia completa.* —*Vientre duro y timpánico, con dolor al tacto*, principalmente en la region umbilical.—**Cólicos violentos con retortijones, punzadas como de cuchillos*, contraccion dolorosa y pellizcos en el vientre, *principalmente por la *noche*, ó á la frescura de la tarde.—Tension y presion *como por una piedra*, principalmente en la region umbilical.—Sensacion de ardor en el vientre alrededor del ombligo.—*Dolores excesivos é insoportables en el vientre, que no desaparecen sino estando acostado.— Dolor de vientre como á consecuencia de un enfriamiento.— Sensacion como si los intestinos estuvieran sueltos y se moviesen al andar.—**Los dolores de vientre van frecuentemente acompañados* de calofrios ó de calor y de rubicundez en las mejillas, así como de una *gran sensibilidad* del vientre y *de la region precordial, á todo contacto y á la me-*

Digitized by Google

nor presion.—Padecimientos por flatuosidades principalmente por la noche, con timpanitis, borborigmos y ruido como de agua. — Tension, presion y *punzadas como por cuchillos en las ingles.*—*Infarto é *hinchazon inflamatoria de las glándulas inguinales*, con rubicundez y sensibilidad dolorosa andando y estando en pié.—°*Ulceracion y supuracion de las glándulas inguinales.*

Deposiciones.—**Estreñimiento con deposiciones duras, tenaces* y caprinas, las que no pueden expelerse sino á costa de grandes esfuerzos.—**Conato inútil*, pero *frecuente de deponer*, sobre todo *por la noche*, y algunas veces con *tenesmo*, salida de las hemorróides y náuseas.—**Deposiciones diarréicas y disentéricas*, principalmente *por la noche*, con *cólicos y retortijones violentos*, con necesidad urgente de expeler, *tenesmo y sensacion de ardor en el ano*, pirosis, *náuseas y eructos*, angustia, calor ó sudor frio en la cara, *calofrios y horripilacion*, postracion y temblor de todos los miembros.—*Diarrea causada por el aire frio de la tarde.—**Evacuaciones poco abundantes de mucosidades sanguinolentas.—**Deposiciones mucosas ó biliosas, ó pútridas, ó ácidas*, ó de un color *verdoso* ó pardusco, ó rojizo, ó amarillo de azufre, ó de un blanco gris.—Deposiciones de la consistencia de papilla, ó espumosas, ó como de carne picada.—**Evacuaciones de materias corrosivas y quemantes.—**Evacuacion de sangre ó de mucosidades por el recto*, aun con deposiciones no diarréicas, y fuera del acto de las deposiciones, algunas veces con tenesmo.—Salida de las hemorróides.—**Salida de ascárides y de lombrices.*—Prurito, punzadas y excoriacion en el ano.—°Prolapsus del recto, que al salir parece negro y ensangrentado.—°Deposiciones de materias no digeridas ó negras y como brea.

Orinas.—*Gana continua de orinar dia y noche*, algunas veces con esfuerzos inútiles, ó con emision poco abundante.—Chorro de la orina sumamente delgado.—*Evacuacion frecuente y abundante de orina, como en la diabetes*, con enflaquecimiento excesivo.—Conato urgente de orinar, con incontinencia de orina.—Flujo de orina nocturno.—Estranguria.—*Orinas de color oscuro, ó rojo, ó pardusco, ó blanquecino*, como si estuvieran mezcladas con arcilla ó con greda, ó de color de sangre.—¯*Orinas fétidas, turbias y sedimentosas, ó sanguinolentas*, ó de un

olor ácido.—**Orinas corrosivas y quemantes.*—Sedimento espeso en las orinas.—Nubes blancas y copos en las orinas.—Excrecion de mucosidades duras ó de copos y de filetes blancos durante ó despues de la emision de las orinas.—*Hematuria.—°Dolores incisivos y contractivos en la region renal por la noche.—Pulsacion, *dolores incisivos*, *sensacion de ardor y punzadas en la uretra*, aun fuera del tiempo de la emision de las orinas.—Inflamacion del orificio de la uretra y secrecion de materias espesas, amarillentas ó serosas, blanquecinas.

Partes viriles.—*Exaltacion del apetito venéreo y mucha lascivia*, con erecciones y poluciones frecuentes.—*Erecciones nocturnas*, *dolorosas*, y algunas veces poluciones sanguinolentas.—Miembro pequeño, frio y flojo.—Prurito voluptuoso, hormigueo, dislaceracion y *punzadas en el glande* y en el prepucio.—Entumecimiento ó *hinchazon inflamatoria del prepucio*, algunas veces con dolores quemantes, grietas, úlceras y erupciones.—*Secrecion purulenta entre el prepucio y el glande*, algunas veces con hinchazon, calor y rubicundez de la parte anterior del miembro.—*Vesículas y *úlceras fagedénicas de fondo lardáceo* y de *bordes elevados* en el glande y en el prepucio.—Sensacion de frio en los testículos.—°Testículos duros é hinchados, con rubicundez lustrosa del escroto *y *dolor tractivo en los testículos y en el cordon espermático.*—Prurito, hormigueo y punzadas en los testículos.—Excesiva traspiracion de las partes genitales, andando.—Excoriacion entre estas partes y los muslos.

Reglas.—*Supresion de las reglas.—*Reglas demasiado abundantes*, con inquietud y cólicos.—*Metrorragia.*—*Antes de las reglas, calor seco con ebullicion de sangre y congestion á la cabeza.—°Durante las reglas, lengua encendida con manchas oscuras y sensacion de ardor, gusto salado en la boca, dentera y encías descoloridas.—*Flores blancas*, *purulentas*, *corrosivas*, con comezon en las partes sexuales.—Prurito, granos y nudosidades en los labios de la vulva.—Hinchazon inflamatoria de la vagina con sensacion como si toda estuviese excoriada.—°Hinchazon de los labios de la vulva, con calor, dureza, rubicundez lustrosa, mucha sensibilidad al tacto y dolores quemantes, pulsativos y lancinantes.—**Prolapsus de la vagina.*—Concepcion fácil y cierta.—**Tume-*

faccion dura de los pechos, *con dolores de ulceracion*, ó *con *supuracion y ulceracion real*.—*Excoriacion de las mamas.

Laringe.—*Catarro con calofrios febriles*, humor hipocondríaco, le disgustan todos los alimentos y tiene constipacion.—*Ronquera contínua y pérdida de la voz*.—Voz gangosa.—°Sensacion de ardor y cosquilleo en la laringe.—**Tos seca*, algunas veces *fatigosa y conmovente*, principalmente *al principio de la noche en la cama*, *ó en el resto de la noche*, aun durante el sueño, y por la mañana al despertarse, excitada *por un cosquilleo* ó una sensacion de sequedad en el pecho, *que se agrava hablando*.—Tos como por una irritacion en el estómago.—°Tos convulsiva, con vomituricion.—Al toser dolores en la cabeza y en el pecho, como si estas partes fueran á estallar, °ó punzadas en el occipucio, ¯ó dolor de excoriacion en el pecho y riñones.—Conato al vómito y accesos de sofocacion al toser.—*Tos con expectoracion de sangre pura*.—*Tos bronca*, con sensacion de sequedad y punzadas en la garganta.

Pecho.—Respiracion difícil con disnea, °ó corta y sonora.—**Respiracion corta subiendo* una escalera, ó andando muy de prisa.—Opresion angustiosa del pecho y *dificultad de respirar*, con necesidad de respirar profundamente, principalmente despues de la comida, ó con *accesos de sofocacion por la noche antes de acostarse y estando ya en la cama* (en el costado izquierdo).—Respiracion corta con opresion y tension en el pecho, y sensacion como si al menor movimiento, y con solo hablar una palabra, se fuese á extinguir la vida.—Presion en el pecho, algunas veces hasta el dorso, con imposibilidad de respirar profundamente.—Sensacion de ardor en el pecho, la que algunas veces se propaga hasta la garganta.—*Punzadas* (como de cuchillos) *en el pecho*, en las costillas, ó hasta el dorso, principalmente en respirando, estornudando y tosiendo.—Sensacion de contusion y de hinchazon, y *dolor de excoriacion y de ulceracion en el pecho*.—Palpitaciones de corazon.

Tronco.—Dolores vivos y sensacion de contusion en los músculos del pecho.—Punzadas, poca firmeza y suma debilidad en los riñones.—Dolor de contusion en los riñones, en el dorso y en los omóplatos.—Sensacion de ardor y *dolor tractivo en el dorso y en la nuca.—Rigi-

dez é hinchazon reumática de la nuca y del cuello.—Punzadas en los músculos del cuello.—Infarto é *hinchazon inflamatoria de las glándulas del cuello con dolores* lancinantes y presivos.

Brazos.—**Dolores vivos en los hombros y en los brazos*, principalmente *por la noche*, cuando se mueven estas partes.—Estremecimientos en los brazos y en los dedos.—Hinchazon caliente y roja del codo hasta la mano.—Miliar pruritosa en los brazos.—*Herpes furfuráceos y quemantes en el antebrazo y en la muñeca.—Crujido, *debilidad y sensacion de parálisis en la mano.*—Sudor en la palma de las manos.—Erupcion sarnosa en las manos.—**Contraccion calambroidea de las manos y de los dedos.*—Hinchazon de las articulaciones de los dedos.—**Grietas y ragades profundas en las manos y los dedos, que sangran.*—Dolores calambroídeos y rigidez fácil de las manos trabajando.—Hinchazon de la muñeca, con dolor al tacto y moviéndola.—*Rigidez de las muñecas.*—Ulceracion en la raiz de las uñas.—Exfoliacion de los dedos.—Los dedos están como muertos.

Piernas.—**Dolores vivos y lancinantes en la articulacion coxo-femoral*, como tambien en los muslos y en las rodillas, *principalmente por la noche y durante el movimiento*, y frecuentemente con sensacion de frio en las partes enfermas.—Mucha debilidad, *pesadez y cansancio sumo en los muslos y en las piernas.*—Sensacion de rigidez, de torpeza y calambres en los muslos.—Granos pruritosos en los muslos.—*Hinchazon edematosa, transparente, de los muslos y de las piernas.*—Tension en las corvas, como si los tendones fuesen demasiado cortos.—Miliar pruritosa en las piernas.—*Herpes en los muslos y en las piernas.—*Contraccion de las piernas y calambres en las pantorrillas y en los dedos.—Hinchazon del empeine* ó de los talones, con dolores vivos ó lancinantes.—*Dolor de luxacion en el pié.*—Frio y sudor en los piés.—°Hinchazon dolorosa de los huesos del metatarso.—*Hinchazon de los dedos.*—Ulceracion en las uñas.

Digitized by

131.—MERCURIUS CORROSIVUS.

MERC-COR.—Mercurio sublimado, mercurio corrosivo, sublimado corrosivo.—*Duracion de accion*: 3 á 4 semanas.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.
ANTÍDOTOS: *Véase* Mercurius..

SINTOMAS GENERALES. — Tirones en el periostio de todos los miembros, como despues de un ataque de fiebre intermitente.—*Dolores violentos en las extremidades.*—Calambres contínuos en los miembros.—Miembros adormecidos é insensibles.—*Rigidez paralítica y parálisis de las extremidades*, á veces con sensibilidad muy dolorosa al menor cambio de posicion, cefalalgia hasta la raiz de la nariz, ojos fijos y brillantes, piel seca y sudor en la frente.—*Temblor en los miembros.*—Falta de fuerzas y *excesiva debilidad general*; accesos de flojedad repentina.—**Mucha agitacion con ansiedad, inquietud y anhelacion continuas.*—**Accesos frecuentes de desmayo, sincope.*—**Dolores osteócopos en los miembros y en la cabeza.*—Mucha debilidad en las articulaciones.—Convulsiones en los brazos, las piernas y los músculos de la cara.—Dolores en el cuerpo, con rigidez general, y aumentando por el movimiento.—Algunos síntomas se agravan por pasear al aire libre.

Piel.—*Piel seca, caliente, quemante y mordicante.*—Prurito lancinante y ardoroso.—*La piel está pálida, descolorida y cubierta de sudor.*—Hormigueo en la piel, como por adormecimiento.—Erupcion miliar por todo el cuerpo.—*Manchas por el cuerpo como las escorbúticas, y en los intervalos erupciones sarnosas, herpes y forúnculos*; burbujas en los brazos y vientre.—Infartos glandulares muy dolorosos alrededor de los pezones.

Sueño.—*Insomnio continuo.*—Al dormirse, sobresaltos violentos con sacudidas en todo el cuerpo.—Por la noche, no puede reposar en ninguna parte, por sensacion de calor y angustia.—*Sueño muy ligero.*—*Estado comatoso.*—*Despierta todas las noches á las tres de la mañana.*—*Ensueños horrorosos* de incendios, de asesinatos.—*Decúbito supino, durante el sueño*, los miembros abandonados á sí mismos.

Fiebre.—*Frio* con mucha frecuencia, y tambien por la noche.—*Las extremidades frias.—Temblor de frio con castañeteo de dientes.—Piel y extremidades frias.*—Calofrios con dolores cólicos, al menor movimiento, así como al levantarse de su asiento; ó bien al aire libre, con tenesmo.—Calofrios en la cabeza.—*Calor*, sobre todo en bajándose, y disminuye incorporándose.—*Sudores nocturnos.—Sudores frios.—Fiebre con cefalalgia violenta, cara roja, piel quemante*, ojos brillantes, las pupilas contraidas, la frente cubierta de gotas de sudor, el cuerpo está envarado y muy dolorido al menor movimiento.

Moral.—*Mal humor y mucha propension á encolerizarse*, alternando algunas veces con hilaridad.—**Estado de estupor*, como en la fiebre tifoídea.—*Comprension debilitada; no comprende lo que le dicen, y mira atontado á los que le hablan.*—Ideas confusas, con palabras sin ilacion.

Cabeza.—*Cefalalgia violenta*, agravada en descubriendo la cabeza.—Accesos de vértigos.—Congestion á la cabeza y á la cara, con mejillas ardientes y emision abundante de gases.—*Dolores lancinantes en la frente.—Cefalalgia frontal*, sobre todo hasta la raiz de la nariz.—*Punzadas, dolores de dislaceracion y presion por encima del ojo izquierdo*, como dentro de los huesos.—*Frio en la cabeza*, en particular al principio de la noche, en acostándose.

Ojos.—Contraccion del músculo fronto-superciliar.—*La conjuntiva está roja é inyectada.—Ojos empañados, abatidos, ojeras con un circulo azulado*, expresan el sufrimiento y el temor de una muerte próxima.—*Ojos centelleantes y muy movibles ó prominentes y fijos.—Mirada que expresa la exaltacion y el dolor.—Pupilas insensibles á la luz.—°Pupila desigual.—*Los objetos parecen mas pequeños y distantes que de ordinario.*—Fotofobia en paseando al sol.

Oido y nariz.—*Pulsacion y punzadas, sobre todo en el oido izquierdo.*—Los oidos están como tapados.—Ruido confuso en los oidos, como de agua corriente.—Sequedad de las ventanillas *nasales*, sobre todo al aire libre.—Coriza muy violenta.

Cara.—*Cara pálida, flaca, descompuesta, macilenta, amarilla y con arrugas.—Cara roja y abotagada.—Tumefaccion de la parte inferior de la cara, de un color rojo pardusco.—Tumefaccion dolorosa de las parótidas, de las glándulas submaxilares y de las sublinguales*, con ó sin salivacion.—Ri-

gidez de los músculos de la masticacion.—*Labios muy hinchados y prominentes como los de los monos.—Labios pálidos.*—Labios secos y esquebrajados.

Dientes.—Dolores dislacerantes, quemantes, en las molares de la mandíbula superior, hasta el ojo izquierdo, con dolores reumáticos en otros puntos del cuerpo, cólicos, diarrea, imposibilidad de coger el sueño, y angustia nocturna.—*Dientes embotados y movedizos.*—Inflamacion y *tumefaccion de las encias*, con dolores quemantes.

Boca.—*Inflamacion de la cavidad bucal, con tumefaccion ardiente y ulceracion.—Olor fétido de la boca.—Sequedad de la boca.—Lengua roja y quemante.—Lengua húmeda y cubierta* de una capa blanca ó amarilla.—*Lengua hinchada,* á veces *hasta el punto de llenar toda la cavidad bucal.—Locucion difícil.—Salivacion abundante*, á veces *con dolor en la boca.* —Evacuacion abundante de un moco albuminoso por la boca.—*Tumefaccion esponjosa del paladar.*

Garganta.—*Dolores ardientes, violentos y graves en la garganta, la faringe y el esófago* hasta el estómago.—*Arañamiento doloroso en la garganta y la faringe*, con dificultad para hablar, deglucion penosa y dolorosa para los líquidos, obligando algunas veces á arrojarlos.—*Sensacion de constriccion y de cerramiento en la faringe, con disfagia.— Dolores fuertísimos en la faringe* y en toda la extension del canal digestivo.—*Desprendimiento en la garganta y en la boca de fragmentos de epitelio.—Deglucion difícil, muy dolorosa y aun enteramente imposible.*

Gusto y apetito.—*Gusto de la boca, metálico, astringente, ó amargo, ó salado.*—Gusto amargo de los alimentos.— *Anorexia completa.—Sed violenta, inextinguible*, á veces con náuseas, vomituricion y vómitos despues de haber tomado la menor cantidad de líquido.

Gastricismo.—Erutos dolorosos.—*Hipo frecuente y violento.—Vómitos abundantes, frecuentes, contínuos*, sobre todo *por la noche*, y algunas veces *con dolores muy intensos en el epigastrio y en la region umbilical.—Vómitos biliosos, verdosos, amargos*, mezclados á veces de alimentos ó de estrías de sangre.—*Vómitos de materias mucosas,* blanquecinas, ó azuladas, ó filamentosas, espumosas ó sanguinolentas.—*Vómito de los alimentos.—Vómitos de sangre pura.—Vómitos de materias negras como de poso de café,*

Digitized by Google

entremezcladas de cuajarones de sangre.—*Vómitos con diarrea* biliosa.

Estómago.—Calor, sensacion de ardor y *dolores violentos, graves, en el estómago y en la cavidad del epigastrio.*—Presion penosa, pellizcos dolorosos y comezon en el estómago.

Vientre.—Punzadas en la region hepática.—*Mucha sensibilidad en el epigastrio á la menor presion.—Dolores violentos, intensos en las regiones epigástrica y hepática.*—Dolores agudos, pellizcos y *fuertes dolores en la region umbilical.*—Dolor de contusion en la region del ciego.—Fuertes cólicos, *dolores dislacerantes, retortijones violentos y dolores graves en los intestinos*, algunas veces con deposiciones sanguinolentas.—Dolores cólicos despues de haber comido patatas.—Retortijones con frio, calofrios y sensibilidad al aire libre.—*Vientre timpanítico, hinchado, meteorizado y excesivamente doloroso al menor contacto.—Dolores en el epigastrio con calambres en los miembros inferiores y menostasia.*—Piel del abdómen fria en todos los puntos.—*Vientre excesivamente doloroso al tacto.*—Sensacion de hinchazon en las glándulas inguinales.

Ano y deposiciones.—*Supresion de las evacuaciones alvinas y urinarias.—Extreñimiento tenaz ó invencible.—Necesidad urgente de deponer sin resultado* y muy fatigosa.—*Deposiciones frecuentes en forma de papilla, negras y muy fétidas.—Deposiciones de diversas materias*, en forma de cintas, viscosas, arcillosas, morenuzcas y rojizas, ó azuladas, en grumos y muy fétidas.—*Evacuaciones abundantes*, mucosas ó *biliosas.—Evacuaciones frecuentes, sobre todo por la noche, con cólicos y tenesmo.*—Conatos de deponer excesivamente urgentes.—Evacuaciones con mucho dolor.—*Diarreas muy fétidas*, amarillentas ó mucosas.—*Diarreas con tenesmo.—Diarreas sanguinolentas.—*Disenterías con evacuacion de mucosidades sanguinolentas, cólicos y retortijones, ganas continuas de deponer y tenesmo sumamente doloroso.*—Evacuaciones involuntarias de sangre pura.—*Dolores ardientes en el recto y el ano.*

Orinas.—*Supresion de las orinas.—Retencion de orina.—Orinas raras y rojas*, con emision difícil.—Orinas muy turbias, de un color moreno oscuro.—Orina amarilla pálida, con poso de color gris.—Prurito, sensacion de ardor y *punzadas en el meato urinario.—*Flujo gonorréico de ma-*

terias espesas, con escozor al orinar y punzadas á lo largo de la uretra.

Partes viriles.—Punzadas en los testículos.—Fuertes erecciones con deseo del cóito.—Eyaculaciones raras durante el cóito.—Despues del cóito, punzadas ardientes en la parte anterior de la uretra.

Reglas y partes genitales de la mujer.—*Supresion de las reglas*, con cefalalgia y temblor de los brazos, de las piernas y del cuello.—Antes de las reglas, temblor en los miembros.—*Reglas muy abundantes, como una hemorragia uterina*.—Metrorragia violenta y de larga duracion.—Dolor presivo en el hocico de tenca, sensiblemente doloroso durante el cóito.—Leucorrea blanco-amarillenta, de un olor dulce y nauseabundo.—Tumefaccion dolorosa de las glándulas mamarias alrededor de los pezones.

Laringe.—Punzadas en la parte superior de la laringe, tragando en seco.—Sequedad de la laringe por la tarde.—*Voz ronca* y débil.—*Tos séca*, hueca y fatigosa.—Tos espasmódica.—Expectoracion de mucosidades mezcladas de sangre.—Hemoptísis.

Pecho.—*Aliento fétido.—Respiracion muy lenta.—Opresion de pecho y respiracion entrecortada*.—Calambres en el lado derecho del pecho que se extienden hasta los brazos.—*Punzadas que atraviesan el pecho.—Punzadas pleuríticas.—Pleuroneumonia efectiva*, sobre todo del costado izquierdo.—*Palpitaciones de corazon*.—Latidos irregulares de corazon, ondulatorios y temblorosos.

Tronco.—*Dolores en la region lumbar*, los que se propagan hasta el hipogastrio y las ingles, y alternan con convulsiones y contracciones musculares generales.—Dolor en el cuello á la presion.—Sensacion de hinchazon de las glándulas axilares.

Extremidades superiores.—Calambres en las extremidades superiores.—Sensacion de fatiga en el músculo deltóides.—*Frio de las manos* y *de los piés*.—Dolores en los huesos del metacarpo.—Fuertes dolores en las articulaciones del dedo pulgar.—*Calambres en los dedos y en las manos*.

Extremidades inferiores.—Sensacion de fatiga, punzadas y *dolores reumáticos en las extremidades inferiores.—Parálisis é insensibilidad completa de estas extremidades.—*

Digitized by

Dolores dislacerantes y *punzadas en la articulacion coxo-femoral.—Piernas adormecidas.—Frio glacial en los piés.—Calambres en los piés y dedos.*

132.—MEZEREUM.

MEZ.—Daíne Mezéreen, Laureola hembra.—HAHNEMANN. *Hist. nat. y prep.* Farm. homeop.——*Dósis usadas:* 15, 30.—*Duracion de accion:* hasta 30 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS: Camph. merc.—*Se emplea como antídoto de:* Merc. nitr-ac.
COMPÁRESE CON: Euphor. bell. hyos. ignat. merc, nitr-ac. puls. staph. veratr. zinc.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que puede ser *consultado* este medicamento contra:—Inflamacion, reblandecimiento con cáries y otras *afecciones de los huesos*; *Malas consecuencias por el abuso del mercurio*; Afecciones escrofulosas con las glándulas infartadas; Raquitismo?; Tabes mesentérica?; Fiebres intermitentes; Tiña; Oftalmías; Prosopalgia y odontalgia reumáticas?; Hematuria; *Leucorreas tenaces*; Acortamiento de los tendones de la pierna, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Traccion, dolores dislacerantes, reumáticos y tension* en los miembros, con debilidad paralítica.—Dolores estremecientes que dejan por largo tiempo en pos de sí una sensacion penosa.—Dolores tractivos en un lado del cuerpo, con calofrios.—**Accesos de dolores y otros padecimientos acompañados de calofrios y horripilacion.—Dolores* corrosivos de excoriacion en las *membranas mucosas.—Sensacion de ardor en los órganos de la digestion.—°Inflamacion é hinchazon de los huesos.—°Ulceracion de los huesos.—Estremecimiento y temblor de los músculos.*—Traccion y sensacion de postracion en las articulaciones.—Quebrantamiento y *pesadez de todos los miembros.*—Torpeza y pereza del cuerpo.—Andar encorvado.—°Enflaquecimiento ó tumefaccion del cuerpo y de la cara con vientre abultado en los niños.—Glándulas doloridas.—*Predominio de los padecimientos en un solo lado del*

cuerpo.—Exacerbacion de los síntomas por la tarde.—*Dolores que se agravan por el tacto y por el movimiento.*—Mucha susceptibilidad al aire frio.

Piel.—Descamacion general de la piel.—**Prurito*, sobre todo *por la noche, mas violento y mas doloroso despues de haberse rascado*, y algunas veces *con hinchazon* de la parte que se ha rascado.—Prurito corrosivo, como por piojos.—*Erupciones miliares*, algunas veces crónicas.—Forúnculos.—*Ulceras* inflamadas, con sensacion de ardor y punzadas, ó con dolor corrosivo de excoriacion.

Sueño.—Mucha *gana de dormir por el dia*, con sueño agitado y no reparador por la noche.—Sacudidas en el cuerpo durante el sueño.—Una pesadilla le despierta muy temprano (hácia las 2 ó las 3 de la mañana).

Fiebre.—**Despeluzamiento, calofrios y frio* de todo el cuerpo, sobre todo en las manos y en los piés, con *sed violenta*, y algunas veces sin deseo de volver á calentarse.—Despues de los calofrios sueño con sudor.—°Fiebre acompañada de dolor de cabeza, palidez del rostro, region esplénica dolorosa, tumefacta y dura, debilidad y *excesiva susceptibilidad al aire frio; °tipo terciana.—Fiebre inflamatoria violenta.

Moral.—Humor hipocondríaco con tristeza y llantos.—Angustia, inquietud sobre todo estando solo, con deseo de la sociedad.—*Maneras bruscas.*—Arrebatos.—Ineptitud para el trabajo.—Debilidad de memoria.—*Embotamiento de la inteligencia.*—Concibe las ideas lentamente.—*Las ideas se pierden frecuentemente.*

Cabeza.—Turbacion estupefaciente de la cabeza, como si estuviera embriagado, ó como despues de poluciones inmoderadas.—Vértigo que hace caer de lado y ver chispas delante de la vista.—*Dolores de cabeza con horripilacion y calofrios*, agravados al aire libre.—*Cefalalgia presiva* y con aturdimiento de un solo lado.—Dolor como de separacion, compresivo ó calambroídeo en la cabeza.—Dolores violentos pulsativos y presivos en toda la cabeza, la frente, la nariz y los dientes, agravados por el mas leve movimiento.—Dolor de cabeza como si dieran con un martillo, con vómito de mucosidades.—°Sensacion de torpeza, con dolores tractivos en un lado de la cabeza.—*Dolores osteócopos en el cráneo*, agravados por el tacto.—Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo y de

Digitized by

los cabellos al tacto.—Prurito corrosivo en la piel del cráneo.—**Erupcion pruritosa en la cabeza*, °á veces con exudacion.

Ojos.—Dolores como si el globo de los ojos fuese muy voluminoso, con presion.—Escozor en los ángulos internos de los ojos.—°Inflamacion de los ojos.—Miopia ó presbiopia.—Se ven chispas.—Pupilas contraidas.

Oidos.—Otalgia con traccion y tirones agudos.—Erupcion pruritosa y que exuda detrás de las orejas.—Dureza de oido.—Sensacion de obturacion en los oidos.—Retintin en los oidos, algunas veces con gana de dormir.

Nariz.—*Excoriacion en el interior de la nariz.*—Disminucion del olfato, con sensacion de sequedad en la nariz, y algunas veces gana inútil de estornudar.—Estornudo frecuente, acompañado de dolor de excoriacion en el pecho.—*Coriza fluente*, con secrecion de mucosidades líquidas y amarillas, excoriacion y sensacion de ardor en la nariz y erupcion en los labios.

Cara.—*Palidez del rostro.—**Presion calambroidea y como con aturdimiento en los huesos de las mejillas*, °algunas veces de un solo lado, que se extiende hasta el ojo, la sien, la oreja, los dientes, el cuello y la espalda.—Tracciones en los huesos de las mandíbulas.—Estremecimiento contínuo y penoso en las mejillas y en los párpados.—Forúnculos en la cara.—Excoriacion y sensacion de ardor en los labios y en las comisuras de estos.—Labios hinchados y grietados, con exfoliacion.—Labio superior ulcerado con dolor quemante al tacto.—Punzadas en las glándulas submaxilares.

Dientes.—**Dolores en los dientes cariados.*—**Punzadas* tractivas, quemantes ó terebrantes, *en los dientes y hasta en los huesos de las mejillas* y de las sienes.—*Dolores con estremecimiento y dislacerantes en los dientes.—*Sensacion como de dentera y de prolongacion de la dentadura.—Las odontalgias se agravan por el tacto y el movimiento, como tambien durante los calofrios y por la tarde.—Durante las odontalgias, *ebullicion* de sangre en la cabeza, calofrios y constipacion.—Dientes cubiertos de mucosidades fétidas.—*Dientes que se carian prontamente.*—Vesículas quemantes en las encías.

Boca y garganta.—Vesículas quemantes en la boca y en la lengua.—*Sensacion de ardor contínuo en la boca.*—

Tartamudez.—Dolor presivo en la garganta al deglutir. —Aspereza, excoriacion, arañamiento con escozor, y punzadas en la garganta y el paladar.—*Sensacion de ardor en la garganta* y en el esófago.—Inflamacion de la garganta.—*Constriccion y estrechez de la faringe.*

Apetito y estómago.—Sabor amargo de la cerveza, la que repugna.—Hambre violenta despues de medio dia. —Repugnancia á la carne.—*Regurgitaciones frecuentes y vacías*, sobre todo despues de haber bebido.—*Náuseas* con acumulacion de agua en la boca, horripilacion y temblor de todo el cuerpo.—Vómitos violentos de mucosidades verdosas y amargas, acompañados de cefalalgia.—*Vómito de sangre.*—*Presion en el estómago.*—Sensacion de ardor y calor en el estómago.—Inflamacion del estómago.—Contraccion del diafragma.

Vientre.—Vientre duro y tirante.—*Dolores abdominales*, crónicos, *calambroideos*, *tirantes*, *agudos*, presivos, constrictivos y lancinantes.—Peso en el vientre.—Sensacion de calor y *de ardor en el vientre.*—Inflamacion de los intestinos.—Presion expansiva en el anillo inguinal.—Traccion en las glándulas de la ingle.—*Cólicos flatulentos* con ruido como de agua y borborigmos en el vientre, *dificultad de la respiracion y calofrios.*

Deposiciones.—Evacuaciones alvinas difíciles, de la consistencia de una papilla espesa, con necesidad urgente de deponer.—*Constipacion.—Deposiciones poco abundantes, blandas, frecuentes.—*Diarreas violentas con dolores insoportables en el vientre.*—Despues de la deposicion, constriccion del ano, que comprime el recto en su caida.—*Antes y despues de la deposicion frio y horripilacion.*

Orinas.—Disminucion de la secrecion urinaria.—Nubes á manera de copos y *sedimento rojizo* en las orinas.—**Hematuria.*—Dolor de excoriacion en la uretra.—Evacuacion de mucosidades por la uretra.

Partes genitales.—Dolores de dislaceracion, estremecimiento y lancinacion en el miembro.—Lancinaciones con dislaceracion, y quemantes en la extremidad del glande.—Secrecion abundante de humor sebáceo debajo de la corona del glande, como una *gonorrea bastarda.*—*Hinchazon del escroto.—**Leucorrea crónica*, como clara de huevo, algunas veces tambien serosa.

Laringe.—*Ronquera* con sensacion de ardor y sequedad

Digitized by

en la garganta, irritacion que provoca la tos, y dificultad de la respiracion.— **Tos violenta estando acostado.*— *Tos seca con vomituricion y vómitos*, por la tarde y por la noche.

Pecho.—Respiracion difícil.—Dolores en el pecho al inspirar, *como si los pulmones estuvieran adheridos* y la cavidad del pecho muy comprimida.—Presion en el pecho.—*Tension dolorosa en los músculos del pecho.*—Dolor de excoriacion y de ardor en el esternon.—*Punzadas en el pecho*, que se agravan inspirando.

Tronco.—Dolores en los riñones.—Dolor contractivo y tensivo en el dorso y hasta el sacro.—Punzadas en el dorso.—Rigidez dolorosa de la nuca y del cuello.—Dislaceraciones periódicas y como tirones en los lados del cuello.—Dolor de excoriacion en las axilas.

Brazos.—Dolor en las articulaciones de las escápulas, como si fueran á dislocarse.—Tension tractiva y reumática en los brazos, con debilidad paralítica.—Dolores con estremecimiento en las espaldas, los brazos, las manos y los dedos.—Hinchazon y calor del brazo y de la mano, con estremecimiento y comezon en los músculos.

Piernas.—Estremecimiento en la articulacion coxo-femoral hasta la rodilla.—**Acortamiento de las piernas.*—Dolores osteócopos en los muslos y en las piernas.—Dolores de dislaceracion, tracciones y tension en los muslos, las piernas, los piés y los dedos.—Tension y rigidez en las rodillas.—Estremecimiento y dolor presivo en la tibia.—Hinchazon dura de las pantorrillas.—Dolor con estremecimiento de los dedos de los piés.

133.—MILLEFOLIUM.

MILL.—Mil hojas.—Hering, *Estudios patogenésicos de la América del Norte.*—*Hist. nat. y prep.* Véase Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 0,30. Medicamento que hasta aquí no habia sido usado sino contra las *hemorragias* y sobre todo algunas especies de *Hematurias* y *hemoptisis* (sobre todo en los tísicos, pero que merece muy bien estar colocado en el rango de nuestros policrestos).

CLINICA.—Examinando los síntomas característicos de este medicamento, se verán los casos en que se le podrá

Digitized by

consultar con buen resultado contra una ú otra de las afecciones siguientes:—Afecciones reumatismales y artríticas, agudas y crónicas; Contracturas; Histeria; Hipocondría; *Convulsiones* de las personas histéricas, de los niños, de las mujeres paridas; *Epilepsias*; Eclampsia.—*Erupciones* pustulosas, escabiformes y otras; *Púrpura hemorrágica;* Várices de las mujeres en cinta; *Ulceras* de toda naturaleza, fistulosas, gangrenosas, atónicas, escorbúticas, cariosas; contusiones; *heridas y llagas*; *consecuencias perniciosas de una caida*; Mordeduras venenosas.—*Fiebres intermitentes*, tercianas, perniciosas, pestilentes.—*Hemorragias* de todas clases; sufrimientos particulares de la vejez y del sexo femenino; *Blenorreas*.—Melancolía; Cefalalgias; Blenorrea de los ojos y lagrimeo; Manchas de la córnea; vista turbia; Otalgias; Odontalgias; Anginas catarrales; — Dispepsias; Cardialgias; *Cólicos de diversas clases*, ventosos, *histéricos*, *hemorroidales*.—*Hematuria*; Arenas y cálculos vesicales; Retencion de orina; *Gonorrea*; Condilomas;—*Reglas demasiado abundantes*; *Metrorragias*; Supresion súbita de las reglas ordinariamente muy abundantes; Aborto inminente; Clorosis; Leucorrea.—Diversos *sufrimientos de las mujeres paridas*, sobre todo afecciones espasmódicas; *loquios demasiado fuertes* ó suprimidos; *Grietas en los pezones*.—Tos y blenorrea de los pulmones; *Hemoptisis y hemorragias pulmonares*; Tísis tuberculosa y otras afecciones pulmonares.

SINTOMAS GENERALES.— Dislaceracion, punzadas en los miembros.—Debilidad y sensacion de malestar, con esperezos.— El uso del café produce congestiones á la cabeza y dolores en los miembros.—°Convulsiones; fáciles sobresaltos con el menor motivo.— Granos; °Cáries de los huesos. °*En muchos casos de lesiones traumáticas tan importante como Arnica* (Jahr).—°Hemorragia.—Fiebre con frio y horripilaciones, calor exterior é interior; calor febril con sed; °fiebres intermitentes.—*Ganas de dormir* con bostezos y esperezos; bostezos violentos; accesos de congestion cerebral, durante el sueño.

Moral y cabeza.—Carácter violento y arrebatado; propension á asustarse.—Confusion y embarazo de la cabeza, con sensacion contínua como si hubiese olvidado al-

guna cosa, no sabe ni lo que hace, ni lo que quiere, con agravacion por la tarde; así como despues de haber tomado vino y café.—Estupor, vértigos, embriaguez; vértigo, que hace caer á la derecha ó hácia atrás, por el mas ligero movimiento, con náuseas al bajarse.—Congestion á la cabeza, con dolor como si estallase el cráneo; trastorno en la cabeza con sensacion de corrientes de fuego; dolores en el occipucio, al despertar solamente; sensacion como si rodease la frente un lazo; °violenta cefalalgia, con sacudidas de los párpados y de los músculos de la frente.—Los *cabellos* se ensortijan frecuentemente y de un modo extraordinario, aunque se les deje cortos.

Ojos.—Oidos.—Nariz.— *Vista* turbia como por una niebla, pero solo en lontananza; ojos brillantes. — *Oidos* como tapados; retintin; sensacion como si humedad ó aire frio saliese por el oido; *dolores del oido sobre todo en el izquierdo.—En la *nariz*, punzadas hácia la raiz, que parten del ojo; **Epistaxis*.

Cara.—Dientes.—Rubicundez de la cara sin calor; color fresco y sonrosado; labios agrietados; úlceras pequeñas en la cara interna del labio inferior.—**Odontalgia*, que parte de la cara; °úlcera en las encías.

Boca.—Garganta.—Sequedad de la boca; estomacace; lengua seca é hinchada; ardor y sensacion de contraccion en la lengua.—Dolor como de cortadura *en el paladar*; °relajamiento de la úvula?.—Dolor en la garganta, durante y fuera del tiempo de la deglucion; dolor en la garganta por la tarde; dolores lancinantes, muy sensibles, que pasan acá y allá á la derecha de la garganta, cerca de la laringe; °úlceras en la garganta?.

Apetito y sufrimientos gástricos.—Sensacion de hambre aumentada, con ruido y escarbamiento en el estómago; *falta de apetito.— Erutos á vacío é hipo.

Estómago.—Sensacion de plenitud en el estómago; estómago como atestado de tierra astringente; calambre del estómago, como si dentro hubiese un líquido que se dirigiese hácia los intestinos y el ano; dolores violentos en la boca del estómago; **gastralgias*; ardor en el estómago.

Vientre.—Dolor, distension y ardor en el *hipocondrio* derecho; °dolor en la region del hígado.—Flatuosidades,

Digitized by

dolores de *vientre* como por flatos encarcelados, borborigmos y retortijones; expulsion frecuente de vientos fétidos.—**Cólicos ventosos*; °cólicos traumáticos, por lesion mecánica del vientre?.—°Ascitis?.—°Hernias encarceladas?.

Defecacion y ano.—Pequeñas cámaras blandas, frecuentes; °disenterías; °diarreas mucosas; flujo celíaco; lientería?.—**Hemorróides* que *dan sangre*, hinchadas, dolorosas; °*hemorragias intestinales*, sobre todo á consecuencia de un esfuerzo.—Lombrices?.

Orinas.—Gana frecuente de orinar, con emision abundante; orinas rojas y abundantes.—°Incontinencia de orina?.—**Hematurias.*—°Catarro de la vejiga?.—°Arenas, cálculos vesicales y disuria, que proviene de estas causas?.

Partes viriles.—°Gonorrea?.—Retencion del esperma en el cóito.—°Condilomas?.—°Hinchazon é induracion de los testículos?.

Reglas y partes de la mujer.—Reglas demasiado abundantes; irregularidad de los ménstruos, ya débiles, ya fuertes; **metrorragias*; °sufrimientos por consecuencia de la supresion de las reglas?.—*Leucorrea.—°Esterilidad con reglas demasiado abundantes?; °abortos inminentes?.—°Convulsiones y otros sufrimientos de las mujeres paridas; °loquios demasiado abundantes.—°Grietas en los picos?.—°Carencia de leche con loquios suprimidos y fiebre?.

Laringe y pecho.—**Tos*: °con expectoracion espumosa; con vómito; **hemoptisis*, °por consecuencia de una caida ó un golpe sobre el pecho, °en las personas tísicas.—°Blenorrea de los pulmones; °tísis tuberculosas?.—**Disnea*; padecimientos asmáticos.—Punzadas en el pecho.

Tronco y miembros.—Dolor en la region del riñon izquierdo, seguido de miccion sanguínea.—*Dolores en los brazos; presion lancinante en el derecho; entorpecimiento, picotazo y dolores (osteócopos?) en el derecho; brazo derecho como paralizado.—Dolores por cima de la articulacion de la *mano* izquierda; dolor presivo, pulsativo, en los huesos del metacarpo; dolor como de un *absceso* bajo la uña del pulgar.—Dolor de *contusion como á consecuencia de una caida*, en la nalga derecha y en el tendon de Aquiles y en el jarrete; dolores violentos, co-

mo osteócopos, en el pié derecho; hormigueo y entorpecimiento en los piés.

134.—MOSCHUS.

MOSCH.—Almizcle.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dosis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* 24 horas próximamente.

ANTÍDOTOS: Camph. n-vom?

COMPÁRESE CON: Asa. bry. cocc. coff. *con.* croc. ign. n-mos. op. puls. spig. staph. stram.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá que los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—*Convulsiones*; Síncope; *Debilidad histérica*; *Diferentes afecciones histéricas* é hipocondríacas; Sobreexcitacion nerviosa con insomnio; *Cefalalgias histéricas* y nerviosas; Jaqueca; Epistaxis; Impotencia?; *Padecimientos asmáticos*; Asma de Millar?; Crup?; *Espasmos pulmonares, sobre todo en las personas histéricas*, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Picazon en los miembros algunas veces con dolor en las partes afectas.—Dolores calambroídeos en los miembros.—Temblor y estremecimiento por todo el cuerpo.—Debilidad que se hace mas sensible durante el reposo que en el movimiento.—°Debilidad hasta el punto de hacer caer desvanecido, con frialdad nocturna de toda la piel.—°*Accesos de desfallecimiento*, sobre todo por la noche, por la tarde, ó al aire libre; seguidos de dolores de cabeza.—Dolor de luxacion y de quebrantamiento en la parte sobre que está echado.—Los padecimientos se agravan cuando el cuerpo se enfria.—Mucha susceptibilidad al aire libre.—Pellizcos, punzadas y prurito que obliga á rascarse en diferentes partes del cuerpo.—*Tétanos.*—°*Convulsiones con calambres de pecho.*—*Síntomas histéricos*, aun en los hombres.

Sueño.—*Mucha propension á dormir de dia* con bostezos frecuentes y profundos.—*Soñolencia.*—Por la noche imposibilidad de permanecer mucho tiempo echado en

una misma posicion ; la parte sobre que descansa duele como si se hallara luxada ó quebrantada.—Ensueños vivos de cosas infamantes, y en los cuales nada se prueba. —**Insomnio toda la noche*, por sobreexcitacion del sistema nervioso.

Fiebre.— La circulacion de la sangre acelerada.— Sensacion frecuente como si soplase un aire fresco, sobre todo en las partes descubiertas.—Sensacion de frio por lo regular en la columna vertebral, con dolores tractivos.— Al aire libre se siente *frio*, y se apetece estar cerca del fuego.— Horripilacion frecuente y ligera, la que partiendo de la cabeza, se extiende por todo el cuerpo.— Accesos de calor quemante por la tarde.—*Sudor todas las mañanas.*

Moral.—Mucha distraccion y falta de espíritu, á veces con palabras confusas.— Preocupacion, durante la cual se habla consigo mismo, y se gesticula, como si hubiese perdido la cabeza.—Suma actividad con debilidad hasta el punto que hace dejar caer todo de las manos.—*Quejas y lamentos á causa de sus excesivos padecimientos, sin que el enfermo pueda decir cuáles son estos*; cuando se le pregunta sobre esto, se queja con mas vehemencia, pero siempre sin decir qué le duele.— *Excesivo temor de morir.*—Ansiedad hipocondríaca, algunas veces con palpitaciones de corazon.—*Humor excesivamente querelloso y grande excitabilidad con arrebatos que rayan en furor.*— Pérdida de la memoria.

Cabeza. — Vértigos y vacilacion con desvanecimiento de la vista al menor movimiento de cabeza.— Vértigo hasta el punto de hacer perder el conocimiento, ó con desvanecimiento.— Vértigo con sensacion como si se diese una caida.— *Vértigo con náuseas y vómitos*, con necesidad de echarse y deseo de café y de agua.— *Aturdimiento* como por embriaguez.— *Cefalalgia con náuseas y vómitos* que obligan á acostarse.—Pesadez de la cabeza. —*Dolor de cabeza compresivo* y con aturdimiento, sobre todo por encima de la raiz de la nariz.—**Traccion calambroidea y tensiva en la cabeza*, y sobre todo en el occipucio y hasta en la nuca.— *Congestion á la cabeza.*— Dolor presivo y con terebracion en la cabeza, como si hubiera un clavo introducido en el cerebro.

Ojos.—Ojos empañados con dolor presivo en los ángulos.

Digitized by Google

—Lagrimeo.—Ojos fijos, centelleantes, con una especie de aturdimiento y falta de espíritu.—Oscurecimiento rápido de la vista.—Pequeños granos rojos en los párpados superiores.—Prurito en los ángulos de los ojos.

Oídos.—Erupcion en las orejas, con dolor quemante despues de haberse rascado.—Crepitacion y *crujido en los oidos.*—Ruido en los oidos.—Dureza de oido.—Secrecion de cerúmen.

Cara y nariz.—*Calor en la cara*, algunas veces sin rubicundez y con ojos empañados.—Calor de una mejilla sin rubicundez, mientras que la otra está roja sin calor.—Color térreo del rostro.—Tension en los músculos de la cara, como si estos estuviesen muy cortos.—**Epistaxis.*—Hormigueo en la punta de la nariz, como si hubiera insectos.—Exfoliacion de los labios.

Estómago.—Sabor pútrido de los alimentos.—Regurgitaciones violentas, algunas veces con náuseas.—*Súbitos accesos de náuseas.*—Náuseas que suben del epigastrio con retraccion del ombligo y dolores calambroídeos.—*Vómitos violentos sobre todo por la mañana* y que van frecuentemente acompañados de dolor de estómago, de pecho y de timpanitis.—*Presion en el estómago,*—*Sensacion de plenitud y de dificultad opresiva en la region del estómago y del epigastrio*, algunas veces con malestar, aumentado despues de haber comido regularmente.—Sensacion de excoriacion, con escozor, quemante, en la region del estómago, despues de la comida.

Vientre.—Accesos de *contraccion dolorosa en la region umbilical*, con suspension de la respiracion.—*Sensacion de tension en el vientre, como si los vestidos estuviesen demasiado estrechos,* acompañada de una angustia que no deja entregarse á ningun trabajo, ni permanecer en un mismo sitio, sino que obliga á andar de prisa constantemente de un punto á otro.—Meteorismo.

Deposiciones.—*Constipacion, sobre todo despues de haber tomado café.*—*Diarrea particularmente toda la noche*, y algunas veces durante el sueño.—Diarrea con dolores cólicos violentos.—Las deposiciones diarréicas van siempre mezcladas de materias fecales.—Deposiciones de color de sepia.—Conato urgente é inútil de deponer.

Partes viriles.—*Fuerte exaltacion del apetito venéreo*, algunas veces con cosquilleo insoportable en las partes

Digitized by Google

sexuales y dolores tensivos en el miembro.— °Impotencia á consecuencia de un enfriamiento.—Poluciones dolorosas sin ereccion.— Ereccion con dolor quemante en la uretra.— Despues del cóito, náuseas y vómitos.

Reglas.— *Menstruacion muy adelantada y muy abundante.* —Traccion y sensacion como si todo se dirigiese hácia el bajo vientre y partes genitales, durante las reglas.

Pecho.— *Constriccion en la laringe, como por el vapor de azufre.*— Respiracion difícil y corta con punzadas en el pecho.— *Constriccion calambroidea y con sofocacion del pecho*, sobre todo cuando se coge frio.— **Calambres en el pecho*, °que algunas veces principian por una necesidad de toser, y se agravan en seguida hasta hacerle á uno desesperar.— Dolor presivo en el pecho, hasta el punto de hacer suspender la respiracion.— *Punzadas en el pecho y en los costados*, algunas veces con rubicundez y abotagamiento de la cara, pupilas dilatadas, lengua encendida y seca, y sed ardiente.— El pecho se halla fuertemente atacado y dolorido en todas sus partes, con tos violenta y seca.— Sensibilidad dolorosa del pecho, debajo de los brazos, sobre todo á la presion.— Palpitaciones de corazon con angustia.

Tronco y miembros.— Tracciones violentas en la nuca y en el dorso, como si estas partes estuvieran muy tirantes.— Traccion en toda la extension de los brazos y sobre todo en las muñecas como por un calambre.— Sensacion de ardor y de frio en las últimas falanges de los dedos.— Hinchazon de las manos, con dolores lancinantes.— Movimientos convulsivos de las manos y de los dedos.— Inquietudes en las piernas, con debilidad paralítica que obliga á moverlas contínuamente.— Vibracion en las piernas, como despues de una gran fatiga, estando sentado.— Debilidad paralítica de las piernas, en cuanto uno se sienta, despues de haber andado.

135.—MUREX PURPUREA.

MUR. — Púrpura antigua. Múrice de púrpura. — PETROZ. — *Journal de Méd homœop.—Hist. nat. y prep.*, Farmacop. homeop.

SINTOMAS GENERALES.—Excesiva fatiga; durante muchos dias, *los sintomas son mas fuertes estando sentado* que andando; cesan cuando se anda, y aparecen cuando se está sentado.—*Piel* seca, como si fuera á agrietarse.—*Gana de dormir*, algunas veces con tristeza; mucha necesidad de dormir hácia las 9 de la noche; sueño interrumpido por dolores, como los precursores de las reglas; se despierta espantado, con fuerte necesidad de orinar, y emision abundante; *ensueños penosos*, despertando á veces con sobresalto.—*Moral* con carácter angustioso, tímido, perezoso; mucha tristeza por la tarde, con repugnancia á la conversacion, y confusion de ideas.

Cabeza.—Nariz.—Debilidad de la *memoria* con dificultad de hallar expresiones.—*Turbacion en la cabeza con inaptitud al trabajo*; algunas veces con deseo de dormir, ó pesadez en la cabeza; cabeza pesada, como por un tiempo cálido, ó bien frecuente, alternando de tiempo en tiempo con ideas muy claras; *cefalalgia*, por la mañana al despertar, que se disipa cuando se levanta; *dolor en el occipucio*, algunas veces muy vivo; dolor en la sien izquierda; *dolor presivo* en la frente, ó bien en la sien derecha; apretamiento calambroídeo en la parte posterior de la cabeza, con necesidad de llevar la mano á aquel punto, el que se alivia inclinándola hácia atrás.—Apretamiento calambroídeo detrás de las *orejas*, ruido en los oidos con agravacion de la pesadez de cabeza.—Frialdad muy penosa en la *nariz*, todo el dia.—*Sensacion de ardor en la mejilla*, en la derecha por la tarde, y en la izquierda por la mañana.

Estómago.—Deposiciones.—*Hambre*, algunas veces tan solo por la mañana, y completamente nula durante la comida.—Dolor tensivo en el *hipocondrio* derecho.—*Cólicos*, dolor vivo como una punzada aguda en el lado izquierdo del bajo vientre, el cual está dolorido durante toda la tarde.—*Deposiciones* difíciles; *constipacion* que dura mas de cinco dias; presion en el ano, como por punzadas dolorosas.

Vias urinarias.—*Frecuente necesidad de orinar* por el dia; por la noche orina sin color.—*Orina* fétida, con sedimento blanco, y flujo mucoso despues de haber orinado.—Hematuria al orinar.

Digitized by Google

Partes genitales (en la mujer).—*Fuerte irritacion de las partes genitales* con deseo ardiente del cóito, casi hasta la locura; el mas ligero contacto renueva el deseo.—En la *matriz*, sensacion de sequedad y de constriccion; pulsacion, dolor incisivo, como por instrumentos cortantes, dolor violento en el lado derecho, que atraviesa el vientre y hasta la mama izquierda; violenta punzada en el lado izquierdo por la tarde.—En los *grandes labios*, sensacion de peso y extension; sensacion de peso en la vagina durante los dolores de vientre.—*Leucorrea* serosa, verdosa, espesa; leucorrea que se hace sanguinolenta, durante la deposicion; reaparicion de una leucorrea sanguinolenta.—En los *pechos* dolores violentos; punzadas agudas.

Laringe.—Pecho.—*Voz* alterada, ronca; *tos* por la mañana en ayunas; tos seca, rara, con opresion de pecho.—*Al respirar* silbido en el pecho por la tarde.—*Dolor en el pecho*, como si este estuviera contundido; punzadas y sensacion de ardor debajo de la primera y segunda costillas izquierdas hasta el dorso.—*Palpitaciones de corazon* y latidos de las arterias.

Tronco.—Extremidades.—*Lumbago*, algunas veces quemante y muy vivo; en estando extendido en la cama, sobre todo por la noche; dolores en las caderas y regiones lumbares; dolores en los órganos de la pequeña pélvis.—*En el antebrazo*, dolor debajo del codo; calor en las *manos*.—*En las piernas mucha debilidad y fatiga*, que se doblan algunas veces con necesidad insuperable de sentarse.—En los *muslos*, fuerte dolor de contusion; calor ardiente en su parte anterior; dolor agudo en el mismo sitio al levantarse, agravado á todo contacto; sensacion de pulsacion en el mismo punto.

136.—MURIATIS ACIDUM.

MUR-AC.—Acido muriático ó hidroclórico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas*: 3, 30.—*Duracion de accion*: hasta 3 semanas en algunas enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. bry.

COMPÁRESE CON: Ars. aur. bell. bry. calc. chin. *lyc.* natr-m. nitr-ac. n vom. phos-ac. puls. rhus, squill.

Digitized by

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones hidrópicas?; Erupciones, herpes y otras afecciones escrofulosas; Fiebres tifoídeas, pútridas; Sordera; Afecciones escorbúticas; Embriaguez?; Hemorróides; Impotencia, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores dislacerantes é incisivos en los miembros, *durante el reposo*, los que se mejoran durante el movimiento.—Dolores de quebrantamiento en todas las articulaciones.—Sensibilidad dolorosa del periostio de todos los huesos, como en una fiebre intermitente.—Hidropesía.—Pereza y temor al movimiento con deseo de estar constantemente sentado.—*Excesiva postracion*; en el momento de sentarse uno se le cierran los párpados.—Vacila al andar por debilidad de la rodilla.—°Mucha sensibilidad en tiempo húmedo.

Piel.—Prurito y cosquilleo voluptuoso y lancinante, con necesidad de rascarse.—*Erupciones costrosas* que pican con el calor de la cama.—Forúnculos con dolor lancinante al tacto.—*Ulceras pútridas* y dolorosas con sensacion de ardor en los bordes.—Pústulas negras.

Sueño.—*Mucha gana de dormir por el dia*, que se disipa desde que uno empieza á hacer ejercicio.—Insomnio antes de media noche.—Ronquido contínuo antes de media noche, y *gemidos*, agitacion, palabras y *disposicion á deslizarse de la cama.—Se despierta frecuentemente y muy temprano* á causa del frio que siente en la cama.

Fiebre.—Predominio de frio.—*Despeluzamiento*, con bostezos y pandiculaciones, *sin sed*, y no seguido de calor.—*Calor sin sed*, con anhelacion y necesidad de descubrirse al principio de la noche.—Pulso intermitente.—*Sudor nocturno* al dormirse á primera hora de la noche ó antes de media noche.

Moral.—Tristeza.—*Taciturnidad y concentracion en si mismo, con ansiedad, aprensiones* y terquedad.—°Perplejidad é inquietud.—Afluencia de ideas sobre acontecimientos recientes durante algun trabajo corporal.—Disposicion á enfadarse y á encolerizarse.

Cabeza.—Vértigo rotatorio, con paso vacilante.—Cefa-

Digitized by

lalgia andando al aire libre, y sobre todo por un viento áspero.—Dolor de cabeza agravado al incorporarse en la cama y tambien al mover los ojos, el que se disipa por un ejercicio corporal.—*Pesadez* sobre todo *en el occipucio*, con oscurecimiento de la vista, la que se agrava mucho mirando fijamente un objeto.—Dolor de cabeza, *como si el cerebro estuviera contundido*.—Accesos de sacudidas, dolores de dislaceracion ó *punzadas en la cabeza*.

Ojos.—Escozor pruritoso en los ángulos de los ojos.—Punzadas á través de los ojos.—Hinchazon y rubicundez de los párpados.—*Hemiopia vertical.

Oidos.—Otalgia con tirones calambroídeos y agudos.—*Pulsacion en los oidos.—*Insensibilidad del conducto auditivo.—Erupcion costrosa en las orejas.—**Dureza de oido* y sordera.—Finura del oido, con sensibilidad al ruido.—Retintin, zumbido y silbido en los oidos.

Nariz.—Ventanillas de la nariz ulceradas.—Obturacion de la nariz.—Coriza con mucosidades espesas, amarillas ó serosas y corrosivas.

Cara.—Calor del rostro, con rubicundez ardiente de las mejillas, andando al aire libre, sin sed.—**Efélides*.—**Erupcion de granos costrosos en la cara*, en la frente y en las sienes.—Forúnculos en la sien.—Sensacion de ardor en los labios.—Tumefaccion del labio inferior.—*Erupciones en los labios*, que á veces se cubren de costras.

Dientes.—*Odontalgia*, con dolor pulsativo, *agravada en bebiendo un líquido frio*, aliviada por el calor.—Odontalgia con presion desgarradora.—Hormigueo en los dientes.—*Escorbuto en las encias*.

Boca y Garganta.—*Sequedad de la boca*, con parálisis de la lengua.—Acumulacion abundante de saliva.—*Pesadez de la lengua al hablar*, como si fuera plomo.—Ulceras profundas y pústulas en la lengua.—Sequedad de la lengua.—*Irritacion de la garganta con dolor de excoriacion y escozor en este órgano y en el paladar.

Apetito.—Sabor de grasa rancia en la garganta.—Gusto ácre y pútrido en la garganta.—Sabor insípido de todos los alimentos, y sobre todo de la cerveza, la que repugna.—*Bulimia y sed inmoderada.—**Aversion* á la carne.

Estómago.—**Erutos* pútridos ó amargos.—Vómito de los alimentos.—Vómito de bílis por la noche, con náuseas y erutos.—Malestar en el estómago, como si se estuviera

Digitized by

gravemente enfermo.—*Sensacion de vacuidad en el estómago.*—Dolor contractivo en el estómago, con sensacion como si estuviera retraido.—Tension presiva y *dolor calambroideo en los hipocondrios.*

Vientre.—Incomodidad en el vientre, como en una grave enfermedad.—*Plenitud y *timpanitis.*—**Dolores calambroideos en el vientre*, con retortijones y pellizcos desde la region umbilical hasta las costillas, acompañados de borborigmos.—*Sensacion de vacuidad en el vientre.*—Lancinacion en las ingles.

Deposiciones.—Evacuacion difícil, como por inactividad del recto.—Deposiciones de un excremento muy delgado.—Diarrea con escozor y sensacion de ardor en el recto y en el ano.—*Diarreas.*—Evacuacion involuntaria de una deposicion líquida y serosa orinando.—*Flujo de sangre durante las deposiciones.*—Prolapsus del recto al orinar.—Prurito en el ano.—**Granos hemorroidales*, *hinchados* y azulados, con dolor quemante de excoriacion.—*Hemorróides húmedas.*—°*Salida dolorosa y penosa de gruesos granos hemorroidales á cada deposicion.*

Orinas.—Tenesmo de la vejiga.—*Conato urgente de orinar, con emision abundante.*—Emision inmoderada de una orina acuosa.—*Relajacion de la vejiga y del cuello de esta.*

Partes genitales.—Excoriacion del prepucio.—Apetito venéreo adormecido.—**Impotencia.*—Sensacion como si todo afluyese hácia las partes genitales, como cuando van á presentarse las reglas.—Reglas muy adelantadas.

Laringe.—*Ronquera crónica.*—Tos violenta y con sollozos, seguida de ruido como el del agua, en el fondo del pecho.

Pecho.—Respiracion profunda con gemidos.—Punzadas en el pecho durante un movimiento violento y al respirar.—Dolor tensivo en el esternon.—Punzadas incisivas en el pecho, con presion sorda en su parte posterior, y con opresion.—Punzadas en la region del corazon.—Por la noche, *punzadas tan violentas en el corazon*, que se sienten en la cara.

Tronco.—*Dolor presivo en el dorso*, como si hubiera estado mucho tiempo encorvado ó hubiese sufrido una derrengadura.—Punzadas en los omóplatos.—Diviesos en el dorso.

Brazos.—Debilidad paralítica y dolor de luxacion en el

Digitized by Google

hombro.—*Pesadez de los brazos.*—*Dolor de dislaceracion, presion y *tirones en los brazos.*—Tension tractiva en la articulacion del codo.—Tracciones calambroídeas y pesadez de los antebrazos.—Dolores dislacerantes incisivos en los antebrazos, las manos y los dedos.—Prurito y cosquilleo voluptuoso y lancinante en la palma de las manos.—*Erupcion* costrosa *en el dorso de la mano y en la parte superior de los dedos.*—Dolor calambroídeo en la parte carnosa del pulgar, escribiendo.—Hinchazon en las puntas de los dedos con sensacion de ardor.—Torpeza nocturna y palidez de los dedos, que están como muertos.

Piernas.—Dolores de dislaceracion y tiron calambroídeo en los muslos.—Manchas herpéticas pruritosas en los muslos.—Hinchazon en las rodillas.—Tension tractiva en la pantorrilla y en el tendon de Aquiles al andar.—Lancinaciones en el tendon de Aquiles dia y noche, que imposibilitan el andar y dormir.—Ulceras pútridas en las piernas.—*Frio en los piés.—Hinchazon en la extremidad de los dedos con sensacion de ardor.

137.—NATRUM CARBONICUM.

NATR.—Subcarbonato de sosa.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeopática.—*Dósis usadas:* 12, 30.—*Duracion de accion*: hasta 40 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Ars.? Camph. nitr.-spir.?—*Se emplea como a tído o de* Chin.

COMPÁRESE CON: *Arn. ars.* carb-an. *carb-veg.* caus. *chin.* ign. kal. lyc. *merc. natr-m. n-vom.* plumb. *puls.* sabad. sep. spig. staph. sulf.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Padecimientos reumáticos con acortamiento de los tendones; Afecciones escrofulosas; Glándulas infartadas; Debilidad por pérdida de humores ú otras causas debilitantes; Tabes dorsal?; *Herpes*; Verrugas; Erupciones sarnosas; Padecimientos de los leprosos; Padecimientos de los borrachos?; Melancolía é *hipocondría.*—Malas consecuencias de un exceso en el estudio?; *Oftalmías crónicas*; Ulceras de la córnea; Fístula lagrimal?; Amblio-

pia amaurótica; Presbiopia; Coriza crónica; Ozena?; Balbuceo; *Dispepsia*, gastralgia y otras *afecciones gástricas*; *Hepatitis crónica*; Cólicos flatulentos; Orquitis?; *Priapismo?*; Esterilidad?; Dismenorrea; Leucorreas; Catarro; Padecimientos tísicos; Enfermedades del corazon?; *Bócio*, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores de dislaceracion calambroídeos, principalmente en los brazos y en las piernas.—Traccion paralítica y dislaceracion en las articulaciones, sobre todo por la tarde y por la noche.—*Acortamiento de los tendones.*—*Estremecimientos en los miembros*, las articulaciones y *en los músculos.*—*Lancinaciones con hormigueo en los músculos.—**Mucha disposicion á luxaciones y á derrengaduras.*—Hinchazon de las glándulas.—Exacerbacion de los síntomas durante una tempestad.—La mayor parte de los síntomas se manifiestan estando sentado y se disipan por el movimiento, la presion y tambien por el frote.—**Durante los dolores, angustia, temblor y sudor.*— Por la tarde mucha agitacion general en todo el cuerpo.—Excesiva sensibilidad morbosa, con temblor, solo al tocar el piano.—**Relajacion y falta de firmeza en todo el cuerpo.*—Vacila al andar.—Torpeza y pereza, sobre todo por la mañana, con temor al movimiento.—Quebrantamiento paralítico *por la mañana* y *mucha laxitud en los miembros.*—*Despues de un paseo moderado, laxitud hasta dejarse caer.—**Debilidad prolongada.*—Demacracion con semblante pálido, pupilas dilatadas y orina oscura.—Repugnancia al aire libre.—**Mucha disposicion á resfriarse, seguida de coriza* ó de cólicos con diarrea.

Piel.—*Sequedad de la piel con *sudor abundante por el menor ejercicio ó el mas ligero trabajo.*—Hormigueo debajo de la piel.—Sarna.—*Erupcion herpética.—Los herpes se extienden y supuran.—°Círculos amarillos, como restos de manchas herpéticas.—°Tuberosidades leprosas.—**Verrugas.*—°Punzadas, dolores incisivos y sensacion de ardor en las partes heridas.—°Erupciones sarnosas (en el vientre, en los leprosos).

Sueño.—**Propension al sueño, irresistible por el dia, con sueño tardo por la noche*, y dificultad de despertarse por la

Digitized by

mañana.—**Sueño agitado y lleno de ensueños vivos*, y algunas veces confusos y lascivos, con violentas erecciones y poluciones.—Ensueños penosos que despues de despierto parece que son verdaderos.—Ensueños horribles de muertos, de inundaciones, de pendencias, de malhechores, de diablos, de ladrones, etc.—Ensueños de viajes.—Por la noche mucha agitacion en el cuerpo, ebullicion de sangre, palpitaciones de corazon y pesadilla, odontalgia, cólicos, vértigos con angustia, etc.—*Estremecimientos y sacudidas durante el sueño.*—Despierta muy temprano.

Fiebre.—Horripilacion febril con manos frias y mejillas calientes, y *vice-versa*; pero siempre sin sed.—*Frio en las manos y en los piés.—*Sudor nocturno* que alterna frecuentemente con *sequedad de la piel.*—*Sudor frio y continuo*, como por angustia.—*Sudor abundante al menor trabajo.

Moral.—Tristeza y decaimiento con llantos é inquietud sobre el porvenir.—**Inquietud* con accesos de *angustia*, ¯sobre todo durante una tempestad, y trabajos intelectuales.—**Aversion á la sociedad.*—*Humor hipocondriaco y disgusto á la vida.—°Desaliento.—*Disposicion á asustarse.—°Despecho y malevolencia.—Disposicion á enfadarse y violentos accesos de cólera.—*Dificultad para concebir y combinar las ideas cuando se lee ó escucha.—**Inaptitud al trabajo intelectual y á la meditacion que fatiga la cabeza.*—Instabilidad de la imaginacion.

Cabeza.—**Turbacion de la cabeza*, ¯sobre todo en la habitacion y durante el reposo.—*Vértigo*, ¯sobre todo despues de haber bebido vino y despues de un trabajo intelectual.—**Cefalalgia estando al sol*, ó cuando se vuelve prontamente la cabeza.—Sensacion de obturacion presiva en la cabeza, como si la frente fuera á estallar.—Cefalalgia presiva, con náuseas, eructos y oscurecimiento de la vista.—Dolor de dislaceracion calambroídeo en la frente hasta los ojos y la punta de la nariz.—*Cefalalgia con punzadas, °algunas veces á través de los ojos.—Sacudidas á través de la cabeza.—Cefalalgia pulsativa en el vértice todas las mañanas.—Congestion y calor en la cabeza.—*Dolor de dislaceracion al exterior del vértice de la cabeza todos los dias á una hora fija.

Ojos.—Sensacion de ardor en los ojos, sobre todo leyendo

Digitized by Google

ó escribiendo.—*Lancinaciones á través de los ojos.*—**Inflamacion de los ojos y de los párpados, con fotofobia.*—Hinchazon de los párpados.—*Ulceras en la córnea.—Abscesos en la glándula lagrimal.—Caida frecuente de los párpados, con dificultad para abrirlos.—Turbacion de la vista con puntos negros que revolotean delante y chispas que deslumbran y cansan los ojos.—**Imposibilidad de leer caractéres pequeños*, como por presbiopia.—*Como pelusilla delante de los ojos.—Pupilas dilatadas.

Oidos.—Punzadas en los oidos.—*Mucha susceptibilidad al ruido.—Sensacion de sordera como por obturacion de los oidos.—**Dureza de oido.*—Retintin, música, zumbido, ruido confuso y pulsacion en los oidos.

Nariz.—Excesiva sensibilidad de la nariz.—Descamacion del dorso y de la punta de la nariz.—Ulceracion en el fondo de las ventanillas de la nariz.—Obturacion de la nariz, algunas veces con expulsion de trozos ó grumos de mocos duros y fétidos.—°Coriza cada dos dias.—**Coriza continua, y tos provocada* por un enfriamiento y *la mas ligera corriente de aire*, la que se disipa solamente despues de haber traspirado.—Mucosidados espesas, verdes ó amarillas en la nariz.

Cara.—°*Calor de la cara.*—Abotagamiento de la cara.—Hinchazon y rubicundez de las mejillas.—Encendimiento y calor quemante con mucha palidez de la cara y ojeras.—Cara alternativamente pálida y roja.—°*Efélides en la cara.*—Erupcion pruritosa, y húmeda en la nariz y en la boca.—°*Manchas amarillas en la frente y en el labio superior.*—Color amarillento de la cara.—°Hinchazon de los labios.—Erupciones, herpes y úlceras alrededor de la boca y en los labios.—Infarto de las glándulas submaxilares.

Dientes.—**Odontalgia*, ¯con dolor como si escarbaran, terebrante, sobre todo despues y *durante la comida*, y particularmente despues de haber comido dulces ó frutas.—Odontalgia presiva por la noche, con hinchazon del labio inferior y de las encías.—Mucha sensibilidad en los dientes inferiores.

Boca y garganta.—Vesículas en la boca y úlceras lisas con sensacion de ardor.—Tartamudez á causa de la torpeza de la lengua.—Aspereza, arañamiento y sequedad

de la garganta y el paladar.— Acumulacion de mucosidades en la garganta.

Apetito.—**Amargor de boca.*—Sabor ácido en la boca con la lengua cubierta de una capa espesa.—**Mucha sed y malestar despues de haber bebido alguna cosa fria.*—**Hambre* violenta, *devoradora*, sobre todo por la mañana, que principia por una sensacion de desfallecimiento y de vacuidad.—Glotonería.—Repugnancia á la leche y diarrea despues de haberla tomado.—**Mucha debilidad de la digestion, con humor hipocondriaco, despues de la comida*, ó á la menor falta de régimen.—Despues de la comida, timpanitis, pesadez y presion en el estómago y epigastrio.—°*Padecimientos por el uso del vino.*

Estómago.—Eructos frecuentes, durante y despues de la comida.—Regurgitaciones dolorosas.—*Sensacion de *desfallecimiento en el estómago, y náuseas continuas.*—Hipo frecuente, sobre todo despues de la comida.—Pirosis y arañamiento en la garganta, sobre todo despues de tomar alimentos grasos.—**Presion en el estómago*, sobre todo, *despues de la comida.*—*Sensibilidad dolorosa en la region del estómago y del epigastrio al tacto, y cuando se habla.—*Dolores de estómago, tractivos, presivos é incisivos.—*Calambres de estómago contractivos.—Sensacion de vacío en el estómago con náuseas.—Meteorismo en el estómago y epigastrio.

Vientre.—Dolores en los hipocondrios.—**Lancinaciones en el hipocondrio izquierdo*, algunas veces despues de haber bebido frio.—*Lancinaciones en la region hepática.*—Dolores de vientre por la mañana despues de despertar.—*Vientre abultado y timpanítico.—Dolores de vientre nocturnos, con tension en la parte superior y diarrea.—Cólico con retraccion del ombligo y dureza de los tegumentos del vientre.—*Punzadas y como si escarbaran en el vientre.—*Punzadas y tracciones en los lados del vientre.—Hinchazon de las glándulas inguinales.—**Acumulacion, retencion y movimientos dolorosos de gases en el vientre.*—Expulsion abundante de gases de un olor ágrio ó fétido.

Deposiciones.—**Conato urgente de deponer*, sin resultado, ó *seguido de una evacuacion poco abundante é *insuficiente.*—Deposicion dura, difícil.—Deposiciones blandas ó líquidas, con conato excesivo y urgente, y tenesmo.—De-

Digitized by Google

posiciones diarréicas, amarillas.—Diarrea con retortijones despues de un enfriamiento, ó despues de haber tomado leche.—*Deposiciones sanguinolentas.*—Expulsion de ténia en una evacuacion.—Durante y despues de la deposicion, sensacion de ardor y dolores incisivos en el ano y en el recto.—Prurito y hormigueo en el ano.—Lancinaciones en el periné.

Orinas.—*Conato frecuente y urgente de orinar* dia y noche, *con flujo* poco abundante ó *inmoderado.*—Se orina en la cama.—Orina de un amarillo vivo, de olor acídulo, ó fétida y turbia, con sedimento mucoso.—*Despues y *durante la emision de las orinas*, *sensacion de ardor en la uretra.*—Estremecimientos, tirones agudos y escozor en la uretra.—Orinas de un color oscuro.

Partes viriles.—Dolor de contusion en los testículos.—Pesadez y traccion presiva en los testículos.—Excoriacion en el escroto.—Secrecion detrás del glande, como una gonorrea bastarda.—Inflamacion, hinchazon y excoriacion fácil del glande y del prepucio.—*Exaltacion del apetito venéreo*, casi como *priapismo*, con poluciones y erecciones contínuas y dolorosas.—Evacuacion de licor prostático al orinar y en el acto de una deposicion difícil.—Despues del cóito, mucha disposicion á traspirar.

Reglas.—*Presion como si todo se dirigiese hácia las partes genitales.*—*Reglas anticipadas, ~con dolores de cabeza, de *riñones y de vientre.*—°Metrorragia.—La concepcion parece ser favorecida por este medicamento.—°Deformidad del cuello de la matriz.—Excoriacion de la vulva entre los muslos.—°Despues del cóito, flujo de mucosidades por la vagina.—**Leucorrea* abundante, espesa y amarillenta, °ó fétida, ~algunas veces precedida de retortijones.

Laringe.—*Ronquera* y aspereza en el pecho, con coriza, calofrio febril, tos como si escarbaran, y dolorosa.—*Catarro contínuo con coriza, y tos excitada por la menor corriente de aire, ó el mas ligero enfriamiento, no disipándose sino por la traspiracion.—Tos provocada por un cosquilleo en la garganta.—Tos violenta y seca, y cuando se pasa del frio al calor.—**Tos* con *expectoracion de un sabor salado, ó de un pus verdoso* y fétido.—Expectoracion de pequeños grumos con estertor mucoso en el pecho.—Tos con expectoracion de sangre.

Pecho.—**Respiracion corta*, algunas veces con *dificultad.* —*Disnea.—Al respirar tension en el pecho.—Presion en el pecho.—*Punzadas en el pecho y en los costados de este.—°Frio contínuo en el costado izquierdo.—**Violenta palpitacion del corazon* y ansiedad, ¯sobre todo subiendo una escalera, ó por la noche, estando echado sobre el costado izquierdo.

Tronco.—*Dolor de excoriacion en los riñones.—Lancinaciones en los riñones estando sentado.—Traccion y tension calambroídea en el dorso y en la nuca.—Hormigueo en el dorso.—*Rigidez de la nuca.—Hinchazon de las glándulas del cuello.—*Induracion de la glándula tiróides.*

Brazos.—*Presion en las espaldas.—Traccion y *dislaceracion en las espaldas*, los brazos y los codos, *con laxitud* en estas partes.—Peso, rigidez y dolores en los brazos hasta el punto de no poderlos levantar.—Sensacion de estremecimiento y estremecimiento real en los brazos, las manos y los dedos, sobre todo al coger algun objeto.—Tension tractiva en los antebrazos y en las manos.—Verrugas en los brazos.—°Dolores incisivos en las manos.—Dislaceracion y terebracion en los huesos del metacarpo, sobre todo por la tarde y por la mañana en la cama.—Sensacion de ardor en las articulaciones de las manos por la tarde.—Temblor en las manos.—Piel de las manos seca, áspera y con grietas.—*Verrugas en el dorso de la mano.*—Manchas rojas y *herpes en las manos.*—Estremecimiento en las articulaciones de los dedos.—Distorsion de los dedos.—Prurito ardiente y *vesículas quemantes en los dedos*, como si se hubieran frotado con ortigas.

Piernas.—Mucha *pesadez de las piernas y de los piés*, con rigidez estando sentado y tambien andando.—Estremecimientos en los muslos.—Erupcion herpética en las caderas.—*Acortamiento de los tendones de la corva.*—°Herpes en la corva.—Traccion presiva y calambroídea en las piernas.—*Calambres y traccion en las pantorrillas, como si fuesen demasiado cortas.—Piernas abultadas, rojas, °inflamadas y cubiertas de úlceras.—Dolores incisivos y *calambres en los piés.—Sensacion de ardor en las articulaciones del pié por la tarde.—*Hinchazon del pié ó de la planta de los piés, con punzadas al apoyar-

los.—Disposicion á luxarse y á torcerse la articulacion del pié.—Piés *frios*.—**Ulceras* crónicas *en el talon*, que provienen de vesículas corrosivas.—Grietas y excoriacion entre los dedos.—Hinchazon de los dedos de los piés con dislaceracion y dolor de excoriacion que no permite dormir.—Ampollas en la punta de los dedos, como por quemadura.—Terebracion, traccion y punzadas en los callos de los piés.

138.—NATRUM MURIATICUM.

NATR-M.—Muriato ó hidroclorato de sosa.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: 40 á 50 dias en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Ars. camph. nitr-spir.—*Se emplea como antídoto de:* Chin.

COMPÁRESE CON: *Arn. ars.* carb-a. *carb-veg.* caus. *chin.* ign. kal. *lyc. merc. natr. n-vom.* plumb. *puls.* s bad. sep. spig. staph. sulf.—Sobre todo despues de *merc.*, es cuando el natr-m. será provechoso, si se halla indicado.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se puede *consultar* este medicamento contra:—Afecciones reumáticas con acortamiento de los tendones; Parálisis de los miembros; Afecciones escrofulosas; Infarto de las glándulas; Funestos resultados á consecuencia de contrariedades y arrebatos de cólera; Debilidad por pérdida de humores y otras causas debilitantes, aun por resultado del onanismo; Debilidad y síncopes histéricos; *Clorosis crónicas descuidadas*; Verrugas; Várices; *Fiebres intermitentes*, aun las que han sido desnaturalizadas por fuertes dósis de quina; Fiebre tifoídea; *Melancolía é hipocondría*; Padecimientos por excesos en el estudio; *Jaqueca*; Caida de los cabellos á consecuencia de graves enfermedades agudas, como tambien en las recien paridas; *Oftalmías crónicas* y blefaroftalmías, sobre todo de las personas escrofulosas; *Ambliopia amaurótica*; Presbiopia; Otitis con flujo purulento; *Coriza*; Costra láctea?; Afeccion escorbútica de las encías; Estomacace?; *Dispepsia*; gastralgia y otras *afecciones gástricas*; Hepatitis crónica?; Cólicos ventosos; *Estreñimiento tenaz*; *Engrosamiento del recto*; Relajacion crónica del vientre; Diabetes?; Gonorrea crónica?; *Priapismo*?; *Impotencia*; Dismenorrea; Amenorrea;

Dismenia de las jóvenes; *Esterilidad con las reglas muy adelantadas y muy abundantes?*; Leucorreas; Catarro; Padecimientos tísicos; Enfermedades del corazon?; *Bocio*; Panadizos; Supresion del sudor de piés, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Traccion presiva en los miembros.—Rigidez de todas las articulaciones, que crujen cuando se mueven.—*Acortamiento de los tendones.*—*Estremecimiento en los músculos de los miembros.*—°Disposicion á las luxaciones y á derrengarse.—**Parálisis.*—Hinchazon de las glándulas.—*Accesos de malestar, sobre todo por la mañana*, ó por la tarde, *con náuseas*, debilidad, palidez mortal del rostro, *cefalalgia*, adormecimiento de los miembros, *necesidad de acostarse*, etc.—**Malas consecuencias debidas á una contrariedad.*—Los síntomas se manifiestan, se renuevan ó se agravan generalmente estando echado y sobre todo en la cama, ó por la mañana; se alivian incorporándose en la cama.—Los dolores nocturnos suspenden la respiracion y ocasionan una especie de parálisis semilateral.—Ebullicion general de sangre con pulsacion en todo el cuerpo, al mas ligero movimiento.—Congestion á la cabeza, al pecho y al estómago con frio en las piernas.—*Malestar é incomodidades despues de haber hablado.—*Mucha relajacion de todas las fuerzas físicas y morales*, despues de una fatiga corporal.—*Pesadez y pereza, sobre todo por la mañana despues de levantarse, con repugnancia para andar y al movimiento.—**Quebrantamiento y laxitud excesiva de los miembros, sobre todo por la mañana*, y estando sentado.—*Debilidad histérica.—*Mucha debilidad.*—Abatimiento y agilidad alternativamente en los miembros.—*Enflaquecimiento* excesivo.—*Disposicion á resfriarse.—Inquietud en el cuerpo con despeluzamiento.

Piel.—Erupcion miliar con dolor lancinante.—Tuberosidades pruritosas.—*Erupcion urticaria* despues de un ejercicio violento.—Herpes.—Diviesos.—*Verrugas.*—Panadizos.—°Várices.—°Callos.—°*Piel súcia, floja, como muerta en las personas cloróticas.*

Sueño.—*Mucha propension al sueño por el dia.*—*Sueño tardo é *insomnio nocturno, con esfuerzos inútiles para vol-*

verse á dormir.—*Dificultad para volverse á dormir durante la noche, cuando se ha despertado.—*Dificultad de despertarse y mucha laxitud soñolienta por la mañana muy temprano.—**Sueño agitado,* lleno de ensueños vivos y lascivos, con erecciones prolongadas y poluciones.—**Ensueños angustiosos* y penosos, *con llantos y palabras* durante el sueño.—Ensueños espantosos de pendencias, de homicidios, de incendios, de ladrones, etc. —Ensueños que ocupan todavía el espíritu despues que se ha despertado, y que se tienen por realidades.—Ebullicion de sangre por la noche, con calor angustioso y palpitaciones de corazon.—Pesadilla.—Somnambulismo.—*Por la noche dolores en el dorso, temblor como en los nervios, *emision de orina frecuente*, cefalalgia, cólicos, padecimientos asmáticos, angustia excesiva en el cuerpo, etc.

Fiebre.—*Calofrios interiores, frecuentes.—*Calofrio continuo y falta de calor vital.*—°*Calofrio con* ó sin *sed.*—Calofrios y horripilacion con gana de dormir, seguido de una ligera traspiracion.— Calor y calofrios alternativos, con dolores de cabeza.—°*Calor con sed ardiente.*—*Postracion antes de la fiebre —°Antes del calofrio, dolores de cabeza; durante el calofrio, respiracion corta, bostezos y gana de dormir.—°Durante el calor, *dolores de cabeza violentos*, aturdimiento, oscurecimiento de la vista, vértigos y encendimiento de la cara.—° *Calentura con dolores osteócopos*, dolores en el dorso, *color amarillento del rostro, dolor de cabeza, debilidad*, amargor de boca, comisuras de los labios ulceradas, *falta de apetito*, presion en la boca del estómago, con excesiva sensibilidad de esta parte al tacto, etc., *tipo cotidiano* ó de terciana; entra la fiebre generalmente *por la mañana*, con calofrios seguidos de calor y sed.—°*Fiebre tifoidea con debilidad, sequedad de la lengua y mucha sed.—*Pulso* irregular *y frecuentemente intermitente.*—*Sudor por la mañana.—**Sudor abundante excitado muy fácilmente por el movimiento y el paseo.*

Moral.—**Tristeza* y *melancolía*, que inclina á inquirir cosas desagradables y *á llorar mucho*; el consolarlos solo sirve para agravar su mal estado.—*Inquietúd acerca del porvenir.—**Angustia*, algunas veces mientras dura una tempestad, pero sobre todo por la noche.—*Indife-*

Digitized by

rencia, laconismo, morosidad é *inaptitud para el trabajo.* —*Precipitacion impaciente é *irritabilidad.*—*Disposicion á asustarse.—Encono á las personas de quienes hace mucho tiempo que se ha recibido alguna ofensa.—**Irascibilidad y violentos arrebatos provocados fácilmente.*—Gana de reir.—Mal humor y alegría alternativos.—**Debilidad de la memoria* y olvido excesivo.—Irreflexion y distraccion.—Se cometen equivocaciones hablando ó escribiendo.—*Incapacidad de reflexionar*, haciéndose fatigoso cualquier trabajo intelectual.—Torpeza.

Cabeza.—**Atontamiento doloroso.*—*Vértigo, durante el cual parece que todo está dando vueltas, corriendo riesgo de caerse hácia adelante, sobre todo cuando se anda ó al levantarse de la cama.—*Vértigo con sacudimientos en la cabeza y aturdimiento.*—**Dolor de cabeza por la mañana* al despertarse, al volverse en la cama, y durante el movimiento de cuerpo ó de cabeza, cuando se corre, cuando se está expuesto al aire frio, ó despues de haber sufrido una contrariedad.—**Pesadez de la cabeza*, todos los dias, sobre todo en el occipucio, que hace cerrar los ojos.—**Cefalalgia como si la cabeza quisiera estallar*, ó como si estuviera tensa y comprimida, principalmente cuando se está escribiendo.—*Ataques de dolores de cabeza con náuseas* y vómitos.—*Presion y compresion en la cabeza y sobre todo en las sienes y por encima de los ojos, agravados frotando las cejas.—*Tirones agudos y *punzadas en la cabeza*, sobre todo por encima de los ojos, con oscurecimiento de la vista y necesidad de acostarse.—*Sacudidas* lancinantes á *través de la cabeza.*—*Latidos, pulsaciones y martilleo en la cabeza, sobre todo durante el movimiento.—*Latidos y traccion en la frente.—Sensacion como si el cerebro vacilase moviendo la cabeza.—Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo, como si estuviera excoriado.—Contraccion y movilidad de la piel del cráneo.—Facilidad á acatarrarse.—Sudor de la cabeza, sobre todo por la mañana y por la noche.—*Costras en la piel del cráneo.—**Caida abundante de los cabellos*, y aun de los pelos de la barba.

Ojos.—Prurito en los ojos.—Punzadas, *escozor y sensacion de ardor en los ojos.—*Inflamacion de los ojos.*—**Lagrimas corrosivas.*—**Lagrimeo frecuente.*—°Legañas en el ángulo externo de los ojos.—*Aglutinacion nocturna de

Digitized by Google

los ojos.—Párpados contínuamente rojos y ulcerados.—*Oclusion espasmódica de los párpados, sobre todo por la mañana, por la tarde (durante el crepúsculo) y por la noche.—Oscurecimiento de la vista bajándose y andando, así como leyendo ó escribiendo.—Vista turbia, como si hubiese pelusilla delante de los ojos, ó se vieran los objetos á través de un velo.—*Confusion de los caractéres al leer.*—°Diplopia.—Hemiopia.—*Presbiopia.—*Vista débil, como en el principio de una amaurosis.*—*Se ven puntos negros, ráfagas luminosas y chispas.—Miopia.

Oidos.—Punzadas en los oidos.—°Pulsaciones y latidos en los oi los.—Hinchazon y calor en las orejas.—**Flujo* (de pus) *por los oidos.*—**Dureza de oido.*—*Retintin, sonido de campanas, ruido sordo y *zumbido en los oidos.*

Nariz.—Adormecimiento, insensibilidad de un solo lado de la nariz.—Inflamacion é *hinchazon de la nariz*, de un solo lado, con dolores al tacto.—Terebracion en los huesos de la nariz.—Excoriacion en la parte interna de la nariz.—Costras en la nariz.—**Pérdida del olfato.*—*Estornudos abortados.—*Obturacion y *sequedad de la nariz.*—**Coriza seca*, algunas veces tan solo por la mañana.—*Coriza violenta, fluente ó seca, con pérdida del olfato y del gusto, y con estornudos.

Cara.—*Rostro amarillento*, térreo.—Cara lustrosa, como por la grasa.—Hinchazon de la cara.—*Prurito y erupcion de granos en la cara y en la frente.—*Dolores en los pómulos durante la masticacion, como por ulceracion.—*Labios secos, con grietas, hendidos*, ó excoriados y ulcerados, con costras y erupciones quemantes y dolorosas.—*Erupcion herpética alrededor de la boca.*—*Hinchazon de los labios.—°Vesículas sanguinolentas en la cara interna del labio superior, con dolor quemante al tacto.—Erupcion granulosa y úlcéras en la barba.—*Hinchazon frecuente de las glándulas submaxilares.*

Dientes.—*Dientes muy sensibles al aire* y al contacto.—*Traccion en los dientes*, como si los arrancaran, la cual se extiende hasta la oreja y la garganta, despues de la comida y por la noche, con hinchazon de la mejilla.—Punzadas, terebracion y pulsacion en los dientes cariados.—Vacilacion y cáries de los dientes.—*Fístulas en las encías.—Encías tumefactas, que sangran fácilmente, muy

sensibles á las sustancias frias ó calientes.—Inflamacion pútrida de las encías.—Ulceras en las encías.

Boca.—Ulceras y *vesículas en la lengua* y en la boca, con escozor ardiente y dolor al contacto de los alimentos y de las bebidas.—Esputos de sangre.—Tartamudez á causa de la pesadez de la lengua.—Torpeza y rigidez de una mitad de la lengua.—Sensacion prolongada como si hubiera un cabello sobre la lengua.—°Salivacion abundante.

Garganta.—**Durante la deglucion sensacion como si hubiese un objeto extraño en la garganta.*—Espasmo de la faringe.—*Inflamacion de la garganta con dolor lancinante*, y ulceracion.—**Expectoracion de mucosidades*, con ruido, sobre todo por la mañana.

Apetito.—*Pérdida del gusto.*—*Amargor de boca.—*Sabor pútrido ó ácido*, como si estuviera en ayunas.—Sabor pútrido del agua.—Gusto de los alimentos en la faringe, sobre todo de los ácidos.—**Sed continua*, frecuentemente con náuseas, timpanitis y otras incomodidades despues de haber bebido.—**Pérdida del apetito*, sobre todo del *pan*, y repugnancia al humo del tabaco.—*Disgusto á los alimentos, y sobre todo si son grasientos.—Padecimientos causados por los alimentos ácidos y el pan.—**Apetito inmoderado* despues de medio dia y por la tarde.—**Bulimia* sin apetito, con plenitud y saciedad por poco que se coma.—°Apetencia por los ácidos.—°*Durante la comida sudor en la cara.*—°*Despues de la comida, erutos á vacío, náuseas*, plenitud y timpanitis con meteorismo de estómago, sueño, atolondramiento de cabeza, ágrios en la boca, *pirosis, ¯palpitaciones de corazon y pulso intermitente ó acelerado.—°Despues de los alimentos grasos ó de los que están confeccionados con leche, erutos desagradables.

Estómago.—Erutos con sabor á los alimentos.—*Erutos ácidos y ácres*, algunas veces con gusto á los alimentos.—**Pirosis* que sube del estómago.—*Náuseas*, sobre todo por la mañana.—**Secrecion de agua como pituitas*, con incomodidad en el estómago, seguida algunas veces de vómito ágrio de los alimentos.—°*Vómito de los alimentos* y de bilis.—**Presion en el estómago* por la mañana, ó en el dia, *náuseas* y postracion repentina.—**Presion en el epigastrio*, como si hubiera un cuerpo duro en el estómago.

—**Epigastrio tumefacto y dolorido al tacto y á la presion*, como si estuviera ulcerado.—**Calambres de estómago* contractivos, algunas veces con náuseas.—°Sacudidas y *sensacion, como por gárfios en la boca del estómago.*—Manchas rojas en la boca del estómago.

Vientre.—*Traccion, tension, presion, pellizcos y *punzadas en la region hepática.*—*Dolor y punzadas en la region esplénica.—°Calambres en el diafragma al bajarse.—**Timpanitis.*—*Hinchazon de vientre.—Malestar tensivo, presivo é hipocondríaco en el bajo vientre.—*Dolores presivos en el vientre.—Dolores abdominales, tractivos y contractivos, como los del parto.—**Retortijones cuotidianos y pellizcos en el vientre*, algunas veces por la mañana y la noche.—*Rigidez en el lado izquierdo del vientre.—*Encarcelacion de flatuosidades, algunas veces por la noche.—*Ruido estrepitoso como de agua y *borborigmos en el vientre.*—Salida de hernias.

Deposiciones.—**Constipacion*, algunas veces prolongada, otras, una deposicion cada dos dias.—**Conato frecuente y urgente de deponer sin resultado*, ó con evacuacion poco abundante.—°*Constipacion por debilidad ó parálisis de la médula espinal.*—°*Engrosamiento del recto.*—Deposicion dura é interrumpida.—*Evacuacion difícil de vientre*, frecuentemente con dislaceracion y *punzadas en el recto* y en el ano.—*Deposiciones muy frecuentes.—*Relajacion prolongada del vientre.—°Diarrea con cólicos y evacuacion de materias mucosas.—*Deposiciones involuntarias.*—Evacuacion de sangre durante las deposiciones.—**Durante y despues de las deposiciones, sensacion de ardor en el ano y en el recto.*—Punzadas, excoriacion y pulsacion en el recto.—Constriccion calambroídea del ano, y sensacion de estrechez del recto.—Prolapsus del recto y dolor quemante del ano, con flujo de materias sanguinolentas y saniosas.—**Granos hemorroidales en el ano*, dolorosos y lancinantes.—Excoriacion en el ano y el periné, sobre todo andando.—Herpes en el ano.—Lombrices.

Orinas.—*Conato frecuente y urgente de orinar dia y noche*, algunas veces á todas horas, *con flujo abundante.*—**Emision involuntaria de orinas*, algunas veces al toser, al andar, ó al estornudar.—**Emision de orinas por la noche.*—Orina clara con sedimento rojo, laterício.—*Despues de la emision de las orinas, flujo de mucosidades por la

uretra.—Flujo de mucosidades por la uretra, algunas veces como en la gonorrea.

Partes viriles.—Prurito, herpes y excoriacion entre el escroto y los muslos.—Secrecion detrás del glande como una *gonorrea bastarda.*—**Excitacion inmoderada de las partes genitales y de la imaginacion, al cóito*, ó adormecimiento del apetito venéreo.—Falta de energía en el cóito.—*Impotencia.—Despues del cóito poluciones.—Olor fuerte y fétido de las partes genitales.

Reglas.—Presion y sensacion como si todo afluyese hácia las partes genitales.—**Reglas muy adelantadas y muy abundantes, ó tardas y escasas.*—**Reglas de muy larga duracion.*—**Supresion de las reglas.*—*Dolores de cabeza, antes, durante y despues de las reglas.—**Antes de las reglas morosidad* é irritabilidad.—*Al principio de las reglas tristeza.—°Durante las reglas calambres abdominales.—**Prurito en las partes genitales.*—°Repugnancia al cóito en la mujer.—°Flores blancas con cefalalgia, disposicion á la diarrea, cólicos y deposiciones mucosas.—**Leucorrea* ácre, °con color amarillo de la cara.—Flujo abundante de mucosidades transparentes, blanquecinas y espesas, por la vagina.—Punzadas en las mamas.

Laringe.—**Ronquera* y sensacion de sequedad en la laringe.—Acumulacion de mucosidades en la laringe por la mañana.—*Opresion de pecho con catarro y tos.—*Tos provocada por un cosquilleo* en la garganta ó en el epigastrio dia y noche, sobre todo, andando ó respirando profundamente.—**Tos por la mañana.*—*Tos con sofocacion, espasmódica al principio de la noche en la cama.—**Tos corta*, crónica con expectoracion de mucosidades é hinchazon en el pecho.—*Tos con expectoracion sanguinolenta*, vomituricion y vómitos.—**Al toser, dolores de cabeza* como si la frente fuera á hendirse.

Pecho.—**Respiracion corta* sobre todo andando de prisa.—**Respiracion dificil*, especialmente durante un trabajo manual, la cual se alivia al aire libre.—*Respiracion sibilante al principio de la noche en la cama.—Aliento fétido.—*Dolor de pecho, como por una tension interior. **Punzadas en el pecho y en los costados*, con dificultad en la respiracion, algunas veces al respirar profundamente y en tosiendo.—**Palpitaciones de corazon angustiosas* y violentas á cada movimiento del cuerpo, pero princi-

palmente estando echado sobre el costado izquierdo.—Estremecimientos y *dolor* lancinante en la *region del corazon.—Palpitacion de corazon irregular é intermitente.*—Movimientos del corazon con estremecimiento.

Tronco.—**Dolor de quebrantamiento y de parálisis en los riñones*, sobre todo por la mañana.—Punzadas, dolores incisivos y fuertes pulsaciones en los riñones.—*Dolor de dislaceracion á través de los riñones y de las caderas.—*Dolores nocturnos en el dorso.—*Laxitud, tension presiva y *tirones en el dorso.*—*Presion, rigidez y tension en la nuca.—°Papera voluminosa.—°Costras en las axilas.—Infarto de las glándulas axilares.

Brazos.—Dolor de luxacion en las articulaciones de las escápulas y de los dedos.—**Laxitud y pesadez paralítica de los brazos.*—Dolor de quebrantamiento en los brazos y en las manos, más sobre todo en las espaldas, que no permiten ni levantar ni mover los brazos.—°Hormigueo en los brazos.—Sacudidas en el codo.—*Lancinaciones en los músculos y en las articulaciones de las manos y de los dedos.—Manchas parduscas en el dorso de la mano.—*Verrugas en las palmas de las manos.*—Piel de las manos seca y con grietas, sobre todo *alrededor de las uñas.*—Las manos frias.—*Sudor en las manos.*—Dificultad de doblar las articulaciones de los dedos.—*Adormecimiento y hormigueo en los dedos.—*Frecuentemente padrastros en las uñas.*—Panadizos.

Piernas.—**Dolores de luxacion en las caderas*, con punzadas.—**Dolores tractivos en los muslos, las rodillas y en las piernas.*—Inquietud y estremecimiento en las piernas.—**Debilidad paralítica en las piernas*, sobre todo de las articulaciones del pié.—Estremecimientos en los músculos de los muslos.—°*Acortamiento doloroso de los tendones de la corva.*—Dolor de luxacion en las articulaciones de la rodilla y del pié.—*Laxitud en las rodillas y en las pantorrillas.—*Herpes en las corvas.—Tension en las piernas y en las pantorrillas.—**Excesiva pesadez de las piernas y de los piés.*—°Sensacion de ardor en los piés.—°Hinchazon de los piés.—Frio en los piés.—°Dolor de ulceracion en los tobillos, en tocándolos y en apoyando el pié.—°Supresion de la transpiracion de los piés.—Rubicundez del dedo pulgar, con tirones agudos y punzadas cuando se anda, y cuando se está depié por mucho

Digitized by Google

tiempo.—Herpes en los maléolos.—*Callos en los piés, con dolores lancinantes* y terebrantes.

139.—NITROGLYCERINUM.

NITGL.—Nitroglicerina, Glonoina.—Hering, *Estudios patogenésicos de la América del Norte,—Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.

Antidotos: *N-vom. acon.* café en bebida, *camph.*—Podrá servir de antidoto contra: *dig. plumb.*

CLINICA.—Examinando los síntomas característicos de este medicamento se verán los casos en que se le podrá administrar con resultado contra la una ó la otra de las afecciones siguientes:—Envenenamiento por la digital, el plomo; Consecuencias de emociones, tales como el miedo, el espanto, la cólera; Consecuencias de conmociones físicas; Consecuencias de un cambio rápido en los esfuerzos intelectuales; consecuencias de ejercicios insólitos, tales como los de á caballo, en carruaje; Consecuencias de un súbito resfriamiento; Consecuencias de la influencia de un frio violento; Convulsiones; Epilepsias; Eclampsias; Fiebres congestivas, apopléticas; Fiebres tifoídeas; Tífus del cólera; Tífus cerebral; Afecciones mentales; Manías puerperales; Congestiones al cerebro; Apoplejías; Cefalalgias; Consecuencias de una insolacion; Meningitis; Hidrocéfalo; Oftalmías; Otitis; Mareo; Afecciones verminosas; Congestiones pulmonares; Carditis y Pericarditis; Hidropesía del pericardio; Mielitis; congestiones de la médula cerebral.

SINTOMAS GENERALES.—Este medicamento corresponde más en los casos de plétora aparente que en la real, y sobre todo en las personas dispuestas á oscilaciones rápidas en la circulacion; *parece indicado sobre todo en las congestiones á la cabeza, al corazon, á la médula espinal*, principalmente en la época de las reglas, durante el embarazo y el puerperio, así como en la edad crítica, y *á consecuencia de una hemorragia suprimida* cualquiera; no podrá reemplazar la sangría de la antigua escuela sino allí donde la aplicacion de esta habria empeorado

Digitized by

evidentemente el estado del enfermo.—Inquietud en los miembros, que obliga á levantarse; laxitud como por falta de sueño; °desfallecimiento sin pérdida del conocimiento; °otras veces con su pérdida. — Latidos, hormigueo, sensacion singular de calor por todo el cuerpo, de arriba abajo.—°*Convulsiones*, sobre todo á la izquierda, con dedos separados.

Sueño.—*Bostezo*; con congestion á la cabeza; con necesidad de suspirar; con ruido en la boca del estómago.—Gana de dormir al anochecer; pesadez de sueño por la mañana.

Fiebre.—*Calor*: sobre todo en la cara; con vapores que de la boca del estómago suben á la cabeza.—Sudor; sobre todo en la cara; despues de haber dormido, aun en sitio fresco; el sudor hace cesar las náuseas.—*Pulso*: **acelerado*; *con alternativas de lentitud; irregular, intermitente; *lleno; *muy duro ¯ó bien muy blando; pequeño y acelerado; °filiforme.

Inteligencia.—Ilusiones: de calles conocidas que parecen desconocidas, mas largo el camino de retorno; la barba parece demasiado larga, el cuello hinchado.—°Laconismo, no quiere responder.—°Pérdida del conocimiento, con gritos y furor; °pérdida de los sentidos ó caida sin conocimiento, durante la congestion de la cabeza.

Cabeza.—**Vértigos*, sobre todo al bajarse; marcha incierta.—*Pesadez en la cabeza*; sobre todo en la frente; por bajo de los ojos; hasta los oidos; cefalalgia sorda con sudor caliente en la frente.—*Dolor de cabeza*: presion de abajo arriba, sobre todo en el vértice; *de *dentro á fuera*, sobre todo en las sienes; **como si el cerebro estuviese demasiado voluminoso*, si hubiese aumentado de volúmen ó hiciese ondulaciones.—**Plenitud* ¯principalmente en el vértice, con latidos ó calor.—*Congestion de sangre, latidos y calor: en las sienes*; *en el vértice; hasta en la nuca, á cada paso; á cada movimiento de la cabeza; °dolor quemante en medio de la cabeza, despues de una fiebre tifoidea.—Punzadas en el costado derecho de la frente, ó en las sienes.—**Dolor de destrozos y de erosion en el cerebro*, aumentado cuando se sacude la cabeza.—*El dolor, el calor y la plenitud de la cabeza *suben de abajo arriba*, empezando en el pecho, la nuca y el occipucio.—**Los*

Digitized by Google

dolores se aumentan sacudiendo la cabeza, al bajarse, durante los movimientos del cuerpo y sobre todo al subir las escaleras.—**Los dolores reclaman la presion exterior*.—Alivio despues del paseo al aire libre.—*Cuando* padece la cabeza: el pulso se pone acelerado, la cara encendida, la frente húmeda.—°Dolores de cabeza á consecuencia de una insolacion.—°Hemicránea inveterada, con dolor violento en el lado izquierdo, vómito y sensacion como si el punto visual del ojo izquierdo estuviese en desórden.—°Cefalalgia insoportable, con furor, calor en la cabeza, cara encendida, ojos prominentes y pulso filiforme.—°Dolor en la cabeza durante un tiempo húmedo; despues de un enfriamiento, y á consecuencia de una vida sedentaria y de trabajos intelectuales forzados.—°Violenta cefalalgia á consecuencia de grandes esfuerzos corporales, ó de una sofocacion con traspiracion detenida.

Ojos.—Mirada extraña; ojos sin vida, fijos, hundidos; movimientos inciertos.—*Rubicundez de la córnea opaca, con ojos prominentes, mirada feroz; *Dolores como si los ojos estuviesen empujados hácia afuera; calor en el globo de los ojos, los párpados y alrededor de las órbitas; dolor en los *globos*, calor, punzadas, distension.—*Delante de la vista*: centellas, relámpagos, nieblas, manchas negras, turbacion; las letras parecen mas pequeñas.—Pérdida de la vista durante el desfallecimiento.

Oidos.—*Plenitud*: en los oidos y á su rededor; punzadas.—Obturacion; zumbidos, sonidos de campanas, cantos, crepitacion y dureza del oido.

Nariz.—Dolor en la raiz de la nariz y el entrecejo.—Los dolores de la cabeza llegan hasta la nariz.

Cara.—**Palidez*: aun durante el calor; *y durante la congestion en la cabeza y el pecho.—*Calor*: *durante los latidos de la cabeza y las palpitaciones.—**Rubicundez*, sobre todo de la parte superior, durante el dolor de cabeza.—°Sudor frio, durante las congestiones de la cabeza.—Prurito, sobre todo en medio de la cara.—Sensacion de hinchazon en el labio inferior.—Dolor y rigidez en la articulacion sub-maxilar.

Dientes.—Odontalgia pulsativa, durante los dolores de cabeza.

Boca y garganta.—*Lengua* hinchada; picazon y punza-

Digitized by

das en la lengua.—*Paladar* sensible, como hinchado, con latidos; velo del paladar seco, contraido.—Cosquilleo y calor en la garganta.

Organos de la digestion.—*Náuseas*: hasta que el sudor se presenta; durante los dolores de cabeza; con dolores de estómago; congestion á la cabeza y al pecho y cara pálida.—Sensacion de vacuidad en el estómago; ruido y sensibilidad en la boca del estómago, sobre todo al bajarse.—*Dolores de vientre*, retortijones por cima del ombligo, que se presentan por la mañana y persisten todo el dia; antes y despues cámaras líquidas; borborigmos en el bajo vientre, mas fuertes al acostarse sobre el costado izquierdo.—*Deposiciones* líquidas, con borborigmos y emision de flatuosidades, todo el dia, desde la mañana.—*Orinas* claras, mas abundantes.

Sistema femenino.—°*Antes y durante las reglas, ó en su periodo*; así como durante el *embarazo*: congestion al pecho y á la cabeza; dolores de cabeza; desfallecimiento.

Laringe y pecho.—Necesidad de respirar profundamente; gemidos; opresion de pecho, que alterna con dolor de cabeza; *pecho como comprimido*; inquietud, angustia en el pecho.—*Punzadas*: bajo el esternon; alrededor del pezon; desde la espaldilla hasta el estómago.—En la region del *corazon*: dolores violentos hasta la espalda; plenitud, pesadez, presion, calor, con difícil pulsacion del corazon.—*Palpitaciones del corazon*, con calor en la cara, pulso acelerado; *latidos de las carótidas.

Tronco.—A lo largo de toda la *espalda*: dolor, calor, horripilaciones; calor quemante entre las escápulas.—En la *nuca*: sensacion de hinchazon; dolor calambroídeo; pulsaciones; plenitud.—En el *cuello*: rigidez; los vestidos fatigan, como apretados.

Miembros torácicos.—En el *brazo*: pesadez, circulacion difícil, debilidad; torpeza y fatiga en el brazo izquierdo.—En el *codo*, dolor en el nervio cubital.—Sensacion del pulso en la punta de todos los *dedos*, con temblor.

Miembros pelvianos.—En el *muslo* izquierdo, debilidad y torpeza; carencia de fuerza, de solidez, en las rodillas.

Digitized by Google

140.—NITRUM.

NITR.—*Kali nitricum.*—Nitrato de potasa. —HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 24, 30.—*Duracion de accion*: hasta 7 semanas en las enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS: Nitr.-spir.—El *camph.* aumenta los efectos del nitro.
COMPÁRESE CON: Amm. arn. *calc.* dros. natr-m. nitr. ac. nitr-spir.

CLINICA.—Guiándose por *el conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—*Inflamaciones internas*; *Gastritis?*; Gastralgias; Cólicos flatulentos; *Enteritis*; Diarreas colicuativas; Tísis laríngea?; *Neumonia crónica*; Padecimientos tísicos, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores dislacerantes*, *lancinantes* y tractivos.—Traccion en los miembros con debilidad paralítica.—*Dislaceracion en los miembros*, dia y noche que se alivia un poco por la friccion.—La mayor parte de síntomas se manifiestan por la tarde, despues de medio dia y *á media noche.*—Los síntomas que se manifiestan por el dia se disipan á primera hora de la noche despues de acostado.—Hinchazon rápida de todo el cuerpo.—Postracion suma por la mañana, con sensacion de calor en la cara y ardor en la frente.—*La laxitud es mas estando sentado que durante el movimiento.*—*Temblor involuntario de todo un lado del cuerpo.*

Piel.—Lancinaciones en la piel como por agujas, *seguidas de sensacion de ardor*, principalmente en la cara.—Nudosidades del tamaño de un guisante, aun en la cara.—*Vesículas quemantes*, llenas de una serosidad amarillenta, que se abren rascándolas, y entonces dejan de quemar.

Sueño.—*Propension al sueño, durante el dia.*—Sueño por la noche agitado; ó que no se hace mas que dormitar, despertando á menudo.—Sueño comatoso.—Sueños angustiosos, agitados, de cosas peligrosas.—*Pesadilla.*

Fiebre.—Calofrios por la tarde con dolores.—*Frio despues de medio dia*, con sed; ó frio precedido de cefalalgia, con

Digitized by Google

adipsia y *seguido de calor nocturno*, sin sed ni sudor.—°Fiebre cotidiana con dolores tractivos en las piernas.—*Sudores abundantes y colicuativos*.—Sudor matutino, sobre todo en el pecho.

Moral.—Ansiedad y agitacion.—Decaimiento y miedo de la muerte.

Cabeza.—*Dolores de cabeza despues de haber comido ternera*.—Dolores de cabeza con contraccion de los párpados, desde la tarde de un dia á la del otro, insoportables bajando la cabeza.—Dolores de cabeza que alternan con dolores dislacerantes calambroídeos en las articulaciones de los dedos.—*Pesadez con aturdimiento de cabeza*, por la mañana como á consecuencia de una embriaguez.—*Dolores presivos en la cabeza*, agravados por el café, y aliviados por el movimiento del carruaje.—*Compresion en el occipucio*, con rigidez de estas partes.—Contraccion en la cabeza que parece terminar en la nariz.—Traccion calambroídea en el occipucio y en la nuca que obliga á torcer la cabeza.—*Dolores de cabeza lancinantes*.—Los dolores en el occipucio se alivian desatando el pelo.—Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo.

Ojos.—*Sensacion de ardor en los ojos*, con lagrimeo y fotofobia, sobre todo por la mañana, despues de lavarlos con agua fria.—Ceguera pasajera.—*Oscurecimiento de la vista*.—Se ven círculos de colores.—Aureola de color de íris alrededor de la luz al anochecer.

Oidos.—Punzadas en los oidos por la noche, las que se agravan echándose sobre ellos.—Tension, punzadas y dislaceraciones detrás de las orejas.—Inflamacion é hinchazon del lóbulo de la oreja con dolor quemante y estremecimiento.—Retintin y ruido como de campana en los oidos.—*Sordera permanente*, por parálisis del conducto auditivo.

Nariz.—Sensacion de ardor en la nariz, con hormigueo, y dolor como si arañaran con gárfios, agravados por el tacto.—*Inflamacion en la punta de la nariz, con dolor lancinante*.—Hinchazon en el interior de la nariz.—Ulceras en las ventanillas nasales.—*Epistaxis con sangre ácre*.—Coriza violenta con obturacion de la nariz y pérdida del olfato.

Cara.—Color pálido y enfermizo.—Rubicundez y tension en las mejillas con exacerbacion de los dolores de ca-

Digitized by

beza.—Dolores de dislaceracion en los huesos de la cara.

Dientes.—*Odontalgias con traccion lancinante, ó dolores de dislaceracion* en los dientes y la cabeza.—Punzadas en los dientes cariados, al tacto.—Odontalgia pulsativa por la noche agravada por el contacto de cosas frias.—*Hinchazon de las encias*, inflamatoria ó escorbútica, que sangran fácilmente.

Boca.—Garganta.—*Aliento fétido.*—Lengua cubierta de una capa blanca.—*Irritacion de la garganta con dolor lancinante* é inflamacion del velo del paladar y de la campanilla.—Dolor nocturno en la garganta, como si fuera á contraerse, con suspension de la respiracion.

Estómago.—*Falta de apetito y *sed ardiente y continua.*—*Apetito* principalmente *por la tarde.*—*Náuseas*, sobre todo por la noche.—Vomituricion y vómitos de mucosidades mezcladas de sangre.—Dolores de estómago con sensacion como si alguna cosa se moviera dentro de él.—Corrosion, debilidad espasmódica y *presion en el epigastrio.*—**Calambres de estómago*, violentos, *con dolor contractivo.*—Punzadas en el estómago y en el epigastrio.—Sensacion de frio ó de *ardor en el estómago.*—(Inflamacion en el estómago).

Vientre.—*Dolores de vientre despues de haber comido ternera*, excesivamente violentos, sobre todo en el lado derecho.—Timpanitis muy considerable.—Retortijones que se disipan hácia la tarde.—Dolores lancinantes en el vientre.—**Encarcelacion de flatuosidades*, sobre todo despues de medio dia.—°*Enteritis con frio glacial en los piés.*

Deposiciones.—*Deposiciones duras*, difíciles y lentas, hechas con muchos esfuerzos.—Necesidad urgente de deponer con tenesmo.—*Deposiciones blandas con retortijones.*—**Diarreas*, algunas veces sin dolores, ó colicuativas.—Evacuaciones sanguinolentas.

Orinas.—Necesidad frecuente de orinar y *emision abundante de una orina clara*, con una nube rojiza.

Partes genitales.—Exaltacion del apetito venéreo.—*Reglas* muy anticipadas y muy abundantes, *con flujo de una sangre negra.*—Antes y durante las reglas, dolores violentos en el vientre y en los riñones.—Leucorrea serosa, blanca que enrojece el lienzo y se agrava durante los dolores de riñones.

Laringe.—Ronquera con aspereza y arañamiento en la

Digitized by Google

garganta.—Tension y dolores incisivos en la laringe, con imposibilidad de la deglucion.—Tos que hace despertar hácia las tres de la mañana, con dolores de cabeza que causan aturdimiento.—*Tos al aire libre ó en subiendo una escalera, como tambien siempre que se suspende la respiracion.—*Tos seca*, sobre todo por la mañana.—*Al toser, dolores* incisivos *en el pecho* hasta que se desprenden las mucosidades.—**Tos con punzadas en el pecho, y expectoracion de sangre pura.*—*Tos con expectoracion purulenta y sudores colicuativos.

Pecho.—*Dificultad de la respiracion*, que no permite estar echado con la cabeza baja.—Opresion de pecho andando cuesta arriba.—Dolor de pecho con tension presiva, acompañado de una sensacion de aspereza debajo del esternon, que obliga á toser fuerte.—*Dolor contractivo en el pecho*, que parte del dorso, con sensacion de constriccion en los pulmones.—*Lancinaciones en el pecho*, sobre todo *respirando profundamente*, en estando acostado y tosiendo, acompañadas de angustia y opresion excesivas.—(*Inflamacion de los pulmones*).—*Palpitaciones violentas de corazon*, sobre todo por la noche en la cama.

Tronco.—Dolores lancinantes en la region de los riñones.—*Dolores violentos en los riñones, por la noche y por la mañana*, al despertar.—Dolores en el dorso al bajarse.—*Presion* en los lomos, durante el reposo, la que se agrava, sobre todo en tosiendo.—*Punzadas en y entre los omóplatos*, frecuentemente acompañadas de suspension de la respiracion, por la noche estando echado sobre el dorso, y que se alivian echándose sobre el costado derecho.—Dolores en la nuca y hasta en las espaldas, como si se tirase con violencia de los cabellos.

Brazos.—*Dolores de dislaceracion en las espaldas por la noche.*—Dislaceracion y punzadas en las articulaciones de los brazos, del codo, de las manos y de los dedos, principalmente por la noche, con pesadez y sensacion como si la mano fuese mas voluminosa, é hinchazon de los dedos.—Torpeza y hormigueo en los brazos y en las manos.—Traccion y *dolores de dislaceracion en los brazos*, desde la espalda hasta los dedos..—Dolores de luxacion en las articulaciones de los dedos.—Debilidad de los brazos, de las manos y de los dedos, que no permite tener nada en la mano.—Dislaceracion calambroídea en

Digitized by Google

las articulaciones de los dedos, alternando con dolores de cabeza.— Calambres y rigidez en las articulaciones de los dedos.

Piernas.— *Dolores de dislaceracion en las piernas.*— Mucha laxitud y *debilidad paralítica en las piernas*, despues de haber andado con moderacion.— Dislaceracion con estremecimiento en la planta de los piés.—Torpeza y hormigueo en los piés.—Contraccion de los dedos.

141.—NITRI ACIDUM.

NITR-AC.—Acido nítrico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. h meop. —*Dósis usadas*: 3, 30.——*Duracion de accion*: hasta 7 semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Calc. camph. con. hep. mez. petr. sulf.— *Se emplea como antídoto de:* Calad.? Calc. merc.

COMPÁRESE CON: Acon. aur. *bell.* calad. *calc.* chel. *con.* graph. *hep. kal. lye.* magn. *merc. mez.* mur-ac. *nitr. op. petr.* phos-ac. plat. *puls. rhus.* selen. *sep. sil. sulf.* sulf-ac. thui. Sobre todo despues de: Bell. calc. hep. kal. natr. *puls. sulf.* y *thui.*, es cuando el ácido nítrico hará buenos efectos, si está indicado: despues del ácido nítrico, se empleará frecuentemente con buen éxito: *Calc. petr. puls. sulf.*

CLINICA.— Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se podrá *consultar* este medicamento contra:— Afecciones de las personas morenas, cabellos y ojos negros ó castaños y de una constitucion deteriorada, seca y biliosa, carácter vivo é irritable; ó bien de personas de una constitucion endeble, linfática ó leucoflegmática, con disposicion á diarreas, corizas, leucorreas ú otros flujos mucosos.— Afecciones reumáticas; dolores osteócopos, inflamacion, cáries y otras *afecciones de los huesos*, sobre todo *por el abuso del mercurio*; *Afecciones sifilíticas y sicósicas*; Herpes, ragades, manchas y otros *malos resultados por el abuso del mercurio*; Inflamacion, obstruccion y *ulceracion de las glándulas*; Afecciones escrofulosas y raquíticas; Afecciones histéricas; Abscesos; Padecimientos cloróticos (?) é ictéricos; Inflamaciones locales internas; Epilepsia?; Sabañones; *Ulceras mercuriales*; Verrugas; Lupias?; Melancolía; *Sobreexcitacion nerviosa*, sobre todo *por el abuso del mercurio*; Jaqueca; Cefalalgias reumáticas, congestivas, histéricas y nerviosas; Caida de

Digitized by Google

los cabellos á consecuencia de cefalalgias frecuentes; *Corona veneris*; *Oftalmías agudas y crónicas*, sobre todo las que proceden *del abuso del mercurio*, ó de úlceras sifilíticas repercutidas; Oscurecimiento de la córnea; Ambliopia amaurótica; Miopia?; Otitis y otorrea purulenta; Dureza de oido; Coriza crónica; Ozena; Herpes faciales; Afeccion escorbútica de las encías y estomacace, sobre todo por el abuso del mercurio; Amigdalitis y otras *anginas flegmonosas*; *Anginas sifilíticas y mercuriales*, *aun con ulceracion*; Odontalgias, sobre todo las que proceden del abuso del mercurio; Afecciones gástricas y hepáticas; Ictericia; Cólicos flatulentos (é inflamatorios)?; *Ulceracion de los intestinos en el tifus*; *Bubones sifilíticos mercuriales* y escrofulosos; Hernias inguinales; Estreñimiento ó *relajacion crónica del vientre*; *Diarreas* y disenterías; Hemorróides; Incontinencia de orina; Arenillas; Gonorreas crónicas; Condilomas; *Orquitis;* Cáncer (?); Escirro del útero (?), Amenorrea; Clorosis?; Leucorreas; Endurecimiento de las glándulas mamarias?; Laringitis crónica (tísis laríngea); Tos convulsiva; Coqueluche?; Hemoptisis; Padecimientos tísicos (sobre todo despues del uso de kali carb.); *Pulmonías de las personas de edad*, *demacradas*, *coléricas y muy débiles*; Espasmos pulmonares; Ragades y manchas mercuriales en las manos; Sabañones en las manos y en los piés, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores lancinantes como por espinas*, sobre todo al tacto.—**Dislaceracion en los miembros* ó tirantez, sobre todo despues de un enfriamiento.—°*Inflamacion y sensibilidad dolorosa de los huesos.*—°*Ulceracion de los huesos.*—Raquitismo.—*Inflamacion*, *hinchazon y supuracion de las glándulas.*—Crujido en las articulaciones.—Ataques de epilepsia precedidos de tirones en los miembros y seguidos de rigidez del cuerpo y ronquido.—*Dolores al cambio de tiempo.—**Dolores que se sienten estando dormido.*—Exacerbacion de los síntomas por la tarde y por la noche.—*El andar en carruaje alivia la mayor parte de los síntomas.*—**Excesiva flojedad y laxitud* general, con temblor, pesadez de las piernas y necesidad de estar acostado, sobre todo por la tarde ó

Digitized by Google

por la mañana.—**Enflaquecimiento excesivo.—Facilidad á resfriarse.*

Piel.— *Sequedad de la piel.—**Erupciones urticarias* pruritosas aun en la cara, y sobre todo al aire libre.—*°Poros negros.—°Manchas de color pardo rojizo* *y efélides oscuras en la piel.—°Manchas cobrizas ó de color violeta.—°Herpes pruritosos.—**Dolores en los sabañones* y en los callos de los piés.—*Los miembros se sienten como helados, inflamados y pruritosos, por un frio moderado con grietas en la piel.—*Forúnculos muy voluminosos.—Heridas y úlceras con punzadas como por espinas*, ó con dolores quemantes y que sangran fácilmente.—Ulceras con supuracion saniosa, sanguinolenta y corrosiva.—*Dolores en las cicatrices antiguas por el cambio de tiempo.—**Verrugas.*—°Lupias.

Sueño.—Gana de dormir por el dia, por debilidad, con vértigos.—Sueño tardo por la noche, *y *del que se despierta muy temprano, ó dificilmente.*—Insomnio como por sobreexcitacion.—*Sueño incompleto y agitado, del que se despierta fecuentemente sobresaltado.*—Sueño no reparador.—Por la noche epistaxis, cefalalgia, odontalgia, *sed, gastralgia*, cólicos, dolores en los miembros, pesadilla, angustia, palpitaciones de corazon, náuseas, vómitos y otros muchos padecimientos.—*Afluencia de sueños fantásticos*, voluptuosos, *angustiosos*, espantosos y frecuentemente con gritos, gemidos, quejas, palabras y sobresaltos con espanto.—Ensueños de muertos, de espectros, de las ocupaciones diarias, de crímenes, de festines, etc.—Sacudimientos de cuerpo y estremecimiento de los miembros durante el sueño.

Fiebre.—Frialdad general de la piel.—**Frio contínuo.*—*Fiebre despues de medio dia; fiebre con calofrios y calor.—Calor interior, sin sed, contínuo ó por accesos.—Calor seco por la noche con sed excesiva.—**Sudor nocturno fétido* ácido.—*Sudor ácido por el dia como la orina del caballo.

Moral.—**Tristeza.*—Melancolía excesiva y *accesos de angustia*, sobre todo por la tarde ó por la noche.—**Inquietud* sobre el estado de su salud con *miedo de la muerte.*—*Inaptitud para el trabajo.—**Mucha excitabilidad.*—Concentracion en sí mismo.—**Irritabilidad* y tenacidad.—Arrebato.—Encono prolongado.—Accesos de furor y de

Digitized by Google

desesperacion con juramentos é imprecaciones.—Humor con disposicion al llanto.—Nostalgia.—Carácter perezoso y disposicion á asustarse.—Debilidad de las facultades intelectuales con ineptitud para los trabajos mentales.—Debilidad excesiva de la memoria.

Cabeza.—*Vértigos andando y estando sentado.—**Vértigos* que obligan á acostarse, sobre todo *por la mañana ó por la tarde*.—Vértigos con debilidad, náuseas ó cefalalgia.—Cefalalgia por la mañana al despertar.—*Mucha* sensibilidad en la cabeza al ruido de los carruajes, ó de una marcha incómoda.—*Accesos de dolores de cabeza con náuseas* y vómitos.—Sensacion de plenitud y de peso en la cabeza, con tension y presion hasta los ojos.—*Dislaceracion en la frente, el vértice y el occipucio.—*Lancinaciones en* casi todas las partes de *la cabeza*, que obligan algunas veces á echarse y turban el sueño de la noche.—*Dolores de cabeza pulsativos.—**Congestion á la cabeza*, con calor interior.—*Dolores osteócopos en la cabeza*, tractivos y presivos.—*Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo; molesta cualquier cosa en la cabeza.—Tension de la piel del cráneo.—*Prurito en la piel del cráneo.—Erupcion húmeda en la cabeza.—**Caida de los cabellos*.—°Placas ulceradas, que exudan, quemantes en la cabeza.

Ojos.—Ojos abatidos y cóncavos.—*Presion y punzadas en los ojos.—**Inflamacion de los ojos*.—*Ulceracion de los ojos.—**Manchas y úlceras en la córnea*.—Hinchazon de los párpados.—Lagrimeo frecuente, sobre todo en leyendo, con sensibilidad dolorosa de los ojos.—Dificultad de abrir los ojos por la mañana (están rodeados de un círculo amarillo).—°Parálisis del párpado superior.—*Pupilas difíciles de contraerse.—Miopia.—Diplopia.—*Niebla, manchas, hilitos, chispas y *puntos negros que revolotean delante de la vista*.—Vista turbia y oscurecimiento de esta.—Deslumbramiento á la luz del dia.

Oidos.—**Punzadas en los oidos*.—Sequedad en el interior del oido.—°Ulceracion de la apófisis mastóides.—**Otorrea*.—Excoriacion detrás de las orejas con prurito y supuracion.—**Obturacion de los oidos*.—*Dureza de oido*, principalmente por prolongacion de las amígdalas.—*Crujido, latidos y *ruido sordo en los oidos*.—Crujido en los oidos durante la masticacion.—Hinchazon de las parótidas.—°Lupia en el lóbulo de la oreja.

Digitized by Google

Nariz.—La punta de la nariz está roja y cubierta de vesículas costrosas.—Herpes pruritosos en las alas de la nariz.—*Picotazos lancinantes en la nariz* al tacto.—*Dolor de excoriacion, sensacion de ardor y *costras en la nariz.* —**Epistaxis* provocada por llantos, ó *por la mañana*, de una sangre negra.—*Sensacion de un olor fetido al respirar por la nariz.—*Olor fétido de la nariz.*—°Excrecencias como un higo en la nariz.—*Estornudos abortados. —*Sequdad y *obturacion de la nariz.*—*Violenta coriza fluente*, con dolores de cabeza, tos, hinchazon y ulceracion de la nariz.—Flujo de mucosidades espesas y corrosivas por la nariz.—Mucosidades fétidas y amarillentas por la nariz.

Cara.—*Palidez del rostro* con ojos hundidos.—Color amarillo de la cara, sobre todo alrededor de los ojos con rubicundez de las mejillas.—Dolor calambroídeo y dislacerante en las mejillas y en los pómulos.—Hinchazon de las mejillas.—**Erupcion granulosa en la cara*, en la frente y en las sienes.—*Pústulas en la cara con bordes rojos y anchos que se cubren de costras.—Hinchazon erisipelatosa de la mejilla con dolor lancinante, náuseas y fiebre.—Piel furfurácea en toda la cara.—Erupciones pruritosas y herpéticas en el sitio de las patillas.—Poros negros en la cara.—Hinchazon de los labios.—°Labios con grietas.—*Ulceracion de los labios* y de sus comisuras. —°Ulceras en la parte roja de los labios.—Diviesos en la barba.—*Hinchazon dolorosa de las glándulas submaxilares.*

Dientes.—Odontalgia con dolor tembloroso, lancinante, tractivo ó *pulsativo, principalmente por la noche en la cama ó por la tarde.—Dolores en los dientes cariados.—Los dientes se ponen amarillentos y **vacilantes.*—Las encías sangran, están blancas é hinchadas.

Boca.—*Olor fétido y pútrido de la boca.*—Excoriacion de la lengua, del paladar y de la cara interna de las encías, con dolor lancinante agudo.—**Salivacion*, °algunas veces por accesos febriles.—Mucha sequedad de la boca, con sed ardiente.

Garganta.—Ulcera, con dolor lancinante en la boca y en la garganta.—**Inflamacion de la garganta*, con dolores lancinantes, sobre todo al tragar los líquidos.—*Tonsilas rojas é hinchadas.—*Sensacion quemante y *dolor de excoriacion en la garganta.*

Apetito.—**Amargor de la boca*, sobre todo despues de haber comido.—**Gusto ágrio*, con sensacion de ardor en la garganta.—*Sabor insípido en la boca.—**Mucha sed*, aun por la mañana al levantarse.—*Disgusto de la carne y de las cosas azucaradas.—Repugnancia al pan, que le deja un gusto ágrio y hace vomitar.—°Apetencia por la tierra, la greda, la cal, ó por los alimentos grasos y los arenques.—Hambre exaltada con disgusto de la vida.—**Dificultad de digerir las leches*.—°Náuseas á causa de los alimentos grasos.—**Sudor* durante y *despues de la comida*.—Despues de haber bebido y mientras la comida, dolor de excoriacion en la garganta, en el esófago y en el estómago, ó cólicos.—**Despues de comer*, *plenitud* en el estómago, *laxitud* con calor, sudor y palpitaciones de corazon por el menor movimiento, ó náuseas, *erutos*, flatuosidades, cefalalgia con vómitos, *sueño*, angustia, etc.

Estómago.—*Erutos ágrios.—*Conato al vómito.—Pirosis.—Evacuacion de agua por la boca como de pituitas, despues de haber bebido de prisa.—Hipo.—**Náuseas frecuentes y gana de vomitar*, ¯frecuentemente con angustia, temblor y despeluzamiento.—Vómitos amargos y ágrios, con erutos frecuentes (despues de la comida).—Presion en el estómago.—Sensacion de ardor ó de frio en el estómago.—Dolor en el cardias en el momento de ingerir los alimentos.—Calambre contractivo del estómago.—**Lancinaciones en el epigastrio.*

Vientre.—Presion tensiva y *punzadas* en el hipocondrio izquierdo.—*Dolores abdominales como á consecuencia de un enfriamiento.*—*Excesiva timpanitis, aun por la mañana.—*Frecuentemente, *pellizcos y dolores incisivos en el vientre.*—*Dolor de ulceracion en el bajo vientre.—**Punzadas en el vientre*, sobre todo al tacto.—**Hernia inguinal*, °aun en los niños.—**Hinchazon y supuracion de las glándulas inguinales.*—*Facilidad á resfriarse el vientre.—**Acumulacion de flatuosidades en el vientre.*—*Ruido sordo y borborigmos en el vientre.—**Encarcelacion de flatuosidades*, sobre todo por la mañana y por la tarde.

Deposiciones.—*Evacuaciones alvinas, difíciles, irregulares.—**Deposiciones duras*, secas.—**Deposiciones muy frecuentes.*—*Conato urgente de deponer.—**Deposiciones diarréicas*, algunas veces mucosas ó de olor pútrido.—

Evacuacion fétida ó lienteria.—*Deposiciones sanguinolentas*, disentéricas, con tenesmo.—Cólicos antes de las deposiciones.—Despues de las deposiciones sobreexcitabilidad y decaimiento.—Dolor quemante y **prurito en el ano* y en el recto.—Excoriacion del ano con exudacion.—*Hinchazon de *granos hemorroidales*, que sangran á cada deposicion.

Orinas.—Necesidad frecuente de orinar, con emision poco abundante de una orina fétida, de color oscuro pardusco.—**Incontinencia de orina.*—*Emision dolorosa de orina.—Orina fria.—**Orina fétida.*—Sedimento rojo y arena en las orinas.—Escozor y sensacion de ardor al orinar.—Flujo de mucosidades, algunas veces sanguinolentas, ó de pus por la uretra.—Hinchazon del orificio de la uretra.

Partes viriles.—Fuerte prurito en las partes genitales.—Caida del vello en dichas partes.—Excoriacion entre el escroto y los muslos.—Manchas rojas que se cubren de costras en el prepucio.—Secrecion detrás del glande como una gonorrea bastarda.—Hinchazon, inflamacion y fímosis del prepucio.—**Ulceras como chancros*, en el prepucio y en el glande.—**Excrecencia como higos*, en el prepucio y en el glande, con dolor, escozor y hemorragia al tacto, y exudacion de un pus fétido y dulce.—°Testículos laxos.—*Hinchazon inflamatoria de los testículos*, con traccion dolorosa en el cordon espermático, hasta el costado del vientre.—**Falta de apetito venéreo y de erecciones.*—Mucha lascivia con evacuacion abundante de licor prostático.—Erecciones nocturnas, dolorosas y casi espasmódicas.—*Poluciones muy frecuentes.

Reglas.—Prurito, dolor quemante y sensacion de sequedad en la vulva.—Lancinaciones en la vagina.—Excoriacion en la vulva y entre los muslos.—Ulceras con prurito ardiente en la vagina.—Reglas muy anticipadas.—*Supresion de las reglas.*—Durante las reglas calambres en el bajo vientre, y presion hácia las partes genitales.—Leucorrea fétida, mucosa, corrosiva.—Flujo fétido de color pardo, rojizo por la vagina.—°Nudosidades duras en las mamas.—Atrofia de los pechos.

Laringe.—**Ronquera* con coriza, tos y dolores lancinantes en la garganta.—*Aspereza en los bronquios.—Arañamiento y punzadas en la tráquea-arteria, sobre todo

despues de haber leido, ó de una conversacion sostenida.—Tos con punzadas y dolor de excoriacion en la garganta y en el pecho.—*Tos solamente por el dia.—*Tos seca, sobre todo *por la noche* en acostándose.—*Tos con aullido.—Tos con vómito.—Tos conmovente por la noche, con suspension de la respiracion, casi como en la coqueluche.—Al toser, lancinaciones en los riñones, ó cefalalgia, ó incomodidad de estómago, ó en los hipocondrios, ó dolor de excoriacion y punzadas en el pecho.—**Expectoracion purulenta, amarillenta producida por la tos.*—Tos corta, con expectoracion de una sangre negra coagulada.

Pecho.—**Respiracion sibilante*, sobre todo durante un trabajo manual.—*Dificultad de la respiracion.—*Respiracion corta.—Disnea con palpitacion de corazon al andar ó subir una escalera.—Calambres de pecho contractivos, punzadas *en varios puntos del pecho* y en los costados.—Dolor de excoriacion en el pecho al respirar y al toser.—*Congestion en el pecho*, con angustia, calor y *palpitacion de corazon.—°Neumonias de personas de edad avanzada, flacas y coléricas*, con tos seca ó expectoracion abundante, verdosa, estrias de sangre, con punzadas violentas, sobre todo en el lado izquierdo, opresion violenta y mucha debilidad.

Tronco.—*Dolor en el dorso y en los riñones despues de un enfriamiento.—**Punzadas entre los omóplatos.—Rigidez de la nuca.—*Hinchazon de las glándulas del cuello y de las axilas.—Supuracion de las glándulas axilares.*

Brazos.—Dolor presivo en la articulacion del hombro.—*Traccion en los brazos.*—Estremecimiento de los músculos de los brazos.—Dolor de quebrantamiento en los brazos, que impide levantarlos.—*Traccion y dislaceracion en los antebrazos y las manos.*—Debilidad y temblor de los antebrazos y de las manos.—Verrugas en los brazos.—°Grietas y ragades en las manos.—°Manchas cobrizas en las manos.—Manos frias.—°Piel de las manos áspera.—Dolor tensivo en la articulacion de los dedos.—Hinchazon de los dedos, sobre todo en las articulaciones, con dolor lancinante.—*Dedos como muertos y adormecidos al aire frio.—**Sabañones en los dedos y en las manos.*—*Herpes entre los dedos.—*Manchas blancas sobre las uñas.

Piernas.— Dolor de luxacion en la cadera, que obliga á cojear.— Laxitud, pesadez y **frio en las piernas* y en los piés.— *Traccion y dislaceracion en las piernas y en los piés.* —°*Inquietud en las piernas*, por la tarde.—*Prurito en los muslos.—°Dolor en los muslos al levantarse de su asiento.—Dolor en la corva, que no permite apoyar el pié.— Rigidez y punzadas en la rodilla.— Genuflexion de la articulacion de la rodilla y del pié.— *Debilidad de la rodilla.— Calambre violento en la pantorrilla*, sobre todo por la noche y hácia la mañana, *asi como al andar*, despues de haber estado sentado.—°Estremecimiento en las pantorrillas.—°Punzadas en los talones apoyando el pié. —**Sudor de los piés*, algunas veces fétido, con excoriacion entre los dedos.— Sudor en los piés.— *Sabañones en los dedos del pié.*

142.—NUPHAR LUTEUM.

NU PH.— *Journal de la Société Gallicane*, t. III, p. 129.

AVISOS CLINICOS.— Hasta aquí se ha empleado este medicamento, todavia poco conocido, contra: *Diarreas* crónicas matutinas, casi sin dolor, con debilidad de las partes genitales.—*Depresion de las facultades sexuales*, y poluciones sin ereccion, con debilidad de los órganos sexuales.

143.—NUX JUGLANS.

N-JUGL.— Nuez de nogal.— *Juglans regia.*— Gazette autrichienne.— *Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.
ANTÍDOTOS? DURACION DE ACCION? DÓSIS USADAS?

AVISOS CLINICOS.—Este medicamento no ha sido, por desgracia, estudiado hasta ahora mas que por la escuela *austriaca* ó *especificista*, es decir, únicamente á fuertes dósis, no habiendo suministrado ninguno de esos sin-

tomas que indican los medicamentos de una manera especial y precisa en los casos particulares de una enfermedad, y que no se obtienen ordinariamente mas que cuando las sustancias son estudiadas en las atenuaciones intermedias. Sin embargo, se verá si los síntomas siguientes podrán algunas veces indicar los casos precisos en los que podrá ser administrada con buen éxito la nuez contra ciertas enfermedades, tales como:—Fiebres intermitentes; *Afecciones escrofulosas de todas clases*; Afecciones raquíticas; Infartos glandulares; *Ulceras*, *herpes*, *oftalmías*, diarreas *sifilíticas*, *escrofulosas* y *mercuriales*; Leucorreas; Cólera, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

GENERALIDADES.—Laxitud, abatimiento y sensacion de relajacion de los músculos.—Agravacion de algunos padecimientos por la tarde y la noche, así como despues de comer; aliviados despues de las deposiciones.

Piel.—Prurito en diversas partes sin erupcion visible.—Pústulas pequeñas, en la cara, sobre todo en la boca, como en el acné rosa.—Granos rojos de pequeño volúmen en el cuello, la cara, espalda y dorso, los que se llenan de un humor espeso.—Vesículas pequeñas como del *eczema rubrum*, con prurito ardiente, encendimiento y grietas en la piel, resudando un líquido que deja tieso el lienzo y le tiñe de un amarillo verdoso, y se agravan por la traspiracion.—Pápulas pequeñas como las del *liquen*, en el empeine del pié, con rubicundez, mucho prurito, engrosamiento de la piel y costras duras.—*Manchas rojas* como pápulas, ó bien con un punto purulento en medio.—Tumor poco voluminoso, duro, rojo y redondo, en el brazo, como una pequeña glándula endurecida, ó un tumor enquistado.—Ulcera en el pene, de borde grueso y duro, de fondo lardáceo y que sangra fácilmente.—Tumor duro, encendido y muy dolorido, en el carrillo, que parte de la encía, teniendo en medio una mancha circular de rojo oscuro, blando y aplanado, formando un absceso que se desocupa por el interior.

Sueño.—Pandiculaciones y bostezos frecuentes.—*Mucha agitacion y anhelacion por la noche en la cama*, á veces con sensacion como si volara por el aire, con vértigos rota-

torios.—*Sueño nocturno agitado*, con *muchos ensueños horrorosos*. — Despierta con sobresaltos durante la siesta, como por sacudidas eléctricas en los antebrazos y en las manos á cada esfuerzo para dormirse.

Fiebre—Por la tarde, cara ardiente con las extremidades frias.—Accesos frecuentes de calor fugaz.—*Pulso mas frecuente por la tarde*, á veces con calor ardiente en las manos.

Moral.—Humor apesadumbrado y disgusto por la tarde. —Mucha repugnancia á la conversacion y las discusiones.—Debilidad de entendimiento, falta de atencion en leyendo y aversion al trabajo.

Cabeza. — Vértigos.— Agitacion y excitacion como por embriaguez, con sensacion como si volase por el aire. —*Peso en la cabeza* por la mañana, con atontamiento.— *Dolor en la frente*, á veces y sobre todo en moviendo con fuerza la cabeza y agitando mucho los ojos.— *Cefalalgia debajo de los ojos, sobre todo del lado izquierdo*, á veces presiva y *aumentada por el movimiento*.—Cefalalgia con pesadez en la cabeza y sensacion de ardor en los ojos.— Dolor de cabeza, como una jaqueca, circunscrito á un punto reducido del hueso parietal izquierdo, exacerbándose considerablemente por la conversacion. —Calor quemante en la cabeza con frio glacial en las extremidades, al principio de la noche en la cama.

Ojos.— Dolor en los ojos como si un coriza fuera á declararse.— Sensacion de ardor en los ojos.

Nariz.—Peso en la nariz como al empezar una coriza.

Cara.—Pústulas pequeñas en la cara, sobre todo alrededor de la boca, como en el acné rosa.—Tumor duro, encendido y doloroso en la mejilla hasta el labio, formando abscesos que vienen á supuracion.

Dientes.— Odontalgia tenaz, tractiva, en los dientes cariados, por la tarde, y aumentada por el calor de la cama.— Abscesos muy dolorosos en las encías.

Boca. — Acúmulo de saliva en la boca. — Lengua cubierta de mucosidades blancas por la mañana en despertándose.

Garganta.—Acumulacion de mucosidades, obligando á roncar frecuentemente.

Apetito y gusto.—*Gusto amargo en la boca*, particularmente por la mañana al despertar, ó pastoso.— Apetito

aumentado.—Sed intensa, ó bien adipsia completa á la comida y á la cena, con una especie de repugnancia al vino y placer de conservar la boca seca.— Le desagrada el fumar, por la tarde.— Despues de la comida agravacion de la mayor parte de los síntomas.

Estómago.— *Eructos violentos y ruidosos* y mucha disposicion á reproducirse las regurgitaciones.—Hipo, sobre todo despues de haber comido alimentos pesados.— *Dolor al corazon y náuseas*, con acúmulacion de agua en la boca y conato al vómito, ó bien con sensacion de ardor en el estómago.— Vómito de los alimentos al principio de la noche en la cama.— *Mucha plenitud*, *sensacion y timpanitis del estómago*, no permitiéndole comer nada á pesar de tener el mejor apetito, y aliviados tan solo por las regurgitaciones.— Presion en el estómago.

Vientre.— *Punzadas en el lado izquierdo, tanto en el vientre como en los hipocondrios*, *sobre todo en bajándose*, en riendo ó andando de priesa.—*Presion dolorosa en el bajo vientre*, sobre todo en el *lado izquierdo*, aliviada por las regurgitaciones ó por la emision de gases.— Dolor violento en la parte inferior del bajo vientre, presivo y tractivo, con reglas muy anticipadas.— *Mucha plenitud*, *timpanitis*, *tension*, *cargazon de vientre*, á veces con necesidad frecuente de deponer, ó despues con *mejoria por las regurgitaciones y la emision de gases*.—*Flatuosidades continuas y emision frecuente de gases*, sobre todo en estando acostado.— Ruido como de agua en el vientre y borborigmos.— Los gases expelidos casi no tienen olor. —Dureza timpanitica de vientre.

Deposiciones.— A veces deposiciones duras y constipacion, ó bien necesidad frecuente de deponer.— Deposiciones líquidas, precedidas de pellizcos en el vientre.— Despues de la deposicion mejoría de la timpanitis y del peso del vientre, ó bien sensacion de ardor y presion en el ano.— Prurito en el ano, por la noche en la cama, con punzadas que obligan á levantarse.

Orinas.— *Necesidad casi continua de orinar*, *emision muy frecuente dia y noche y secrecion de orinas considerablemente aumentada*.— Emision de orina involuntaria, gota á gota, si la urgente necesidad no es satisfecha de pronto.—Orinas claras, color de vino blanco y sin sedimento.

Partes viriles.— Erecciones frecuentes dia y noche.—

Ulcera cerca del frenillo del prepucio, con bordes gruesos y duros, de fondo lardáceo y que sangra con facilidad.

Reglas.— Reglas muy anticipadas cada quince dias, precedidas de fuertes dolores en las ingles, y que duran ocho dias, con sangre abundante y cuajarones negruzcos.

Pecho.— Punzadas fugaces como si fuera en los dos pulmones.— Opresion en el pecho andando y antes de andar.— Prurito en el esternon, obligando á rascarse.

Tronco.— Punzadas en el sacro, tan violentas que le hacen estremecer.—Granos rojos, como los del *acné*, en el dorso, la nuca y las espaldas, los que se llenan de un pus espeso.— Debajo de las axilas, pequeñas vesículas, como de un eczema rojo, con prurito quemante y ligera resudacion con rubicundez, excoriacion y grietas en la piel.— Diviesos muy dolorosos, gruesos y purulentos en la espalda y la region del hígado.

Extremidades superiores.— Manchas grandes, pruritosas, en medio de la sangría del brazo con una pequeña elevacion purulenta.—Tumor pequeño indolente, duro, rojo y redondo en los brazos, como una pequeña glándula endurecida, ó un tumor enquistado.— Pápula dolorosa y purulenta, formándose en el antebrazo sobre una pequeña placa roja, ardiente y pruritosa.—Forúnculo muy doloroso, grueso y duro en el músculo biceps braquial del brazo derecho.—Herpe crónico en la mano, que viene á hacerse pruritoso y rojo.— Tirones y sensacion de debilidad paralítica en la mano derecha.— Prurito en los dedos ó bien en los brazos, por la noche en la cama.— Tirones en el pulgar y el índice de la mano derecha, como por lisiadura.

Extremidades inferiores.— Dolores en la articulacion coxo-femoral al andar.—*Dolor en la articulacion de la rodilla que imposibilita el andar*, bien lancinante, ó reumático, ó como debilidad paralítica.— Estirones como por luxacion en el dedo pulgar derecho.— Sensacion de ardor y prurito en las piernas por la noche en la cama.— Pequeñas pápulas como las de liquen, en el empeine, con rubicundez, mucho prurito, engrosamiento de la piel y costras duras.

Digitized by Google

144.—NUX MOSCHATA.

N-MOS.—Nuez moscada.—Hell.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*:?
Antídotos: Semina cari carvi (comino).
Compárese con: Con. ign. magn. mosch. n-vom. op. sep. puls. aulf.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que deberá ser consultado este medicamento contra:—*Afecciones principalmente de las mujeres y de los niños*; *Afecciones ocasionadas por la influencia de un frio* (húmedo); Afecciones reumáticas; Neuralgias?; Afecciones escorbúticas?; Eclampsia de los niños?; *Accesos de desfallecimiento y otros paroxismos histéricos*; Convulsiones?; Afecciones escrofulosas y raquíticas?; Tabes dorsal?; Atrofia de los niños?; Fiebres intermitentes; Fiebres tifoídeas; Coma?; Imbecilidad?; Apoplejía?; Cefalalgia por indigestion; Ambliopia amaurótica?; *Efélides*?; *Odontalgia de las embarazadas*; *Odontalgia por el aire frio y húmedo de la tarde*; Parálisis de la lengua y de los órganos de la deglucion?; Anginas?; Aftas en la boca?; *Náuseas y vómito de las embarazadas*; Dispepsia, sobre todo de los ancianos?; Gastralgia?; *Infarto del hígado* (y del bazo?); Cólicos flatulentos, nefríticos y verminosos?; Cólicos de los niños?; *Diarreas*, sobre todo á causa de un estado de debilidad ó por enfriamiento; Diarreas pútridas y sanguinolentas; *Diarreas de los niños*; Disenterías; Cálculos urinarios?; Disuria?; Impotencia?; Espermatorrea?; Parto laborioso, dolores de parto falsos, espasmódicos ó débiles?; Prodromos del aborto?; *Odontalgia y padecimientos gástricos* (y tos?) *de las mujeres embarazadas*; *Amenorrea* á consecuencia de un enfriamiento en el agua; Dismenorrea?; Metrorragias?; Prolapsus de la vagina, del recto, etc.?; Tos catarral por enfriamiento en el agua; Tísis?; *Padecimientos asmáticos*; Hemoptísis?; *Enfermedades del corazon*, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores con sensacion como si escarbaran*, *y presivos* que pasan de un sitio á otro y que

nunca ocupan mas que un pequeño espacio; duran pocos instantes, pero reaparecen muy pronto.—Traccion en los miembros, especialmente durante el reposo, así como despues de un enfriamiento.—**Por un tiempo frio* (y húmedo) *dolores en los miembros y en las articulaciones* y otras incomodidades.—Los síntomas se agravan al aire frio; el calor exterior los alivia.—Afecciones acompañadas de gana de dormir y de disposicion *á desvanecimientos.—*Accesos de desvanecimiento.*—Convulsiones.—Estado de enfriamiento como cuando uno se enfria repentinamente despues de sudar, con dolor en la nuca y en todos los huesos.—Excesiva sensibilidad dolorosa de todo el cuerpo, aun estando echado sobre mullido; la parte sobre la que está acostado, se pone luego muy dolorida.—Mucha agitacion del sistema muscular.—Despues de la mas ligera fatiga laxitud y necesidad de acostarse.—*Excesiva laxitud*, sobre todo, *en los riñones y en las rodillas*, como despues de una larga carrera, con *gana de dormir.*

Piel.—*Piel fria y seca, poco dispuesta á la traspiracion.*—°Sabañones.—Manchas azuladas en la piel.

Sueño.—*Mucha gana de dormir.*—Soñolencia comatosa y sopor.

Fiebre.—Considerable sensibilidad al aire frio, el que ocasiona rápidamente *calofrios con palidez del rostro.*—Calofrios frecuentes.—°*Fiebre*, *terciana* doble, con gana de dormir, lengua blanca, estertor, expectoracion sanguinolenta, y sed moderada durante el calor.—°Fiebre maligna, con diarrea pútrida ó colicuativa?—Sudores sanguinolentos.

Moral.—*Humor variable*, con deseo, tan pronto de una cosa como de otra.—*Mucha disposicion á mofarse de todo*, especialmente estando al aire libre, y á veces con un aspecto de estupidez como por imbecilidad.—Afluencia incesante de ideas jocosas.—Humor variable, tan pronto sério como alegre.—Debilidad de la memoria y olvido.—**Lentitud en la marcha de las ideas, concepcion difícil de estas, *aturdimiento.—*Ausencia de ideas*, como falta de entendimiento.—Demencia y enajenacion mental.—*Manía*, con palabras extravagantes y gestos raros, que no vienen al caso.—Delirios.

Cabeza.—**Turbacion* y pesadez presiva en la cabeza, y

sobre todo en la frente.— *Vacilacion* con angustia, rigidez del cuerpo y aturdimiento.— *Vértigo como por embriaguez*, con delirios y chocheces, ó con aturdimiento. —*Cefalalgia como por una indigestion, sobre todo despues del desayuno.—Dolores de cabeza presivos, con peso y turbacion de esta.— *Dolores de cabeza, sobre todo en las sienes*, con calor interior y *sensacion, como si el cerebro vacilase al mover la cabeza.*— Sensibilidad dolorosa de la sien al tacto.— Dolores de cabeza presivos y pulsativos, sobre todo por encima del ojo izquierdo.— Los dolores de cabeza se manifiestan generalmente despues de la comida, y mas particularmente del desayuno.

Ojos.—Sequedad de los ojos y *sensacion de sequedad*, que impide el movimiento de los párpados. — Lagrimeo abundante y dolores ardientes en los ojos.— Tension alrededor de los ojos y en los párpados.— Sensacion de plenitud en los ojos, con contraccion de las pupilas.

Oidos.—Otalgia con dolores lancinantes.— Dolor en las trompas de Eustaquio, á las mutaciones de tiempo, como por un cuerpo áspero, y sobre todo al acercarse la lluvia ó el viento.

Cara.—*Palidez del rostro, y círculos azules alrededor de los ojos.— Sensacion de hinchazon en toda la mitad izquierda de la cara con picotazos ardientes, como por el flúido eléctrico.

Nariz.— Obturacion de la nariz, á veces semilateral.

Dientes.—*Dolores lancinantes y de dislaceracion en los dientes, que se extienden hasta los oidos y las sienes, con lancinaciones en el acto de la succion, y exacerbacion de los dolores por el aire y por el contacto.—*Dolores dislacerantes nocturnos en los dientes, con imposibilidad de aproximar las mandíbulas que están como paralizadas.—*Dolores lancinantes en los dientes, agravados por el calor exterior.—*Odontalgia producida por el aire húmedo de la tarde, con dolores compresivos en los dientes y dolores en la nuca*; parece que se mueven los dientes; el agua caliente alivia los dolores.—Dolores de muelas despues de haber trabajado con las manos en el agua, ó á consecuencia de un enfriamiento.— Sacudidas en los dientes despues de haber bebido agua fria.— *Dientes embotados*, como si estuvieran cubiertos de cal.— Hemorragia de las encías.

Boca.—Sequedad y *sensacion de sequedad en la boca* sin sed.—Aliento fétido.—*Acumulacion abundante de mucosidades espesas y de saliva en la boca.*—Sensacion de torpeza de la lengua al tacto, como si fuera de cuero.—*Sequedad y sensacion de lo mismo en la lengua.*—Lengua cubierta de una capa blanca.—Hinchazon de los folículos mucosos sublinguales.

Garganta.—*Mucha sensacion de sequedad en la garganta*, con aspereza.

Apetito.—Gusto en la boca como despues de haber comido mucha sal.—Gusto pastoso ó *como de greda en la boca.*—*Hambre y apetito inmoderados*, sobre todo hácia el medio dia.—Disminucion del apetito y pronta saciedad.—*Sed nula.*—°Decaimiento y malestar despues de la comida.—*Debilidad de la digestion y del estómago.

Estómago.—Erutos ácres, poco despues de la comida.—Náuseas por el movimiento del carruaje.—Despues de la comida, y sobre todo del desayuno, agravacion de los padecimientos, y principalmente de los dolores de cabeza.—Plenitud de estómago con dificultad de la respiracion.—Sensacion de calor, y dolor ardiente en el estómago.—Estómago timpanítico.—Calambres de estómago, *con mucha debilidad de la digestion.*—Presion en el estómago, como por encarcelacion de gases.

Vientre.—Presion en el hígado, como por cuerpos duros y puntiagudos.—°Hinchazon del hígado.—°*Sensacion de peso en los hipocondrios y en la parte superior del vientre.*—Cólico con dolor dislacerante.—**Timpanitis* con náuseas y arañamiento en la region umbilical.—*Retortijones*, como por lombrices, con *gana de dormir.*—**Padecimientos flatulentos por la noche que turban el sueño.*

Deposiciones.—*Deposiciones blandas, lentas, difíciles de evacuar.*—°*Diarreas por debilidad ó á consecuencia de un enfriamiento.*—*Diarreas sanguinolentas, °pútridas.—°Diarreas como huevos revueltos, con falta completa de apetito (en los niños).—Diarreas de materias no digeridas.—°*Diarrea con falta de apetito y propension al sueño en los niños.*—Diarrea mucosa como por lombrices.—*Afecciones verminosas, con cólicos y soñolencia.*

Orinas y partes viriles.—Al orinar dolores ardientes é incisivos.—Estrangurria.—Orina de olor de violeta.—Falta de apetito venéreo.—Debilidad de las funciones ge-

Digitized by Google

nitales.—Falta de erecciones, aun durante las ideas voluptuosas.—Flujo de licor prostático.

Reglas.—Irregularidad en los ménstruos.—Antes de las reglas dolores de riñones y laxitud con presion en el estómago, aflujo de agua en la boca, como pituitas y dolores hepáticos.—Durante las reglas sensacion como si todo acudiese hácia el bajo vientre y tracciones en los miembros.—Flujo menstrual espeso y de color oscuro.—°Supresion de las reglas.—°*Metrorragia espesa, oscura con presion que tira hácia abajo.*—Mamas muy pequeñas y sin leche.

Laringe.—Voz temblorosa.—**Ronquera y catarro.*—°Ronquera repentina andando contra el viento.—Tos con dolor en el pecho, como si estuviera en carne viva.—°*Tos seca con suspension de la respiracion, despues de un enfriamiento en el agua.*—°Tos seca que se establece cuando está ocupado de un trabajo que fatiga, ó con el calor de la cama.—Tos con expectoracion de sangre.

Pecho.—Disnea.—**Respiracion corta*, sobre todo *despues de la comida*.—Dificultad de la respiracion.—Estrechez de la garganta, como por estrangulacion.—**Opresion de pecho* que viene ordinariamente del epigastrio.—Plenitud y *sensacion penosa de un peso sobre el pecho*.—**Palpitacion de corazon*, algunas veces con accesos de desvanecimiento.—Temblor del corazon.

Tronco.—Traccion en los músculos de la nuca por la impresion de un aire húmedo.—*Dolores como de rotura en los riñones y en el dorso*.—Dolor en el dorso andando en carruaje.—Laxitud en los riñones y en las rodillas.

145.—NUX VOMICA.

N-VOM.—Nuez vómica.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 15, 24, 30.—*Duracion de accion*: 15 á 20 dias, y mucho mas tiempo.

ANTÍDOTOS: Acon. alcohol. camph. cham. coff. cocc. puls. vinum.—*Se emplea como antídoto de:* Ambr. ars. calc. cham. chin. cocc. coff. colch. cupr. dig. graph. lach. petr. phos. puls. stram. sulf. tabac.

COMPÁRESE CON: *Acon.* alum. *ambr.* amm. *arn. ars.* bis. bry. *calc.* cann. caps. *carb-veg.* caus. *cham. chin. cocc. coff. colch. con. cupr. dig.* dros. dulc. *ferr. graph. hyos. ign. ipec. lach.* laur. lyc. magn. magn-m. *merc.* mur-ac. *natr. natr-m.* n-mos. *op. petr. phos. sep. st. am. sulf. tabac.* tart. mgs.—Cuando la

nuez vómica producirá buen efecto siempre que se halle indicada será sobre todo despues de: *Ars. ipec. lach. petr. phos.* y *sulf.*—Despues de la nuez vómica se verá que conviene frecuentemente: *Bryon. puls. sulf.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra: *Padecimientos por el abuso del café, del vino* ú otras bebidas *espirituosas* ó medicamentos *narcóticos*; Malas consecuencias de un *enfriamiento*, de un arrebato de *cólera*, ó de un *exceso de estudio*, ó de *vigilias prolongadas*, ó de una *vida sedentaria*; Afecciones, principalmente de las personas de un *temperamento vivo*, *colérico* ó *sanguíneo*, de ojos y cabellos negros, color pálido ó amarillo, ó de *muy buen color*; *Constitucion biliosa*, *seca*, *ó pletórica*, y fuerte, ó linfática, endeble y agotada, ó constitucion venosa con disposicion á hemorróides, á la hipocondría, á la histeria y á la melancolía; *Afecciones periódicas é intermitentes*; Padecimientos y dolores en los miembros por un tiempo áspero y tempestuoso; Afecciones reumáticas; Prodromos y metastasis artríticas; Congestiones sanguíneas á la cabeza, al pecho, ó al vientre; Debilidad física y nerviosa á causa del onanismo, de polucione s ú otras pérdidas debilitantes; Accesos de desvanecimie nto y de debilidad histérica ó hipocondríaca; Atrofia de los niños escrofulosos; Debilidad muscular y dificultad de aprender á andar en los niños?; Afecciones de las glándulas y de los vasos linfáticos; Accesos de convulsiones, de epilepsia, de tétanos, de baile de San Vito; Parálisis, principalmente de las extremidades inferiores; Padecimientos cloróticos ó ictéricos; Diviesos; Sabañones; Equímosis; Erupciones miliares; Afecciones á consecuencia del sarampion, tales como la miliar blanca, tos catarral, etc., etc.; Fiebres inflamatorias con afecciones gástricas, mucosas ó biliosas; Fiebres cotidianas, tercianas y cuartanas; Fiebres tifoídeas. Fiebres lentas; *Enajenacion mental de los borrachos*; Afecciones morales por exceso de estudio, ó debidos á una humillacion, ó á un arrebato de cólera; Manía; Melancolías hipocondríacas é histéricas; Congestion cerebral con vértigos; Apoplejía sanguínea; Cefalalgia catarral, congestiva, nerviosa ó histérica; *Jaquecas*; Incomodidades de la cabeza por el abuso del café ó de las bebidas espirituosas,

por estudios forzados ó por un temporal crudo y ventoso; Oftalmías catarrales, ó escrofulosas (ó artríticas?); Fotofobia escrofulosa; Hemorragia de los ojos; Coriza en el período inflamatorio; Otalgia inflamatoria; Prosopalgia y odontalgias reumáticas con fluxion; Odontalgia por el abuso del café; Denticion difícil de los niños, con fiebre; *Estomacace*; Angina escarlatinosa; *Angina catarral*; Angina faríngea, uvular y tonsilar; *Gastralgia*; Gastritis; *Afecciones gástrico-mucosas ó biliosas; Dispepsia, aun con vómito de alimentos;* Vómito de los borrachos, de las mujeres embarazadas, etc.; Estrechez y escirro del cardias?; Cólera?; Dolores hepáticos?; *Hepatitis*; Obstruccion y dureza del hígado y del bazo, aun por el abuso de la quina; Tabes mesentérica; Congestiones abdominales y estancacion en el sistema de la vena porta; Cólicos espasmódicos, flatulentos y hemorroidales; *Cólicos por arenillas vesicales*; Hernias umbilicales y crurales?; *Hernias estranguladas*; Hernias inguinales; Peritonitis; *Estreñimiento tenaz*, principalmente á causa de una *vida sedentaria* ó por *abuso del café*; Diarreas mucosas ó sanguinolentas; disentería; Estrechez espasmódica del ano y de la uretra; *Hemorróides ciegas y que sangran*; Iscuria y estrangurria espasmódicas, ó á consecuencia de la litiasis; Catarro de la vejiga de la orina; Gonorrea bastarda; Orquitis; Inflamacion del cordon espermático; Satiriasis?; *Cólicos menstruales con reglas muy anticipadas*; Supresion de los lóquios; Amenorrea?; Leucorreas; Prolapso de la matriz y de la vagina; Cefalalgia; Odontalgia, náuseas, vómito, cólicos, estreñimiento y otros *padecimientos de las mujeres embarazadas*; Metritis?; Dolores de parto ó retortijones muy violentos; Aborto; *Peritonitis puerperal*; Excoriacion de los pezones; Oftalmia, catarro nasal, hernias, estreñimiento, convulsiones y otros *padecimientos de los recien nacidos*; Catarro inflamatorio de las vías aéreas con tos; *Grippe*; Coqueluche?; Tos convulsiva; Bronquitis; *Pleuresía?*; Asmas espasmódicos, gaseosos y congestivos; Dolores de riñones; Ciática; Gonitis artrítica, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores lancinantes*, conmoventes, ó *dolores con estremecimiento*, dislacerantes y trac-

Digitized by Google

tivos, con sensacion de torpeza y debilidad paralítica de las partes afectas.—Dolores de tal modo insoportables, que quisiera el paciente quitarse la vida.—**Dolores de contusion en los miembros y en las articulaciones*, lo mas frecuente *por la mañana en la cama, y durante ó despues del movimiento.*—*Tension y *rigidez*, adormecimiento y *torpeza*, *pesadez*, *laxitud y parálisis de los miembros.*—Temblor de los miembros.—Palpitacion de los músculos ó sensacion como si hubiera en ellos alguna cosa que se moviese.—Inmovilidad de las articulaciones.—Contracciones calambroídeas en muchas partes.—**Ataques de convulsiones*, de calambres, de tétanos y otros espasmos, algunas veces con *gritos*, *inversion de la cabeza*, temblor de los miembros, evacuacion involuntaria de vientre y de orinas, vómitos, sudor abundante, sed y respiracion estertorosa.—°Cualquiera emocion molesta y renueva los ataques epilépticos.—Los ataques de corea son seguidos de una sensacion de torpeza y de adormecimiento de las partes afectas.—**Accesos de malestar*, principalmente despues de comer, por la tarde ó por la noche, y algunas veces *con náuseas que suben de la boca del estómago*, *ansiedad*, debilidad y *temblor de los miembros*, calor pasajero y *palidez del rostro*, retintin en los oidos, dolores en la boca del estómago, hormigueo en los piés y en las manos, y necesidad de echarse.—**Accesos de desfallecimiento*, al menor esfuerzo, principalmente, *despues de pasearse al aire libre*, y algunas veces *con vértigos*, aturdimiento, aparicion de chispas, oscuridad en la vista, y hervidero de sangre.—*Mucha laxitud y fatiga*, aun *por la mañana*, al ¯despertarse, ó despues de haberse levantado y *mucho abatimiento despues de un paseo aun moderado al aire libre.*—*Caida rápida y general de las fuerzas y *mucha flojedad de los músculos*, con paso ¯vacilante °y postracion.—*Sobreexcitacion de todo el sistema nervioso*, con *excesiva impresionabilidad de todos los órganos*, principalmente de la vista y del oido.—**Sensibilidad excesiva y repugnancia al aire libre* y por las corrientes de aire, con disposicion á resfriarse fácilmente.—*Torpeza del cuerpo, pereza y *horror á todo movimiento*, con *mucho deseo de estar echado* ó sentado, posiciones en las cuales casi todos los dolores se alivian.—*Los padecimientos que han aparecido durante el reposo en la

Digitized by Google

habitacion se mejoran con el paseo al aire libre, y *viceversa*.—*El café, el vino, el humo del tabaco, la meditacion y las vigilias, así como tambien un temporal ventoso, provocan ó agravan muchos de los padecimientos. *Por la mañana al levantarse* ó por la noche hácia las ocho ó las 9, y tambien *despues de comer*, es ordinariamente cuando se está mucho peor y los padecimientos aparecen *periódicamente* en una ú otra de estas épocas.—**Enflaquecimiento general.*

Piel.—°Color pálido *ó amarillo de la piel.—**Ictericia*, con disgusto de los alimentos y accesos de desvanecimiento. —*Piel fria y azulada durante los calofrios.—Prurito con picazon, y quemante por la mañana, ó por la noche, al desnudarse y aun durante la noche.—Sensibilidad, y dolor de excoriacion en toda la piel, con sensacion de torpeza en el sitio que se toca.— Erupciones de un prurito ardiente.—°Sabañones con prurito quemante; °grietas que sangran, é hinchazon de un rojo pálido.—*Diviesos. —*Manchas azuladas, como por sugilaciones despues de una contusion.— °Ulceras con bordes elevados de color rojo pálido.—Erupciones miliares y granulosas, con prurito ardiente.

Sueño.—**Mucha gana de dormir*, principalmente *por la mañana al levantarse*, ó despues de comer, *ó por la noche temprano*, y frecuentemente con *insomnio por la noche.*— Sueño por la ¯mañana muy dulce y prolongado, con dificultad de despertarse.—**Sueño muy corto con dificultad de dormirse antes de media noche, é imposibilidad de permanecer en la cama despues de las tres de la mañana.*—*Por la noche en la cama mucha afluencia de ideas, las que impiden frecuentemente dormir hasta la mañana.—*Estado comatoso, con sueño pesado y profundo, durante el dia. —*Sueño nocturno, ligero, del que se despierta con frecuencia, ¯ó como *una especie de coma vigil, con desvarios llenos de turbaciones y agitacion*, hallándose enfadado porque la noche se le hace larga.—**Durante el sueño sobresaltos frecuentes con espanto, gemidos, lamentos, muchas palabras, llantos*, ¯delirios con intento de escaparse de la cama, respiracion con ronquido ó sibilante y *decúbito dorsal, y los brazos levantados sobre la cabeza.—**Ensueños continuos, fantásticos, terribles y angustiosos ó voluptuosos*, ¯llenos de crueldades y de horrores, ó de meditaciones

y de cuidados; ensueños de foragidos, de cuerpos mutilados, de que se le caen los dientes, de las ocupaciones del dia y de negocios urgentes,—Por la noche agitacion en los muslos, ansiedad é inquietud, calor y ebullicion de sangre.—*Al despertar* por la mañana, *dolor de contusion en los miembros*, *mucha laxitud con necesidad de continuar acostado*, *y accesos de pandiculaciones*, *y bostezos convulsivos*.—Pesadilla.

Fiebre.—**Despeluzamiento*, horripilacion y *frio*, principalmente *por la noche* ó al principio de ella, despues de haberse acostado, ó *por la mañana*, ó al aire libre, ó *al menor movimiento*, ó aun durante el calor como tambien *despues de haber bebido*, de haberse enfadado ó descubriéndose.—*Frio, calofrios y horripilaciones parciales, principalmente en el dorso y en las extremidades.—**Durante los calofrios*, *piel*, *manos y piés*, *cara y las uñas frias y azuladas*; ó dolor, congestion de sangre y *calor en la cabeza*, *con rubicundez y calor de la cara* (ó de una) de *las mejillas*; *sed con deseo de beber cerveza*, contraccion calambroídea en los piés y los dedos de estos; ó punzadas en el costado y en el vientre, *dolores en el dorso y en los riñones*, *tirantez en los miembros*, pandiculaciones, bostezos espasmódicos y necesidad de acostarse.—**Calor*, *principalmente por la noche* ó hácia la mañana, ó en paseándose al aire libre, y algunas veces solamente *en la cabeza ó en la cama*, *con rubicundez de las mejillas*, ó en los piés y en las manos con frio parcial, ú horripilacion y calofrios en el resto del cuerpo.—**Durante el calor*, *vértigos*, *cefalalgia*, *calofrios por poco que uno se mueva*, *ó que se descubra*, *sed* ó repugnancia á las bebidas, con sequedad de la boca, náuseas, vómitos, zumbido de oidos, orinas rojas, dolores en el pecho.—*Accesos febriles, sobre todo por la *mañana* ó por *la tarde*, ó por la noche y compuestos generalmente de *calofrios con calor parcial* (seguido de sudor), ó de *calor precedido, seguido ó mezclado de calofrios*, ó de calor alternado con calofrios, *y sed continua con deseo de beber cerveza*, algunas veces aun antes de los calofrios y despues del calor; tipo cotidiano ó *de terciana*.—°*Accesos febriles*, *con congestiones y dolores de cabeza y padecimientos gástrico-mucosos ó biliosos*, ó con pérdida del conocimiento, mucha debilidad y postracion, aun al principio del acceso.—**Pulso lleno y frecuen-*

Digitized by Google

te, ó pequeño, acelerado ó débil, ó intermitente.—*Sudores abundantes*, algunas veces fétidos ó ácidos, ó de olor á moho; sudores frios y viscosos; *sudores parciales ó semilaterales*, principalmente en la cabeza y en las partes superiores del cuerpo; *sudores nocturnos*, principalmente *despues de media noche ó hácia la mañana*; sudores durante el movimiento al aire libre; sudores que alternan con calofrios ó seguidos de calor y de sed con deseo de cerveza.—Durante los sudores, algunas veces remision de los dolores ó dolor de las partes sobre que se ha estado acostado, horripilaciones ó cólicos por poco que uno se descubra, ganas de vomitar, calor en la cara y en las manos, sequedad de los labios y de la parte anterior de la boca.

Moral.—**Humor hipocondriaco y apesadumbrado*, moroso, cuidadoso y triste, á veces con gana de llorar sin poderlo conseguir.—*Melancolía con *mucha inquietud sobre su estado*, *necesidad de hablar de su mal*, desesperando de la curacion, y *temiendo una muerte próxima*.—Deseo de la soledad, del reposo y la tranquilidad, con aversion á la conversacion.—**Angustia*, *ansiedad é inquietud excesivas*, frecuentemente con agitacion que no permiten permanecer en ninguna parte, como si se hubiese cometido un crímen, lo *que induce hasta el suicidio*.—*Los accesos de angustia se suceden lo mas frecuentemente *por la noche al acostarse*, ó *despues de media noche*, hácia la mañana, y algunas veces van acompañados de palpitaciones de corazon, calor y sudor, náuseas y vómitos, pupilas dilatadas y opresion del corazon.—**Exaltacion y mucha excitacion moral*, con *impresionabilidad extrema de todos los órganos*, sensibilidad excesiva al menor dolor, al menor ruido ó movimiento, *extraordinaria facilidad á asustarse*, y carácter sentimental, el que hace que la música conmueva hasta el punto de derramar lágrimas.—**Exasperacion inconsolable y lamentos*, *quejas y gritos* (durante los padecimientos), algunas veces con calor y rubicundez de las mejillas.—Carácter tímido, desconfiado y suspicaz, con *incertidumbre é indecision*.—**Humor lloroso*, con gran susceptibilidad é irritabilidad, *disposicion á enfadarse y á encolerizarse fácilmente*, *con deseo de criticar y de vituperarlo todo*.—*Humor áspero, malicioso, *querellas*, *injurias é inventivas*, con palabras impúdicas

y llenas de envidia, mezcladas de llantos y gritos.—**Mal humor, despecho y cólera* hasta llegar á cometer violencias.—Imprudencias y torpezas.—***Enfado con *desazon é inaptitud á todo trabajo corporal é intelectual.*—***Incapacidad para meditar; disposicion á equivocarse cuando habla; dificultad de hallar expresiones convenientes; *¯*error acerca de los pesos y las medidas; confusion frecuente al escribir con omision de sílabas y de palabras enteras. —°Divagaciones y acciones maniáticas, visiones espantosas, pérdida del conocimiento y delirios, algunas veces con murmuracion.

Cabeza.—*Turbacion en la cabeza* y aturdimiento con obnubilacion como despues de un desórden en las comidas, principalmente estando al aire libre y al sol.—*Embriaguez*, estupor y aturdimiento.—**Vértigos* con sensacion de *rotacion y de vacilacion del cerebro*, principalmente durante *ó despues de la comida*, y tambien *andando y paseándose al aire libre*, cuando se estornuda, se tose, al *bajarse* y al volverse á incorporar, *por la mañana ó por la noche despues de acostado*, tambien cuando está acostado sobre el dorso, y frecuentemente con *oscurecimiento de la vista*, peligro de caerse, vacilacion, *accesos de desvanecimiento. °zumbido sordo en los oidos y pérdida de conocimiento.—*Congestion de sangre á la cabeza*, con susurro en los oidos.—°Pérdida de conocimiento con estado de coma somnoliento y parálisis de la mandíbula inferior de los órganos de la deglucion y de las extremidades.—**Pesadez, presion y sensacion de expansion en la cabeza como si fuera á estallar la frente*, principalmente *por encima de los ojos.*—***Dolor de contusion en el cerebro.—**Dolores dislacerantes y tractivos ó con estremecimientos en la cabeza*, ó punzadas, ó golpes y dolores pulsativos, ó sensacion como si escarbaran y *como si hubiera un clavo introducido en el cerebro*, ó tension y apretamiento, ó dolor de ulceracion.—Sacudidas y ruido en el cerebro á cada paso que se anda.—***De ordinario, los dolores de cabeza se sienten *con frecuencia en lo interior del cerebro*, ó en el occipucio, ó *en un solo lado*, ó en la *frente hasta los ojos* y en la raiz de la nariz; aparecen principalmente *por la mañana* despues de despertarse, ó al levantarse, *despues de la comida ó al aire libre, ó periódicamente todos los dias á la misma hora*, y se agravan ó se renuevan *por el tra-*

bajo intelectual y toda meditacion, por el *vino*, *el café*, un tiempo crudo y caloroso; andando, bajándose ó meneando la cabeza. —*Dolores de cabeza con inaptitud para la meditacion, °ó con pérdida de conocimiento y delirio, *ó *con náuseas*, *eructos y vómitos*, *ó con calor y rubicundez de las mejillas* y calofrios en lo demás del cuerpo, ¯ó con fatiga, laxitud y mucha necesidad de acostarse.—Inversion de la cabeza hácia atrás durante las convulsiones.—**Dolor de la piel del cráneo y de la raiz de los cabellos*, con excesiva sensibilidad al tacto.—Dolor de excoriacion en la piel del cráneo, por un viento tempestuoso.—Tumores pequeños y dolorosos en la frente. —Sudor viscoso en la frente, paseándose al aire libre.— Sudor semilateral de la cabeza, durante los dolores semilaterales.

Ojos.—*Ojeras y lagrimeo.—*Dolores presivos y tensivos en los ojos, °principalmente al abrirlos mirando al sol. —*Dolores dislacerantes nocturnos en los ojos, ó dolor *ardiente*, *escozor*, sensacion y sequedad, *prurito y comezon* como por sal, principalmente en los ángulos.—Dolor de contusion en el ojo.—**Ojos inflamados*, *con rubicundez é hinchazon de la esclerótica*, ó *de la conjuntiva*.— *Color amarillo de la esclerótica, principalmente en la parte inferior de los globos.—*Equímosis de la esclerótica y *resudacion sanguinolenta de los ojos*.—*Los ángulos de los ojos rojos y llenos de legañas, con aglutinacion nocturna.—Pupilas dilatadas ó contraidas.—*Prurito ardiente ó dolores vivos, tractivos, ó sensacion de excoriacion en los párpados, en los bordes, principalmente por la mañana, ó cuando se los toca.—**Hinchazon y rubicundez de los párpados*.—Contraccion de los párpados como por una cosa que pesa.—Ojos fijos, brillantes.— **Sensibilidad excesiva de los ojos á la luz* del dia, principalmente *por la mañana*. Se ven chispas, ó puntos negros y grises.—Presbiopia.—Oscurecimiento amaurótico de la vista.—Como si todos los objetos estuviesen mucho mas claros de lo que realmente están.—Se ven chispas como relámpagos.

Oidos.—*Apretamiento del oido*, principalmente cuando se mastica ó se aprietan los dientes.—Hormigueo y prurito en los oidos, sobre todo por la noche.—**Golpes y punzadas agudas y dolorosas en los oidos*, que hacen gritar, prin-

cipalmente por la mañana en la cama.—Al deglutir, dolor en el oido como si se comprimiese hácia afuera.—Silbido y chillido, **susurro y retintin en los oidos*.—Sobre todo *durante la menor ocupacion y el menor estado de reposo*.—°*Dureza de oido*.—°Chasquido en masticando.—Las palabras resuenan fuertemente en los oidos de la persona que las pronuncia.—Hinchazon de las parótidas.

Nariz.—Prurito insoportable en la nariz.—Dolor de excoriacion ó de ulceracion en las ventanillas nasales.—**Obturacion de la nariz*, algunas veces en un solo lado, y constantemente *con prurito y flujo de mucosidades*.—**Romadizo*, principalmente *por la mañana*, ó *por la noche*, y *coriza seco*, *con calor y pesadez en la frente*, y obturacion de las ventanillas de la nariz.—**Coriza fluente por el dia* ó *en la mañana*, con sequedad y obturacion nocturna de la nariz.—Picazon en la nariz y en la garganta, calor en las ventanillas nasales y estornudo frecuente durante el coriza.—Mucosidades sanguinolentas en la nariz.—*Epistaxis* y salida de coágulos de sangre por las ventanillas de la nariz.—Exhalacion fétida por la nariz.—*Excesiva sensibilidad del órgano del olfato.—Olor como de azufre quemado, como de queso podrido, ó como el pábilo de una luz.

Cara.—°Aspecto enfermizo, con ojos ojerosos y nariz puntiaguda.—**Cara pálida*, *amarillenta* (sobre todo alrededor de la nariz y de la boca) y *térrea*.—*Calor y *rubicundez de la cara ó* (de la una) *de las mejillas*, °alternando algunas veces con palidez.—Sudor frio en la cara.—Palpitaciones musculares por la noche en la cama ú hormigueo pruritoso en la cara.—**Dolores dislacerantes y tractivos en la cara*, °algunas veces *en un solo lado hasta la oreja*, con hinchazon de la mejilla.—Tension alrededor de la boca, de la nariz y de los ojos, con tumefaccion de estas partes.—**Hinchazon de la cara*, algunas veces *de un solo lado* y con color pálido del tumor.—Granos pequeños purulentos en las mejillas y en la cabeza.—*Sequedad, grietas y exfoliacion dolorosa de los labios.—*Costras y ulceracion en la parte encarnada de los labios* y en los ángulos de la boca.—Granos pequeños purulentos alrededor de los labios y la barba.—Sensacion de excoriacion y pequeñas úlceras en la superficie interna de los labios.—Erupcion herpética en la barba.—

Distorsion de la boca.—*Apretamiento espasmódico de las mandíbulas.*—Punzadas en las glándulas submaxilares al deglutir.

Dientes.—**Dolores de excoriacion* ó de ulceracion, ó dolores tractivos que causan *estremecimiento*, con *punzadas*, ó como si escarbaran, y terebracion *en los dientes y en las mandíbulas*, ó solamente en los dientes cariados, principalmente *por la noche*, ó *por la mañana*, al despertarse, ó *despues de comer*, ó *paseándose al aire libre*, ó inspirando el aire fresco, ó por la tarde, ó meditando y á consecuencia de un trabajo intelectual; *dolores de excoriacion*, frecuentemente *hasta en la cabeza, los oidos y las mejillas*, ó con infarto doloroso en las glándulas submaxilares, *hinchazon y dolor de las encías*, *manchas rojas y calientes en las mejillas y en el cuello*, humor lastimero y desaliento.—°Las odontalgias no ocupan frecuentemente mas que un solo lado; se agravan algunas veces al calor de la habitacion y se mejoran al aire libre.—**Las bebidas y sopas calientes*, así como el *agua fria*, °el vino y el café, renuevan ó agravan igualmente los dolores de muelas.—Vacilacion y caida de los dientes.—**Hinchazon pútrida y dolorosa de las encías*, algunas veces con pulsacion como durante un absceso; sensacion de ardor, tirones y facilidad á dar sangre.—**Ulcera en las encías.

Boca.—**Olor fétido*, °pútrido y cadavérico de la boca, principalmente *despues de la comida*, y *por la mañana en ayunas.*—*Mucha sequedad*, principalmente de la *parte anterior de la boca y de la lengua*, sobre todo despues de media noche.—Dolor en la boca, en la lengua y en el paladar, como si todo estuviese en carne viva y excoriado.—**Acumulacion de mucosidades de un blanco amarillento en la boca.—°Ulceras de un olor fétido, *granos y vesículas dolorosas en la boca, en la lengua y en el paladar.—**Hinchazon inflamatoria* del paladar.—**Acumulacion de agua en la boca*; salivacion nocturna; saliva sanguinolenta; esputos de sangre.—**Lengua cubierta de una capa blanca*, °*espesa*, ó amarillenta, ó *seca con grietas*, pardusca, ó negruzca, con rubicundez viva de los bordes.—**Mucha pesadez de la lengua con dificultad de hablar*, y sensacion en hablando, como si la lengua se condensase.—Habla balbuciente.

Garganta.—*Arañamiento y *dolor de excoriacion en la*

Digitized by Google

garganta, principalmente al deglutir y al inspirar el aire fresco.—Sensacion de hinchazon en el paladar y **dolor deglutiendo en seco, asi como si hubiese un tumor ó un tapon en la garganta*, ó como si la faringe se hubiera estrechado.—Punzadas en la garganta, principalmente al tragar, las que algunas veces llegan hasta las orejas.—**Hinchazon de la campanilla* °y de las tonsilas, **con dolores presivos y lancinantes.—°Compresion y contraccion espasmódica de la garganta.—Sensacion de ardor en la garganta, principalmente por la noche, la que algunas veces se extiende hasta la boca y el esófago.

Apetito.—Gusto salado de la boca, sulfuroso, dulce, metálico, herbáceo ó mucoso.—**Gusto ácido de la boca*, principalmente *por la mañana*, ó despues de haber ingerido los alimentos.—**Gusto ácido de los alimentos*, y principalmente *del pan* (del centeno y del trigo) y *de la leche*.—**Gusto pútrido*, principalmente *por la mañana*.—*Sabor amargo de la boca*, de los esputos, de los alimentos, y principalmente del pan.—*Insipidez de los alimentos*, principalmente de la leche, de la carne, del café y del tabaco.—*Falta de apetito y *disgusto de los alimentos*, y principalmente *del pan de centeno, del tabaco y del café*, y algunas veces con sed contínua.—**Sed*, algunas veces con *repugnancia á todas las bebidas*; principalmente á la leche y la cerveza, *¯ó con deseo de esta última*, ó de leche.—*Deseo de aguardiente ó de greda.—Hambre, algunas veces con disgusto de los alimentos, ó pronta saciedad.—Bulimia periódica despues de medio dia.—*Durante la comida; calor en la cabeza, ¯sudor en la frente, náuseas y accesos de desfallecimiento.—**Despues de la comida, eructos y regurgitaciones, náuseas, gana de vomitar y vómito de los alimentos, presion y dolor calambroideo en el estómago*, timpanitis presiva en el epigastrio, cólicos, pirosis, *cabeza atolondrada y dolorida, desazon y humor hipocondriaco*, ¯ansiedad, *vértigos* y accesos de desfallecimiento, frio y calofrios, con *calor en la cabeza y en la cara, y rubicundez de las mejillas*, fatiga *y deseo de dormir*.—Las bebidas incomodan en el estómago y causan frecuentemente náuseas, con gana de vomitar.—*El pan de centeno y los ácidos causan igualmente padecimientos; pero los alimentos, los mas grasos son los que sientan mejor.

Estómago.—Conato inútil de erutar, con sensacion dolorosa de contraccion espasmódica del esófago.—**Erutos* y *regurgitaciones frecuentes*, y por lo regular *amargos y ácidos*.—**Hipo frecuente y violento*.—**Pirosis*, principalmente despues de haber tomado ácidos ó alimentos grasos.—**Náuseas y arcadas* contínuas, principalmente *por la mañana*, ó durante la comida, ó *despues de haber bebido* ó *comido*.—Vómito acuoso.—**Vomituricion y vómitos violentos de materias mucosas y ágrias*, ¯ó *de alimentos*, ó de materias insípidas, ó *de bilis*, *principalmente *despues de haber bebido* ó *comido*, °ó *por la mañana*, ó aun por la noche, y frecuentemente con dolor de cabeza, calambres en las piernas y en los piés, ansiedad y temblor de los miembros.—**Regurgitacion y vómitos de sangre*, °mezclados de coágulos y de materias negras, con retortijones, ebullicion en el pecho y flujo de sangre negra, con deposiciones duras.—**Presion en el estómago y en el epigastrio como por una piedra*, ó *dolores calambroideos*, *contractivos* y corrosivos, principalmente *despues de haber comido* ó *bebido*, ó *por la mañana*, ó paseándose al aire libre, ó despues de haber tomado café, ó por la noche, y frecuentemente con *tension* y *timpanitis del epigastrio*, opresion y constriccion de pecho, erutos, vomiturición y vómitos.—*Dolores de contusion, pulsacion, *dolor quemante*, *sensacion de excoriacion* y dolores penosos en el estómago.—**Sensibilidad dolorosa de la boca del estómago al tacto* y á toda *presion*; se hacen insoportables los vestidos apretados.—*Mucha ansiedad en la region precordial, como si el corazon fuera á estallar.—°*Sensacion en el cárdias, como si los alimentos se detuviesen en él y subiesen hácia el esófago.*

Vientre.—Dolor contractivo en los hipocondrios.—*Sensibilidad dolorosa á todo contacto en la region hepática* y á todo movimiento, con *dolores pulsativos*, *lancinantes*, presivos y tensivos.—Hinchazon y dureza en la region hepática.—**Presion*, tension y *plenitud*, y *timpanitis*, y sobre todo del epigastrio, principalmente despues de la comida.—**Cólicos con dolores calambroideos*, *contractivos* y *compresivos*, ó *retortijones* y punzadas, ó dolores vivos y tractivos en la region umbilical, en las costillas y en el bajo vientre, *principalmente despues de la comida*, ó despues de haber tomado café, ó *por la mañana*, y frecuen-

temente *con gana de vomitar*, erutos, calor en la cara, laxitud y disposicion al sueño.—Incomodidad de vientre al aire libre como por un enfriamiento, con sensacion como si fuera á declararse una diarrea.—*Sensacion de peso y de hinchazon en el vientre.—*Calor y sensacion de ardor, ó *sensacion de excoriacion*, *como si todo estuviera en carne viva*, ó dolor de contusion en el vientre.—*Congestion de sangre y ebullicion de ésta en el vientre.—*Movimientos en el vientre, como por alguna cosa viva, y conmocion de los intestinos cuando se anda.—**Cólicos flatulentos*, algunas veces por *la mañana*, pero principalmente *despues de haber bebido ó comido*, y frecuentemente con *dolores presivos*, *como por piedras*, *afluencia de gases*, *que se detienen* en los hipocondrios, que suben hasta el pecho, *borborigmos frecuentes y ruido sordo en el vientre*, presion en el ano, en el periné y las vías urinarias, dolores de riñones, timpanitis, ansiedad, fatiga y necesidad de acostarse.—**Dolor de contusion en los tegumentos del vientre*, principalmente en tosiendo ó riendo, etc., etc., con *sensibilidad dolorosa al tacto*.—Palpitacion de los músculos abdominales, con sensacion como si corriese alguna cosa por ellos.—**Sensacion de debilidad en el anillo inguinal*, *como si fuera á salir una hernia*.—Hinchazon de las glándulas inguinales.—Excoriacion del pliegue de la ingle.

Deposiciones.—**Conato frecuente pero inútil de deponer*, *con angustia*, y sensacion como si el ano se hallase estrechado ó cerrado.—**Constipacion tenaz*, frecuentemente *como por inactividad*, ó como por *compresion de los intestinos*, con *deposiciones duras*, *difíciles* y muy voluminosas.—**Evacuaciones incompletas*, con cólicos y sensacion de constriccion del recto.—°*Alternativas de constipacion y de deposiciones diarréicas*.—Deposiciones, mitad blandas ó líquidas, mitad duras, con muchos gases.—**Deposiciones diarréicas en corta cantidad*, *acuosas*, *ó mucosas y sanguinolentas*, con cólicos y retortijones, dolores de riñones y tenesmo, dolor de excoriacion en el recto y dolor quemante en el ano.—**Deposiciones mucosas*, blanquecinas ó verdosas de color oscuro.—**Salida de materias viscosas y de mucosidades sanguinolentas*, ó de sangre pura, aun en las deposiciones no diarréicas.—*Dolor contractivo en el recto*, durante el acto de la deposicion y

Digitized by Google

fuera de ella.—**Constriccion y estrechez espasmódica del recto.*—°Hinchazon y oclusion del ano.—**Hemorroides* con dolor de excoriacion, punzadas, dolor ardiente y *presion en el ano y en el recto*, principalmente *cuando se medita y cuando se está ocupado en un trabajo intelectual.*—Flujo de sangre por el ano.—Prurito, cosquilleo y hormigueo en el ano y en el recto, como por ascárides.—Salida de lombrices.—Presion y prurito en el perine.

Orinas.—**Conato inútil de orinar*, con presion en las vías urinarias; *dolores penosos en el cuello de la vejiga y °emision dolorosa de orinas gota á gota.*—°Estrechez espasmódica de la uretra.—**Evacuacion dolorosa de orinas espesas.*—**Evacuacion frecuente de orinas acuosas* y pálidas, algunas veces con mucosidades espesas ó materias purulentas.—°Orinas rojizas con sedimento de color de ladrillo.—°Dolores en la region renal como si hubiese allí un cuerpo extraño, con imposibilidad de echarse sobre el lado enfermo, **emision rara de algunas gotas de orina saturada, y hematuria.*—**Al orinar, dolor ardiente en el cuello de la vejiga* y en la parte anterior de la uretra.—Prurito y dolor de excoriacion en la uretra antes, durante y despues de la emision de orinas.—*°Cólico nefrítico con vómitos violentos.*

Partes viriles.—**Comezon y prurito en el glande y en la superficie interior del prepucio.*—**Excoriacion y retraccion del prepucio.*—*°Secrecion sebácea abundante detrás del glande.*—Prurito, punzadas y dolores constrictivos en los testículos.—**Apetito venéreo exaltado*, con *erecciones y poluciones frecuentes*, principalmente *por la mañana.*—Poluciones con flacidez del miembro y algunas veces seguidas de frio y de debilidad de las extremidades inferiores.—°Impotencia á consecuencia de excesos en las comidas de noche.—°Despues del cóito, calor seco del cuerpo y sequedad de la boca.—°Hinchazon inflamatoria de los testículos, con sensibilidad dolorosa al tacto, dureza y retraccion de estos.—*Hernias escrotales voluminosas.*—°Dolor calambroídeo y sensacion de estrangulacion en el cordon espermático.—Flacidez del miembro durante el cóito.

Reglas.—°Hinchazon de la matriz con excesiva sensibilidad al tacto.—**Prolapsus de la vagina °ó de la matriz.*—**Dolores calambroídeos y contractivos en la matriz* y en el

bajo vientre hasta los muslos, con *presion dolorosa hácia las partes sexuales* (y flujo de mucosidades).—**Calor ardiente en las partes sexuales*, con deseos venéreos.—**Exaltacion erótica*, *fácil* y á la menor excitacion, principalmente por la *mañana en la cama*.—**Reglas muy anticipadas y muy escasas*.—Repeticion de la regla al plenilunio.—**Durante las reglas*, *cólicos espasmódicos*, *náuseas y accesos de desvanecimiento por la mañana*, ¯*mucha* fatiga, cefalalgia con calofrios y dolores reumáticos en los miembros.—*Flujo de mucosidades amarillentas y fétidas por la vagina.—*Dolores de excoriacion en los pezones.

Laringe.—**Ronquera catarral y apretamiento doloroso de la laringe* y del *pecho*, principalmente *por la mañana*, ó por la noche en la cama, con arañamiento en la garganta, *acumulacion de mucosidades tenaces que no se pueden desprender*, cefalalgia, calor y rubicundez de la cara, despeluzamiento y estreñimiento.—*Sensacion de compresion en la garganta, con peligro de sofocacion.—Imposibilidad de hablar en alta voz.—**Tos seca* y algunas veces contínua, fatigosa, °y aun *espasmódica*, *excitada regularmente por una sensacion de *titilacion y de prurito*, *ó de aspereza y de arañamiento en la garganta*, que aparecen principalmente *por la mañana*, ó al principio de la noche en la cama, ó *toda la noche*, sobre todo hácia la mañana, ó *despues de comer*, ó ¯*periódicamente*, cada dos dias.—*Renovacion ó provocacion de la tos por el *movimiento*, ¯la meditacion ó la lectura, y estando echado sobre el *dorso*.—*En tosiendo punzadas y *dolores de excoriacion en la laringe*, dolor de cabeza como si el cráneo fuera á estallar, dolor de contusion en el epigastrio, °y algunas veces aun con vómito, peligro de sofocacion y sangre por la nariz y por la boca.—Paseándose al aire libre, la tos seca se vuelve húmeda y se establece la expectoracion.—Esputos de sangre coagulada expelidos por la tos.

Pecho.—*Dificultad de la respiracion, respiracion corta, *constriccion asmática y opresion de pecho*, principalmente *por la noche*, ó por la mañana, ó *al principio de la noche despues de acostado*, como tambien *subiendo una escalera*, ó en andando, ó *despues de comer*, y frecuentemente *con sofocacion*, *ansiedad*, presion en el epigastrio, zumbido

Digitized by Google

de oidos, pulso acelerado y sudor.—*Durante los accesos asmáticos, todo vestido apretado alrededor de los hipocondrios es insoportable.—**Respiracion lenta* y sibilante, alternando algunas veces con respiracion acelerada.—Aliento fétido y de un olor ácido.—Necesidad de respirar profundamente.—*Dolor de constriccion y de contraccion calambroídea en el pecho.—*Presion tensiva en el pecho como por un peso*, principalmente *por la noche y al aire libre*, y frecuentemente con dificultad de la respiracion.—*Punzadas en el pecho y en los costados, las que se aumentan respirando y con el movimiento del torax.—Calor y sensacion de ardor en el pecho, algunas veces por la noche, con agitacion, ansiedad é insomnio.—Dolor de contusion en el pecho, frecuentemente con respiracion corta, y principalmente en el esternon y en los costados.—Pulsacion en el pecho y en los costados.—Punzadas y golpes en la region del corazon.—**Palpitaciones de corazon*, *principalmente despues de comer, estando acostado, ó por la mañana, y algunas veces *con náuseas y gana de vomitar, y sensacion de pesadez en el pecho.

Tronco.—**Dolores de contusion en el dorso y en los riñones*, con sensacion de debilidad de estas partes, como despues del parto.—**Dolores de riñones nocturnos* que no dejan volverse en la cama.—Dolor de luxacion ó como despues de una derrengadura, en el dorso y en los omóplatos.—**Dolores reumáticos*, *tractivos* y ardientes en el dorso, algunas veces al principio de la noche.—*Convulsiones en el dorso, con inversion de la cabeza.—Punzadas y dolor de constriccion entre los omóplatos.—Tirones, dolor de contusion, rigidez y sensacion de peso en la nuca.—Hinchazon de los músculos del cuello, con dolor como si fuesen demasiado cortos.

Brazos.—Dolores reumáticos, con sensacion de debilidad en las espaldas y brazos.—Pereza, torpeza, fatiga y falta de fuerza en los brazos.—Parálisis de los brazos, con insensibilidad y sensacion como si hirviese la sangre.—*Tirantez en los brazos, *con sensacion de torpeza é inmovilidad*, principalmente por la noche.—Miliar pruritosa en los brazos.—Hinchazon de los músculos del antebrazo, con dolor como si estuviesen quemados.—Adormecimiento y torpeza del antebrazo, por la mañana.—

Dolor de luxacion en las muñecas.—Debilidad paralítica de la mano.—Adormecimiento fácil de las manos y de los dedos.—Manos frias.—*Excesivo sudor y algunas veces fresco de las palmas de las manos.*—Calor de las palmas de las manos.—Entumecimiento de las venas de los brazos y de las manos.—Hinchazon pálida de las manos y de los dedos.—*Contraccion calambroidea de las manos y de los dedos*, con dolor como si los tendones fuesen demasiado cortos, principalmente durante los calofrios ó despues de media noche.—Hinchazon caliente y dolorosa del pulgar, y que pasa á ser un absceso en la articulacion. —*Rubicundez y prurito quemante én los dedos, como de sabañones.

Extremidades inferiores.—Granos con prurito corrosivo en la nalga.—*Punzadas, dolor de luxacion y estremecimiento en la articulacion coxo-femoral.—**Dolores vivos y lancinantes en los muslos, con torpeza y debilidad paralítica* agravados por el movimiento y el contacto.—*Dolor como de quebrantamiento en los muslos.*—Miliar, con prurito ardiente y *diviesos en los muslos* y en las rodillas.—Frio ó sudor en los muslos por la noche.—*Mucha pesadez, vacilacion, debilidad y temblor en las piernas, con genuflexion de las rodillas*, ó imposibilidad de andar ó estar de pié.—El niño cae fácilmente al ir á andar.—**Rigidez y tension en las corvas, como si los tendones estuvieran muy cortos*, principalmente al levantarse del asiento.—Sensacion de sequedad en la articulacion de la rodilla, con crujido al moverla.—°*Hinchazon dolorosa de la rodilla*, con nudosidades gotosas.—*Disposicion de las piernas á adormecerse fácilmente.*—°Parálisis, frio ó insensibilidad de las piernas.—Dolor tensivo y *calambres en las pantorrillas*, principalmente *por la noche*, ó por la tarde, ó despues de *media noche*, ó por la mañana *en la cama*.—Calambres en los piés y en los dedos.—°Hinchazon roja de la pierna, con manchas negras, dolorosas.—Luxacion fácil del empeine del pié.—Hinchazon del dorso de los piés.—Adormecimiento fácil de los piés (piés como muertos). Contraccion de los dedos de los piés.—*Prurito ardiente en los dedos de los piés, como por sabañones.

146.—OLEANDER.

OLEAND.—Laurel rosa.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 6, 30.—*Duracion de accion*: 3 á 4 semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. cocc. n-vom. puls. sabad.

COMPÁRESE CÓN: Anac. chin. *cocc.* n-vom.

CLINICA.—Hasta el dia no se ha empleado este medicamento mas que contra:—*Parálisis*; *Herpes en las orejas*; *Erupciones en la cabeza*, y una especie de debilidad intelectual que se manifiesta por *la distraccion*.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Tension calambroidea*, como si los huesos estuvieran quebrantados, *en los miembros* y en otras partes del cuerpo.—*Mucha debilidad*, que no permite apenas andar.—Sensacion de vibracion y como de sonoridad en todo el cuerpo.—Tension en todo el cuerpo.—Rigidez paralítica de los miembros, y parálisis sin dolores.—Accesos de desvanecimiento, como por debilidad, á veces con pérdida del conocimiento, disipándose despues de haber transpirado.—Debilidad y laxitud general, con temblor de las rodillas estando acostado, y de las manos escribiendo.—Abatimiento, como si fuera á concluirse la vida.—Necesidad de extender los miembros.—Torpeza é insensibilidad de todo el cuerpo.

Piel.—Prurito corrosivo que obliga á rascarse, algunas veces al desnudarse.—Piel muy sensible, con rubicundez y excoriacion por poco que uno se rasque.

Sueño.—*Bostezos frecuentes con horripilacion* y estremecimiento de los músculos.—Necesidad de acostarse, con una especie de soñolencia.—Insomnio y agitacion por la noche.—*Sueños agitados y lascivos*, y despierta frecuentemente.

Fiebre.—Accesos frecuentes de horripilacion repentina.—Sensacion de calor con calofrio general.—Calor fugaz, sobre todo durante un trabajo intelectual.—Pulso fre-

cuente y lleno, ó irregular y variable.—Falta de calor vital.

Moral.—Tristeza y falta de confianza en sí mismo.—*Repugnancia al trabajo*, y excesiva pereza.—Irascibilidad, morosidad y *mal humor*.—Humor que no soporta contradiccion alguna.—Arrebato colérico, seguido de pronto arrepentimiento.—Debilidad de la memoria.—*Mucha distraccion é inadvertencia.*—Aturdimiento.—*Entendimiento obtuso, con difícil concepcion de las ideas.*—Desvarios poéticos sobre el porvenir.

Cabeza.—*Vértigo rotatorio*, con vacilacion de las piernas.—Vértigo al levantarse despues de haber estado acostado, ó mirando hácia abajo cuando se está en pié.—Vértigo rotatorio, oscurecimiento y chispas en los ojos.—*Dolores de cabeza con aturdimiento*, como si el cerebro estuviera distendido.—*Pesadez dolorosa de la cabeza* que se alivia echándose.—*Presion* sorda *en la cabeza, como si la frente fuera á abrirse.*—Latidos dolorosos y pulsativos en la cabeza.—Terebracion en el cerebro.—Presion al exterior de la cabeza.—*Prurito corrosivo en la piel del cráneo*, con escozor despues de haberse rascado.—*Costras furfuráceas ó húmedas*, en la cabeza con prurito, sobre todo por la noche, y sensacion de ardor despues de haberse rascado.—Descamacion de la piel del cráneo.

Ojos.—Dolor en los ojos como despues de haberlos fatigado mucho por la lectura.—Presion en los ojos.—*Dolor quemante y tension en los párpados*, sobre todo leyendo.—Oscurecimiento de la vista mirando de lado.

Oidos.—Presion aguda en los oidos.—Traccion calambroídea en el oido.—Canto, retintin y como ruido sordo de tambores en los oidos.—Manchas herpéticas, rojas y escabrosas delante de la oreja, con exudacion fétida detrás de la misma.

Nariz.—*Presion aturdiente* y sorda en la nariz.—Prurito alrededor de la nariz.

Cara.—Rostro pálido, hundido, con círculos azulados alrededor de los ojos.—*Presion* sorda y *adormecimiento en los huesos de la cara*, y sobre todo en los pómulos, que penetra profundamente hasta la cabeza.—Calor en las mejillas, sin rubicundez y *vice-versa.*—Palidez de la cara alternando con rubicundez de color subido.—Hinchazon roja de la cara alrededor de los ojos.—Erupcion tuber-

Digitized by Google

culosa en la cara y en la frente.—Labios parduscos y secos.—Sensacion de torpeza y de hinchazon en el labio superior.—Hinchazon alrededor de las comisuras de los labios.

Dientes.—*Odontalgia durante la masticacion*, con presion incisiva.—Dolor de dislaceracion y traccion en los dientes, á veces por la noche, pero *solamente en la cama*, disipándose en cuanto se levanta.—Sensacion de vacilacion de los dientes, con las encías de un blanco azulado.

Boca.—Sequedad de la boca, con lengua cubierta de una capa blanca.—Lengua áspera, súcia, blanca, con erección de las papilas.—*Pérdida de la palabra.*—Dolor ardiente en la garganta.

Apetito.—Todos los alimentos tienen un gusto muy soso ó insípido.—Gusto pastoso en la boca.—*Bulimia* con temblor de las manos, por el gran deseo de los alimentos, frecuentemente con falta de apetito.—*Sed*, sobre todo de *agua fria.*—Aturdimiento en comiendo con avidez á medio dia.

Estómago.—Erutos de olor pútrido.—*Erutos vacios, violentos*, algunas veces despues de la comida.—*Náuseas con gana de vomitar*; acumulacion de saliva en la boca, seguida de hambre violenta.—Vómito de alimentos ó de serosidades amargas de un verde amarillento.—Sensacion de vacuidad en el estómago, con plenitud de vientre.—Latidos y pulsaciones en el epigastrio, como despues de un acaloramiento.

Vientre.—Pellizcos en el vientre como por una diarrea.—Punzadas y corrosion en el vientre.—Sensacion de vacío y de debilidad en los intestinos.—*Ruido como de agua y borborigmos en el vientre*, con *emision abundante de gases de un olor pútrido.*

Deposiciones.—Conato de deponer sin resultado.—*Deposiciones liquidas, blancas, amarillas.—Evacuacion* casi involuntaria *de una deposicion no digerida.*—Dolor ardiente en el ano, antes, despues y fuera del tiempo de la deposicion.

Orinas.—Aumento y secrecion de las orinas.—Orinas parduscas, ardientes, con sedimento blanquecino.—Emision de orinas frecuente, sobre todo despues de haber tomado café.

Laringe.—Tos corta, con estremecimiento, provocada

Digitized by

por un cosquilleo en la faringe.—Acumulacion de mucosidades viscosas en la traquearteria.

Pecho.—Opresion de pecho en estando acostado, con respiracion profunda y lenta.—Respiracion débil.—Dolor gravativo y compresivo, ó sensacion de un gran vacío en el pecho.—Lancinaciones sordas ó tensivas en el pecho, en el esternon y los costados, sobre todo en respirando profundamente.—Sensacion de frio en el pecho.—Punzadas en el diafragma.—Tracciones por encima del corazon, agravadas en bajándose.—*Palpitaciones de corazon*, violentas y algunas veces *angustiosas*, con sensacion, como si el pecho se dilatase.

Tronco.—Dolor en el dorso, como si hubiera habido una derrengadura.—Lancinaciones tensivas, ardientes y agudas en el dorso.—Pulsacion violenta de las carótidas.—Dolores de dislaceracion en la nuca por la noche en la cama.

Brazos.—Dolor de luxacion en los brazos al levantarlos.—Estremecimiento en los músculos de los brazos.—**Tracciones calambroideas* y dislaceracion en los brazos y en los dedos.—*Presion sorda en los antebrazos*, *las manos* y en los dedos, como despues de un golpe ó una contusion.—Las venas de las manos están tumefactas.—Hinchazon y rigidez de los dedos, con dolor ardiente.

Piernas.—Dolor de luxacion en las nalgas.—*Sensacion de debilidad en los muslos*, *las piernas*, *los piés* y en la planta de estos, como si estas partes estuviesen adormecidas.—*Presion sorda* y algunas veces lancinante *en los muslos*, *los piés* y en los dedos de estos.—*°Parálisis de las piernas y de los piés*.—Sensacion de vibracion y como de resonancia en las piernas y en los piés, sobre todo en la planta de estos.—Traccion calambroídea en las piernas y en los piés.—Calambres en las pantorrillas estando sentado.—Frio contínuo en los piés.

Digitized by Google

147.—OPIUM.

OP.—Opio.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 3, 9, 30.—*Duracion de accion*: de 24 horas hasta 5 dias, segun las circunstancias.

ANTÍDOTOS: Camph. calc. con. hep. mez. petr. sulf.—*Se emplea como antídoto de:* Calad. calc. merc.

COMPÁRESE CON: Acon. *bell.* bry. *camph.* cann. chin. cic. *coff. colch.* con. croc. *dig. hep. hyos. ipec. kal.* men. *merc.* mosch. nitr.-ac. n-mos. *n-vom. petr. ph-os. phos-ac. plumb. puls.* rut. samb. *stram.* tab. tatr. *thui.*—Cuando el opio será eficaz, si está indicado, será sobre todo despues de: *Bell. hep. kal. merc. puls. thui*; despues de opio, serán algunas veces convenientes: *Calc. petr. puls.*

CLINICA.—Guiándose por *el conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—*Afecciones mas bien recientes que antiguas*; *Torpeza nerviosa y falta de reaccion vital contra los medicamentos administrados*; *Padecimientos de los borrachos*; *Afecciones de los viejos*; Convulsiones, tétanos, epilépsia y otras *afecciones espasmódicas*; *Parálisis*; *Malas consecuencias de un susto con miedo*, ó de una alegría repentina; *Asfixia*; *Coma soñoliento* ó vigil; Fiebres intermitentes, tifoideas y *soporosas*; *Delirium tremens*; Manía; Imbecilidad; *Cefalalgia congestiva, con vértigos*; Apoplejía; Encefalitis; Ambliopia amaurótica; *Catarata*; Trismo; Tialismo por el abuso del mercurio; *Ileo*; Hernias inflamadas y estranguladas?; *Estreñimiento* principalmente por inercia del canal intestinal, despues de diarreas frecuentes, ó por falta de ejercicio, y sobre todo en personas vigororas, pletóricas y bien nutridas, así como en los niños y en las mujeres embarazadas; *Timpanitis*; Iscuria; Calentura láctea con estado soporoso; *Dolores de parto suprimidos, falsos ó espasmódicos*; *Metralgia puerperal*; Ortofnea paralítica; Tos y asma sofocante, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Insensibilidad general de todo el sistema nervioso.*—Excesiva inquietud en los miembros.—*Temblor* en todo el cuerpo, *con sacudidas, estremecimientos en los miembros*, y frio general.—**Accesos de convulsio-*

nes, °sobre todo *por la tarde*, *hácia media noche*, con sueño, movimientos involuntarios de la cabeza y de los brazos, y los puños cerrados.—°*Convulsiones epilépticas por la noche*, ó por la mañana, *con accesos de sofocacion*, pérdida del conocimiento y de sensibilidad, y movimientos violentos de los miembros.—Sueño despues de cada acceso de convulsion. Flojedad de todos los músculos.—°Convulsiones con gritos.—Sensacion de zumbido y de vibracion en todo el cuerpo.—Falta de dolores durante los padecimientos.—Irritabilidad excesiva de todos los músculos que están bajo el imperio de la voluntad, y disminucion de la de los demás.—Las personas que abusan del opio envejecen pronto.—°*Tétanos*.—°*Emprostótonos*.—*Parálisis*.—Sensacion de fuerza y de vigor, ó desvanecimientos y *mucha debilidad*.—Enflaquecimiento general.—*Anasarca*.—Agravacion y renovacion de los padecimientos acalorándose.

Piel.—Piel azulada, con manchas azules.—Prurito contínuo en la piel, con pequeñas elevaciones redondas y sin color.—Descamacion de la epidermis.—Sabañones.

Sueño.—°*Soñolencia comatosa con ronquido* y boca abierta, ojos abiertos y convulsos, cara encendida y tumefacta, mandíbula caida, pérdida del conocimiento, respiracion difícil, lenta y aun intermitente, pulso lento y aun suprimido, y movimientos convulsivos de los músculos de la cara, de los ángulos de la boca y de los miembros.—°*Excesiva gana de dormir con imposibilidad absoluta de poderlo realizar*.—*Sueño incompleto*, sin que se le pueda despertar.—Sueño agitado con ensueños angustiosos.—*Insomnio* con anhelacion angustiosa, inquietud y delirio.—Carfologia durante el sueño.—Gemidos en durmiendo.—Horribles sacudidas en los miembros durante el sueño.—Pesadilla.—*Ensueños lascivos*, *horrorosos* y angustiosos.

Fiebre.—*Frio general en la piel*, sobre todo en los miembros.—Frio y rigidez en todo el cuerpo.—*Calor quemante del cuerpo*, con mucha *rubicundez de la cara*, ansiedad, delirio y agitacion.—°*Pulso generalmente lleno*, *lento* é intermitente, ó acelerado y duro.—*Fiebre con sueño soporoso*, ronquido, movimientos convulsivos de los miembros, excreciones suprimidas y sudor caliente.—*Fiebre*, algunas veces, con *pérdida del conocimiento*, ó delirio.

Moral.—*Indiferencia*, ó excesiva ansiedad é inquietud.—Inconstancia y volubilidad.—*Mucha disposicion á asustarse*, y carácter perezoso.—*Arrojo temerario é inconsiderado.*—*Tranquilidad de espíritu*, con desvaríos agradables, y olvido de los padecimientos.—*Estupidez é imbecilidad.*—*Pérdida de los sentidos.*—Considerable afluencia de ideas, con alegría, y disposicion á hacer reflexiones sublimes y profundas.—*Errores de la imaginacion.*—*Manía, con ideas extravagantes, °ó fijas; le parece que no está en su casa.—**Delirio con visiones espantosas*, °de ratones, de escorpiones, etc., y deseo de huir.—*Divagaciones.*

Cabeza.—Cabeza turbada, con sensacion de calor en los ojos y necesidad de cerrarlos.—*Cabeza atontada, como á consecuencia de una embriaguez.—*Aturdimiento, como en los borrachos.—Vértigo* al incorporarse en la cama, que obliga á volverse á echar.—Vértigo despues de un susto.—°*Accesos como de un golpe de sangre, con vértigo,* zumbido de oidos, *pérdida del conocimiento, rostro encendido, con calor y abotagamiento*, ojos rojos y medio cerrados; pupilas dilatadas é insensibles, espuma en la boca, movimientos convulsivos de los miembros, *respiracion lenta con ronquido*; antes del acceso, insomnio ó sueño, con ensueños angustiosos; ebullicion de sangre y calor general; despues del acceso mucha excitabilidad nerviosa, risas y divagaciones.—Cefalalgia que se agrava moviendo los ojos.—Cefalalgia con tension presiva en toda la cabeza.—Sensacion como si el cerebro se desgarrase.—*Excesiva pesadez de la cabeza.—*Congestion á la cabeza*, con fuerte pulsacion.

Ojos y oidos.—Párpados caidos como paralizados.—Sensacion como si el globo de los ojos fuese muy voluminoso.—**Ojos rojos inflamados.*—Temblor de los ojos y de los párpados.—**Ojos fijos, medio cerrados, convulsos*, prominentes, vidriosos.—**Pupilas dilatadas* é inmóviles.—*Oscurecimiento de la vista.*—Se ven chispas.—Zumbido de oidos.—Retintin en los oidos.

Cara.—*Cara pálida, térrea,* macilenta, con ojos hundidos y manchas rojas en las mejillas.—**Cara color rojo subido*, algunas veces pardusca, *caliente y abotagada.*—Palidez y rubicundez alternativa del rostro.—Hinchazon de las venas de la cara y de la cabeza.—**Relajacion de todos los músculos de la cara.*—*Temblor, *sacudidas y movimien-*

Digitized by Google

tos convulsivos de los músculos de la cara.—Labios hinchados.—*Labios y mandíbula inferior caidos, por laxitud.—**Estremecimiento de las comisuras de la boca.*—*Distorsion de la boca.—*Calambres de la mandíbula.*

Boca y garganta.—Dientes movedizos.—Sequedad en la boca con mucha sed.—*Salivacion abundante.*—Esputo de sangre.—Ulceras en la boca y en la lengua.—Lengua negra.—*Parálisis de la lengua.*—Voz débil, baja, con imposibilidad de hablar alto sin hacer grandes esfuerzos.—Sequedad de la garganta.—Tumefaccion y movimientos de la garganta, con deglucion difícil por accesos cotidianos.—*Imposibilidad de deglutir.*

Apetito.—Pérdida del gusto.—Gusto amargo ó ágrio en la garganta.—*Sed ardiente*, especialmente con deseo de cerveza.—Accesos de *bulimia*, con falta de apetito y *repugnancia á todos los alimentos.*—Lentitud y debilidad de la digestion.

Estómago.—Náuseas con gana de vomitar y vomituricion.—*Vómitos con dolores violentos en el estómago, y convulsiones.*—Vómitos de sangre ó de materias verdosas.—°*Vómito de materias fecales y de orina.*—Sensibilidad dolorosa y timpanitis del estómago y del epigastrio.—Presion constrictiva en el estómago con angustia excesiva.—*Pesadez en el estómago.*—Compresion del diafragma.

Vientre.—**Vientre duro* é hinchado como por una *timpanitis.*—*Pesadez en el vientre*, como por un peso.—Pulsacion, presion, *peso* y tiron en el vientre.—°*Deposiciones como de pequeñas bolas duras, aun cuando no se pongan lavativas.*

Deposiciones.—**Constipacion*, algunas veces *de larga duracion.*—*Deposiciones fétidas*, negras.—Diarreas espumosas y líquidas, con dolor ardiente en el ano, y tenesmo violento.—*Deposiciones involuntarias.*

Orinas.—**Retencion de orina*, como por inactividad de la vejiga.—Orinas raras, oscuras, con sedimento color de ladrillo.—Hematuria.

Partes genitales.—**Exaltacion del apetito venéreo,* con *erecciones y poluciones* frecuentes.—Extasis amorosos.—Disminucion del apetito venéreo é impotencia.—**Dolores calambroideos en la matriz.*—°*Metralgia violenta durante el embarazo, con eructos, vomiturición*, agitacion extrema, siendo el contacto insoportable en el vientre.

Laringe.— *Ronquera penosa*, como por acumulacion de mucosidades en la tráquea-arteria, con excesiva sequedad de la boca, y la lengua blanca.- Voz débil, baja.— Tos violenta, seca, bronca, agravada despues del reposo.—*Tos* durante la deglucion, ó *al respirar, con suspension de la respiracion*, y color azulado de la cara.—*Tos con expectoracion de sangre y de mucosidades* espesas y espumosas.— °*Tos fatigosa como la de la grippe, seca, seguida de bostezos.*— °*Tos con cosquilleo, seca, que atormenta dia y noche.*

Pecho.— *Respiracion sonora, estertorosa y con ronquido.— Respiracion difícil, lenta é intermitente como por parálisis del pulmon.—**Dificultad de la respiracion y sofocacion con mucha angustia.*— Asma espasmódico.— *Accesos de sofocacion*, haciendo esfuerzos para toser.—Presion en el pecho con punzadas en los costados al inspirar.— *Tension y constriccion en el pecho.*— Calor y dolor ardiente en el pecho, sobre todo en la region del corazon.—°*Eretismo del corazon.*

Tronco y miembros. — *Emprostótonos.* — Hinchazon de las venas y pulsacion de las arterias del cuello.— *Estremecimientos y movimientos convulsivos de los brazos.*—Parálisis de los brazos.— *Temblor de los brazos y de las manos.* — Sabañones en los dedos.— Hinchazon de las venas de las manos.— *Estremecimientos y movimientos convulsivos de las piernas.*— Debilidad, torpeza y parálisis de las piernas.— Pesadez é hinchazon de los piés.— Sabañones en los dedos de los piés.

148.—OXALIS ACIDUM.

OX-AC.— Acido oxálico.— *Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.— Hering.— *Estudios patogenésicos de la America del Norte.*

Compárese con: *Hippom. rumex. rhab.*

CLINICA.—Examinando los síntomas característicos de este medicamento, se verán los casos en que se le podrá administrar con éxito contra una ú otra de las afecciones siguientes:— Parálisis; Reumatismos articulares; Icteri-

cia; Enfisemas; Dolores violentos en los cánceres; Fiebres tifoídeas.—Manías; Apoplejías; Vértigos; Lipitudo.—Aftas de la boca; Anginas; Pirosis; Vómitos de las mujeres preñadas; Gastritis; Cáncer del estómago; Cólicos; Enteritis; Diarreas; Disenterías; Cólera.—Arenas y cálculos urinarios.—Laringitis; Catarro bronquico; Tos mucosa; Pneumonías; Afecciones del corazon.—Marasmo dorsal.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores en los miembros, con laxitud, debilidad, entorpecimiento; laxitud, con dolor en la cabeza, esperezos y bostezos, aliviados al aire libre; malestar y fatiga, con alivio en la posicion horizontal; laxitud, como á consecuencia de grandes esfuerzos, con sudor, despues de la diarrea; laxitud, con sed y vértigos.—°Adelgazamiento, con latidos en el corazon.—Desfallecimiento; sensacion de entorpecimiento; miembros demasiado ligeros al andar.—Temblor; convulsiones; parálisis del lado izquierdo.—*Los dolores ocupan un pequeño sitio oblongo, y se muestran, con preferencia, primero á la izquierda, despues á la derecha.—Dolores por paroxismos.—Por la tarde*: dolores, tos, escalofrios.—*Por la noche*: flatuosidades, palpitaciones del corazon.—*Por la mañana*: *diarrea*, *pulso acelerado*, dolores de garganta, sufrimientos del estómago.

Piel.—Piel sensible, al rascarse.—Prurito, en la nuca.—Piel jaspeada, como en los niños.—Erupciones verrugosas, con prurito y rubicundez; pústula dolorosa en el dedo índice; exfoliacion de la piel de las uñas.—°Enfisema general de la piel.—°Ictericia.—°Ulceras.

Sueño.—Bostezos frecuentes, violentos.—Gana de dormir por el dia; sueño profundo, prolongado.—*Ensueños con espanto*, con sobresaltos, como por terror; el paciente se endereza y mira á su rededor; ensueños como si se resbalase, como si fuese arrojado al agua.—Por la *mañana*: dolor de cabeza; curvatura; dolores nefríticos.

Fiebre.—Horripilaciones que suben de abajo á arriba; escalofrios con estornudos, por la noche; frio, despues de la diarrea, despues de medio dia; por la tarde, frio con temblor y rubicundez de la cara; frio y escalofrios, con constitucion apoplética.—*Calor*: á cada esfuerzo; en las

manos; interior; sobre todo en la cara; calor con sudor. —*Sudor*, durante la debilidad; *con vértigos; por la noche, frio viscoso.—*Pulso*: *pulso frecuente por la mañana* (como *sulf. ars.*); *pulso raro, desigual, mas débil*; pequeño y lento, despues de la diarrea, con escalofrios; temblo-roso; *que se hace imperceptible.*—°Fiebre tifoídea.

Moral é inteligencia.—Excitacion, vivacidad, alegría. —Afeccion del órgano del amor filial y dolor en el occipucio.—Angustia; *miedo (gritos y llantos)*.—Estupor; meditacion difícil, lenta.—*Repugnancia por la conversacion*: durante el dolor de cabeza, con sensacion de plenitud en la cara.—Sagacidad; **pensando en los dolores, reaparecen.*

Cabeza.—**Vértigos*: durante la fatiga, con sed, angustia y dolor de cabeza; °durante el sudor; al asomarse á la ventana; al levantarse de su asiento.—Vacuidad en la cabeza; °*embarazo de la cabeza*, °todas las mañanas; frente cargada por la mañana.—Apoplejía.—°Ardor en la frente.—*Dolores en el sincipucio y el vértice*, en el lado izquierdo de la frente, al despertarse.—*Presion* sobre pequeños sitios circunscritos; presion, como por un tornillo detrás de las orejas.—*Dolor de cabeza*: despues de haberse acostado; despues de haber dormido; al levantarse; con alivio despues de defecar.—El vino afecta la cabeza.

Ojos.—Dolores en el globo del ojo, sobre todo el izquierdo.—Legañas.—Disposicion á cerrar los ojos.—Los pequeños objetos, sobre todo los de forma lineal, parecen mas grandes, porque se supone están mas distantes.—°Pérdida de la vista durante los vértigos, con sudor y sangre por la nariz.

Nariz.—Punzadas en la nariz derecha, al respirar.—Vesículas en la nariz derecha, con hinchazon del ala.—Estornudos y escalofrios.—°Epistaxis con pérdida de la vista.

Cara.—Calor de la cara, rubicundez, sensacion de turgencia.—*Cara pálida, ojos hundidos.

Dientes.—Dolores en los molares cariados.—°Dientes como embotados; *encías* dando sangre; doloridas; úlceras pequeñas en las encías.

Boca.—Abundantes mucosidades en la boca; dolor; *mucha saliva; acumulacion de agua.—*Lengua* cargada de

blanco; roja, hinchada, sensible, seca, quemante.—*Inflamacion de la boca; *úlceras: °aftas.

Garganta.—Picazon; apretamiento en la garganta; aumento de la secrecion mucosa.—Sequedad de la garganta, por la mañana, despues la diarrea.—Deglucion dolorosa, más por la mañana; disfagia, con erutos ágrios.—Ardor en la garganta y en el estómago.—°*Anginas*, agudas y crónicas.

Gusto y apetito.—*Gusto ágrio en la boca*; *pirosis.—Aumento del apetito.—*Carencia de apetito*: con insipidez de los alimentos, sed, náuseas; anorexia, tanto con lengua cargada como con lengua limpia.—*Sed*: durante los vértigos, la anorexia, las náuseas y los dolores de estómago.—Despues de haber *comido*: erutos, náuseas, dolores en rededor del ombligo, cólicos, borborigmos, necesidad de ir al sillico, fatiga.—Comiendo se alivia el dolor del estómago.—°Digestion débil, difícil.

Síntomas gástricos.—Erutos de aire; ágrios.—Pirosis.—Hipo; hipos repentinos con erutos.—Náuseas y sed, con retortijones; ganas de vomitar, despues la diarrea; °náuseas de las mujeres preñadas.

Estómago.—Ardor en el estómago y la garganta.—*Sensacion de vacío en el estómago*, que fuerza á comer.—Estómago sensible al tacto.—*Dolores violentos en el estómago*; que despiertan por la noche; °gastritis; *gastralgias.

Vientre.—En el *hipocondrio izquierdo*: dolores persistentes como de contusion; punzadas; punzadas en el bazo, que se disipan al respirar profundamente; dolor entre el hipocondrio y el ombligo.—°Dolor penoso entre el ombligo y la boca del estómago, en el embarazo.—°Punzadas en la region del hígado.—**Dolores en la region umbilical*; *cólicos*; ombligo como desollado; °inflamacion crónica de los intestinos; punzadas; *dolor con ganas de deponer y tenesmo; con expulsion de flatos, que se aumenta por el movimiento y se alivia por la quietud.—°Ardor sobre pequeños sitios circunscritos en el vientre; retortijones.—*Flatuosidades*, *borborigmos* y otros ruidos en el vientre, con ó sin dolores, *sobre todo por la tarde*, la noche y despues de medio dia; flatuosidades con presion y hormigueo en el ano.—Dolores como para defecar; dolores, presion; cólicos antes de la diarrea.—En la *ingle izquierda*: flatuosidades encarceladas; dolor agudo;

Digitized by

contraccion.—En la *derecha*: cólicos, borborigmos; dolor sobre un pequeño sitio circunscrito en el lado derecho del vientre; punzadas por cima de la cadera derecha; dolor en el lomo derecho.

Ano y defecacion.—*Deposiciones retardadas*; *conato de ir al sillico, con presion en el ano*; tenesmo; dolor, tenesmo y molestia en el recto.— Por la mañana: *deposiciones líquidas ó en forma de papilla*, con cólicos alrededor del ombligo y presion en el ano; las cámaras diarréicas vuelven desde que se acuesta; el dolor durante la cámara provoca los de la cabeza; deposiciones con sangre y mucosidades.—*Antes* de las deposiciones: dolor de cabeza.—*Durante* ellas, miccion (desfallecimiento, vómitos).—*Despues*: náuseas, calambres en las pantorrillas; sequedad de la garganta; alivio en los dolores nefríticos.

Vias urinarias.— Dolor en la region de los riñones.— Gana frecuente de orinar; orinas abundantes.— Ardor en la uretra, como por orinas ácres; al orinar, dolor en el glande.—°Arenas y cálculos urinarios?

Partes viriles.—*Aumento del apetito venéreo*; ereccion por la mañana.—*Dolores en los testículos*, sobre todo en el derecho; *pesadez y distensiones, hasta en los cordones espermáticos.*

Laringe y tos.—En la *laringe*: sensacion de hinchazon y desolladura; contraccion y cosquilleo.— Ronquera; ruido de mucosidades.—°Laringitis; °catarro brónquico.—Tos con cosquilleo, por la tarde; tos seca durante una fuerte agitacion corporal.—Mucosidades aumentadas, ó bien disminuidas en la garganta; *mucosidades concretas en pedazos*, duras, espesas, desmenuzables; durante el estilicidio de la nariz, salida de pedazos duros de la garganta; pedazos negros en la expectoracion amarilla.

Pecho y respiracion.—*Disnea con opresion*; respiracion difícil, durante el movimiento, por la tarde; con punzadas; al bostezar y respirar, dolor por cima de la cadera; punzadas que cortan la respiracion.—*Dolores de pecho*: sordos; presivos; como si estuviese en carne viva; dolor á través del medio del pecho; punzadas en el lado izquierdo.—*Dolores en la region del corazon*; punzadas; como en una parte ulcerada; de atrás adelante, de arriba abajo.—°*Palpitaciones del corazon, por la noche des-*

pues de haberse acostado; *al pensar en ello, se detienen los latidos del corazon; °endocarditis?; °pericarditis?; °hipertrofia del corazon?

Tronco.—**Dolor en los riñones*, como por entorpecimiento ó como si estuviese herido el hueso.—*Dolores en la espalda*: bajo el omóplato; entre ellos; desde estos hasta los lomos; desde el dorso hasta los muslos; *dolor en la region lumbar, que pasa repentinamente á las extremidades inferiores.*—Torpeza, picazon y carencia de fuerza.—°Marasmo dorsal?

Miembros torácicos.—Dolores en las *escápulas*: punzadas en la articulacion, que pasa hácia el dorso viniendo del pecho. Dolor, primero en el *deltóides* izquierdo, despues en el derecho; dolor en medio del brazo derecho, como en el hueso, con necesidad de mover el miembro; brazo como rígido y entumecido.—*Manos* frias, como muertas; dolores en el metacarpo y en lo grueso del pulgar, con sensacion de *lisiadura en la articulacion de la mano derecha, obligando á estirarla, con punzadas en la region de la uña.*—Torpeza y pesadez en la mano derecha, movimiento lento de los dedos.—Dolores artríticos en los dedos; contraccion de los de la mano izquierda; distensiones convulsivas de los dedos.—*Uñas* de color oscuro.

Miembros pelvianos.—En los *miembros inferiores*: *debilidad*, inquietud, entorpecimiento, *parálisis*, rigidez, horripilacion, frio, calor.—*Rodillas fatigadas*; dolores en la corva izquierda.—Dolores en la articulacion del pié derecho.—Contraccion de los *dedos gordos* del pié derecho.

149.—PARIS QUADRIFOLIA.

PAR.—Paris ta de cuatro hojas, Uvas de zorro.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. homœop.—*Dósis usadas:* 9, 30.—*Duracion de accion*: 2 á 4 dias, segun las circunstancias.

ANTÍDOTOS: Acon. coff.

COMPÁRESE CON: Hell. ign. kal. natr-m. n-vom. puls. sabad..

SINTOMAS GENERALES.—*Lancinaciones contínuas en todos los miembros.—Apretamiento calambroideo en las articu-*

Digitized by Google

laciones, ó sensacion al moverlas como si estuviesen rotas, hinchadas y luxadas.—*Sensacion de pesadez en todo el cuerpo.*

Piel.—Excesivo prurito en diversas partes.—Hormigueo subcutáneo sin prurito.—Dolor de excoriacion en la piel, al tacto.—Panadizo.

Sueño.—Mucha propension al sueño por el dia y por la noche muy temprano.—*Sueño incompleto, interrumpido* ó inquieto por la noche, con agitacion contínua y *afluencia de ensueños.*—Ensueños voluptuosos, con erecciones y poluciones.

Fiebre.—Calofrios, sobre todo en el pecho, en el vientre y en las piernas, la piel como carne de gallina, y bostezos.—*Frio interior continuo, con temblor interno.—Sudor matutino*, pruritoso, que obliga á rascarse.—Frio en un solo lado del cuerpo.

Moral.—Propension á tratar á los demás con desprecio y desden.—*Propension á decir simplezas* y complacerse con las que se le dicen.—*Mania con locuacidad.*—Repugnancia á los trabajos intelectuales.—Disgusto, mal humor.

Cabeza.—Cabeza atolondrada y pesada.—Vértigo leyendo en alta voz, con dificultad de hablar y de ver.—*Dolores de cabeza agravados por la meditacion.*—Dolor presivo en la cabeza, que se disipa apoyando sobre ella la mano.—Sensacion de hinchazon en la cabeza, con presion como si todo lo que contiene fuera á salirse por las sienes y por los ojos.—Tension en el cerebro y en los tegumentos de la frente.—*Punzadas y lancinaciones en la cabeza.*—Cefalalgia pulsativa por la noche, con mucha agitacion. Cefalalgia pulsativa con sensacion de vacilacion al subir una escalera.—Dolor de cabeza, despues de haber fumado.—Dolor de excoriacion al exterior del vértice por el tacto.—Sensibilidad dolorosa y caida de los cabellos.—Tension de la piel del cráneo, en la frente y en el occipucio.—Costras en la cabeza.

Ojos.—Dolor en los ojos, como una presion en los huesos de las órbitas.—*Sensacion como si los globos de los ojos estuvieran muy voluminosos, ó hinchados.*—Dolor ardiente en los ojos, *con lagrimeo*, sobre todo por la mañana despues de levantarse.—Conmocion y estremecimiento en las pestañas del párpado superior.—*Vista incierta* y vacilante.

Oidos.—Otalgia con dolores dislacerantes.—Disminucion del oido.—Retintin en los oidos.

Nariz.—Nariz como obstruida en su parte superior, con sangre al sonarse.—Olor pútrido de la leche y del pan.—Obturacion de la nariz por la mañana, con expulsion al sonarse de mucosidades espesas y sanguinolentas.—*Coriza seca*, alternando con coriza fluente.—Secrecion de mucosidades líquidas por la nariz y los ojos, y que provoca una respiracion anhelosa.—Mucosidades nasales, rojas ó verdosas.

Cara.—Dolores en la cara, con punzadas quemantes en los huesos de las mejillas.—Granos purulentos debajo de la nariz y en la barba.—*Granos sanguinolentos* en la mandíbula inferior, parecidos á los granos de mijo.—Granos en la frente, con dolor presivo al tacto.—Labios con grietas.—Herpes alrededor de la boca.

Dientes.—Odontalgia tractiva ó con pulsaciones tambien tractivas, sobre todo en los dientes cariados, agravada por las cosas frias.—Dolores incisivos en las encías todas las mañanas.—Encías arrugadas, como si estuvieran quemadas.

Boca y garganta.—Boca seca, árida, por la mañana al despertarse.—Acumulacion de saliva áspera y astringente.—Espuma blanca y mucosa en los ángulos de la boca, por la mañana.—Dolor de excoriacion y descamacion del velo del paladar.—Hinchazon dura, del volúmen de un huevo, en el paladar, que tambien está duro.—Lengua áspera y seca, con sensacion como si fuera muy voluminosa.—Ligera irritacion en la garganta, como por la presion de una bola.—Punzadas, arañamiento y dolor quemante en la garganta.

Apetito.—Gusto pastoso y soso.—Apetito violento.—Erutos repugnantes ó presivos.—Regurgitaciones acuosas.—Náuseas con gusto ágrio.—Debilidad y lentitud de la digestion.—Hipos contínuos despues de la comida.

Estómago.—*Presion en el estómago*, como por una piedra, que se alivia erutando.—Dolor ardiente desde el estómago hasta el vientre.

Vientre.—Dolor tensivo en todo el vientre.—*Presion dura en el vientre.*—Traccion incisiva y terebracion en un lado del vientre, por la noche en la cama, en el lado sobre que se acuesta.

Deposiciones.—Evacuaciones alvinas frecuentes, pero insuficientes y de la consistencia de papilla.—*Deposiciones diarréicas, fétidas*, como de olor á carne podrida.

Orinas y partes genitales.—Disminucion de la secrecion de las orinas.—Conato urgente y frecuente de orinar, *con dolor quemante durante la emision.*—Orina inflamada, formando nubes hácia el medio, con sedimento rojizo y película de color de íris despues de reposada.—Dolor quemante y punzadas en la uretra.—Exaltacion del apetito venéreo.—Reglas muy adelantadas.

Laringe.—Por la mañana, sensacion de sequedad en la tráquea-arteria.—*Ronquera penosa* y voz baja, con *ruido estrepitoso, continuo, de mucosidades.*—Ronquera periódica.—Dolor ardiente en la faringe.—*Tos, como excitada por el vapor del azufre*, en la tráquea-arteria, ó como por mucosidades viscosas en la faringe.—Tos nocturna estando acostado sobre el lado izquierdo.—*Tos con expectoracion de mucosidades viscosas, verdosas*, provenientes de la laringe.

Pecho.—Dificultad de la respiracion, con necesidad de respirar profundamente.—Presion en el costado derecho del pecho.—Punzadas en el pecho y en los costados.—*Palpitaciones de corazon* durante el reposo y el movimiento.

Tronco.—Dolores en el dorso y en la nuca, al bajar, como si tuviera encima un gran peso.—Punzadas y *lancinaciones en el dorso*, así como entre los omóplatos.—Tension y debilidad de los músculos del cuello y de la nuca.

Brazos.—Posadez y debilidad paralítica en los brazos y en las articulaciones de los dedos.—Dislaceracion y traccion en los dedos, desde el hombro.—Temblor de las manos.—Punzadas en los dedos.—Dedos tan pronto calientes como frios, ó bien como muertos.—Adormecimiento de los dedos.—Panadizos.

Piernas.—Dolores de dislaceracion y traccion en las piernas, y sobre todo en la articulacion coxo-femoral.—Dolor paralítico en la articulacion del pié.—Hormigueo en el tendon de Aquiles.—Dislaceracion y traccion, punzadas en los dedos de los piés.—Frio en los piés por la noche en la cama.

Digitized by

150.—PETROLEUM.

PETR — Aceite de petróleo.— HAHNEMANN.— *Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop. — *Dósis usadas:* 18, 50.— *Duracion de accion*: hasta 50 dias, en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Acon. n-vom.

COMPÁRESE CON: Calc. cann. *cham.* ign. *lyc.* mang. *nitr-ac. n-vom. phos. puls. sulf.*— Sobre todo despues de: *Nitr-ac.* y *phos.*, es cuando el petróleo será eficaz si se halla indicado.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:— Padecimientos producidos por contrariedades; Afecciones escrofulosas y raquíticas; Accesos de desfallecimiento; Atrofia de los niños; Herpes; *Ragades*; *Sabañones*; Erupciones pustulosas; Fiebres intermitentes; Melancolía; *Vértigos crónicos*; *Cefalalgia causada por contrariedades* ó por una caida; Jaqueca; Tiña; Oftalmías escrofulosas; Miopia y presbiopia; *Fistulas lacrimales* (alternando con *sil.*); Otitis y otorrea purulenta; *Dureza del oido* (sobre todo despues del uso del ácido nítrico); Sordera por parálisis del nervio acústico; *Afecciones gástricas*; Mareos; Padecimientos causados por el movimiento del carruaje; Dispepsia crónica; Hernia inguinal; Diarreas mucosas; Hemorróides; Estrechez de la uretra; Herpes en el escroto; Gonorrea; Cálculos urinarios; Leucorreas; Dismenia de las jóvenes; Erupciones pustulosas de las embarazadas; Catarro con ronquera; *Ragades y grietas de las manos en invierno*; *Sabañones en las manos y en los piés*, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores tractivos en los miembros.—Rigidez y *fácil adormecimiento de los miembros.—Crujido de las articulaciones, con rigidez artrítica* y dolores tractivos, dislacerantes.— Hinchazon é induracion de las glándulas, aun despues de una contusion.— *Estremecimiento de los miembros* por el dia y durante el sueño.— Ataques de epilepsia.— °Accesos de desvanecimiento con ebullicion de sangre, calor, palpitaciones y presion en el corazon.— °*Al menor esfuerzo, debilidad ex-*

cesiva, °algunas veces con turbacion de la vista, temblor del cuerpo, zumbido de oidos y náuseas.—Debilidad, náuseas y otras *incomodidades por el movimiento del carruaje.*—Agravacion y aparicion de muchos síntomas por un temporal tempestuoso.—*Calor fugaz, *ebullicion de sangre* y sudor despues de un paseo, ó despues de haberse encolerizado.—**Enflaquecimiento*, °aun en los niños.—Sensacion de un malestar insoportable y general, con temblor y abatimiento.—Pesadez y laxitud en todos los miembros.—*Excesiva laxitud por la mañana y por la tarde.*—Mucha disposicion á resfriarse.—**Repugnancia al aire libre, con despeluzamiento en cuanto se expone á él.*—Muchos síntomas se manifiestan por la mañana.

Piel.—Mucha sensibilidad en la superficie de la piel.—Miliar urticaria.—*Herpes pruritosos.*—*Chapas pruritosas, excoriadas, de la piel, y que exudan.*—Manchas oscuras y amarillas en la piel.—°Erupcion de pústulas pruritosas y ardientes.—*Ragades.—*Piel enfermiza*; toda lesion tiende á ulcerarse.—Diviesos.—Ulceras con dolor lancinante.—°*Solucion de continuidad de las úlceras.*—Verrugas.—*Clavos en los piés.*—°*Sabañones*, algunas veces dolorosos.

Sueño.—Propension á dormir por el dia y á primera hora de la noche, estando sentado tranquilamente.—**Sueño incompleto y agitado por la noche*, con afluencia de ensueños vivos, angustiosos y horribles, de los que se despierta con frecuencia sobresaltado, con calor angustioso.—**Par la mañana parece que no ha dormido lo bastante.*

Fiebre.—Calofrios con cefalalgia, y frio en las manos y en la cara.—°Despeluzamiento frecuento por todo el cuerpo, y en entrando en calor mucho prurito en la piel.—Despeluzamiento ó frio, generalmente por la tarde, y algunas veces con las uñas azuladas.—Sudor inmediatamente despues del calofrio.—**Fiebre* por la tarde, °con calor de la cara, y piés frios despues del calofrio.—Calor fugaz frecuente.—Fiebre con pulso lleno y sensacion ardiente en la piel.—**Calor nocturno.*—*Sudor nocturno.

Moral.—*Ansiedad y *disposicion á asustarse.*—*Tristeza y abatimiento moral, °algunas veces con sensacion de debilidad en el corazon (en la boca del estómago?).—*Falta

de resolucion.—°Inquietud sobre el porvenir.—*Humor hipocondríaco.—*Carácter irascible, violento, con injurias.*—°Llora con frecuencia, por la mas mínima cosa.—**Falta de memoria.*—Inaptitud para reflexionar.—*Debilidad del pensamiento.

Cabeza.—*Atontamiento de cabeza.—**Vértigo frecuente.*—**Vértigo* como por una excesiva cantidad de gases.—**Vértigo en bajándose*, ó bien al incorporarse en la cama ó al levantarse del asiento.—**Dolores de cabeza despues de haberse enfadado*, ó *por la mañana, en ayunas*, como tambien por la tarde despues de haber paseado.—Accesos de cefalalgia semilateral que obliga á estar acostado.—*Pesadez y plenitud en la cabeza por la mañana y al bajarse.—**Dolores presivos, ó lancinantes presivos en la cabeza*, y sobre todo en el occipucio.—°Cefalalgia agravada por cualquier trabajo intelectual, hasta el completo embotamiento de los sentidos.—Tension en la cabeza como si la dura-madre estuviese distendida.—Dolores de cabeza calambroideos, tractivos, como si pellizcaran.—**Dolores de cabeza pulsativos*, sobre todo en el occipucio.—Sensacion como si todo se moviese en la cabeza.—La piel del cráneo está dolorida al tacto, como si estuviese contundida ó ulcerada.—°Traccion en la cabeza, en la frente, las sienes y hasta en los dientes.—**Erupcion en la cabeza y en la nuca.*—Hinchazones edematosas y costras en la piel del cráneo.—*Alopecia.

Ojos.—Prurito en los ojos.—Presion, escozor, punzadas y dolor ardiente en los ojos.—°Inflamacion de los ojos.—°*Fístula lacrimal.*—Lagrimeo.—Estremecimiento y temblor de los ojos y de los párpados.—Convulsiones de los ojos.—Miopia ó *presbiopia.*—Diplopia.—*Se ven lucecitas ó chispas y puntos negros, y un *velo delante de la vista.*

Oidos.—Otalgia con dolor calambroideo y estremecimiento.—°Sequedad y sensacion de sequedad penosa en lo interior del oido.—Flujo de sangre y de pus por los oidos.—Erupcion en las orejas.—Rubicundez, excoriacion y resudacion detrás de las orejas.—**Sordera.*—*Retintin, sonido como de truenos, ruido sordo y *zumbido en los oidos.*

Nariz.—Epistaxis.—Vesículas purulentas en la nariz.—Ventanillas nasales ulceradas.—°Hinchazon de la nariz, con secrecion de pus y dolor por encima de la raiz de

esta.—*Obturacion de la nariz.—°Sequedad y sensacion de sequedad penosa en la nariz.—°Coriza con ronquera.

Cara.—**Calor de la cara*, algunas veces despues de la comida, y con sed.—°*Color amarillento, pálido.*—Erupcion granulosa en la cara.—Granos costrosos con dolor lancinante en los labios y en sus comisuras.—*Tumefaccion de las glándulas submaxilares.—Luxacion fácil de la articulacion de la mandíbula, por la mañana en la cama, con dolores vivos.

Dientes.—Odontalgia á la impresion del aire libre, mas violenta por la noche, con hinchazon de la mejilla.—Entorpecimiento de los dientes con dolor al apretarlos.—Vesícula purulenta en las encías, como una fístula.—Hinchazon de las encías, con dolor lancinante al tacto.

Boca.—**Aliento fétido*, algunas veces como de ajo.—Ulceras en la cara interna de las mejillas.—Acumulacion de mucosidades en la boca y en la garganta.—*Lengua cubierta de una cana blanca.—Excesiva sequedad de la boca, con sed *muy intensa.*

Garganta.—*Ligera irritacion de la garganta* durante la deglucion, *con dolor lancinante.*—Hinchazon y *mucha sequedad de la garganta.*—Al deglutir los alimentos (líquidos?) se dirigen hácia las fosas nasales.—Ruido estrepitoso de mucosidades por la mañana.

Apetito.—**Gusto pútrido, soso, mucoso*, ó bien amargo ó ácido.—Mucha *sed con deseo de cerveza.—Bulimia.*—°Hambre con pronta saciedad.—*Voracidad.—Gusta de golosinas.—*Falta de apetito.—*Repugnancia á la carne y la grasa*, así como á los alimentos calientes y cocidos.—Incomodidades durante la digestion de casi todos los alimentos, por poco que se haya tomado de ellos.—*Despues de la comida, oscurecimiento de la vista y vértigo*, °náuseas, **pesadez y presion en el estómago*, sueño ó cólico con eructos, °ó eructos ácidos, congestion á la cabeza, calambres de pecho, etc.

Estómago.—Eructos ruidosos.—*Eructos ágrios* y regurgitaciones.—Pirosis.—*Náuseas frecuentes, sobre todo por la mañana*, frecuentemente con *acumulacion de agua en la boca*, dificultad de la respiracion, eructos ágrios, lengua seca y blanca, punzadas en la region hepática, calor en la cara, vértigos, etc.—*Náuseas por el movimiento del carruaje.—**Flujo de agua por la boca, como de pituitas.*—*Gana

Digitized by Google

de vomitar.—°Vómito verdoso, amargo.—*Presion en el estómago.*—Calambres de estómago.—Sensacion de vacuidad y de debilidad en el estómago.—Dolor en el epigastrio, como si se arrancase de aquel punto alguna cosa.—°Hinchazon del epigastrio, con dolor al tacto.—°Sensacion de plenitud en el epigastrio.

Vientre.—Dolor de vientre poco despues de la comida.—°Sensacion de un gran vacío en el vientre.—Timpanitis y tension del vientre, con calambres.—*Pellizcos y *retortijones en el vientre*, á veces con necesidad urgente de deponer.—*Cólicos nocturnos hácia la mañana, con diarrea.—*Borborigmos en el vientre, °con sensacion como si el abdómen estuviera enteramente vacío.—°Hernia inguinal.—Expulsion de gases fétidos.—°Sensacion de frio en el vientre.

Deposiciones.—**Deposiciones difíciles, duras*, nudosas ó insuficientes.—**Deposiciones frecuentes durante el dia*, °á veces con evacuacion de materias serosas, amarillentas.—**Diarrea*, precedida frecuentemente de retortijones.—**Deposiciones mucosas*, frecuentemente con sangre.—Dolor ardiente en el recto despues de deponer.—Herpes pruritosos en el periné.

Orinas.—Emision de orina frecuente con flujo poco abundante de una orina de color rojo, ó pardusca y fétida.—Trasudacion de orina involuntaria.—Emision de orina por la noche.

Partes viriles.—°*Estrechez de la uretra.*—Dolor ardiente, **prurito, rubicundez, excoriacion, resudacion*, ó granos pruritosos y herpéticos *en el escroto y al lado de este en el muslo.*—Disminucion del apetito venéreo.—Poluciones frecuentes.—°Abundante secrecion de licor prostático.—°Despues del cóito, debilidad ó irritabilidad nerviosa.

Reglas.—**Prurito, excoriacion y exudacion alrededor de la vulva.*—Repugnancia al cóito en la mujer.—*Reglas muy anticipadas*, con flujo de una sangre que provoca comezon.—Leucorrea como clara de huevo.—°Leucorrea, °con ensueños *lascivos.*—Prurito y caspa furfurácea en los pezones.

Laringe.—*Ronquera* con ó sin coriza.—Tos con sequedad en la garganta.—*Tos con sofocacion °por la noche.—**Tos seca por la noche*, ó al principio de esta, °despues de acostado.—°Tos seca con punzadas debajo del esternon.

Pecho.—*Respiracion dificil* al aire frio.—Estertor y ronquido en la tráquea-arteria.—Sensacion de peso, de ansiedad y de inquietud en el pecho.—Opresion de pecho por la noche.—*Punzadas en los costados del pecho.—°Herpes en el pecho.—*Palpitaciones de corazon.

Tronco.—**Dolores en los riñones*, °que no permiten estar de pié.—**Dolor en el dorso*, que impide moverse.—Debilidad y rigidez en el dorso y en los riñones.—°Herpes en la nuca.—°Hinchazon de las glándulas y erupcion en la nuca.—°Supuracion de las glándulas axilares.

Brazos.—Dolor tractivo en los brazos y en los dedos.—Mucha debilidad en los brazos.—Tirantez de los brazos y de los dedos.—Inflamacion erisipelatosa en el brazo.—Manchas amarillas en el brazo.—Forúnculos en el antebrazo.—Dislaceracion en las manos.—Sensacion quemante en la palma de las manos.—Sudor en las manos.—°Manchas pardas en la muñeca.—**Grietas cruentas en las manos y en los dedos*, sobre todo en invierno.—°Sabañones y verrugas en los dedos.—Rigidez artrítica en las articulaciones de los dedos.

Piernas.—Crujido de las articulaciones de las piernas.—Calambres en los muslos, pantorrillas y planta de los piés.—Diviesos en los muslos y en las piernas.—Tension de la córnea.—*Lancinaciones en la rodilla*.—Debilidad de la rodilla.—°Herpes en la rodilla.—Erupcion tuberosa, pruritosa, en la pantorrilla.—°Herpe en el tobillo.—Sensacion ardiente en las plantas de los piés.—*Frio en los piés.—Hinchazon de los piés.—Tumefaccion caliente de las plantas de los piés.—Hinchazon y rubicundez del talon, con dolor ardiente y punzadas que se agravan andando.—Sabañones en los dedos de los piés.—*Clavos en los piés.—°Ulceras tenaces en los dedos, con bordes elevados y fondo rojo, superficial, y que exudan.

Digitized by

151.—PHOSPHORUS.

PHOS.—Fósforo.—HAHNEMANN.—*Hist. y at. y prep.* Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* hasta 7 semanas en las afecciones crónicas; 3 á 5 dias en las afecciones agudas.

ANTÍDOTOS: Camph. coff. n-vom. vinum.

COMPÁRESE CON: Acon. agar. *alum.* amb. *amm. ars. bell.* bry. *calc. carb-veg.* caus. cham. chin. cin. coff. con. *graph.* hell. hyos. *iod.* ipec. kal. kreos. lyc. mag. merc. n-vom. op. petr. plumb. *puls. rhus.* sep. sil. *spong.* sulf. veratr.—El fósforo será eficaz, siempre que por otra parte se halle indicado, sobre todo despues de: *Calc. kal. kreos. lyc.* y *rhus;* despues de fósforo, serán á veces convenientes: *Petr. rhus.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones de las personas de una constitucion débil, tísica, irritable y linfática; de las personas de cabello rubio, ojos azules, talla esbelta y de un temperamento vivo y sensible, ó de una constitucion debilitada por largas enfermedades, ó por causas debilitantes que han ejercido una influencia lenta, pero contínua, sobre la economía animal; Padecimientos á consecuencia de un enfriamiento ó de un arrebato de cólera; *Afecciones reumáticas y artríticas crónicas*; *Debilidad física y nerviosa producida por exceso de largas influencias morbosas sobre la economía animal*; Afecciones linfáticas, escrofulosas y raquíticas; Afecciones de las glándulas, aun á consecuencia de una contusion; Dolores osteócopos, exóstosis y otras enfermedades de los huesos; Afecciones hidrópicas; Manchas hepáticas; *Abscesos linfáticos*; Fungus hematodes; *Hemorragia y congestion sanguíneas*; Sabañones; Escarlatina y sarampion, y malas consecuencias de la repercusion de estas enfermedades?; Clorósis?; Atrofia?; *Forúnculos*; *Fiebres héctica*s; Fiebres tifoídeas?; Afecciones hipocondríacas é histéricas; Somnambulismo; Congestion á la cabeza; *Vértigos congestivos*; *Cefalalgias reumáticas, nerviosas é histéricas*; Jaquecas; Caida de los cabellos, á consecuencia de graves enfermedades agudas; Tiña; *Oftalmía y fotofobia escrofulosas*; Oftalmía artrítica; Catarata; Glaucoma; *Ambliopía amaurótica, y sordera á consecuencia de congestion en la cabeza;* Afecciones del oido causadas por enfermedades nerviosas

é inflamatorias; Pólipo de la nariz; Inflamacion escrofulosa de la nariz; *Prosopalgia reumática* ó congestiva; Odontalgia reumática, ó congestiva; Dispepsia, gastralgia; *acedías* y otras *afecciones gástricas*; Gastritis; Escirro del estómago?; *Cólera*, *Colerina*; Cólicos espasmódicos y flatulentos; Enteritis?; *Relajacion crónica del vientre*; *Diarreas*, sobre todo de las personas sensibles, de una constitucion irritable así como las de los ancianos y de los tísicos; *Diarreas crónicas y colicuativas*; Diarreas con fenómenos tifoideos; Cálculos urinarios?; *Dismenorrea*; Esterilidad á consecuencia de un apetito venéreo muy exaltado; Vómito de las embarazadas; Erisipela, abscesos é induraciones de los pechos (despues del uso de *bell.* ó de *merc.*); Afonía; Catarro pulmonar; Grippe; *Laringitis crónica* (despues del uso del *acon. spong. hep.*); *Disposicion al crup*, ó padecimientos crónicos producidos por esta enfermedad; Neumonía crónica; *Padecimientos asmáticos*, sobre todo á consecuencia de una neumonía, ó en las personas sensibles; Padecimientos tísicos; Enfermedades del corazon; *Dolores reumáticos de los riñones*; Hinchazon edematosa de los piés, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dislaceraciones y punzadas* artríticas y reumáticas, principalmente *en los miembros*, algunas veces *despues de un ligero enfriamiento*, sobre todo por la noche en la cama.—Dolor quemante en los miembros.—Tension, calambres, estremecimientos y distorsion de algunos miembros.—Convulsiones.—Rigidez de algunas partes.—Accesos de palidez y entorpecimiento en algunos miembros, que parecen estar como muertos. —*Temblor de los miembros*, sobre todo durante el trabajo. —°Facilidad á derrengarse.—**Ebullicion de sangre y congestiones*, algunas veces con pulsacion en todo el cuerpo. —**Hemorragia por diferentes órganos*. —*Debilidad y *quebrantamiento de las articulaciones*, sobre todo de las rodillas.—*Excesiva debilidad y laxitud paralítica*, algunas veces súbita, sobre todo por la mañana en la cama, ó por poco que se haya andado.—Accesos de desvanecimiento. —Sensibilidad excesiva de todos los órganos.—*Laxitud histérica.—*Abatimiento general *y debilidad nerviosa*.— °Pesadez de los miembros y pereza.—**Parálisis* con hor-

Digitized by Google

migueo en las partes afectas.—*Enflaquecimiento y consuncion.—*Infarto de las glándulas.—**Imposibilidad de estar al aire, sobre todo si es frio.*—Mucha disposicion á coger resfriados, que frecuentemente son seguidos de cefalalgia y odontalgia, coriza con fiebre, despeluzamiento, etc.—*Dolores en los miembros cuando muda el tiempo.* —La mayor parte de síntomas se manifiestan *por la mañana y por la tarde, en la cama*, como tambien *despues de comer*; mientras que otros muchos se *presentan al principiar á comer, y se disipan despues.*

Piel.—Descamacion de la piel.—Chapas excoriadas en la piel, con grietas y punzadas.—*Manchas redondas, herpéticas, por todo el cuerpo.—Herpes secos, furfuráceos. —*Manchas amarillas ó morenas en la piel.—*Manchas cobrizas ó azuladas, como petequias. —°*Manchas cobrizas como despues del abuso del mercurio, con descamacion y exfoliacion de la piel.*—*Forúnculos.—°Exóstosis, con dolores nocturnos.—*Abscesos lintáticos, °con úlceras fistulosas, de bordes callosos, que segregan un pus fétido y sin color, y fiebre héctica.—°Fungus hematodes. —**Hemorragia abundante por las heridas pequeñas.*—**Sabañones* y *callos en los piés*, algunas veces dolorosos.—Hormigueo en la piel.—Erupciones urticarias.

Sueño.—*Excesiva *gana de dormir durante el dia*, como por somnolencia.—Sueño estupefaciente.—**Sueño tardo* por la noche, ó *insomnio* nocturno, ó frecuente desvelo, con dificultad de volverse á dormir, á causa de un estado de *inquietud*, con *angustia*, y agitacion, calor, vértigo y ebullicion de sangre.—Imposibilidad de estar acostado sobre el dorso ó sobre el costado.—*Sueño no reparador, *por la mañana parece que no se ha dormido bastante.*—Por la noche, vértigos con *náuseas*, sensibilidad dolorosa de los miembros, dolores de estómago y de vientre, asma sofocante y espasmódica, etc.—Se despierta frecuentemente con sobresaltos y espanto.—Durante el sueño, estremecimiento de los miembros, gritos, palabras, llantos, lamentos y gemidos.—**Ensueños angustiosos, penosos, espantosos y horribles*, ó vivos é inquietos.—Ensueños de animales que muerden, de bandidos, de incendios, de los negocios del dia, de hemorragias, de muertos, de guerrillas, de gentuza, etc.—Pesadilla.—°*Somnambulismo.*

Fiebre.—*Horripilacion y *calofrios*, sobre todo *por la noche*, *en la cama*, algunas veces con bostezos, seguidos ó no de calor.—Frialdad de los miembros.—Calofrios seguidos de calor, con sed y sudor, sobre todo por la noche y despues de medio dia.—**Calor fugaz* ¯ó angustioso.—**Calor nocturno.*—Fiebre héctica, ¯con calor seco hácia el anochecer, sobre todo en las palmas de la mano, sudores y diarreas colicuativas, rubicundez circunscrita de las mejillas, etc.—*Pulso acelerado y duro.—Sudor nocturno y viscoso.—**Sudor matutino.*—°*Fiebre tifoidea con estado pútrido, sueño soporoso, boca abierta, labios y lengua secos y negros.*

Moral.—Tristeza melancólica y melancolía, algunas veces con llantos violentos, ó interrumpidos por ataques de risa involuntarios.—**Angustia é inquietud*, sobre todo *estando solo*, ¯principalmente por la tarde, ó por un tiempo tempestuoso, con *disposicion al miedo* y á amedrentarse.—*Inquietud sobre el porvenir, ¯ó sobre el éxito de su enfermedad.—Disposicion á asustarse.—**Tristeza hipocondriaca.*—Disgusto de la vida.—**Mucha irascibilidad, arrebato de cólera y violencia.*—Llantos y risas involuntarias y espasmódicas.—Misantropía.—**Repugnancia al trabajo.*—Impudencia, como por enajenacion.—Mucha indiferencia por todo, ¯y aun por su familia.—Falta de memoria, sobre todo por la mañana.—Excesiva afluencia de ideas difíciles de coordinar.—°*Estado de mucha penetracion.*

Cabeza.—*Obnubilacion y *aturdimiento*, sobre todo *por la mañana*.—*Frecuentes *accesos de vértigo* de diversa naturaleza, y á diferentes horas del dia, sobre todo *por la mañana*, al medio del dia y por *la noche en la cama*.—Vértigo estando sentado; le parece que el asiento se eleva, con humor hipocondríaco.—**Vértigos con náuseas y dolores presivos en la cabeza.*—Vértigo tenaz.—*Vértigo con pérdida de ideas.—Accesos periódicos de dolores de cabeza, con náuseas y vómitos, y dolores pulsativos, con estremecimiento.—Dolores de cabeza nocturnos, precedidos de náuseas, por la tarde.—Cefalalgia despues de una contrariedad.—**Cefalalgia por la mañana.*—Debilidad de cabeza, que se fatiga por la música, la risa, una marcha pesada, etc.—Dolor de contusion en el cerebro.—**Cefalalgia con aturdimiento*, algunas veces con fuerte

ebullicion de sangre y palidez del rostro.—*Sensacion de pesadez y de plenitud, y *presion en la cabeza.*—Dolor de dislaceracion en la cabeza, y sobre todo en las sienes, ó *semi-lateral.*—Lancinaciones en diversas partes de la cabeza, sobre todo por la tarde.—**Congestion á la cabeza*, con latidos, zumbido, calor y sensacion ardiente, sobre todo en la frente.—Sensacion de frio en la cabeza.—Los dolores de cabeza se alivian al aire libre.—°Punzadas exteriores á un lado de la cabeza.—Sensacion penosa como si la piel de la frente estuviese muy tirante.—Facilidad á resfriarse, con sensacion al aire libre, como si el cerebro se congelase.—*Prurito en la piel del cráneo.—**Caida de los cabellos*, sobre todo *por encima de las orejas.*—°Costras secas, y escamas abundantes en la piel del cráneo.—°Exóstosis en la cabeza.

Ojos.—Dolores en los ojos, como en los huesos de las órbitas.—**Presion en los ojos*, como si se hubiese introducido en ellos un grano de arena.—*Punzadas, escozor, calor y *sensacion quemante en los ojos*, sobre todo en los ángulos exteriores.—*Congestion de sangre á los ojos.—Rubicundez de la esclerótica y de la conjuntiva.—Color amarillento de la esclerótica.—**Inflamacion de los ojos*, de diversa naturaleza.—**Lagrimeo*, sobre todo *al aire libre y al viento.*—**Aglutinacion nocturna de los ojos.*—Orzuelo.—Estremecimiento de los párpados y de los ángulos.—*Dificultad de abrir los párpados.—Hinchazon de los párpados.—Ambliopia.—Debilidad de la vista por la mañana al despertarse.—*Miopia.*—**Ceguera diurna*, algunas veces instantánea; **todo parece que está cubierto de un velo gris.*—Oscurecimiento de la vista á la luz.—*Reflejo negro, ó chispas y *manchas negras delante de la vista.*—Sensibilidad de los ojos á la claridad del dia y á la luz artificial.—Aureola verdosa alrededor de la luz artificial.

Oidos.—*Otalgia.—Dislaceraciones agudas y punzadas en los oidos* y en la cabeza.—**Latidos y pulsaciones en los oidos.*—*Congestion de sangre en los oidos.—Sensacion de sequedad en los oidos.—Flujo amarillo por los oidos, alternando con sordera.—*Excesiva sensibilidad del oido.—Mucha repercusion de los sonidos, y sobre todo de las palabras, con sonoridad en la cabeza.—**Sordera*, *principalmente para la voz humana.*—Murmullo en los oidos.—*Zumbido de oidos.

Digitized by Google

Nariz.—*Nariz de color encendido*, *hinchada* y dolorida al tacto.—*Costras secas y duras en la nariz.—°Pólipo de la nariz.—Excoriacion de los ángulos de la nariz.—Ventanillas nasales ulceradas.—Efélides abundantes en la nariz.—°*Exhalacion fétida por la nariz.*—Mucosidades sanguinolentas al sonarse.—**Epistaxis*, algunas veces durante la deposicion, ó por la tarde.—*Excesiva sensibilidad del olfato, sobre todo durante los dolores de cabeza.—Anosmia.—**Sequedad penosa de la nariz.*—*Coriza seco y fluente, con ligera irritacion en la garganta y pesadez en la cabeza.—**Flujo continuo por la nariz*, *de mucosidades amarillas*, verdosas.—Estornudo frecuente.—**Obturacion de la nariz*, sobre todo por la mañana.

Cara.—**Cara pálida*, *macilenta*, *súcia*, *térrea*, *con los ojos hundidos*, *y sus bordes rodeados de un cerco azul.*—Palidez que alterna con *rubicundez del semblante* y calor fugaz.—*Rubicundez y calor ardiente en las mejillas.—Rubicundez circunscrita de las mejillas.—**Abotagamiento de la cara*, sobre todo *alrededor de los ojos.*—Estremecimiento de los músculos de la cara.—**Tension de la piel de la cara*, *algunas veces de un solo lado.*—Descamacion de la piel de la cara.—°Sensibilidad dolorosa en un solo lado de la cara, en abriendo la boca.—**Punzadas dolorosas*, *tractivas y dislacerantes en los huesos de la cara*, sobre todo por la tarde ó por la noche en la cama, ó despues del mas ligero enfriamiento.—*Los dolores de la cara se renuevan hablando, ó al menor contacto.—Erupciones de granos y costras en la cara.—*Labios azulados.—*Labios secos, cubiertos de costras parduscas.—Labios grietados.—Herpes y granos alrededor de la boca.—*Ulceracion de las comisuras de los labios.*—Calambre de la mandíbula.—Infarto de las glándulas sub-maxilares.

Dientes.—**Odontalgia* tractiva ó *dislacerante*, ó bien corrosiva, terebrante, pulsativa, con estremecimiento y *lancinante*, *sobre todo al aire libre*, ó *por la tarde* y *por la mañana*, algunas veces tambien solo por *la noche*, sobre todo con el calor de la cama, ó bien al contacto de los alimentos calientes.—*Odontalgias despues del mas ligero enfriamiento, con salivacion.—Dentadura dolorida por la mañana, durante la masticacion, como por ulceracion.—Cáries de los dientes.—Considerable vacilacion de los dientes.—Hemorragias de las encías.—Rechina-

Digitized by Google

miento de dientes.—Sensibilidad dolorosa, inflamacion, excoriacion, *ulceracion, ¯*hinchazon y fácil hemorragia de las encias.*

Boca.—*Excoriacion de la boca.—**Acumulacion de saliva*, ¯sala la ó dulce, ó *excesiva sequedad de la boca.*—*Mucosidades viscosas en la boca.—*Esputo de sangre.—Vesículas purulentas en el paladar.—La piel del paladar arrugada, como si fuera á desprenderse.—**Lengua seca*, ¯cubierta de una capa parda negruzca.—**Lengua blanca.*

Garganta.—**Sequedad de la garganta*, dia y noche.—Presion en la garganta.—*Escozor, *arañamiento y dolor ardiente en la garganta.*—**Ruido estrepitoso de mucosidades*, por la mañana.—Dolor de excoriacion en la garganta.—Tumefaccion de las amígdalas.

Apetito.—°Gusto pastoso, ó como de queso.—Amargor en la boca y la garganta, con aspereza.—°*Sabor ágrio en la boca, sobre todo despues de la comida.*—°Pérdida del gusto.—Falta de apetito por una sensacion de plenitud en el esófago, y mucha sed.—°Deseo excesivo de cosas frescas.—°Hambre despues de la comida.—*Bulimia, aun por la noche.—°Despues del desayuno, sensacion de desfallecimiento y de laxitud en el vientre.—*Despues de la comida, gana de dormir* y pereza, calor y ansiedad, sensacion ardiente en las manos, *acedías mas pronunciadas, presion y plenitud en el estómago*, el pecho y el vientre, acompañados de dificultad de la respiracion, vómito de los alimentos, timpanitis, ¯ó *cefalalgia*, erutos, hipo, debilidad, cólicos y otros muchos padecimientos.

Estómago.—Erutos con dolor en el estómago como si arrancaran alguna cosa.—°El humo del tabaco produce náuseas y palpitacion del corazon.—**Erutos* abundantes, generalmente *en seco*, sobre todo *despues de la comida* y despues de haber bebido, *algunas veces tambien abortados*, ó espasmódicos, ó bien *ágrios*, ¯ó *con sabor á los alimentos.*—**Regurgitacion ácida de los alimentos.*—*Pirosis.—Hipo.—**Náuseas de diversa naturaleza*, sobre todo *por la mañana* ó por la tarde, ó bien despues de la comida.—Náuseas con excesiva hambre ó sed, que se disipan en comiendo, ó en bebiendo agua.—°Evacuacion de agua por la boca, como de pituitas, sobre todo despues de haber comido cosas ácidas.—**Vómitos con mucho dolor de estómago*, y considerable debilidad.—Vómito verdoso,

negruzco.—Vómito de materias ácidas.—*Vómito de los alimentos, sobre todo por la tarde.—**Vómito de bilis* por la noche, ó de mucosidades, algunas veces con frio y entorpecimiento de las manos y de los piés.—Vómito de sangre.—Vómito con diarrea.—*Dolor de estómago*, sobre todo *al tacto*.—Violentos dolores de estómago, los que se alivian bebiendo frio.—°*Sensacion de estrechez del cardias*; los alimentos apenas son ingeridos suben á la garganta. —**Plenitud de estómago*.—Punzadas y *presion en el estómago*, sobre todo *despues de la comida*, con vómito de los alimentos.—*La boca del estómago dolorida al tacto, y aun por la mañana.—Sensacion de frio, ó calor, y **sensacion ardiente en el estómago y en la boca de este*.—Inflamacion en el estómago.—**Dolor calambroideo, sensacion de arañamiento y contraccion en el estómago*, °algunas veces con sofocacion.—Malestar general, pero que principalmente se siente en el estómago.—Los dolores de estómago se manifiestan sobre todo *despues de la comida*, así como tambien por la tarde y por la noche.

Vientre.—Punzadas en la region hepática.—**Timpanitis*, sobre todo *despues de la comida*.—Vientre duro y tirante. —Dolor contractivo en el vientre.—**Cólicos espasmódicos*. —*Pellizcos, retortijones y *dolores dislacerantes en el vientre*, sobre todo *por la mañana en la cama*, por la noche y por la tarde, y frecuentemente con gana urgente de deponer, y diarrea.—Dolores de vientre lancinantes, algunas veces con palidez del rostro, calofrios y dolor de cabeza.—*Sensacion de frio con calor*, *y *sensacion ardiente en el vientre*.—Inflamacion de los intestinos.—*Sensacion de debilidad y de vacío en el vientre, como una especie de atonía.—Malestar en el vientre, despues del desayuno.—°Presion como si todo afluyese hácia los lados del vientre.—*Hernia inguinal.—*Manchas amarillas en el vientre.—Hinchazon y supuracion de las glándulas inguinales.—**Encarcelacion de flatuosidades*.—**Cólicos flatulentos*, con dolores profundos en el bajo vientre, empeorados estando acostado, con *ruido sordo y borborigmos*.

Deposiciones.—*Constipacion.—Deposiciones duras, lentas, interrumpidas, difíciles de evacuar y enteramente secas.—°Gana urgente y penosa de defecar.—**Laxitud prolongada del vientre*.—*Deposiciones de consistencia de papilla.—*Diarreas serosas.—°*Diarreas con caida de las*

fuerzas.—°*Diarreas mucosas.* — °*Diarreas sanguinolentas.*— °Lientería.—*Deposiciones verdosas*, grises ó negras.—°Deposiciones involuntarias.—°Flujo de mucosidades por el ano, que permanece constantemente abierto.—°Ténia, °ó ascárides por el recto, al deponer.—**Flujo de sangre durante la deposicion.*—Despues de defecar, presion, dolor ardiente y tenesmo en el ano y el recto, con mucho decaimiento.—*Prurito y punzadas en el ano y en el recto. —*Salida de *granos hemorroidales por el recto y ano*, que dan sangre fácilmente; por lo regular con dolor de excoriacion, estando sentado ó acostado.

Orinas.—*Secrecion muy abundante de una orina acuosa.*—Emision frecuente de orina poco abundante. — Orina con sedimento blanco, seroso, arenoso y rojo, ó bien amarillo.—*Orinas turbias, con sedimento color de ladrillo.—Orinas pálidas, acuosas ó blanquecinas.— Película de color del íris sobre las orinas.— Hematuria.— *Al orinar, escozor y sensacion ardiente. — *Tension y estremecimiento, ó *dolor quemante en la uretra*, fuera del tiempo de la emision de las orinas.

Partes viriles.—**Considerable exaltacion del apetito venéreo*, con deseo constante del cóito.—*Erecciones muy violentas por la tarde ó por la mañana.—**Poluciones muy frecuentes.*—°Eyaculacion sin energía y muy pronta durante el cóito.—*Dolores en los testículos*, é hinchazon del cordon espermático.

Reglas.—Dislaceraciones en las partes genitales y *punzadas desde la vagina hasta la matriz.*—**Reglas muy anticipadas y muy abundantes*, ó escasas y serosas.—°Flujo de sangre por la matriz durante el embarazo. — Reglas de muy larga duracion con odontalgias y cólicos.— Antes de las reglas, hemorragia abundante de las úlceras, °leucorreas con conato á orinar y llantos.—°A la aparicion de las reglas, retortijones incisivos, dolores en el dorso y vómitos.—°Despues de las reglas, debilidad, círculos azules alrededor de los ojos y ansiedad.—Reglas de muy corta duracion.—**Retardo de las reglas.*—*Durante las reglas, *dolores de cabeza* lancinantes, fermentacion en el vientre, expectoracion de sangre, dolores en el dorso, quebrantamiento de los miembros, *mucha laxitud y fiebre*, °ó palpitacion del corazon, *calofrios*, tumefaccion de las encías y de la mejilla y otros muchos padecimientos.

—*Leucorrea* con escozor, corrosiva.—°Nudosidades duras y dolorosas en los pechos.—*Inflamacion erisipelatosa de los pechos, con hinchazon, dolores ardientes y punzadas.—°*Abscesos en los pechos*, aun con úlceras fistulosas.

Laringe.—**Ronquera y arañamiento en la garganta*, °algunas veces *prolongados*.—**Afonia*, tan pronunciada, que no se puede hablar sino muy bajo.—*Catarro con tos, °fiebre y temor á la muerte.—°*Sensibilidad muy dolorosa de la laringe*, que no deja hablar.—°Excesiva sensibilidad de la laringe, con dolor quemante.—Sequedad en la tráquea-arteria y en el pecho.—*Expectoracion de mucosidades por la laringe.—**Tos provoca la por un cosquilleo y una picazon en el pecho, ó con ronquera y sensacion como si el pecho estuviera en carne viva.*—Tos bronca por la noche que no deja dormir.—**Tos con punzadas en la garganta*, ¯en el pecho y la boca del estómago, algunas veces solo por la noche.—*Tos seca cotidiana, y que dura muchas horas, con dolores en el estómago y en el vientre.—*Tos seca con estremecimiento* como si la cabeza fuese á estallar, provocada por el aire frio, al beber y al leer en alta voz.—Tos con vómitos.—°Tos provocada por la risa.—°Tos seca como por tubérculos ó una inflamacion crónica de los pulmones.—°*Tos con expectoracion purulenta* y salada, sobre todo por la mañana y por la tarde.—°Expectoracion verdosa á consecuencia de la tos.—Tos con *expectoracion de mucosidades viscosas ó de sangre*, con escozor en el pecho.

Pecho.—°Respiracion sonora y estertorosa.—*Respiracion *difícil*, sobre todo por la tarde, *con angustia en el pecho*, que se agrava estando sentado.—**Dificultad de la respiracion y opresion de pecho de diversa naturaleza*, ¯sobre todo por la mañana ó por la tarde, y tambien durante el movimiento.—Asma espasmódico.—Accesos de sofocacion por la noche.—*Presion en el pecho.—**Pesadez, plenitud y tension en el pecho.—**Calambres de pecho* contractivos.—Dislaceracion en el pecho.—**Lancinaciones en el pecho y sobre todo en el costado* izquierdo, algunas veces de larga duracion, ó bien al tacto.—°Dolor de excoriacion quemante en el pecho.—Sensacion de fatiga en el pecho.—*Angustia en el pecho.—Congestion en el pecho*, con sensacion de calor que sube á la garganta.—**Latidos del corazon de diversa naturaleza*, ¯sobre todo despues de la comida, por

la mañana y por la tarde, *como tambien estando sentado y á consecuencia de cualquiera emocion moral.—°Palpitaciones de corazon con opresion de la respiracion.—°Dolor debajo del pecho izquierdo, acostándose sobre él.—*Manchas amarillas en el pecho.

Tronco.—**Dolor de quebrantamiento en los riñones y en el dorso*, ¯sobre todo despues de haber estado mucho tiempo sentado, el cual impide levantarse, andar y hacer el menor movimiento.—Dolor quemante en los riñones.—Dislaceraciones y *punzadas en los omóplatos*.—*Rigidez de la nuca.—Presion en la espalda.—*Hinchazon del cuello.—*Infarto de las glándulas axilares, de las de la nuca y de las del cuello.—Prurito y punzadas debajo de los sobacos.—Sudor fétido en los sobacos.

Brazos.—*Dislaceracion reumática (y punzadas) en los hombros, los brazos y las manos, sobre todo por la noche.—*Dolor ardiente en las manos* y en los brazos.—Adormecimiento de los brazos y de las manos.—Laxitud y **temblor en los brazos y en las manos*, ¯sobre todo teniendo asido algun objeto.—°Herpes furfuráceos en los brazos.—Congestion de sangre en las manos, con hinchazon y rubicundez de las venas, sobre todo dejando los brazos caidos.—Dolor de luxacion en las articulaciones de las manos y de los dedos, con tension.—*Hinchazon de las manos aun por la noche.—°Calor de las manos.—Frio en las manos por la noche.—Contraccion y estremecimiento de los dedos.—Dedos como muertos.—Parálisis de los dedos.—*Entorpecimiento de las puntas de los dedos.—Piel con grietas en las articulaciones de los dedos.—*Sabañones* en los dedos.

Piernas.—Dolor de ulceracion en las nalgas estando sentado.—*Dolor de luxacion en las articulaciones coxo-femorales*, y en las de las rodillas y los piés, con calor exterior.—Fatiga dolorosa y pesadez de las piernas.—Sensacion ardiente en las piernas y en los piés.—Tension y calambres en las piernas, sobre todo en las rodillas.—Sacudidas en las piernas, por el dia y por la noche, antes de dormirse.—**Traccion y dislaceracion en las rodillas*, hasta los piés.—*Debilidad paralítica de las piernas °y rigidez artrítica en las rodillas.—Herpes en la rodilla.—Manchas como petequias en las piernas.—°Exóstosis en la tibia.—°Estremecimientos en las pantorrillas.—Dislacera-

Digitized by Google

cion y punzadas en los piés, sobre todo por la noche.—*Hinchazon de los piés*, ó solamente de los maléolos, sobre todo por la tarde ó despues de un paseo, algunas veces con dolor lancinante.—Luxacion fácil de la articulacion del pié.—*Frio en los piés, sobre todo por la noche.—*Dolor de ulceracion en la planta de los piés al andar.—*Sacudidas en los piés, por el dia y por la noche, antes de dormirse.—*Entorpecimiento de la punta de los dedos.—Inflamacion y rubicundez de la parte carnosa del dedo pulgar del pié, con lancinaciones.—*Sábañones y callos en los dedos de los piés.*

152.—PHOSPHORI ACIDUM.

PHÓS.-AC.—Acido fosfórico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 3, 20, 30.—*Duracion de accion*: 3 á 4 dias en las enfermedades agudas; 6 á 7 semanas en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. coff.—*Se emplea como antídoto de:* Lach.

COMPÁRESE CON: *Asa. bell.* caus. *chin.* coff. con. ign. *lach. lyc.* merc. *op. rhus.* sep. *staph.* sulf. thui. *veratr.*—El ácido fosfórico será eficaz siempre que se halle indicado, sobre todo despues de *Lach.* y *rhus.*—Despues del ácido fosfórico conviene algunas veces: *Chin. lach. rhus. veratr.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Artritis inveterada; Artrocace; *Debilidad física y nerviosa á consecuencia de graves enfermedades agudas, por pérdida de humores* y otras causas debilitantes, *sobre todo cuando han minado rápidamente una constitucion fuerte hasta entonces*; *Padecimientos por causa del onanismo*; Debilidad de los jóvenes que crecen con rapidez; *Malos resultados de un pesar concentrado con inquietud ó de un amor desgraciado*, etc.; Herpes; *Ulceras inveteradas*; Varices; Escarlatina y malas consecuencias de la repercusion de esta enfermedad; *Fiebres tifoideas*; Fiebres nerviosas lentas debidas á un pesar; *Enfermedades de los huesos*; Caida y encanecimiento del cabello á causa de pesadumbres; Colerina; *Diarreas*, sobre todo despues de un pesar, ó despues de la repercusion de la escarlatina; *Diarreas epidémicas*; Diabetes sacarina; *Poluciones á consecuencia del onanismo*; Impoten-

Digitized by Google

cia á consecuencia de excesos en el cóito; Disuria de las embarazadas, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Tracciones y *dolores dislacerantes, con estremecimiento de los miembros.*—Dolores calambroídeos presivos.—*Sensacion como si se raspase con un cuchillo el periostio.*—Dolores osteócopos, ardientes, dislacerantes, por la noche.—**Hinchazon de los huesos.*—*Sensacion ardiente en toda la parte inferior del cuerpo, aunque los miembros estén frios al tacto.—Hinchazon de las glándulas.—*Quebrantamiento de los miembros y de las articulaciones, como por una parálisis, ó por crecimiento de dichos órganos, sobre todo por la mañana y por la tarde.—Adormecimiento y *debilidad de los miembros.*—Pesadez en los miembros y las articulaciones, con mucha pereza.—Excesiva fatiga despues de haber andado.—**Debilidad excesiva, general, física ó nerviosa*, mucha disposicion á la transpiracion por el dia, con sensacion quemante en el cuerpo.—*Enflaquecimiento*, con semblante enfermizo y ojeras.—Considerable ebullicion de sangre con mucha agitacion.—*Los dolores se agravan en el reposo* y se alivian por el movimiento, y los que se manifiestan por la noche se alivian con la presion.

Piel.—Insensibilidad de la piel.—*Hormigueo debajo de la piel.*—Manchas de color encendido y quemantes en los miembros.—**Erupcion como la escarlatina.*—Inflamaciones erisipelatosas.—*Erupciones de pequeños granos y de miliares reunidos en grupo*, y rojos.—Erupciones granulosas con dolor quemante ó de excoriacion.—Vesículas sarnosas.—Herpes húmedos y secos.—*Callos en los piés*, con punzadas y dolor quemante.—Sabañones.—*Condilomas.—**Forúnculos.*—°Ulceras lisas, indolentes, con secrecion de un pus súcio y fondo dentellado.—°*Ulceras pruritosas.*

Sueño.—Mucha *propension al sueño*, por el dia, *muy temprano*, y por la mañana, con dificultad de despertarse.—*Soñolencia.*—Sueño tardo é insomnio nocturno causado por agitacion y calor seco.—Al dormirse, aparicion de cifras delante de la vista.—*Sueño profundo.*—Estremecimiento y movimientos automáticos de las manos, ge-

midos, palabras y cánticos, ó aire tan pronto risueño como lloroso durante el sueño, con ojos medio abiertos y convulsos.—*Ensueños angustiosos* de muertos, con miedo al despertarse.—Ensueños lascivos.

Fiebre.—*Horripilacion y calofrios*, algunas veces con *temblor de frio*, ó con *frio en las manos y en los dedos*, generalmente por la tarde, y sin sed.—Sensacion de frio con calofrio y frio en el vientre.—Calor febril por la tarde sin sed, con angustia y mucha actividad de la circulacion sanguínea.—Calofrios que alternan con calor.—°*Fiebre maligna con excesiva debilidad, apatia, estupidez, aversion á hablar*, diarrea, etc.—**Sudores nocturnos*.—Sudores matutinos.

Moral.—Gana de llorar como por nostalgia.—**Tristeza* é inquietud sobre el porvenir.—*Inquietas averiguaciones sobre su enfermedad.—Agitacion y precipitacion.—**Morosidad taciturna y repugnancia á la conversacion*.—**Excesiva indiferencia*.—Imposibilidad de soportar el ruido ni la conversacion.—*Espíritu obtuso y perezoso, sin imaginacion.—*Falta de ideas é ineptitud para los trabajos intelectuales.—Ilusiones de los sentidos.

Cabeza.—*Atolondramiento de cabeza, como despues de la embriaguez, ó de poluciones inmoderadas.—Vértigo con aturdimiento, estando en pié y andando, sobre todo por la tarde.—*Dolores de cabeza por la mañana*.—Dolores de cabeza contínuos que obligan á echarse, y que se agravan por la mas ligera emocion, ó por el ruido, hasta llegar á hacerse insoportables.—*Pesadez de la cabeza* como si estuviera llena de agua.—*Presion calambroidea y dura en la cabeza*, que se agrava comprimiendo esta, volviendo la cabeza, por la meditacion, y subiendo una escalera, pero sobre todo despues de media noche, en la parte de la cabeza sobre la cual descansa.—Compresion en el cerebro.—Dolores de cabeza dislacerantes.—*Lancinaciones* en las sienes, ó por *encima de los ojos*.—Estremecimientos ó sacudidas, golpes y martilleo en la cabeza.—Dolores tractivos en los huesos del occipucio.—Cabellos grises, lasos, como estopa.—Alopecia.

Ojos.—Ojos empañados, vidriosos, abatidos.—*Presion en los ojos*, con sensacion como si sus globos fuesen demasiado voluminosos.—*Frio en el borde interno de los párpados.—*Dolor quemante en los párpados y en sus ángulos*.

Digitized by Google

sobre todo por la noche á la luz artificial. —**Inflamacion de los ojos*, con las venas de los ángulos internos inyectadas.—Inflamacion de los párpados.—Orzuelo.—Mancha amarilla en la esclerótica.—*Lagrimeo. — Pupilas dilatadas.—Mirar fijo.—Vista turbia como á través de una niebla.—*Miopia*.—Como una faja negra delante de la vista.

Oidos.—*Punzadas en los oidos*, algunas veces con traccion de las mejillas, las mandíbulas y los dientes, *que se agravan tan solo con la música*.—Tracciones calambroideas en los oidos.—**Imposibilidad de soportar la música*, el ruido y la conversacion.—Repercusion fuerte de todos los sonidos en el oido.—*Sordera*, para los sonidos distantes.—Ruido en los oidos al sonarse.

Nariz.—Hinchazon del dorso de la nariz, con manchas rojas.—*Costras en la nariz.—Necesidad de introducir los dedos en la nariz.—°Exhalacion fétida por la nariz.—Flujo de pus por la nariz.—Epistaxis.—Coriza violento, con rubicundez de los bordes de las ventanillas nasales.—Coriza fluente, con tos y dolor ardiente en el pecho y en la garganta.

Cara.—Rostro pálido, macilento, con ojos hundidos, y sus bordes rodeados de un cerco azul, y nariz afilada.—Traccion en las mejillas y en las mandíbulas.—Rasgos irregulares.—Calor de la cara con *tension en la piel*, como si esta estuviera cubierta de clara de huevo seca.—*Granos gruesos en la cara.—*Dolor ardiente en las mejillas.—*Herpes húmedos y costrosos en las mejillas, en los labios y en las comisuras de estos.—Labios cubiertos de grietas, las que supuran, con dolor de excoriacion.—Granos y costras sobre la parte roja de los labios.—°Granos en la barba.—Hinchazon de las glándulas submaxilares.—Dolor en la mandíbula inferior, como si estuviese dislocada.

Dientes.—Odontalgia con dolor dislacerante, agravado por el calor de la cama y por las cosas frias ó calientes.—Dolores violentos por la noche en los dientes incisivos.—°*Dientes amarillos*.—**Hemorragia*, hinchazon y decoloracion de las encías.—Nudosidades dolorosas en las encías.

Boca.—Sequedad de la boca sin sed.—*Mucosidades viscosas, tenaces, en la boca y sobre la lengua*.—Punzadas y sensa-

cion quemante en la lengua.—Por la noche se múerde la lengua sin querer.—Hinchazon de la lengua, con dolor al hablar.—Voz gangosa. — Escozor en lo interior de la boca durante la masticacion de alimentos sólidos.—*Excoriacion y *ulceracion del velo del paladar*, con dolor quemante.

Garganta.—Dolor de excoriacion en la garganta, con escozor y punzadas, sobre todo durante la deglucion (de los alimentos). — Dolor contractivo en el hoyuelo del cuello.—Estertor de mucosidades viscosas.

Apetito.—Gusto pútrido, ácido, herbáceo.—*Gusto prolongado* de los alimentos, y sobre todo *del pan*.—Repugnancia al pan, que parece amargo.—**Mucha sed* de leche fria, ó de cerveza; en general **de cosas refrigerantes* y suculentas; el pan parece demasiado seco.—**Sed inextinguible*, provocada por una sensacion de sequedad en todo el cuerpo.—Los ácidos provocan erutos amargos y otras incomodidades.—**Despues de la comida, presion*, ó sensacion de *ondulacion en el estómago*, con atontamiento de la cabeza, mal estar, plenitud y gana de dormir, ó abatimiento como si fuera á desvanecerse.

Estómago.—*Erutos ácidos*, incompletos y quemantes.—**Náuseas continuas* en la garganta.—*Náuseas que obligan á acostarse.—Vómito de los alimentos.—Vómito ácido.—*Presion en el estómago como por un peso*, estando en ayunas y *despues de tomar cualquier alimento*, como tambien tocando la boca del estómago.—Sensacion de frio ó de quemadura en el estómago.

Vientre.—Presion calambroídea con angustia en los hipocondrios, y sobre todo en el hígado.—Sensacion de peso en el hígado.—Punzadas en la region del hígado y del bazo.—Vientre meteorizado y tirante.—Contracciones en los dos lados de la region umbilical.—*Dolores de vientre calambroídeos*, sobre todo en la region umbilical.—Punzadas y retortijones en el vientre.—*Sensacion quemante en el hipogastrio.—Hinchazon de vientre como si contuviese agua, sobre todo al tacto, ó doblándose hácia delante, ó hácia atrás.—*Murmullo sordo, frecuente, y *borborigmos en el vientre*. — *Desarrollo y expulsion de gases abundantes, sobre todo despues de haber tomado ácidos.—Hinchazon de las glándulas inguinales.

Deposiciones.—Deposiciones duras, caprinas, difíciles

Digitized by

de evacuar.—°Deposiciones frecuentes.—**Deposiciones diarréicas*, no debilitantes.—*Evacuaciones diarréicas, mucosas, de color gris blanquizco.—°Diarreas serosas y lientéricas.—Deposiciones involuntarias de la consistencia de papilla, con sensacion como si se fueso á expeler una ventosidad.—Durante la defecacion, salida de las hemorróides.—Despues de la defecacion, tenesmo.—Dislaceraciones, escozor y prurito en el ano y en el recto.

Orinas.—Conato urgente de orinar, con emision de orina menos abundante de lo ordinario, palidez del semblante, calor y séd.—**Emision* frecuente y *abundante de orina acuosa*, que deposita inmediatamente una nube espesa y blanca.—°*Orina como leche*, con copos sanguinolentos y gelatinosos.—°Orinas fétidas.—Flujo de orina con dolores calambroídeos en los riñones.—Necesidad urgente é irresistible de orinar.—°Orinas como en la diabetes sacarina.—Angustia é inquietud antes de orinar.—*Emision de orina por la noche.—*Dolor quemante en la uretra, durante y despues de la emision de las orinas.—Constriccion calambroídea en la vejiga.—*Dolores incisivos en la uretra al orinar.—°*Gonorreas crónicas*, con laxitud de las partes y de la membrana mucosa.

Partes viriles.—*Dolores lancinantes en el glande.*—Hormigueo y vesículas que exudan, alrededor del frenillo.—*Condilomas.—Erupcion en el miembro y en el escroto.—Hinchazon inflamatoria del escroto.—°Dolor en los testículos al tacto.—Dolor corrosivo en los testículos.—Hinchazon de los testículos, y cordon espermático abultado, duro y tirante.—Falta de apetito venéreo.—Erecciones frecuentes sin deseo del cóito.—**Poluciones frecuentes y muy debilitantes.*—Espermatorrea, por los esfuerzos que se hacen para deponer.

Reglas.—°Dolores hepáticos durante las reglas.—Leucorrea amarillenta, pruritosa, despues de las reglas.—°Fisómetra.

Laringe.—*Excesiva ronquera* y aspereza en la garganta.—Dolor contractivo en el hoyuelo del cuello, que estrecha la garganta.—**Tos provocada por cosquilleo y arañamiento en la laringe*, ó encima del epigastrio, seca por la tarde, y con espectoracion de un blanco-amarillento por la mañana.—**Tos con vómito de los alimentos*, y cefalalgia.—Expectoracion durante la tos, con olor y gusto herbáceos.

—Tos, con *expectoracion purulenta* y dolores en el pecho.

Pecho.—°Respiracion corta é *imposibilidad de hablar de un modo sostenido*, por debilidad del pecho.—Opresion calambroídea y contractiva del pecho, como si estuviera apretado.—Debilidad en el pecho, despues de haber hablado.—*Presion en el pecho*, frecuentemente *calambroidea* ó incisiva.—Lancinaciones en los costados del pecho.

Tronco.—Erupcion dolorosa al tacto, en el dorso, en los omóplatos, en el cuello y en el pecho.—*Hormigueo en el dorso y en los riñones*.—Tension y traccion calambroídea en los músculos del cuello, sobre todo movieudo la cabeza.—Miliar en el cuello.—°Diviesos debajo de los sobacos.

Brazos.—*Presion calambroidea* en los brazos, en las manos y en los dedos.—Traccion y *dislaceraciones con estremecimiento*, en los brazos y en los dedos.—Erupciones granulosas en los brazos.—Dolores tractivos, incisivos, en las articulaciones de los codos, de las manos y de los dedos.—Debilidad y temblor de los brazos.—Quistes sobre el dorso de la mano.—La piel de las manos y de los dedos seca, arrugada, árida.—Dedos como muertos, algunas veces de un solo lado, y de una manera muy circunscrita.—Lancinaciones en los dedos y en las articulaciones de estos.

Piernas.—°*Hinchazon* y °*forúnculos en las nalgas*.—*Dolores* de quebrantamiento *en las caderas* y en los muslos, sobre todo andando y al levantarse de su asiento.—Calambres en la articulacion coxo-femoral, con dislaceracion en toda la pierna, insoportable estando sentado, y durante el reposo.—*Dolores presivos*, *calambroideos*, en los muslos, en las piernas, en los piés y en los dedos de estos.—Dislaceracion en toda la pierna, con pesadez en las articulaciones.—Debilidad en las piernas, hasta el punto de caer si se da un paso en falso.—Dislaceracion quemante por la noche en la tibia.—Granos en las rodillas y en las piernas, que llegan á hacerse confluentes y se trasforman en úlceras que sangran fácilmente.—°*Ulceras pruritosas en las piernas*.—*Sensacion quemante en los piés y en las plantas de estos*, con excoriacion entre los dedos.—°Hinchazon de los piés.—°Sudor de los piés.—Clavos en los piés.—Sabañones en los dedos de los piés.—Hin-

Digitized by

chazon de la articulacion del dedo pulgar del pié, con latido quemante, dolores incisivos y sordos al tacto.

---

153. — PHYTOLACCA.

PHYT.—Fitoloca decandra.—Espinaca de Indias.—— Véase HALE, *Remedios americanos.*

AVISOS CLINICOS.—Este medicamento ha sido empleado hasta aquí con éxito contra:— *Reumatismo* crónico, agravado durante el mal tiempo; Reumatismo sifilítico del periostio, con glándulas cervicales y axilares hinchadas y agravacion nocturna.—Opistótonos; Tétanos; Trismus.—*Sífilis congénita*, con afeccion de la garganta, úlceras en las partes genitales, dolores violentos en los brazos y las piernas, con hinchazon edematosa, manchas de un rojo pálido en las extremidades, en la cara y en el cuello; *Oftalmias sifilíticas*, con hinchazon rojo-morada de los párpados, sobre todo el izquierdo, granulaciones y dolor alrededor de la órbita.—*Parotitis*, con formacion de abscesos y fístulas; Catarro nasal, con obturacion de una nariz, estilicidio por la otra y completa obturacion yendo á caballo.—*Angina granulosa*, con sequedad, sensacion de una bola ardiente en la garganta, al tragar, opresion é incapacidad de tragar los líquidos calientes; *Angina lardácea*, con grande postracion, imposibilidad de permanecer en pié, ó de enderezarse en la cama, y violentos dolores en la cabeza, el dorso y los miembros.—*Estreñimiento* crónico, con dolores pasajeros como de golpes á lo largo del perineo hasta la mitad del pene.—*Dismenorrea* muy dolorosa, en las mujeres manifiestamente estériles; *Menorragia*, con aumento simultáneo de lágrimas, de saliva, de bilis y de orinas.—*Hinchazon dolorosa de los pechos*, que impide la salida de la leche; *Abscesos en los pechos*, con fístulas, úlceras de mal aspecto y secrecion de un pus sanioso; Excoriacion muy dolorosa de los pechos: Antiguas cicatrices en los pechos, impidiendo salir bien la leche.—*Ciática*, con dolores presivos, lancinantes y distensivos en el lado exterior del muslo, agravados por el movimiento y la presion exterior, así como por la noche.

SINTOMAS GENERALES.—Todos los dolores tienen un carácter neurálgico y se agravan por el movimiento y la presion; los dolores en las extremidades afectan siempre las partes del lado exterior.—Muchos síntomas, sobre todo los de la cabeza, se alivian despues del desayuno; algunos sufrimientos abdominales desaparecen durante la noche; los dolores de cabeza se agravan despues de medio dia; los del pecho, despues de media noche; los de la boca, de la garganta y del estómago, así como los síntomas de los ojos y de los párpados, por la mañana; la vista está peor por la noche.—Los dolores internos se irradian á veces súbitamente sobre las extremidades.—Bostezos frecuentes y soñolencia; sueño agitado, con decúbito sobre el vientre; náuseas estando despierto, por la noche.—Forúnculos: detrás de las orejas y sobre el dorso; pústulas detrás de las orejas; erupcion de manchas pequeñas, como lentejas y elevadas sobre el pecho, con prurito violento; muchos dolores son seguidos de prurito y quemazon; dolores en cicatrices antiguas; supuracion en los tumores indolentes.—Muchos síntomas van acompañados de calor.—Completa indiferencia por la vida, y grande repugnancia por los quehaceres del dia, por la mañana, al despertarse.

Cabeza.—Vértigos con oscurecimiento de los ojos.—Sensacion de excoriacion en el fondo del cerebro.—Dolor en toda la cabeza; dolor sordo, contínuo, en el vértice, particularmente despues de la comida del medio dia, ó con oido mas fino.—*Dolor de cabeza con náuseas*: por cima de las cejas; al andar.—Agravacion de los dolores de cabeza mirando hácia abajo, ó al bajarse.—Cerebro como magullado, al bajar de un sitio elevado al suelo.—Afeccion catarral de la cabeza.—Dolor presivo, sobre todo en las sienes, el sincipucio y por cima de los ojos.—Presion en las sienes, con sensacion de constriccion en la region precordial, como al principio del mareo.—Sensacion de excoriacion en la cabeza, como si fuese á estallar una jaqueca, peor á la derecha, y agravada por el tiempo húmedo.—Dolores fugaces, que cambian de sitio, en muchas partes de la cabeza, pero mas del lado derecho.—Calor en la cabeza.

Ojos.—Presion alrededor y dentro de los ojos, como si fuesen muy voluminosos.—Ardor y picazon de los ojos,

más en el izquierdo, con lagrimeo abundante; picazon en los ángulos internos, peor en el izquierdo y fuertemente agravado, por la noche á la luz del gas.—Sensacion de arena dentro de los ojos, sobre todo bajo el párpado izquierdo, con lagrimeo de este ojo.—Sensacion en los ojos y la nariz como si fuese á sobrevenir un romadizo.—Imposibilidad de cerrar los ojos sin dolor, como por excoriacion, todas las mañanas.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—Lagrimeo contínuo de ambos ojos, aliviado al aire libre.—Hinchazon morada de los párpados, mas fuerte en el izquierdo y por la mañana.—Fotofobia, por la mañana.—Vista turbia.—Presbicia.

Oidos y nariz.—Dolores en los oidos, más en el derecho; tapamiento de la trompa de Eustaquio del lado izquierdo con ruido y sensacion de disminucion del oido, mientras que en realidad está mas fino; oido mas fino con dolor en el sincipucio.—Coriza fluente.—Estilicidio mucoso de una nariz, mientras que la otra está tapada, ó estilicidio ya de la una, ya de la otra nariz.—Obturacion completa de la nariz yendo á caballo.

Cara y dientes.—Palidez de la cara; *calor de la cara*, sobre todo del lado izquierdo, despues del medio dia, ó bien con rubicundez, piés frios y sensacion de plenitud en la cabeza; erupcion del lado izquierdo del labio superior.—*Gana irresistible de apretar los dientes.*

Boca y garganta.—Pequeñas úlceras en el interior de las mejillas, como las mercuriales; sensibilidad y calor del paladar y de la lengua; acumulacion en la boca de una saliva amarilla, de un gusto metálico; hinchazon del velo del paladar.—Dolor de garganta, con engrosamiento del velo del paladar y acumulacion, por la mañana, de mucosidades espesas y amarillas; alivio despues de haber expectorado, así como despues del desayuno; al tragar, así como al volver la cabeza hácia la izquierda, sensacion como si en la garganta estuviese atravesado un cuerpo extraño.—Dolor general de las partes de la cámara posterior de la boca, irradiándose hácia la trompa de Eustaquio.—*Sensacion de una grande sequedad en la garganta*, sobre todo por la *mañana.*

Síntomas gástricos y estómago.—Gusto de avellanas en la boca.—Furioso apetito; hambre inmediatamente

despues de comer; el apetito ordinario permanece á pesar de las náuseas.—Erutos con salivacion; náuseas en el estómago, sobre todo durante el dolor de cabeza y al despertar de noche; vómito sin sensacion desagradable en el estómago.—Presion en el estómago, por la mañana al despertarse, con acumulacion de agua en la boca.—Constriccion en los precordios, con presion en las sienes.

Vientre é hipocondrios.—Dolor de escarbamiento en la parte superior y exterior del hígado, de madrugada, imposibilitando de andar; dolor penetrante en el hipocondrio derecho, despues de media noche, no dejando permanecer acostado sobre el lado derecho; violento dolor presivo en el hipocondrio izquierdo por la tarde, no permitiendo estar sentado, y disipándose por la noche, permaneciendo acostado sobre el lado doloroso.—°Dolor y sensacion de excoriacion en el hipocondrio derecho, durante el embarazo.—Dolor neurálgico en las regiones ilíaca é inguinal del lado izquierdo; retortijones todo el dia y flatuosidades fétidas.

Defecacion y orinas.—Cámaras duras; °estreñimiento crónico; diarrea con molestas sensaciones en los intestinos; evacuaciones biliosas abundantes.—En medio de la noche, dolor neurálgico que pasa como un tiro desde el ano por el perineo hasta la mitad del pene.—°Gana urgente de orinar.—Orina abundante por la noche.—°Dolor en la region vesical al orinar y despues.—Dolor en la region de los riñones y sensacion desagradable á lo largo de los uréteres.—Sedimento calcáreo en las orinas; orinas encendidas que depositan un poso color de caoba, muy difícil de arrancar.

Partes sexuales.—Sensacion rotatoria en la próstata.—°Metrorragia; °reglas muy abundantes y anticipadas; °menstruacion dolorosa; °dolores violentos del vientre durante las reglas, en una mujer estéril; °leucorrea.—Inflamacion, hinchazon y supuracion de los pechos.

Laringe y pecho.—Cosquilleo en el lado izquierdo de la tráquea, con tos de irritacion, dolor del costado derecho del pecho y grande sequedad de la garganta; tos bronquica seca, con ronquera y calor en la tráquea y los bronquios.—Disnea.—*Dolor en el costado derecho del pecho*, hasta la espalda, que se manifiesta al respirar profunda-

Digitized by Google

mente, y aliviándose despues de medio dia, ó agravándose despues de media noche, permaneciendo acostado sobre el lado derecho, impidiendo el sueño y desapareciendo por la mañana despues de haberse levantado.—Sensibilidad de los músculos del pecho, como si estuviesen contundidos.—Sacudidas dolorosas en la region del corazon, seguidas de un dolor semejante en el brazo derecho.

Tronco.—Dolor en la region lumbar derecha, seguido inmediatamente de un prurito violento.—Dolor persistente en el omóplato izquierdo, como por un golpe, y de tiempo en tiempo, sensacion como si se apoyase en él algun hierro frio.—Sensacion de presion y pesadez sobre los omóplatos, como despues de haber llevado una pesada carga.—Rigidez del lado derecho de la nuca, mas fuerte en la cama despues de media noche.—Sensacion de tirantez en las dos parótidas; dureza de una glándula en el lado derecho de la nuca; supuracion de un tumor detrás de la oreja, con estilicidio de pus y sangre.

Miembros superiores.—Dolor sordo y resentimiento de la parte alta de la escápula y del borde superior del músculo trapecio, aumentados por la presion y por la contraccion del músculo.—Dolor de todos los músculos del omóplato izquierdo, en todo su espesor.—*Presion y sensibilidad de las partes exteriores del uno ó del otro brazo, por cima del codo*, como á consecuencia de una contusion, con agravacion apretando las partes y extendiendo el brazo.—Debilidad y dolor en el hueso del brazo derecho, con agravacion por el movimiento y la presion.—*Dolores reumatismales en el antebrazo, las manos y los dedos.*—Dolores lancinantes y neurálgicos en los dedos.—Dolores repentinos en la punta de los dedos, como por centellas eléctricas.

Miembros inferiores.—Ciática, dolores neurálgicos en las partes exteriores de los muslos y en la ingle izquierda.—Pesadez en las rodillas, con fatiga, despues de un pequeño paseo; pesadez en las extremidades inferiores, como si estuviesen entumidas.—*Dolores reumatismales* en las rodillas, con sensacion como si los músculos fuesen demasiado cortos, y sobre todo por un tiempo húmedo.—Dolor en el pié derecho y en el empeine, hácia las

cuatro de la mañana.—Piés frios, con aumento de la circulacion capilar en la cabeza y en la cara.—Fuerte sudor en los piés, sobre todo bajo los dedos gordos.—Dolor neurálgico en el dedo gordo derecho á media noche; dolor en la parte carnuda del pié derecho y en un callo.

154.—PLATINA.

PLAT.—Platina.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 6, 30.—*Duracion de accion:* 40 á 50 dias en algunas enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Puls.—*Se emplea como antídoto de:* Plumb.

COMPÁRESE CON: Ang. *asa.* bell. canth. *croc.* fer. hyos. lyc. magn. mang. natr. nitr-ac. *plumb. puls.* rhus. *sabad. stram.* stront. valer. verb.—Sobre todo despues de *bell.* es cuando la platina produce buenos efectos, si se halla indicada.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que se deberá *consultar* este medicamento contra:—*Diversas afecciones del sexo femenino*, y principalmente de las mujeres irritables, que tienen las reglas abundantes y el apetito venéreo muy pronunciado; Padecimientos por el abuso del plomo; Malas consecuencias de un arrebato de cólera, ó de una mortificacion; Neuralgias y neurosis; Catalepsia, eclampsia y otras afecciones espasmódicas; Espasmos histéricos; Manía; Melancolía; Histeria; Cefalalgias nerviosas é histéricas; *Neuralgia facial*; Odontalgias nerviosas y congestivas; Peritonitis puerperal?; Cólico saturnino; Estreñimiento á consecuencia de viajar en carruaje; *Dismenorrea*; *Metrorragia*, aun la consecutiva del parto, ó del aborto; Estreñimiento; Ninfomanía, Eclampsia y otras afecciones de las parturientas, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores compresivos, calambroideos, constrictivos ó presivos*, como por la introduccion de una espina, ó bien como *golpes obtusos.—Dolores calambroideos, con estremecimiento, tractivos en los miembros y en las articulaciones.*—Tension en los miembros como si estuviesen rodeados de ligaduras muy apretadas.—Dolo-

Digitized by

res como despues de una contusion ó un golpe, sobre todo *comprimiendo* la parte afecta.—Dolores débiles en un principio, que aumentan poco á poco, frecuentemente á intervalos regulares, y disminuyen del mismo modo. —°*Sensacion de entorpecimiento y rigidez paralítica en diversas partes*, frecuentemente con temblor y palpitacion de corazon.—°Accesos de rigidez espasmódica de los miembros, sin pérdida de conocimiento, pero con apretamiento de las mandíbulas, afonía, ojos convulsos y movimientos involuntarios de las comisuras de los labios y de los párpados.—Los accesos de espasmos se manifiestan principalmente al amanecer.—°*Afecciones á consecuencia de un susto, de una mortificacion* ó *de un exceso de cólera.—Afecciones morales y físicas que alternan entre sí*; cuando las unas se manifiestan, las otras cesan; y *viceversa.—Debilidad excesiva.*—Inquietud con hormigueo, sensacion de debilidad y temblor en los miembros, sobre todo *durante el reposo* y al aire libre.—La mayor parte de los síntomas se *agravan estando en reposo*, y se alivian por el movimiento.—Las afecciones que se alivian al aire libre, se aumentan hácia *el anochecer*, y en la habitacion.

Piel.—*Escozor* con hormigueo, *dolor de excoriacion*, y prurito ó *dolor quemante*, *como á picotazos* y lancinante, con necesidad de rascarse en diversas partes de la piel.—*Ulceras* (en los dedos de las manos y de los piés).

Sueño.—*Bostezos convulsivos y espasmódicos*, sobre todo despues de medio dia.—Mucha propension al sueño por la tarde.—Sueño prolongado por la mañana.—Ensueños angustiosos, de guerra y de sangre derramada.—*Ensueños lascivos.*—Desvelo por la noche, sobre todo despues de media noche, con pensamientos angustiosos, tristes y penosos.—Aturdimiento por la noche al despertarse.—Por la noche se está acostado sobre el dorso, los brazos pasados por encima de la cabeza, las piernas apartadas, y se siente necesidad de descubrirlas.

Fiebre.—Despeluzamiento contínuo y horripilacion por todo el cuerpo, sobre todo al aire libre.

Moral.—°*Tristeza*, sobre todo *por la tarde*, *con mucha necesidad de llorar*, por lo regular (cada segundo dia), alternando con alegría loca y bufonadas.—°*Llantos involuntarios.*—°Gritos pidiendo auxilio, con todas sus fuerzas.—

Excesiva angustia de corazon, con mucho miedo de la muerte, la que cree muy cercana*, acompañada de temblor, palpitacion de corazon y dificultad de la respiracion.—°Miedo con temblor de las manos y de los piés, y desórden de las ideas, como si todas las personas que se les acercan pareciesen otros tantos demonios.—°Humor histérico con mucho decaimiento moral, debilidad nerviosa y sobreexcitacion del sistema vascular.—Propension á asustarse.—Mucha irritabilidad, con muy mal humor, algun tiempo despues de haberse encolerizado.—Indiferencia apática y distraccion.—Orgullo y muy buena opinion de si mismo, con desden para con todos los demás*, sin excepcion ni aun de las personas que mas ama y respeta; sucede esto sobre todo estando en la habitacion, *menos veces estando al aire libre y al sol.*—Distraccion y olvido.—*°Pérdida del conocimiento.*—°Divagaciones.—Errores de los sentidos; le parece ser de mas estatura que lo que realmente es; y por el contrario, todas las demás cosas y personas son muy pequeñitas y de menor estatura.—*°Gana irresistible en la madre de asesinar al hijo.*

Cabeza.—Pesadez tensiva como si hubiese un tornillo en la frente.—Accesos pasajeros de vértigo por la tarde con pérdida del conocimiento.— *Dolores de cabeza que se aumentan poco á poco*, ó por accesos, *hasta llegar á hacerse muy violentos, y se debilitan progresivamente.*— Accesos de dolores de cabeza con náuseas y vómitos.—*Sensacion de entorpecimiento en la cabeza*, y al exterior en el vértice.—Dolor en los lados de la cabeza, *como por la presencia de un clavo.*—**Dolores presivos, calambroideos*, en la frente y en las sienes, sobre todo en la raiz de la nariz, como una *compresion*, fuertemente agravados por el movimiento y al bajarse, °algunas veces con calor y rubicundez de la cara, inquietud y llantos, *ó con leucorrea.*—°Hormigueo en las sienes como por insectos.—°Zumbido y ruido en la cabeza como el que ocasiona un molino.—Sensacion de contraccion en la piel del cráneo y en el vértice.

Ojos.—Dolores en los ojos despues de haberse fatigado la vista mirando un objeto.—Tension en las órbitas, con dolor corrosivo de excoriacion en los bordes.—**Dolor calambroideo en los bordes de las órbitas.*—Tension compresiva en los globos de los ojos.—*Presion en los ojos*, con

sueño.—Hormigueo en los ángulos de los ojos.—*Sensacion* de calor *ó de frio y escozor en los ojos.*—*Temblor ó estremecimiento* espasmódico *de los párpados.*—°Ojos convulsos.—*Los objetos parecen mas pequeños que lo que son en realidad.*—Vista turbia como á través de un velo, frecuentemente con tirones perceptibles, alrededor del ojo. —Temblor y centelleo delante de la vista.

Oidos.—*Otalgia con dolor calambroideo.*—Sacudidas en los oidos.—*Sensacion de entorpecimiento* y de frio en los oidos, que se extiende hasta la mejilla y labios.—Hormigueo corrosivo en los oidos.—**Ruido en los oidos parecido á un trueno sordo, ó como á lo lejos.*

Nariz.—Dolor calambroídeo, con sensacion de entorpecimiento en la nariz.—Necesidad inútil de estornudar y hormigueo en la nariz.—**Coriza seco*, frecuentemente de un solo lado.

Cara.—*Cara pálida*, macilenta.—*Calor quemante y rubicundez ardiente de la cara*, con sed violenta y sequedad de la boca, sobre todo por la tarde.—°Distorsion de los músculos de la cara.—Sensacion de frio, con hormigueo y **sensacion de entorpecimiento* de todo un lado de la cara. —*Calambre y presion* tensiva *en los pómulos.*—°Hormigueo pulsativo en las mandíbulas, sobre todo por la tarde, y durante el reposo, con llantos involuntarios.—Sensacion de corrosion, con dolor de excoriacion que obliga á rascarse, en los labios y en la barba.—Vesículas corrosivas y lancinantes en los labios.—Labios secos, grietados.—Red venosa roja azulada en la barba.—Sensacion de entorpecimiento ó de frio alrededor de la boca y en la barba.—°Calambre en la mandíbula.

Dientes.—**Odontalgia con dolor pulsativo y como si escarbaran.*—Traccion *calambroidea*, y por accesos, en los dientes.—*Se hacen grietas en las encias.*

Boca y garganta.—Dolor quemante debajo de la lengua.—Sensacion en la lengua *como si estuviera quemada.* —Sensacion como si la garganta estuviera en carne viva, durante y fuera del tiempo de la deglucion (en el vacío).—Traccion *calambroidea* en la garganta, *como una estrangulacion.*—Sensacion de prolongacion en la úvula. —Arañamiento y acumulacion de mucosidades en la garganta.—*Ruido estrepitoso de mucosidades.*

Apetito.—Sabor mucoso, pastoso.—*Sabor dulce* en la

Digitized by

punta de la lengua.—*Falta de sed.*—*Pérdida del apetito* desde el primer bocado.—*Pérdida completa del apetito. —*Repugnancia á los alimentos por efecto de la tristeza.*—Repugnancia á la carne.—Bulimia; come con una celeridad voraz, con disposicion á despreciarlo todo.—*Despues de la comida, erutos, presion en el estómago y cólicos.

Estómago.—Necesidad inútil de erutar.—Erutos á vacío, ruidosos.—Serosidades de un amargor dulce y desagradable, que suben á la garganta y cortan la respiracion. —*Náuseas* contínuas, con laxitud, temblor y ansiedad. —**Presion en el estómago*, sobre todo *despues de la comida*. —*Dolor contractivo en la boca del estómago como si se estuviese muy apretado.*—Presion ó sacudidas, ó bien palpitacion, punzadas y pellizcos en la boca del estómago.—Sensacion quemante en el mismo punto, algunas veces tambien desde la garganta hasta el vientre.

Vientre.—*Dolores de vientre con presion sorda y sacudidas.*—*Timpanitis*, con expulsion difícil é interrumpida de gases.—**Constriccion en el vientre.*—*Pellizcos en la region umbilical.*—Punzadas en los costados del vientre y en la region umbilical.—Corrosion en el vientre.—*Tracciones en las ingles*, que parten del sacro.

Deposiciones.—**Estreñimiento*, algunas veces muy tenaz. —Necesidad frecuente, con deposicion poco abundante, á trozos, y expelida solamente á costa de grandes esfuerzos.—Evacuaciones de la consistencia de papilla.—Ténia y ascárides del recto en el acto de deponer y fuera de él.—*Despues de la deposicion, horripilacion general*, ó sensacion de debilidad en el vientre.—Frecuentemente *hormigueo pruritoso y tenesmo en el ano*, sobre todo por la tarde.—Lancinaciones violentas y obtusas en el recto.

Orinas y partes genitales.—Orina roja con nube blanca, ó bien que se enturbia y depone un sedimento rojo. —Flujo de orinas lento, pero frecuente.—Dolor quemante y corrosivo en el escroto.—*Exaltacion poco natural del apetito venéreo*, con erecciones frecuentes, sobre todo por la noche.—*Flujo de licor prostático.—Cóito de muy corta duracion y con muy poco deleite.

Reglas.—*Sensacion como si todo se dirigiese á las partes genitales*, con presion en el bajo vientre.—*Exaltacion poco natural del apetito venéreo en la mujer, con sensi-

Digitized by

bilidad dolorosa y *hormigueo voluptuoso en las partes genitales internas* y externas.—°Induracion del útero.—Congestion sanguínea del útero.—°*Aborto*.—°*Metrorragias*, de una sangre espesa, oscura, con tracciones en las ingles. —**Reglas muy adelantadas y muy abundantes*, °algunas veces con cefalalgia, inquietud y llantos.—**Reglas de muy larga duracion*.— Antes de las reglas, retortijones y dolores como los del parto, en el bajo vientre.—*Calambres al principio de las reglas*.—*Durante las reglas, presion, como si todo se dirigiese hácia las partes genitales, las que están muy sensibles.—Leucorrea como de clara de huevo, que fluye principalmente despues de orinar y al levantarse del asiento.

Pecho.—°*Afonia*.—°Tos cor'a y seca.—*Respiracion corta, con opresion constrictiva del pecho*.—Opresion aflictiva del pecho, con sensacion de calor que sube del epigastrio.—°Respiracion corta, difícil y angustiosa.—Dolor en el pecho como si sobre él hubiese una cosa pesada que le oprimiese, con necesidad de respirar profundamente, siendo impedida la respiracion por una sensacion de debilidad.—°Tension, presion y punzadas en los costados del pecho, que no permiten estar acostado de ningun lado.—Presion y golpes obtusos en el pecho.—Presion calambroídea en un lado del pecho.—Dolor calambroídeo en el pecho, que empezando débilmente aumenta hasta llegar á cierta intensidad, y despues va disminuyendo progresivamente.—Lancinaciones sordas en el costado del pecho al inspirar.—*Palpitaciones de corazon angustiosas*.

Tronco.—*Dolor de quebrantamiento en los riñones y en el dorso*, sobre todo por la *presion en estos puntos*, ó bien inclinando el cuerpo hácia atrás.—Dolor calambroídeo en los riñones.—Sensacion de entorpecimiento en el coxis. —Rigidez de la nuca.—Debilidad y sensacion de entorpecimiento tensivo en la nuca.

Brazos.—Pesadez y *laxitud en los brazos, con tirones paralíticos*.—Presion y dolor calambroídeo en los antebrazos, las manos y los dedos, sobre todo teniendo asido con firmeza algun objeto.—Corrosion pruritosa, picotazos y sensacion quemante en los brazos, las manos y los dedos.—Sensacion de rigidez en los antebrazos.—Palpitacion dolorosa en los dedos.—Distorsion de los

dedos.— Entorpecimiento de los dedos.— Ulceras en los dedos.

Piernas.— Dolor calambroídeo y tension en los musios, los piés y los dedos.— *Debilidad de los muslos y de las rodillas, como si estas partes estuvieran quebrantadas.*— Sacudidas y golpes en las piernas.— °Laxitud en las piernas. — Agitacion y temblor de las piernas, con sensacion de adormecimiento y °rigidez.— Laxitud y torpeza en los piés estando sentado.— °Frio en los piés.— Corrosion, excoriacion y escozor en los maléolos, que se agravan mucho al menor contacto.— Pulsaciones dolorosas en los dedos de los piés.— Hinchazon en la parte carnosa del dedo pulgar, con dislaceracion y pulsaciones nocturnas.— *Ulceras en los dedos de los piés.*

155.—PLUMBUM.

PLUMB.— Plomo.— HARTLAUB Y TRINKS.— *Hist. nat. y prep.*— Farmac. homeop. —*Dósis usadas:* 30.— *Duracion de accion*: 30 á 40 dias en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Alum. bell. hyos, op. plat. stram. y *electricitas.*

COMPÁRESE CON: *Alum. bell. chin.* con. fer. hyos. *natr-m. n-vom. op.* phos. *plat.* puls. rut. sabad. sep. *stram.* zinc.

CLINICA.— Hasta ahora no se ha empleado este medicamento mas que contra algunas especies de *Estreñimiento.*

SINTOMAS GENERALES.—*Tracciones y dislaceraciones en los miembros, mas violentas por la noche*, las que á veces se trasportan á otros sitios rascándose.—Sensacion ardiente en diversas partes del cuerpo.— *Dolores osteócopos* violentos, *con hormigueo y por accesos.— Calambres y dolores constrictivos en los órganos internos.*— Pasmo, pesadez, cansancio sumo y acortamiento de algunos miembros. —*Parálisis.*— Temblor convulsivo y *estremecimiento de los miembros, convulsiones y calambres*, seguidos algunas veces de parálisis.— *Ataques de epilepsia.— Desvanecimientos*, especialmente estando en sociedad.— Pesadez y pereza en los miembros.— *Debilidad excesiva con temblor de los*

miembros.— Despues de un ligero ejercicio, abatimiento con necesidad de acostarse, y pulsaciones en todo el cuerpo.—Músculos lácios y relajados.—*Enflaquecimiento general*, y sobre todo de las partes paralizadas, seguida de hinchazon de las mismas.—*Hinchazones hidrópicas*, algunas veces de todo el cuerpo.—Sensibilidad al aire libre.—Los síntomas se desarrollan lentamente y desaparecen algunas veces durante un cierto espacio de tiempo, para volver á aparecer en seguida.

Piel.—*Color* aplomado, *azulado ó amarillo de la piel.*—Manchas, por todo el cuerpo, de un moreno oscuro.—Inflamacion fácil y supuracion de ligeras llagas.—Dolor quemante en las úlceras.— Excoriaciones.— Decúbito.—Esfacelo.

Sueño.—*Mucha propension al sueño por el dia; el sujeto se duerme fácilmente*, aun hablando.—*Sueño y somnolencia* algunas veces *con entorpecimiento.*— Sueño tardo.—*Insomnio nocturno*, con calambres abdominales.—Estremecimientos durante el sueño.—Afluencia de ensueños, algunas veces lascivos, con erecciones.—Palabras durante el sueño.

Fiebre.—Predominio de *calofrios* y de *frio*, sobre todo *en los miembros* y al aire libre.—Sudores frios ó viscosos.—Calor fugaz angustioso.

Moral.—*Melancolía taciturna* y abatimiento.—*Mucha angustia é inquietud*, con suspiros.—Enfado y aversion á la conversacion y al trabajo.—Desaliento.— Hastío de la vida.—Debilidad de la memoria.— Imbecilidad.—Demencia.—Manía.— Divagaciones.—Furor.—*Delirios furiosos*, á veces con el aspecto de un loco.

Cabeza—Cabeza atolondrada, pesada, como por apatía y melancolía.—*Aturdimiento* hasta llegar á caer sin conocimiento.—Embriaguez.—Vértigos, sobre todo bajándose ó mirando á la atmósfera.—*Cefalalgia como por una bola que* de la garganta *subiese al cerebro.*—*Pesadez de la cabeza*, sobre todo en el occipucio y en la frente.—Dislaceracion en la frente y las sienes.— Dolores de cabeza lancinantes.—Congestion á la cabeza, con pulsacion y calor.—Mucha sequedad de los cabellos.—*Caida de los cabellos*, y aun de los pelos de las cejas y del bigote.

Ojos.—*Dolor presivo y muy sensible, como si el globo del ojo fuese muy voluminoso.*—Pesadez de los ojos durante el

Digitized by Google

movimiento.—*Parálisis de los párpados.*— Contraccion en los ojos y en los párpados.— Distaceracion en los párpados, con sueño.— Congestion sanguínea á los ojos.—Inflamacion de los ojos y del íris.—Aglutinacion nocturna de los ojos.—Hinchazon de los ojos.—*Color amarillento de la esclerótica.*—Oclusion espasmódica de los párpados. —Ojos convulsos. — Pupilas contraidas. — *Vista turbia como por una niebla*, que obliga á frotarse los ojos.—*Miopia.*—Ceguera, como por amaurosis.

Oidos.— *Distaceracion en los oidos.*— Terebracion y punzadas en los oidos.—Sensibilidad al ruido.—Disminucion, algunas veces, rápida del oido.—Sordera.

Nariz.— Nariz fria.—Inflamacion erisipelatosa de la nariz.— Vesículas purulentas en los ángulos de la nariz, que están de un color muy encendido.— Olor fétido de la nariz.— Pérdida del olfato.—Obturacion de la nariz. —Acumulacion de mucosidades tenaces en las ventanillas de la nariz, y que no pueden expelerse sino por las fosas nasales.— Coriza fluente con flujo de mucosidades serosas.

Cara.—*Cara pálida, amarilla, hipocrática.*— Aspecto como el del que tiene perturbada la razon.— Abotagamiento de la cara.—Hinchazon de un solo lado de la cara.—Piel lustrosa, aceitosa, lo mismo á la vista que al tacto.— *Distaceraciones en los huesos de las mandíbulas*, que se disipan por la friccion, ó reaparecen en otro sitio.—Terebracion de la mandíbula inferior.—Exfoliacion de los labios.—*Calambres* en la mandíbula.—Hinchazon de las glándulas submaxilares.

Dientes.— Dolores dislacerantes, con estremecimiento en los dientes, agravados por las cosas frias.— Dientes cubiertos de mucosidades amarillentas.—Dientes que se ennegrecen.— Dentadura de un olor *fétido*, cariada, que se mella.— Vacilacion y caida de los dientes.— Rechinamiento de dientes.— Encías pálidas, tumefactas.— Nudosidades dolorosas y duras en las encías.

Boca.—*Sequedad de la boca.*— Abundante acumulacion de *saliva dulce* en la boca, con sequedad de las fáuces.—Salivacion.— Espuma en la boca.— Mucosidades viscosas en la boca, por la mañana al despertarse.— *Esputos de sangre.*— Aftas y úlceras fétidas en la boca.—Inflamacion, hinchazon y pesadez de la lengua.—Lengua de un

color oscuro, seca y con ragades.—*Lengua* verde, ó *cubierta de una costra amarilla.*—*Palabra impedida.*

Garganta.—Ligera irritacion de la garganta, *como por una hinchazon*, ó *por la presencia de un cuerpo extraño en la garganta.*—*Sensacion como de una bola que sube á la garganta.*—Sensacion de estrangulacion en la garganta.—*Parálisis de la garganta con imposibilidad de tragar.*—Traccion de la garganta al comer, como si el esófago se arrancara.—Sensácion como si un insecto serpeara en el esófago.—Inflamacion é induracion de las amígdalas.

Apetito.—*Gusto insipido* ó amargo.—Gusto sulfuroso, ácido, en el fondo de la garganta.—*Mucha sed* de agua fria.—*Falta de apetito.*—Hambre violenta, muy poco tiempo despues de la comida.—Mucho deseo de pan y de cosas fritas.

Estómago.—Erutos con gusto á los alimentos.—*Erutos á vacio*, algunas veces muy violentos y dolorosos.—*Erutos insipidos.*—Hipo.—*Regurgitacion de agua dulce* ó ágria.—Disgusto y *náuseas frecuentes*, con gana de vomitar, algunas veces con vomituricion.—*Vómitos continuos y violentos de los alimentos*, ó *de materias verdosas y negruzcas*, ó amarillentas, con dolores violentos en el estómago y en el vientre.—Vómitos de bílis ó de sangre.—*Vómitos de materias fecales*, con cólicos y constipacion de vientre.—*Dolores de los mas violentos en el estómago.*—Sensacion de peso y *presion en el estómago*, algunas veces despues de la comida.—Presion sorda y ansiedad en la boca del estómago.—*Calambres de estómago constrictivos.*—Punzadas desde la boca del estómago hasta el dorso.—Retortijones y dolor ardiente en el estómago.—Inflamacion del estómago.

Vientre.—Dolor en el hígado con presion lancinante.—Afecciones del bazo.—*Dolores abdominales de los mas violentos*, con retraccion del ombligo.—Timpanitis y dureza del vientre.—*Cólicos violentos con dolor constrictivo*, sobre todo *en la region umbilical*, *con fuerte contraccion del abdómen*, formando algunas veces elevaciones y hundimientos, *agravados por el menor contacto*, y á veces hasta el mas alto grado por la noche.—Pellizcos y retortijones en el vientre.—Punzadas alrededor del ombligo.—Sensacion en la parte superior y costados del vientre, como si alguna cosa se arrancase y cayese.—Pulsacion

Digitized by Google

en el vientre.—Sensacion ardiente ó frio en el vientre. —(Inflamacion de los intestinos).—*Nudosidades duras en el vientre*, como por induraciones internas.— Dolor de quebrantamiento en los músculos abdominales, que se agravan por el movimiento y al tacto.—Produccion y encarcelacion contínua de gases, con *ruido sordo y borborigmos en el vientre.*— Expulsion abundante de *gases muy fétidos y calientes*, quemantes.—En el recto, necesidad muy urgente de expeler ventosidades, sin resultado alguno.

Deposiciones.—**Constipacion de vientre de las mas tenaces.* —Gana contínua é inútil de deponer.—*Deposiciones difíciles de evacuar*, algunas veces *en bolitas como excremento de ovejas*, y tenaces.—Deposiciones disentéricas.—*Diarreas de larga duracion*, generalmente de excrementos amarillos, ó bien dolorosas, y frecuentemente muy fétidas.— Diarreas sanguinolentas.—Retraccion dolorosa y *constriccion del ano.*—Prolapsus del recto.

Orinas.—*Retencion de orina.*—Emision de orina difícil y gota á gota.— Tenesmo de la vejiga.—Emision de orinas mas frecuente y mas abundante que de ordinario.— Orina acuosa, ó rojiza, inflamada, turbia y algunas veces espesa.—Flujo de sangre por la uretra.

Partes genitales.—Hinchazon é inflamacion de las partes genitales (del miembro y del escroto).—Estrangulacion y *constriccion en los testículos*, con estremecimiento del cordon espermático.—Retraccion de los testículos.— Excoriacion del escroto.—*Exaltacion excesiva del apetito venéreo con erecciones y poluciones* frecuentes.—Secrecion de esperma insuficiente, durante el cóito.—(Impotencia?).—Leucorrea.—Aborto.

Laringe.— *Ronquera y aspereza en la garganta.*— Afonía.— *Constriccion de la garganta.* — Expectoracion abundante de mucosidades de la laringe, viscosas, transparentes, ó de color verdoso amarillento ó en glóbulos.— Tos seca, convulsiva.—*Expectoracion de pus á consecuencia de la tos.*—*Tos con expectoracion de sangre.*

Pecho.—*Respiracion difícil*, angustiosa, oprimida y jadeante.—Respiracion corta.— *Asma espasmódica.*— Opresion de pecho que aparece periódicamente.—Accesos de sofocacion.—Presion en el pecho, sobre todo respirando profundamente y riendo.—*Punzadas en el pecho y en los*

Digitized by

costados, algunas veces con disnea.—Hervidero en el pecho, con *angustia en la region del corazon*, y palpitaciones sensibles.

Tronco.— Dolores dislacerantes y punzadas en los riñones, en el dorso y entre los omóplatos.— Desviacion de la columna vertebral.—Tension en la nuca, que se extiende hasta la oreja, moviendo la cabeza.

Brazos.—Movimientos convulsivos de los brazos y de las manos, con dolores en sus articulaciones.—Traccion y *dislaceraciones en los brazos* y en los dedos.— Debilidad y parálisis dolorosa de los brazos y de las manos.—Quistes sobre el dorso de las manos.—Dificultad de mover los dedos.— Chapas rojas é hinchadas en los dedos.

Piernas.—Tracciones en la articulacion coxo-femoral estando acostado.—*Sensacion dolorosa de parálisis en las articulaciones coxo-femorales*, *en las de las rodillas y de los piés*, sobre todo subiendo una escalera.—*Parálisis de los muslos y de los piés*.—Adormecimiento de las piernas y de los piés.— Dislaceraciones y punzadas en los muslos y en las rodillas.—Sensacion de entorpecimiento en los piés, con dificultad de apoyarse sobre ellos.—Calambres en la planta de los piés.—Hinchazon de los piés.—Sudor fétido de los piés.—Distorsion de los dedos de los piés.

156.—PODOPHYLLUM PELTATUM.

PODOPH.— Véase Hale, *Remedios americanos*.

AVISOS CLINICOS.—Este medicamento se ha usado con éxito contra :—*Atrofia de los niños escrofulosos*, con deposiciones frecuentes pero normales, ó con diarrea matutina; *Denticion dificil*; *Gastritis* con acedías, erutos ardientes, muy ágrios, sed y vómito de materias biliosas mezcladas de sangre, con contracciones de estómago de tal suerte dolorosas, que obligan á dar fuertes gritos; *Hepatitis crónica y degeneracion del hígado*, con dolor, plenitud y sensacion de excoriacion en el hipocondrio derecho, que obliga á frotar constantemente esta region con las manos; *Ictericia*, con cálculos hepáticos, dolores desde el estó-

Digitized by Google

mago hasta la region de la vesícula biliosa y náuseas violentas; *Catarro intestinal*, con diarrea mas fuerte por la mañana y que cambia constantemente de color, ya verdosa, ya amarilla, ya blanquizca.—*Cólico espasmódico*, con retraccion de los músculos abdominales, ó contraccion de estos músculos en nudos; *Cólicos en los niños por consecuencia de una indigestion*, con accesos todas las mañanas; *Diarrea durante la denticion*, con gritos, rechinamiento de dientes, agitacion de la cabeza de un lado á otro y cámaras verdosas; *Cólera de los niños*, con deposiciones muy fétidas, mas frecuentes por la mañana, con ojos semiabiertos y gemidos en el sueño; *Diarrea de los ninos*, con cámaras verdosas, acuosas, y caida del recto; *Disenteria de los niños*, con cámaras verdosas, mucosas y sanguinolentas, y fuerte inquietud de la cabeza; *Estreñimiento*, con cámaras difíciles, caida del recto, orinas frecuentes, dolor y debilidad del dorso; *Hemorróides*, con caida del recto y con diarrea que se empeora por la mañana, ó con estreñimiento, flatulencia y dolor de cabeza; *Leucorrea*, con estilicidio de moco espeso y trasparente, estreñimiento, presion hácia abajo, caida del recto ó de la matriz; *Falsas posiciones del útero*, con estreñimiento, fácil caida del recto, orinas frecuentes, dorso débil y doloroso; *Caida de la matriz*, sobre todo á consecuencia del parto, con caida simultánea del ano y muchas cámaras por dia.

SINTOMAS GENERALES.—La mayor parte de los síntomas, pero sobre todo los del abdómen, se agravan por la mañana y se alivian por la tarde.—*Piel* húmeda, con calor anormal; °músculos blandos, con debilidad, en los niños; °color terroso de la piel, en los niños.—°Durante la fiebre, escalofrios al moverse y al acostarse, seguidos inmediatamente de sudor; °frio por la noche al acostarse, despues fiebre con sueño turbado por palabras y despertar incompletos; °fiebre con estreñimiento; °fiebre con palabras incoherentes; °fiebres tercianas, cuartanas y cotidianas; °frio por la manana á las siete, con dolor en los hipocondrios, las rodillas, los maléolos, los codos y las muñecas; °dolor en el dorso antes del frio; °el temblor y la sensacion de frio persisten todavía algun tiempo despues del principio de la fiebre;

Digitized by Google

°sed mas pronunciada durante el calor que durante el frio; °durante el frio, incapacidad de hablar, por no poder encontrar las palabras que se buscan; °durante el calor, delirio y locuacidad, sin recuerdo de lo que ha pasado; °durante la fiebre, dolor violento de cabeza con fuerte sed; °durante el sudor, sueño; °en la apirexia, inapetencia.—Soñolencia por el dia, sobre todo por la mañana, con borborygmos; gana de dormir muy temprano por la tarde, con sueño profundo por la noche; malestar por la tarde, despues del primer sueño; *gemido por la noche, con ojos semiabiertos; por la mañana, despertar muy difícil, sueño no reparador.

Cabeza.—*Vértigo* permaneciendo en pié, con disposicion á caer hácia adelante; *vértigo*, con sensacion de plenitud por cima de los ojos, ó con sacudidas dolorosas en el sincipucio, que obliga á cerrar los ojos; °delirio y locuacidad durante la fiebre.—Dolor en el sincipucio por la mañana; presion dolorosa en las sienes, por la mañana, con distensiones en los ojos, como si mirasen bizcos; cefalalgia con estupor, que atraviesa las sienes, mejorada por la presion exterior; dolor de cabeza por la mañana con calor en el vértice.—°Movimiento contínuo de la cabeza durante la fiebre de denticion, con sudor en la cabeza durante el sueño.—Dolor súbito en el sincipucio por la tarde, con dolor de garganta.—Dolor de cabeza que alterna con diarrea.—°Dolor de cabeza por la mañana, con semblante encendido.—Dolor violento en el sincipucio con sensacion de excoriacion encima del sitio afectado.—Durante los dolores de cabeza, distension y sensacion de plenitud en los ojos.—Dolor en las sienes y los globos de los ojos, con calor y pulsacion de las arterias temporales.

Boca y garganta.—Los dientes están por la mañana cubiertos de mucosidades desecadas; °rechinamiento de dientes por la noche, sobre todo en los niños durante la denticion.—Fuerte salivacion; °mal olor de la boca, del que uno mismo se apercibe; gusto en la boca, como á hígado asado, por la noche; acideces en la boca; boca y lengua secas al despertar por la mañana; °capa blanca sobre la lengua, con mal gusto de la boca.—Garganta seca; °estertor mucoso en la garganta; °dolor de garganta que empieza á la izquierda y pasa á la derecha;

Digitized by Google

dolor de garganta del lado izquierdo, agravado al tragar los líquidos por la mañana.—°Bocio.

Síntomas gástricos.—Saciedad por pocos alimentos, despues náuseas y vómitos; ¯pérdida del apetito; indiferencia por la comida; °bulimia.—°Gusto pútrido en la boca.—°Deseo de cosas ácidas.—Sed por la tarde; °poca durante la fiebre; °diarrea inmediatamente despues de haber comido ó bebido.—°Acedías del estómago; °erutos ágrios; °erutos de gas muy ágrio; ¯despues de medio dia, acedías con sensacion de un malestar muy desagradable en el estómago; °regurgitacion de los alimentos; °regurgitacion del agua; °pirosis.—Náuseas violentas durante muchas horas; náuseas y vómitos con plenitud en la cabeza; vómitos de mucosidades calientes, espumosas; °vómitos de alimentos con olor y gusto pútridos; °vómito de alimentos una hora despues de la comida, seguido de bulimia.—°Todo lo que se ha comido se vuelve inmediatamente ágrio.—°Sufrimientos gástricos con abatimiento moral.

Estómago y vientre.—Calor en el estómago; sensacion de vacío en el epigastrio; latidos en el epigastrio, despues de la diarrea; °punzadas en el epigastrio al toser.—°Plenitud en el hipocondrio derecho, °con sensacion de excoriacion, ¯ó con flatulencia; punzadas en el hipocondrio derecho que se agravan comiendo; dolor movible y calor en el hipocondrio derecho; °hepatitis crónica con estreñimiento.—Sensacion de pesadez y estiramiento hácia abajo, en el hipocondrio izquierdo; °sensacion de flatulencia en el hipocondrio izquierdo.—°*Cólico espasmódico con retraccion de los músculos abdominales*, á las ocho de la noche y á las cinco de la mañana; ¯dolor en el colon trasverso á la tres de la madrugada, seguido de diarrea; dolor y borborigmos en el colon ascendente.—Dolor de vientre al ser de dia, aliviado por el calor exterior, al encorvarse para adelante, acostándose sobre un lado, pero agravándose por la posicion supina.—Los dolores de vientre se acompañan primero de frio, despues sobreviene el calor con sudor; sensacion de calor en el vientre, con gana de ir al sillico.—Vientre como vacío, con sensacion de desfallecimiento, despues de deponer.—°Dolor agudo por cima de la ingle izquierda, que impide moverse durante el embarazo.

Defecacion y orinas.—°Estreñimiento con flatuosidades y dolor de cabeza; °deposiciones duras, secas y difíciles.—Defecacion por la mañana, con fuerte presion en el vientre, calor y dolor en el ano; **evacuaciones frecuentes*, por el dia, °con ojos hundidos; **Diarreas*, °agudas ó crónicas, **que se agravan por la mañana*; °Diarrea dolorosa con gritos y rechinamiento de dientes, durante la denticion; °pequeñas cámaras mucosas y gelatinosas, con flatulencia y dolor en el sacro; °cámaras frecuentes, como de cal, y muy fétidas, con vomituricion y fuerte sed, en los niños; °cólera infantil.—Cámaras; *verdes, por la mañana; °amarillas; °mucosas, blanquizcas; °cámara de un amarillo oscuro y de olor cadavérico; °calientes, acuosas; °espumosas; °los alimentos salen sin digerirse.—°*Caida del recto*, sobre todo por la mañana, *con deposiciones diarréicas*, en los niños tambien; durante la defecacion, parece que la matriz va á descender.—**Incontinencia de orina*; °mearse en la cama; *orinas escasas, °ó suprimidas; °orinas frecuentes por la noche, durante el embarazo.

Partes genitales.—Dolor lancinante, á lo largo del cordon espermático.—°Reglas suprimidas en las jóvenes, con presion hácia abajo, en el vientre y en la region lumbar.—°*Leucorrea* de mucosidades espesas, trasparentes, con estreñimiento y presion hácia abajo.—°*Sintomas de un descenso de la matriz, con flatulencia*, despues del parto.—°*Dolores en los ovarios*, durante el embarazo.—°En los meses primeros del embarazo, imposibilidad de acostarse mas que de bruces.—°Hinchazon de los labios de la vulva durante el embarazo.—°Fuertes retortijones con calor y flatulencia.

Laringe y pecho.—Tos durante la fiebre; coqueluche con estreñimiento y pérdida de apetito.—Dolor de pecho, agravado por la respiracion profunda, que produce una sensacion como si un hilo se rompiese en el pulmon.—Necesidad de respirar profundamente, y suspiros; respiracion corta; sensacion de ahogo por la tarde al acostarse.—Sensacion en el pecho, como si el corazon se subiese hasta la garganta; dolor lancinante en el corazon.—**Palpitaciones de corazon, despues de cada esfuerzo*, ó *emocion*, °sobre todo en los indivíduos que sufren de borborigmos, con sueño profundo, no repa-

Digitized by Google

rador, con soñolencia en la mañana; °palpitaciones con cloqueo que sube á la garganta y corta la respiracion.

Tronco y miembros.—*Dolor de riñones*, al andar y al permanecer de pié, con sensacion como si el espinazo se encorvase hácia adelante; agravado por un paso en vago ó por la progresion sobre un terreno desigual; dolor en la region lumbar, con sensacion de frio, *agravado por la noche y durante el movimiento*; dolor entre las escápulas, por la mañana; rigidez de la nuca, con dolor de los músculos del pescuezo y de los omóplatos.—Reumatismo en el antebrazo izquierdo y los dedos; debilidad en las muñecas, que están dolorosas al tacto.—Debilidad y dolor reumático en la nalga izquierda, agravado al subir escaleras; dolor en los muslos, las rodillas y las piernas, aumentando al tenerse en pié; **debilidad paralítica de las articulaciones*, °sobre todo del lado izquierdo, °y en las rodillas; chasquido en las rodillas al andar; pesadez y rigidez de las rodillas al empezar á andar; dolor en las rodillas, las piernas y los piés, sobre todo por la noche.—Piés frios; sudor en los piés, por la tarde.

157.—PRUNUS SPINOSA.

PRUN.—Espino negro.—WAHLE.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: Muchas semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

CLINICA.—Hasta ahora tan solo se ha hecho uso de este medicamento contra:—Anasarca general; *Ascitis*; Diarrea, etc., etc.

SINTOMAS GENERALES.—Punzadas en los músculos.—Temblor en todo el cuerpo.—Inquietud en el cuerpo, con respiracion corta y opresion de pecho.—Sueño despues de la comida.—Sueño nocturno tardío, é insomnio.—Se despierta muy temprano.—Laxitud por la mañana como despues de un sueño no reparador.—Sueño lleno de ensueños y de desvaríos.—Sueño de diviesos, ó de cosas que están súcias.—Despeluzamiento, sobre todo

Digitized by Google

por la tarde.—Calor seco por todo el cuerpo, en particular en las partes genitales.—Sudor solamente en la cara durante el sueño.—Tristeza, indiferencia, mal humor y morosidad.

Cabeza.—Dientes.—Pesadez de cabeza y vértigos.—*Presion en la cabeza*, principalmente en la frente, en el occipucio y en las sienes.—Violentos dolores nerviosos en la cabeza que hacen perder las ideas y los sentidos.—*La presion en la cabeza se manifiesta lo mas frecuentemente de fuera á dentro.*—Cefalalgia como por el calor del sol.—Dolores en los ojos como si arrancaran los globos.—Oclusion presiva en los oidos.—Estornudo frecuente.—*Dolores violentos neurálgicos, ó dolores de luxacion en los dientes*, ó bien sensacion como si se levantaran y arrancaran los dientes.—Dolores como picotazos en la dentadura.

Boca.—Deposiciones.—Punzadas y dolor quemante en la lengua.—Lengua cubierta de mucosidades blanquizcas.—Sabor mucoso, pastoso ó amargo en la boca.—*Pronta saciedad al comer.*—°Náuseas contínuas con disgusto de todos los alimentos, y diarrea.—*Plenitud, timpanitis y opresion en la boca del estómago, con respiracion corta.*—Dolores presivos en la region hepática.—*Cólicos violentos espasmódicos*, que no permiten echarse ni sobre la espalda, ni sobre los costados, ni andar sino muy lentamente; los dolores disminuyen inclinando el pecho hácia adelante.—Cólicos presivos en el epigastrio, ó en el costado derecho del vientre, aun por la noche.—Punzadas en el vientre que cortan la respiracion.—*Ascitis, ¯con pérdida del apetito, orinas raras, deposiciones duras y nudosas.—*Desarrollo de gases*, con cólicos espasmódicos y calambres en la vejiga.—Punzadas en la region inguinal y presion como si fuese á salir una hernia.—Deposiciones difíciles, duras y nudosas.—*Diarrea, ¯con cólicos y evacuacion abundante de materias fecales.—Dolores calambroídeos en el recto.—Protorragia despues de la deposicion.

Orinas.—Reglas.—*Calambres en la vejiga*, aun por la noche.—Orinas raras y pardas.—Chorro de la orina filiforme.—Orinas calientes, corrosivas.—Orina de un color amarillo claro, con depósito blanquecino, y á veces de color azul celeste.—Estrangurria.—Retencion de

Digitized by Google

orina espasmódica.—Tenesmo de la vejiga.—Violentos dolores quemantes en la uretra, cuando se hacen esfuerzos para orinar.—Dolor de excoriacion en la uretra, y sobre todo al tacto.—Flacidez del miembro y retraccion del prepucio.—Prurito en el escroto, como tambien en la region de los ovarios.—Flujo de sangre acuosa y pálida por la matriz.—*Reglas muy adelantadas* y muy abundantes, con dolores de riñones.—Flores blancas corrosivas que tiñen el lienzo de amarillo.

Laringe y pecho.—Arañamiento y aspereza en la garganta, con gana de toser.—Al hablar dolor en el pecho con voz débil.—*Tos excitada por un cosquilleo en la laringe.*—Tos sibilante.—*Respiracion oprimida, corta, difícil, angustiosa y estertorosa.*—Sensacion de peso y de opresion en el pecho.—La respiracion se detiene constantemente en la boca del estómago.—Dolores debajo del esternon, y opresion, con plenitud en la boca del estómago y timpanitis.

Tronco y miembros.—Dolor de ulceracion en los riñones.—Rigidez en el dorso y en los riñones, como á consecuencia de una derrengadura.—Dolor de las glándulas axilares.—Tension, dolores de luxacion y sensacion paralítica en diversas partes de los brazos y de las manos.—Prurito en los dedos como por sabañones.—Dolores en las caderas por la noche, antes de media noche.—Dolores de luxacion en las rodillas y en los piés.—Sensacion quemante en las piernas.

158.—PULSATILLA.

PULS.—Pulsatilla negra, Anémona de los prados.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: 4 á 5 dias en los casos agudos, y muchas semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Cham. coff. ign. n-vom.—*La pulsatilla es el antídoto de*: Agar. ambr. arg. bell. cham. chin. col. fer. ign. lyc. merc. plat. ran. sabad. stann. sulf. sulf-ac. tart.

COMPÁRESE CON: Agar. ambr. *amm. ant. arn. ars. asa.* aur. *bell.* bry. *cham. chin.* coc. *colch.* con. cupr. *fer. ign.* kal. lach. lep. *lyc. merc. nitr-ac. n-vom. n-mos.* petr. *plat. rhus.* sabad. *sep.* stann. *sulf. sulf-ac. tart. thui.* zinc.—Cuando la pulsatilla será eficaz, siempre que se halle indicada, será sobre todo despues de: *Asa. ant. aur. chin. lach. lyc. nitr-ac. rhus. sep. sulf. tart.* y *thui.*—Despues de la pulsatilla conviene algunas veces: *Asa. bry. nitr-ac. sep. thui.*

Digitized by Google

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones, principalmente *del sexo femenino*, ó de personas de un *carácter dulce, amables y propensas á reir ó á llorar fácilmente*, con *fisonomía dulce* y temperamento flemático, inclinadas hácia la melancolía, constitucion linfática, con *semblante pálido*, ojos azules y cabellos rubios, efélides, disposicion á catarros ó á otros flujos mucosos, etc.; *Malas consecuencias del abuso de las aguas sulfurosas*, del mercurio, de la quina, de la camomila, ó *de la manteca de cerdo*, y aun del vino; *Padecimientos á consecuencia de un susto*, ó de una afliccion, *ó de un enfriamiento en el agua* (baños de piés, lluvia, etc.); Afecciones reumáticas y artríticas, con hinchazon; *Artritis vaga*; Reumatismo articular; Afecciones espasmódicas; Ataques de epilepsia y accesos de desvanecimiento, debidos á la supresion de las reglas; Congestiones pasivas con abultamiento de las venas; Várices; Aneurismas; *Flujos mucosos*; Afecciones escrofulosas y raquíticas?; Atrofia de los niños; Ictericia; *Clorosis*; Inflamaciones erisipelatosas; Zona?; Erupciones urticarias?; *Sarampion* y malas consecuencias de la repercusion de esta enfermedad; Viruelas locas conoídeas?; *Erupciones causadas por la grasa de cerdo*; Sabañones; Ragades?; *Supuraciones*; Ulceras inflamadas ó pútridas; Consecuencias de las contusiones, golpes, caidas; Fiebre comatosa; Fiebres inflamatorias con afecciones gástricas, mucosas ó biliosas; Fiebre tifoídea; *Fiebres intermitentes*, aun despues del abuso de la quina ó del sulfato de quinina; Fiebre héctica; Manía, melancolía, histeria y otras *afecciones morales consiguientes á la supresion de las reglas*; Congestion cerebral; Apoplejía?; *Cefalalgias*, aun á consecuencia del abuso del mercurio ó de una indigestion; *Jaqueca*; *Oftalmías y blefaroftalmías con secrecion mucosa abundante*; Oftalmía á causa de la supresion de una gonorrea; Orzuelo?; Catarata?; Oscurecimiento de la córnea?; Fístula lagrimal?; Ambliopia amaurótica (con hemeralopia?); *Otalgia inflamatoria*; *Otorrea purulenta*; *Dureza de oido*, aun á consecuencia de un frio, ó despues de la repercusion del sarampion; Ozena?; *Hemorragia nasal*; Coriza agudo ó crónico; *Disposicion á acatarrarse fácilmente*; *Odontalgia reumática*; *Anginas catarrales*; *Afecciones gástrico-mucosas ó biliosas*, con vómito ó diarrea; *Indigestion por el*

Digitized by Google

abuso de la grasa de puerco ó de cosas grasientas de pastelería; Enfriamiento del estómago por los helados, las frutas, los ácidos, etc.; *Dispepsia con vómito de los alimentos*, aun por haber abusado del vino; Hematémesis; *Gastralgia*; Gastritis?; Afecciones hepáticas crónicas; Ictericia; Cólicos espasmódicos ó gaseosos; Enteritis?; Peritonitis?; *Diarreas mucosas* ó biliosas; Disentería; Funestas consecuencias de la supresion del flujo hemorroidal; Iscuria, disuria y estrangurria; Incontinencia de orina en los niños (se orinan en la cama); *Catarro de la vejiga*; Gonorrea y malas consecuencias de la supresion de esta enfermedad; Hidrocele ó *hinchazon inflamatoria de los testículos*, aun á consecuencia de una compresion ó de una contusion; Prostatitis; Priapismo; Poluciones frecuentes á causa del onanismo; *Dismenia, amenorrea y dismenorrea, y muchos padecimientos consiguientes á la supresion de las reglas, ó á la irregularidad de estas*, principalmente *en la edad de la pubertad*, ó crítica; Metritis?; Metrorragias, principalmente en la edad crítica; *Leucorreas*; Afecciones morales, odontalgias, padecimientos gástricos, cólicos, espasmos, histéricos, disuria y *otros muchos padecimientos de las mujeres embarazadas* y de las recien paridas; Dolores de parto espasmódicos; Retortijones muy prolongados y muy violentos; Falta de dolores de parto; Adherencia de la placenta; Supresion de los loquios?; Peritonitis puerperal; Agalactia; Padecimientos por el destete; Excoriaciones de los niños en quienes se ha abusado de la camomila; Oftalmías de los recien nacidos?; Afecciones catarrales con tos húmeda; Grippe; Coqueluche?; Hemoptísis; *Afecciones asmáticas*; Neumonía?; Padecimientos tísicos?; *Afecciones orgánicas del corazon*; Carditis?; Desviacion raquítica de la columna vertebral; *Hinchazon inflamatoria* ó edematosa *de las piernas y de los piés*; Psoitis?; Ciática?; Coxalgia.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores tractivos y con estremecimiento* en los músculos, agravados *por la noche*, ó *al principio de ella, en la cama*, así como tambien por el calor de la agitacion, aliviándose al aire libre, °y acompañados frecuentemente de entorpecimiento con debilidad paralítica, ó de hinchazon dura de las partes afectas.—

Digitized by

°Punzadas y sensacion de frio en las partes afectas, á cada cambio de tiempo.—°Tension en algunos miembros como si los tendones fuesen demasiado cortos.—°*Dolores erráticos que pasan rápidamente de un sitio á otro*, frecuentemente con *hinchazon y rubicundez en las articulaciones*.—Saltos de tendones.—°*Accesos de dolores con calofrios, dificultad de la respiracion, palidez del rostro* y temblor de las piernas.—°Cuanto más violentos son los dolores, tanto más fuertes son los calofrios.—°*Dolores de contusion ó de ulceracion subcutánea*, en tocando las partes afectas.—°*Dolores y padecimientos semilaterales*.—*Agravacion y renovacion* de los padecimientos *estando sentado*, despues de ejercicios prolongados; ó *al levantarse*, despues de haber estado mucho tiempo sentado, así como tambien *en el reposo*, y principalmente en *estando echado de costado*, ó sobre el dorso.—Los padecimientos que han aparecido estando acostado sobre el dorso, *se mejoran echándose sobre el costado*, ó sentándose en la cama, y *vice versa*.—El movimiento, la marcha, la presion, el calor exterior y el aire libre *mejoran* igualmente muchos padecimientos, mientras que algunas veces se *agravan* bajo estas mismas condiciones.—Ordinariamente *es por la tarde, ó por la noche, antes de media noche*, y algunas veces tambien *por la mañana* y despues de la comida, cuando se suele estar peor de estos padecimientos.—°*Agravacion de los padecimientos cada dos dias, por la tarde*.—Agitacion y malestar de todo el cuerpo, con imposibilidad de dormir ó de reposar, y necesidad contínua de extender los miembros.—Pulsaciones frecuentes y penosas por todo el cuerpo, mas fuertes durante el movimiento.—°*Mucha disposicion de los miembros á adormecerse*.—Temblor frecuente de los miembros, con ansiedad.—Pereza y *pesadez de los miembros*, con *debilidad paralítica*, sensibilidad dolorosa de las articulaciones y andar vacilante.—Fatiga por la mañana temprano, que se aumenta estando acostado.—°Accesos de desvanecimiento con palidez mortal de la cara.—°Convulsiones epilépticas, con movimientos violentos de los miembros, y seguidas de debilidad, de eructos y gana de vomitar (despues de la supresion de las reglas).—Mucha sensibilidad y repugnancia al aire libre.—Necesidad suma de estar acostado ó sentado.—°Dolor de contusion

Digitized by Google

en los huesos de las extremidades.—*Enflaquecimiento.*

Piel.—*Prurito* lo mas frecuentemente *quemante ó con picotazos* (como por picaduras de hormiga), principalmente *por la tarde*, y por la noche al calor de la cama, agravado rascándose.—**Manchas rojas como de sarampion*, ó de urticaria.—Frecuente rubicundez, aun de las partes frias.—°Erupciones semejantes á viruelas locas conoídeas, con prurito violento en la cama.—*Sabañones con hinchazon rojo-azulada, calor y dolor quemante ó pulsativo.—°Erisipela flemonosa, con dureza, calor ardiente y dolor lancinante al tacto, ó moviendo la parte enferma.—Diviesos.—Rubicundez lustrosa, dureza y prurito alrededor de las úlceras, *que sangran fácilmente*, y con *dolores lancinantes*, quemantes y corrosivos.—°Ulceras inflamadas ó pútridas.—Várices.

Sueño.—**Somnolencia continua y sueño comatoso, con agitacion y desvarios inquietos* por el dia ó por la noche.—*Mucha tendencia al sueño por el dia, principalmente por la tarde*, ó despues de medio dia.—Sueño irregular por la noche muy temprano, ó por la mañana muy tarde, y algunas veces con insomnio nocturno.—*Sueño tardo*, el que á veces se efectúa dos horas despues de media noche, y frecuentemente *despertando temprano.*—**Una grande afluencia de ideas impide dormir por la tarde y por la noche.*—*Sueño agitado con *desvelo frecuente* y ¯estado de letargo al despertarse.—Imposibilidad de dormir de otro modo que sentado, con la cabeza inclinada hácia adelante ó hácia un lado.—**Durante el sueño, palabras*, delirios, movimientos convulsivos de la boca, de los ojos y de los miembros, ¯*llantos*, *gritos* y gemidos, pesadilla, *sobresaltos con espanto*, ¯sacudimientos en el cuerpo y *estremecimiento en los miembros.*—**Por la noche, mucha agitacion* y ansiedad, °inquietud y *angustia de corazon*, ebullicion de sangre, *calor seco*, prurito, divagaciones é ideas fijas.—*Se duerme acostado sobre el dorso*, las rodillas levantadas y los brazos puestos sobre la cabeza, ó cruzados sobre el vientre.—**Ensueños frecuentes, angustiosos, horribles*, ¯confusos, vivos, penosos, voluptuosos, de querellas, de los negocios del dia, de espectros y de muertos.—*Bostezo frecuente.*

Fiebre.—**Frio, calofrios y horripilacion*, principalmente *por la tarde*, ó *despues de medio dia*, y algunas veces *con*

Digitized by Google

palidez del rostro, vértigos y aturdimiento, *dolor y pesadez de cabeza*, ¯*ansiedad y opresion de pecho*, °vómitos mucosos, ¯necesidad de acostarse y calor pasajero.—Frio y calofrios parciales, principalmente en el dorso, en los brazos y en las piernas, en las manos y en los piés, frecuentemente con calor de la cabeza ó de la cara, y rubicundez de las mejillas.— *Frio semilatera'*, con entorpecimiento del lado afecto.— **Calor seco*, principalmente *por la noche*, *al principio de estar en la cama*, ó por la mañana, y frecuentemente *con accesos de angustia*; *cefalalgia*, cara roja y tumefacta, ó *sudor de la cara*, *calofrios descubriéndose*, sensacion de ardor en las manos, con hinchazon de las venas, lamentos, suspiros y gemidos, sueño profundo ó agitado, respiracion angustiosa y precipitada, accesos de desvanecimiento con oscurecimiento de la vista, gana de vomitar y deposiciones diarréicas.—**Calor parcial*, principalmente *en la cara con rubicundez de las mejillas*, en las manos, en los piés, etc., y frecuentemente *de un solo lado*, con frio ó calofrios de las mismas partes del lado opuesto.—**Accesos febriles*, compuestos de *calor*, *precedidos de calofrios con adipsia*, y mezclados ó *seguidos de sudores*; tipo cotidiano, terciano ó cuartano; *exacerbacion por la tarde*, *ó despues de medio dia*; remision por la mañana, y, en la apirexia, *cefalalgia*, *opresion dolorosa de pecho*, *tos humeda*, *amargor de boca*, constipacion ó diarrea.—°Síntomas febriles con pérdida del conocimiento, delirios, llantos y desesperacion, ó con síntomas gástrico-mucosos ó biliosos, ó con sueño comatoso.—Repugnancia al calor exterior.—*Pulso acelerado y pequeño, ¯ó lleno y lento, ó débil y casi suprimido.—**Sudores principalmente por la noche*, ó *hácia la mañana*; sudores abundantes y fétidos, ¯*sudores semilaterales*, ó parciales (en la cabeza y en la cara), y sudores con calambres en los brazos y en las manos; fatiga, sueño comatoso, desvaríos y °rubicundez de la cara.

Moral.—**Melancolía* con *tristeza*, *llantos*, *mucha inquietud sobre sus negocios*, ó su salud, °temor de la muerte, cuidados y humor apesadumbrado.—°Risas y llantos involuntarios.—*Mucha angustia é inquietud*, con mas frecuencia *en la region precordial*, y algunas veces *con tendencia al suicidio*, ¯palpitaciones de corazon, calor y necesidad de aflojarse los vestidos, temblor de las manos y ganas

Digitized by Google

de vomitar.—*Accesos de ansiedad, con temor de morir ó de ser atacado de apoplejía, con zumbido de oidos, calofrios y movimientos convulsivos de los dedos.—Aprensiones, °antropofobia, *_miedo nocturno ó vespertino á los espectros_, con deseo de esconderse ó de escapar, desconfianza y sospechas.—*Locura taciturna, con aire sombrio, frio y descarriado, suspiros, y con frecuencia se le ve sentado, las manos juntas y sin quejarse de nada. —°Desesperacion con desconfianza de la felicidad eterna, entregado á contínuas oraciones.—_Desaliento_, _indecision_, horror á toda ocupacion, dificultad de la respiracion.—Carácter envidioso, descontentadizo y codicioso, de modo que todo lo desea para sí.—Humor caprichoso, con deseo ya de una cosa, ya de otra, y rechazándolas en seguida que las obtiene.—*_Humor hipocondriaco y morosidad_, principalmente por la tarde, frecuentemente con _repugnancia á la conversacion_, _mucha susceptibilidad de carácter_, disposicion á enfadarse, gritos y llantos.—*_Mal humor_, algunas veces con horror al trabajo, y _disgusto ó desprecio de todo_.—Inadvertencia, precipitacion y distraccion.—Al hablar, dificultad para expresarse correctamente, y omision de muchas letras al escribir.—°Estado de aturdimiento; no sabe donde está ni lo que hace. —Excesiva afluencia de ideas, muy variadas.—*Divagaciones nocturnas; °delirios violentos y pérdida del conocimiento.—°Visiones espantosas.—Debilidad de la memoria.—Ideas fijas.—°Estupidez.

Cabeza.—*_La cabeza se halla fatigada por los trabajos intelectuales_.—*_Sensacion de vacio y de turbacion en la cabeza_, como despues de vigilias prolongadas ó de desarreglos de cualesquiera especie, y algunas veces con indiferencia.—*_Vértigos_ rotatorios, _como en la embriaguez_, ó bien vértigos hasta el punto _de hacer caer_, y vaivenes, principalmente _por la tarde_, ó por la mañana, al incorporarse, despues de haber estado acostado, _estando sentado, bajándose_, y paseando al aire libre, ó despues de la comida, así como al levantar los ojos, y frecuentemente con _mucha pesadez_, y calor en la cabeza, palidez del rostro, propension al vómito, sueño, oscurecimiento de la vista, y °zumbido de oidos.—°La meditacion y la conversacion aumentan los vértigos.—°Accesos de aturdimiento y pérdida del conocimiento, con rubicundez azulada y abota-

Digitized by Google

gamiento de la cara, pérdida del movimiento, violentas palpitaciones de corazon, pulso casi imperceptible y respiracion estertorosa.—*Dolor de contusion en el cerebro*, como en las fiebres tifoídeas, ó á consecuencia de una embriaguez por el aguardiente.—**Cefalalgia, como la producida por una indigestion* ocasionada por comidas grasientas.—**Dolor en la cabeza como si la frente fuera á hendirse, ó como si el cerebro estuviera tirante, comprimido*, ó contraido.—**Punzadas ó dolores vivos*, tractivos y *con extremecimiento*, ú hormigueo, *pulsacion* y terebracion en la cabeza.—**Ruido confuso, sordo ¯y chirrido en la cabeza, ¯ó sensacion dolorosa, como si una corriente de aire atravesara el cerebro.—**Los dolores de cabeza son por lo regular *semilaterales*; se propagan hasta el oido y la dentadura, si ocupan la frente por encima de los ojos hasta las órbitas, ó bien se dejan sentir en el occipucio, con contraccion dolorosa en la nuca.—**Aparicion ó agravacion de los dolores de cabeza *por la noche, al principio de esta, despues de acostado*, ó por la mañana en la cama, como tambien cuando uno se baja, ¯ó mueve los ojos ó la cabeza, ó paseándose al aire libre, *ó sea ocupándose de un trabajo intelectual; ¯la compresion los alivia algunas veces.—°Dolor de cabeza con náuseas y vómitos, ¯ó con congestion y calor á la cabeza, ¯ó bien con horripilacion y accesos de desvanecimiento, *vértigos, oscurecimiento de la vista, y zumbido de oidos, ¯fotofobia y lagrimeo.—Dolor en la piel del cráneo, peinándose al revés.—Picazon y prurito en la cabeza.—Pústulas purulentas y tumores pequeños, con dolor de ulceracion en la piel del cráneo.

Ojos.—Dolor en los ojos como si los rasparan con un cuchillo.—Sensacion quemante, **dolor presivo* como por arena, ¯ó *dolor vivo y lancinante en los ojos*, ó bien terebracion y dolor incisivo.—Prurito ardiente de los ojos, principalmente por la tarde.—**Inflamacion de los ojos y de los bordes de los párpados*, con rubicundez de la esclerótica y de la conjuntiva, y secrecion mucosa abundante.—**Hinchazon y rubicundez de los párpados.—°Triquiasis.—°Humor cristalino oscurecido, color gris.—Orzuelos ¯con inflamacion de la esclerótica, y dolores tensivos, tractivos, cuando se mueven los músculos de la cara.—**Sequedad de los ojos y de los párpados*, sobre todo

Digitized by Google

cuando se tiene sueño.—*Lagrimeo abundante*, principalmente al viento, así como al aire libre, al frio y á la luz fuerte del sol.—°Lágrimas ácres y corrosivas.—Abscesos cerca del ángulo del ojo, como una fístula lacrimal.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—*Pupilas contraidas* ó dilatadas.—*Mirar fijo y estúpido.—*Oscurecimiento de los ojos y pérdida de la vista*, algunas veces con palidez del rostro y gana de vomitar.—Vista pálida (aspecto azul de todos los objetos).—°Pérdida de la vista al crepúsculo, con sensacion como si los ojos estuviesen cubiertos con una venda.—**Vista turbia*, como á través de una niebla, ó *como por alguna cosa que se pudiera quitar frotando*, principalmente al aire libre, por la tarde, por la mañana ó al despertarse.—Diplopia.—*Círculos luminosos delante de los ojos, y difusion de la luz de las bujías.—Mucha sensibilidad de los ojos á la luz, que causa punzadas.

Oidos.—Dolor en el oido como si alguna cosa fuese á salir por él.—**Punzadas* con prurito *ó dolor vivo*, *con estremecimiento y compresion en los oidos* y en sus inmediaciones; °los dolores vienen algunas veces por accesos, invaden toda la cabeza, se hacen insoportables y hasta llegan á hacer perder la razon.—**Hinchazon inflamatoria*, *calor y rubicundez erisipelatosa de la oreja y del conducto auditivo*, así como de las partes inmediatas.—°Hinchazon dolorosa de los huesos detrás de las orejas.—°Cerúmen duro, negro.—**Flujo de pus*, de sangre, ó de un humor amarillento espeso, por el oido.—Gorjeo como de pájaros, murmullos pulsativos, *retintin*, **ruido y zumbido en los oidos.—***Dureza de oido*, como por obturacion del conducto auditivo.—Costras quemantes, con picor, en el tragus (con hinchazon de las glándulas del cuello).—Punzadas en las parótidas.

Nariz.—Presion y dolor de absceso en la raiz de la nariz.—**Ulceracion de las ventanillas* y de las alas de la nariz.—**Flujo de un pus fétido y verdoso*, ó *amarillento por la nariz*.—Moco sanguinolento al sonarse, y **hemorragia nasal*, algunas veces con obturacion de la nariz.—**Obturacion de la nariz y coriza seco*, principalmente *por la tarde y al calor de la habitacion*.—Coriza con pérdida del gusto y del olfato, ó **con secrecion de mucosidades espesas y fétidas.—*Cosquilleo en la nariz, y estornudo frecuente,

Digitized by

principalmente por la tarde y por la mañana.—Despeluzamiento contínuo durante el coriza.—Olor contínuo en la nariz, como el de un catarro crónico, ó como de una mezcla de café y de tabaco.—Hinchazon de la nariz.

Cara.—**Rostro pálido* y algunas veces con aspecto de sufrimiento.—*Palidez del semblante que alterna con calor y rubicundez de las mejillas.—Sudor en la cara y en la piel del cráneo; *horripilacion ó sudor semi-lateral* en la cara.—°Rostro abotagado y de color rojo azulado.—Movimientos convulsivos y palpitaciones musculares de la cara, ó sensibilidad dolorosa de la piel, como si estuviese excoriada.—Erisipela en la cara, con dolor lancinante y descamacion de la piel.—Nudosidades rojas en la region de los pómulos.— Hinchazon, tension y grietas en los labios, con esfoliacion de la piel.—Dolor vivo y contractivo de las mandíbulas.— Hinchazon de las glándulas submaxilares y de las del cuello.

Dientes.—**Dolores vivos, lancinantes en los dientes*, ó *dolores tractivos con estremecimiento*, como si el nervio se estirase ó aflojase á golpes, ó dolores pulsativos, como si escarbaran, y corrosivos, frecuentemente *con picazon en las encias*.—*Las odontalgias que afectan los dientes sanos lo mismo que los cariados, *frecuentemente son semilaterales*, y se propagan en general *hasta la cara, la cabeza, el oido* y el ojo del lado afecto, *acompañadas algunas veces de palidez del rostro, despeluzamiento*, °y disnea. —*Agravacion ó aparicion de las odontalgias, principalmente *por la tarde*, ó *despues de medio dia*, ó por la noche, así como *con el calor de la cama*, ó de la habitacion; renovándose en comiendo ó tomando alguna cosa caliente y por el contacto del mondadientes; *alivio por el agua fria, y al aire fresco*. — Algunas veces las odontalgias se agravan por el agua y el aire frio, ó al viento, pero estos casos son muy raros.—Sensacion quemante ó de hinchazon, dolor de excoriacion y pulsacion en las encías. —Vacilacion de los dientes.

Boca.—*Sequedad de la boca °por la mañana.—Mal olor y hasta *fetidez pútrida de la boca*, principalmente *por la mañana*, ó por la noche y al principio de esta en la cama. —**Flujo de una saliva sosa y acuosa por la boca*, algunas veces con gana de vomitar.—Sensacion como si la lengua fuese muy larga.—Insensibilidad de la lengua, como

Digitized by Google

si estuviera quemada. —*Lengua cubierta de una capa espesa*, de color gris, *blanquecina* ó amarillenta.—Acumulacion de mucosidades tenaces en la boca, y sobre la lengua: estas partes están como cubiertas de una piel blanca.—°Grietas ¯y vesículas dolorosas en la lengua.—Sensacion como si el paladar estuviese hinchado ó cubierto de mucosidades tenaces.

Garganta.—**Dolor de excoriacion en la garganta, como si toda estuviera en carne viva*, con arañamiento, sensacion de ardor y escozor.—*Rubicundez de la garganta, de las tonsilas y de la mandíbula, con *sensacion como si estas partes estuviesen hinchadas*, principalmente al deglutir. —Deglucion difícil, como por parálisis ó por estrechamiento de la garganta.—**Punzadas* en la garganta, con presion y tension al deglutir en seco. —°Inflamacion de la garganta, con dilatacion varicosa de las venas. —*Sequedad en la garganta, ó *acumulacion de un moco tenaz que reviste las partes afectas*.—*Los dolores de la garganta se agravan ordinariamente *por la tarde* ó despues de medio dia.

Apetito.—**Gusto de la boca soso, mucoso, pútrido*, ¯empireumático, térreo, ó como de pus.—**Gusto dulce*, ácido ó *amargo, de la boca y de los alimentos*, principalmente de la carne, del pan, manteca de vacas, de la cerveza y la leche, sustancias que frecuentemente parecen tambien insípidas y disgustan.—*Amargor ó acedía de la boca, inmediatamente despues de haber comido*, así como por la mañana y por la tarde.—Gusto amargo del vino, y pútrido de la carne. —Los alimentos parecen estar demasiado salados ó insípidos.—**Falta de apetito y disgusto de los alimentos*.—Hambre y deseo de comer sin que se sepa qué alimento.—Hambre canina, con dolor corrosivo en el estómago.—**Adipsia completa*, ó *sed excesiva*, con lengua húmeda ¯y *deseo de cerveza*, ó de bebidas espirituosas, picantes y ácidas.—**Sensacion de un desarreglo de estómago, semejante al que causaria la carne de cerdo, ó las comidas grasientas de pastelería*.— Disgusto y repugnancia por el humo del tabaco.—**Despues de haber comido, náuseas* y eructos, regurgitacion y *vómito*, meteorismo y *presion en la boca del estómago*, cólicos, flatos, cefalalgia, dificultad de la respiracion, °mal humor y melancolía, ó risas y llantos involuntarios, *y ¯otros muchos padeci-*

Digitized by Google

mientos.—°El pan es sobre todo lo que mas pesa en el estómago.

Estómago.—**Eructos frecuentes*, algunas veces abortados, ó *con gusto á los alimentos*, ó ácidos, *ó amargos*, y principalmente *despues de la comida*.—Regurgitacion de los alimentos.—Evacuacion de agua del estómago, como pituitas.—**Hipo frecuente*, principalmente fumando, despues de haber bebido, ó por la noche, °y algunas veces con accesos de sofocacion.—**Náuseas y gana de vomitar insoportables*, algunas veces *hasta en la garganta y en la boca*, con sensacion penosa como si un gusano subiese al esófago.—Accesos de contraccion y estrangulacion en el esófago.—**Vómitos*, algunas veces violentos, *de materias verdosas*, *mucosas ó biliosas y amargas*, ó ácidas.—**Vómito de los alimentos*.—Vómito de sangre.—*Las náuseas y vómitos se efectúan principalmente *por la tarde* ó *por la noche*, ó *despues de haber bebido* ó *comido*, así como durante la comida, y frecuentemente se manifiestan con *despeluzamiento*, *palidez del rostro*, *cólicos*, dolores en los oidos y en el dorso, sensacion quemante en la garganta y borborigmos.—**Sensibilidad dolorosa de la region estomacal*, á la menor presion.—**Dolores presivos*, *calambroideos*, contractivos y compresivos, *en el estómago y en la region precordial*, principalmente *despues de la comida*, ó *por la tarde*, ó por la mañana, y frecuentemente *con vómito* ó náuseas y dificultad de la respiracion.—Hormigueo *ó pulsaciones en la boca del estómago*, ó punzadas en dando un paso en falso.—°Dolor en el epigastrio que se agrava fuertemente estando sentado (durante la preñez).

Vientre.—Tension tractiva en los hipocondrios, ó punzadas pulsativas como en un absceso.—Timpanitis principalmente del epigastrio, con tension y sensacion de plenitud.—**Dolores calambroideos y compresivos*, algunas veces en el fondo del epigastrio, con presion sobre el recto, ó *retortijones*, principalmente alrededor del ombligo, ó dolores vivos y lancinantes en el vientre.—*Los cólicos están acompañados por lo regular de vómito ó de diarreas; se manifiestan lo mas frecuentemente *por la tarde*, *ó despues de haber comido ó bebido*, y algunas veces el apretarse el vientre ó el reposo los alivia, mientras que el movimiento los agrava.—Hinchazon anular alrededor del ombligo, dolorosa cuando se anda.—Re-

Digitized by Google

traccion y dolor del vientre, *con sensibilidad excesiva de los tegumentos*, que parecen hinchados, con *dolor de contusion* al tacto, cuando se bosteza, canta ó tose, y á cualquier movimiento de los músculos abdominales.—*Cólicos flatulentos*, principalmente *por la tarde despues de la comida*, ó despues de media noche, ó por la mañana, con dolores presivos, producidos por encarcelacion de gases, *rumor*, *ruido sordo y borborigmos* en el vientre, y expulsion de gases fétidos.—Pústulas purulentas en las ingles.

Defecacion. —*Estreñimiento y evacuaciones difíciles, algunas veces con presion dolorosa en el recto y dolores en el dorso.—*Conato frecuente de deponer*, aun por la noche.—Deposiciones involuntarias y sin sentirlas durante el sueño.—**Diarreas* aun *por la noche*, y algunas veces *con cólicos* y *retortijones*, calofrios, horripilaciones, y dolores en el ano.—**Evacuaciones frecuentes de mucosidades blanquizcas*, *amarillentas, *sanguinolentas ó de materias verdosas*, como picadillo, *biliosas* ó *acuosas*, y algunas veces corrosivas.—Antes y despues de las deposiciones, sensacion de ardor, escozor y dolores de excoriacion en el ano y en el recto.—*Flujo de sangre por el ano*, aun fuera del acto de deponer.—**Hemorróides ciegas* y que sangran, con prurito, escozor y dolor de excoriacion.—Salida de las hemorróides.

Orinas.—°Retencion de orina con rubicundez y calor en la region de la vejiga, ansiedad y dolores penosos en el vientre.—**Tenesmo de la vejiga* y *conato frecuente de orinar*, con presion dolorosa en la vejiga y dolor tractivo en el vientre.—*Emision involuntaria de algunas gotas de orina*, al andar, al toser, estando sentado, ó al expeler gases.—**Se orina en la cama.*—**Flujo abundante de orinas acuosas*, con debilidad en los riñones, y diarreas, ú *orinas raras*, *rojas ó pardas*, algunas veces con espuma de color violado.—Orinas con sedimento rojo ó de color de ladrillo, ó violado, mucoso, ó gelatinoso.—**Orinas sanguinolentas*, °con depósito purulento y dolores en los riñones.—**Flujo por la uretra como en la gonorrea.*—Estrechez de la uretra con chorro de orina muy delgado.—Sensacion de ardor en la uretra durante y despues de la expulsion de las orinas.—Tirantez y presion en la uretra, en el cuello de la vejiga y en la vejiga.—Presion y

Digitized by Google

constriccion en la vejiga con resentimiento de la region vesical.—°Hinchazon en la region del cuello de la vejiga, con resentimiento al tacto, chorro de orina intermitente, y dolor calambroídeo hasta en la pélvis y en los muslos, despues de haber orinado.

Partes viriles.—*Prurito y comezon en el prepucio y en el escroto, principalmente por la mañana y por la tarde.—**Hinchazon inflamatoria de los testículos y del cordon espermático* (algunas veces de un solo lado), con *dolores presivos y tractivos hasta el vientre* °y los riñones, rubicundez y calor del escroto, náuseas y gana de vomitar.—*Hinchazon hidrópica del escroto, de color blanco azulado.—*Exaltacion extraordinaria del apetito venéreo, casi como *priapismo*, con *erecciones frecuentes y continuas*, deseo permanente del cóito, y *poluciones frecuentes*.—Secrecion de licor prostático.

Reglas.—**Dolores calambroideos en la matriz*, ó *tension tractiva en el útero*, y *dolores como los* del parto.—°Metrorragia.—**Sangre de las reglas negra*, con cuajarones y mucosidades, ó sangre pálida y serosa.—*Reglas irregulares*, muy *tardas*, ó muy adelantadas, de muy corta ó de muy larga duracion, ó *enteramente suprimidas*, *con cólicos, espasmos histéricos abdominales*, dolores hepáticos, gastralgia, dolores de riñones, *náuseas y vómitos*, *calofrios y palidez de la cara*, jaqueca, vértigos, afecciones morales, tenesmo del ano y de la vejiga, punzadas en el costado, y *otros muchos padecimientos*, antes, mientras ó despues de la época.—**Flores blancas*, *espesas como crema*, ó corrosivas y quemantes, principalmente en la época de las reglas (antes, durante y despues), y algunas veces con retortijones.—Hinchazon de las mamas, con tension y presion, como si se llenasen de leche.

Laringe.—*Catarro con *ronquera*, aspereza, sequedad, arañamiento y dolor de excoriacion en la laringe y el pecho.—**Accesos de constriccion en la laringe*, principalmente *por la noche*, estando acostado horizontalmente.—**Tos conmovente*, principalmente *por la tarde*, *por la noche*, ó por la mañana, provocada por una sensacion de sequedad ó de arañamiento y cosquilleo en la garganta, *agravada estando acostado*, y frecuentemente *acompañada de gana de vomitar*, *con vomituricion y vómito*, *ó de sofocacion*, como por el vapor de azufre, con epistaxis, y respira-

Digitized by

cion estertorosa.—*Tos con punzadas en el pecho ó en los costados, y palpitacion de corazon.—*Tos húmeda* son *expectoracion de mucosidades blancas, tenaces ó de materias espesas, amarillentas*, de un gusto amargo pútrido.—**Expectoracion de una sangre negra, y en coágulos, por la tos.*—Al toser, punzadas en el hombro derecho y el dorso.

Pecho.—°Respiracion acelerada, corta, y *superficial* (durante la fiebre), ó estertorosa y angustiosa.—**Dificultad de la respiracion, respiracion corta*, sofocacion como por el vapor del azufre, y *accesos de disnea y de sofocacion*, con ansiedad.—*Constriccion calambroidea en el pecho ó la laringe*, hipo violento, tos, dolor de cabeza y vértigos, principalmente *por la tarde*, despues de la comida, ó *por la noche estando acostado horizontalmente.*—*El movimiento, la marcha acelerada, el aire libre y el frio agravan los padecimientos asmáticos.—**Tension calambroidea y constriccion en el pecho*, principalmente al respirar, y algunas veces con calor interior y ebullicion de sangre.—Dolor de ulceracion, ó dolor vivo, ó incisivo en el pecho.—**Punzadas en el pecho* y en los costados, principalmente por la noche y cuando se está acostado, y algunas veces con dificultad de respirar profundamente, imposibilidad de estar echado sobre el lado enfermo, tos corta y accesos de sofocacion.—Congestion de sangre en el pecho y corazon, sobre todo por la noche.—**Accesos frecuentes y violentos de palpitaciones en el corazon*, principalmente despues de comer, ó despues de emociones morales, ó provocados por la conversacion, y frecuentemente *con angustia*, oscurecimiento de la vista y opresion de la respiracion, sobre todo estando acostado sobre el lado izquierdo.—Ansiedad, pesadez, presion y sensacion quemante en el corazon.

Tronco.—**Dolores en los riñones y en el dorso*, como despues de haber estado mucho tiempo encorvado, ó con rigidez como por una faja ceñida alrededor del cuerpo.—**Dolores de riñones como los del parto.*—*Punzadas en el dorso, en los riñones y entre los omóplatos.—°Desviacion de la columna vertebral.—**Dolores reumáticos, tractivos y tensivos en la nuca y en el cuello*, algunas veces solo de un lado, y frecuentemente con hinchazon de las partes y dolores de ulceracion subcutánea al tacto.—Crujido en las vértebras del cuello y los omóplatos, moviendo

Digitized by

estas partes.—Granos pruritosos en el cuello.—Hinchazon de las glándulas del cuello.

Brazos.—**Dolores vivos, con estremecimiento y tractivos en la articulacion escapular, como tambien en los brazos, en las manos y en los dedos.*—Dolor paralítico en la articulacion escapular, levantando y moviendo el brazo.—*Sensacion quemante en el brazo, por la tarde ó por la noche, con sensacion de sequedad en los dedos.—°*Pesadez presiva en los brazos*, con *sensacion de entorpecimiento*, principalmente en las manos.—Sensacion de **hinchazon y dolor de luxacion en las articulaciones de los codos*, ¯de las manos y de los dedos, con tension y rigidez.—Fácil adormecimiento de los dedos, principalmente por la mañana y por la noche.—Vesículas entre los dedos con dolores que causan comezon.—Dolor de panadizo en el índice.

Piernas.—*Dolor de contusion ó de ulceracion en el psoas.*—Dolor de luxacion en la articulacion coxo-femoral, con estremecimientos dolorosos, como en una llaga, hasta la rodilla, principalmente durante el reposo.—*Tirones y tension en los muslos y las piernas, principalmente en las pantorrillas, como si los tendones fuesen demasiado cortos.—Dolor de contusion con sensacion de debilidad paralítica en los huesos y en los músculos de los muslos y de las piernas.—*Dolor de ulceracion subcutánea en las piernas y en la planta de los piés.*—Chasquido en las rodillas.—**Hinchazon de las rodillas*, °algunas veces y principalmente ¯por encima de la rótula, y con frecuencia calor, inflamacion, *y *dolores vivos, tractivos y lancinantes.*—Debilidad y genuflexion de las rodillas, con vacilacion al andar.—°Tirones y *mucha flojedad en las piernas*, y principalmente *en las rodillas*, con *temblor.*—Hinchazon de las venas y **várices en las piernas.*—Hormigueo en las piernas estando en pié.—*Dolores de contusion en la tibia.*—Tension y traccion en las pantorrillas.—**Hinchazon caliente de las piernas*, ó solamente *del dorso* ó *de la planta de los piés*, algunas veces con dolores lancinantes al tacto, y durante el movimiento.—Sensacion de torpeza dolorosa en la planta de los piés y en la parte carnosa de los dedos de estos.—*Hinchazon edematosa de los piés, principalmente por la tarde.—Punzadas terebrantes y dolores incisivos en los talones.—Punzadas en la planta de los piés y en la punta de los dedos.

Digitized by Google

159.—RANUNCULUS BULBOSUS.

RAN.—Ranúnculo bulboso.— *Archivos de* STAPF.— *Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.— *Dósis usadas:* 6, 9.—*Duracion de accion*: muchas semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Bry. Camph. puls. rhus.—*Las bebidas alcohólicas* agravan sus efectos; la misma accion ejercen *staph. sulf.* y el *vinagre.*

COMPÁRESE CON: *Bry.* carb-v. n-vom. *puls.* ran-sc. *rhus.* sassap. sabad. sep. staph.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores de quebrantamiento en general, punzadas* ó dolores dislacerantes, *reumáticos y artríticos* en los miembros y en los músculos.—Estremecimientos de los músculos.—Sacudidas en todo el cuerpo.—Ataques de epilepsia.—(Induraciones.—Afecciones ictéricas).—*Dolores provocados por el contacto, el movimiento, la extension ó el cambio de posicion*, sobre todo en el tronco y en los miembros.—*Muchos de los síntomas se presentan tambien al cambio de temperatura*; por ejemplo, cuando se pasa del frio al calor, y *vice-versa*, como tambien por la *mañana y por la tarde*, y despues de comer.—Laxitud y quebrantamiento en todos los miembros.—Temblor de los miembros despues de un acceso de cólera aun de los mas ligeros.—Debilidad rápida como si fuera á perder el conocimiento.

Piel.—Prurito frecuente é intenso en diversas partes de la piel.—Lancinaciones en la piel que se cambian en prurito.—*Erupciones vesiculosas* como ampollas de quemadura.—*Vesículas de color azul oscuro*, pequeñas, profundas, transparentes, en grupos aproximados, con *prurito quemante*, y costras callosas y herpéticas.—Ulceras corrosivas y lisas, con bordes agudos y prurito ardiente y lancinante.—Excrescencias callosas y otras formas.—*Herpes en todo el cuerpo.*—°*Erupciones en forma de ampollas, de los recien nacidos.*—°*Sarna pustulosa.*

Sueño.—Gana de dormir por el dia.—*Sueño tardío é insomnio* nocturno, frecuentemente por opresion de pecho, calor y ebullicion de sangre, generalmente sin causa apreciable.—*Despierta con frecuencia por la noche, y vigilia prolongada.*—Despierta muy de mañana.—Imposibilidad

Digitized by Google

de estar acostado sobre un lado.—*Sueños ansiosos*, de peligro (por el agua), ó vivos y lascivos.

Fiebre.—Accesos de fiebre que consisten principalmente *en frio despues de la comida ó por la tarde*, con dolores abdominales y otras incomodidades. — Calor en la cabeza con frio en las manos.—Calofrios por la tarde con calor en la cara.

Moral.—Pusilanimidad é inquietud, sobre todo por la tarde.—Miedo apacible por la tarde.—*Irritabilidad colérica y humor querelloso*, sobre todo á la madrugada.—Opresion con llantos excesivos.—Pérdida de las ideas.—Dificultad para meditar.—*Entendimiento obtuso.*

Cabeza.—Debilidad, aturdimiento y pesadez de la cabeza.—*Vértigo* rotatorio en saliendo de la habitacion al aire libre, *hasta el punto de hacer caer.*—Cefalalgia con ansiedad y debilidad durante la comida.—Cefalalgia semilateral por encima del ojo, con abatimiento y deseo de llorar.—Compresion y presion expansiva en el sincipucio y en el vértice.—*Sensacion de tumefaccion en toda la cabeza.*—Dolores de dislaceracion y presion en las sienes.—Golpes en el occipucio.—*Congestion sanguinea á la cabeza.*—La mayor parte de los síntomas de la cabeza aparecen *al pasar de un sitio caliente á otro frio, y vice-versa.*—Hormigueo doloroso ó punzadas quemantes en la piel del cráneo.

Ojos y oidos.—Prurito en los ojos.—*Presion en el globo de los ojos.—Dolor de excoriacion en los ángulos de los ojos*, con escozor y ardor.—Inflamacion de los ojos y lagrimeo.—*Punzadas en los oidos*, sobre todo por la tarde.—Sensacion calambroídea en los oidos y en las orejas.

Nariz.—Hormigueo penoso y doloroso en la nariz.—*Nariz roja, hinchada* é inflamada, con dolor tensivo y costras abundantes en lo interior.—Obturacion de la nariz, sobre todo en la habitacion, con dolor de excoriacion.—Flujo abundante de mucosidades viscosas por la nariz.

Cara y dientes. — Calor en la cara con fuerte rubicundez de la mejillas.—Hormigueo en la cara, principalmente en la barba y en la nariz.—Dolores calambroídeos y como rotatorios en la cara y en las mandíbulas.—Calambres en los labios.—Dolores de muelas por la mañana al despertar.—Dolores incisivos en las muelas y como si las arrancaran.

Digitized by Google

Boca y garganta.—Acumulacion abundante de agua en la boca.—Salivacion.—*Saliva blanca* con gusto metálico—*Acumulacion de mucosidades abundantes en la garganta*.—Sensacion espasmódica como si alguna cosa subiera al esófago y la garganta.—*Dolores* inflamatorios, *quemantes*, *en la garganta y en el paladar*.

Apetito y estómago.—Sabor insulso, dulce, de un amargor ácido.—Sabor amargo, empireumático, durante ó despues de haber comido alimentos secos.—Sed aumentada despues de medio dia.—Eructos frecuentes.—*Hipo calambroideo*.—*Náuseas* frecuentes despues de medio dia ó por la tarde, algunas veces con dolores de cabeza.—Dolores de estómago.—*Presion en la boca del estómago*.—Dolor de excoriacion y *sensacion ardiente en la boca del estómago*, como tambien en la parte interna de su orificio, sobre todo al tacto.—(Inflamacion del estómago).

Vientre.—*Dolor como de rotura en los hipocondrios*, algunas veces al tacto.—Dolor de excoriacion en el hipocondrio izquierdo, principalmente en moviendo el tronco.—*Lancinaciones en la region hepática*.—Pulsaciones en el hipocondrio izquierdo.—Dolores sordos en el vientre con sensibilidad de los intestinos al andar.—*Dolores abdominales*, *como pellizcos*, con movimientos de rotacion y sensacion á la presion exterior, como si todo lo contenido en el vientre estuviera contundido y ulcerado.—*Dolor de excoriacion quemante en el vientre*, como en una inflamacion lenta.—Expulsion frecuente de gases muy fétidos.

Deposiciones.—**Reglas**.—Deposiciones tardas y duras.—*Deposiciones frecuentes y abundantes*.—Disuria.—Ulceras en la vejiga.—*Leucorrea* ácre y corrosiva.

Pecho.—*Respiracion corta y difícil*, *con opresion de pecho*, como despues de una mortificacion ó un pesar, con *necesidad de respirar profundamente* y de llorar mucho.—Presion en el pecho.—*Dolor reumático en el pecho ó como de ulceracion subcutánea*.—Presion ardiente en el pecho.—*Lancinaciones en el pecho y el costado* derecho, que profundizan frecuentemente hasta el hígado.—Sensibilidad dolorosa en el exterior de las partes inferiores del pecho y del epigastrio.—*Sensibilidad dolorosa de todas las partes externas del pecho*, de los músculos intercostales, de la pleura, etc., que se manifiestan ó se agravan sobre todo por el *movimiento*, *el contacto y extendiendo el cuerpo*.—

Digitized by Google

Dolor en el pecho como por adherencia de la pleura.

Tronco y miembros. — Dolor de quebrantamiento reumático en todo el tronco y entre los omóplatos.—Dolores calambroideos, dislacerantes, lancinantes y con estremecimiento en los brazos.—Frio en las manos.—Prurito en las manos y en los dedos.—*Herpes en la palma de las manos.*—Hormigueo en los dedos.—*Herpes, ampollas y úlceras en los dedos.*—*Dolores tractivos á lo largo de los muslos.* — Dolores calambroideos, terebrantes, y prurito en medio de los muslos.—Crujido de la articulacion de la rodilla.— Dolor de rigidez en las articulaciones de los piés.—Calambres en el empeine.—Lancinaciones pulsativas en los talones.—Dolor de excoriacion y lancinaciones en los dedos de los piés.

160.—RANUNCULUS SCELERATUS.

RAN-SC.—Ranúnculo malvado —*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farm. homeop.—*Dósis usadas*: 6? 30?—*Duracion de accion*: 6 á 7 semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTO: amph.

COMPÁRESE CON: Puls. *ran.* sil. veratr.

SINTOMAS GENERALES.—(*Afecciones artríticas*).—*Dolores terebrantes*, *corrosivos*, *lancinantes*, con hormigueo, y que se manifiestan ó se agravan *hácia la tarde.*—Dolores presivos y tractivos.—Afecciones periódicas.—Estremecimientos convulsivos. — Desvanecimientos. — *Erupciones vesiculosas* con secrecion serosa, ácre, amarillenta. —Úlceras tenaces.—*Insomnio* con agitacion y *anhelacion despues de media noche*, algunas veces con angustia y calor.—*Gana de dormir* por la tarde, con humor de mal estar y poca disposicion al trabajo.—Bostezos frecuentes despues de medio dia.—*Sueño incompleto* despues de media noche, con *ensueños angustiosos*, *horribles.*—Despierta temprano, con vigilia prolongada.—*Fiebre despues de media noche*, calor general y sed ardiente, con pulso lleno, blando, acelerado, seguido de sudor general, sobre todo en la frente.—Calofrios durante la comida.—Pulso muy frecuente con sensacion como si la arteria radial estu-

Digitized by Google

viera muy débil.—Horripilacion por la tarde con sed y presion alrededor de la frente.—Sensacion de frio por la mañana despues de levantarse, que parte desde la nuca y baja á lo largo del dorso.—Calor por la tarde, sobre todo en la cara, y seguido de sudor con abatimiento.—*Pereza é ineptitud para el trabajo*, por la mañana y por la tarde.—Tristeza, melancolía, por la tarde.—*Mucha distraccion* y disposicion á olvidar las cosas.

Cabeza.—Vértigo con pérdida de las ideas.—Cefalalgia como si la cabeza estuviera comprimida con una venda.—*Presion corrosiva*, tractiva, calambroídea, sorda, ocupando por lo regular un punto muy limitado del vértice.—Presion compresiva y expansiva, en las sienes.—Pesadez y *sensacion de plenitud en la cabeza, que parece estar hinchada* y mas voluminosa.—Contraccion de los tegumentos de la cabeza.—Escozor y prurito en la piel del cráneo.

Ojos y oidos.—Dolor en los ojos moviéndolos prontamente.—*Presion en el globo de los ojos*, con frecuencia.—*Escozor en el ángulo de los ojos*, de tiempo en tiempo.—Ojos convulsos.—Lagrimeo.—El blanco de los ojos de un amarillo claro, con inyeccion de las venas y aglutinacion de los párpados.—*Otalgia*, con presion en la cabeza y traccion en los dientes.—Tracciones, punzadas y terebracion al exterior del conducto auditivo.

Cara y dientes.—Escozor y hormigueo en la nariz.—Picazon en la punta de la nariz.—Estornudo frecuente.—Mucosidades serosas, abundantes, en la nariz.—Cara que parece está cubierta de telas de araña.—*Traccion en la cara, con sensacion de frio.*—Estremecimientos en la cara.—*Frecuentemente calor fugaz á la cara.*—Mancha roja en el lado del ala derecha de la nariz, sobre la que se forma una pequeña vesícula con dolor de excoriacion.—Sensacion de temblor alrededor de las comisuras de los labios, y del labio inferior.—Dolores de muelas lancinantes y embotamiento de los dientes.—*Tracciones con estremecimiento* y lancinantes *en los dientes.*—Hinchazon roja y dolorosa, y facilidad á dar sangre las encías.—Hormigueo en algunos raigones, como si estos estuvieran comprimidos por afuera.

Boca y garganta.—Sequedad de la boca.—Salivacion espumosa.—*Lengua cubierta de una capa blanca.*—Infla-

Digitized by Google

macion de la lengua con sensacion ardiente y rubicundez.—Descamacion y úlceras en la lengua.—Contraccion con estrangulacion de la garganta, que se agrava comiendo pan.—*Sensacion ardiente y arañamiento en la garganta.*—Hinchazon de las amígdalas, con *lancinaciones.* —Escozor y punzadas en la garganta.—Mucosidades espesas en la garganta, difíciles de arrancar por la expectoracion.—Necesidad frecuente de tragar en seco.

Estómago.—Sabor dulce, por la mañana, con lengua blanca, muy cargada.—*Sensacion de hambre*, sin apetito, á veces con erutos.—Anorexia.—Despues de la comida, emision de gases, ó deposiciones líquidas.—*Erutos con gusto de los alimentos*, despues de la comida.—*Erutos vacíos*, frecuentes, sobre todo despues de haber comido tostadas con manteca.—Erutos ágrios, rancios por la tarde.—*Náuseas* sobre todo despues de media noche, ó por la mañana, *con gana de vomitar.*—Dolores de estómago los mas violentos, con inquietud.—*Sensacion de plenitud, de presion* y de tension en el *epigastrio*, agravada por la presion exterior, con exacerbacion por la mañana.—Dolores contractivos en el estómago.—Lancinaciones en el epigastrio.—*Dolor de excoriacion y sensacion ardiente en el epigastrio.*—(Inflamacion del estómago).

Vientre.—Presion sorda en la region hepática, agravada respirando profundamente.—*Lancinaciones en la region hepática.*—Punzadas en la region del bazo, agravadas respirando profundamente.—Punzadas, sacudidas y presion en la region lumbar.—Dolores abdominales, con accesos de desvanecimiento.—*Presion* sorda como por una espina, ó sensacion de torcedura *detrás del ombligo*, por la noche ó por la mañana.—Dolores abdominales calambroideos.—Pellizcos y retortijones en el vientre.—Estremecimiento en el vientre.

Deposiciones.—Partes genitales.—Deposiciones retardadas.—*Conato urgente y frecuente de deponer, con deposicion blanda.—Necesidad frecuente*, sin mas resultado que la emision de gases.—Prurito en el ano, como por hemorróides, con sensacion como si el ano estuviera oprimido por fuera.—Resudacion por el ano.—Diarrea serosa y fétida.—*Necesidad frecuente de orinar*, con emision poco abundante de orinas claras.—Sensacion de ardor en la uretra despues de haber orinado.—Emision de al-

Digitized by

gunas gotas despues de orinar.—Estirones en el miembro.—Lancinaciones en el glande.—Escozor en el escroto.—Poluciones.

Pecho.—Tos corta, seca, rara y sin esfuerzo.—Respiracion difícil y profunda.—Suspiros involuntarios.—*Dolor de quebrantamiento en el pecho*, con sensacion de fatiga en esta parte, sobre todo por la tarde.—Presion en el pecho.—*Pellizcos y punzadas en el pecho y la region del corazon*, algunas veces con suspension de la respiracion, sobre todo por la tarde ó por la noche.—Roimiento detrás del esternon, que suspende la respiracion.—*Sensibilidad dolorosa en el exterior del pecho*, sobre todo en el esternon.—Palpitaciones de corazon, mas frecuentes.—Presion como por un clavo en la region del corazon.

Tronco y miembros.—Dolor de quebrantamiento y de parálisis en los riñones.—Picazon y hormigueo en el dorso y en el pecho.—Excoriacion de la piel en el sobaco derecho.—*Punzadas* terebrantes *en el antebrazo*, y hasta los dedos.—Terebracion en los huesos de las manos.—Sensacion como si royeran en las palmas de las manos.—Sensacion de corrosion, terebracion y estremecimientos lancinantes en los huesos de los dedos.—Hinchazon de los dedos.—*Sensacion de corrosion y terebracion* en todos los puntos de las piernas y de los piés, sobre todo, en los dedos de estos.—*Punzadas* con estremecimiento y hormigueo en los dedos pulgares de los piés.—Lancinaciones y dolores ardientes en los callos de los piés.

161.—RAPHANUS SATIVUS.

RAPHAN.—Rábano.—Dr. Nusser.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Duracion de accion:* de 1 á 15 dias.
ANTÍDOTOS?

SINTOMAS GENERALES.—*Considerable laxitud y abatimiento*, con quebrantamiento á veces en todos los miembros; el niño se echa de dia por sentirse enfermo; enflaquecimiento visible.—*Piel* generalmente madorosa; sensacion de ardor pasajero en varios puntos; olor de rábano en todo el cuerpo.—*Gana de dormir*; *somnolencia*

Digitized by

casi todo el dia, con humor regañon, soñando; sueño agitado, con desvelo frecuente, cefalalgia, náuseas y pellizcos en la region umbilical; sueño con desvarios; insomnio desde las once de la noche hasta las dos de la mañana; despues sueño agitado, con atontamiento de la cabeza, frio en las rodillas y en los piés; sueño solamente hasta las tres de la mañana, con ensueños inquietos; despierta á las tres de la mañana, con horripilacion violenta en el dorso y en los brazos; *durante el sueño sudor abundante*, ó bien murmullo ligero, como si conversara con sus amigos.—*Horripilacion, sobre todo á lo largo del dorso, y en la parte posterior de los brazos*, y en particular despues de beber agua fria; *horripilacion* frecuente, con calor interior en la cabeza y general en la piel; **despues de la horripilacion calor interior*, ó bien alternando la horripilacion con el calor; *frio* por la tarde en la cama, con debilidad en las articulaciones, sobre todo las del codo, y seguida de sudor muy abundante; frio interior con piel caliente y húmeda; quejándose continuamente de frio, mientras que la piel está constantemente ardiente al tacto; *sudor* con olor al medicamento (lo mismo el aliento); sudor abundante durante el sueño, sobre todo hácia la mañana. — Pulso pequeño y un poco duro; pulso algo frecuente y duro; pulso lento.—**Moral: excesiva angustia, con miedo de la muerte, que se cree próxima*, y se piden los socorros de la religion.

Cabeza.—Dientes.— Atontamiento de la *cabeza* por la mañana al despertar, con dolor sordo en la frente; vértigo con turbacion de la vista; dolor violento en la frente; *presion en la frente*, algunas veces, y sobre todo por la noche, ó con pesadez de la cabeza; presion encima de los ojos con oscurecimiento de la vista, que se disipa despues del vómito; presion por encima de la raiz de la nariz; punzadas en el vértice; sudor en la cabeza, despues de levantarse. —*Ojos* hundidos, con rubicundez, edema del párpado inferior; *pupilas* un poco dilatadas; vista mas fuerte y mas larga en un miope.—En el *oido* izquierdo dislaceracion y punzadas que parece estar en los huesos; punzadas en el oido derecho; prurito en la concha de la auricula izquierda, la que está dolorosa al tacto.—**Obturacion de la nariz.*—Olor á rábano; *estornudo* frecuente ó al menos necesidad frecuente de estornudar.

Digitized by Google

—*Cara* roja, sombría, *descompuesta* con nariz afilada y mejillas amarillas ó bien con los ojos hundidos y color lívido, hasta el punto de inspirar miedo á sí mismo; cara pálida con rasgos angustiosos y que denotan una gran debilidad y muchos sufrimientos; color amarillo, sobre todo por la mañana despues de levantarse; dislaceraciones en la mejilla derecha; infarto é induracion de las *glándulas submaxilares*.—*Odontalgia* lancinante en los dientes molares izquierdos.

Boca.—Vómitos.—*Lengua blanca, *cubierta de una capa espesa y blanca*; ¯palidez y rubicundez azulada de la lengua con surco profundo y puntos de un rojo pálido en su parte media (al principio de la mejoría).—*En la garganta calor y sensacion de ardor* algunas veces, y sobre todo en las amígdalas y con punzadas, hinchazon, rubicundez y dolor en las amígdalas como si estuvieran en carne viva, *mucosidades abundantes en la garganta*, como en un catarro bronquial; expectoracion abundante de mucosidades blancas y muy viscosas, procedentes de la faringe y el esófago, por la mañana, á consecuencia de un sueño pesado y con dolor de excoriacion en la garganta.—*Gusto* de rábano; *gusto insípido; *gusto *amargo*; ¯muy mal gusto; sabor como á pimienta.—**Anorexia*; ¯repugnancia á los alimentos y al tabaco en polvo (los que lo usan); en la anorexia mucho deseo de lecho caliente.—*Sed continua y excesiva.—*Eructos* frecuentes, con gusto pútrido.—*Náuseas* por accesos con disposicion á desvanecimientos, de suerte que, á pesar de la extremada debilidad, se tiene que sentar, no pudiendo permanecer acostado; decaimiento del estómago.—**Gana de vomitar*, **frecuente*, á veces á cada momento, ¯con pérdida de la vista y del oido á veces á cada momento; *gana de vomitar*, ¯con oscurecimiento de la vista y del oido, y regurgitacion de agua y de mucosidades que á veces contienen estrías de sangre; conato al vómito en tosiendo con presion en el pecho y regurgitacion de mucosidades ácidas y sin color.—**Vómitos*: ¯violentos de los *alimentos y de mucosidades blancas*, algunas veces con arcadas violentas, considerable presion en el pecho, y frio; °*vómitos* de mucosidades y de bilis; ¯*vómitos* de un líquido verde y muy amargo, despues de una agua clara; horripilacion en el dorso y brazos antes de vomitar; °*vó-*

Digitized by Google

mito negro (morbus niger), °*vómito de materias estercoráceas* (miserere)?

Estómago.—Partes genitales. —°*Dolores de estómago*, que obligan á comer constantemente, excesiva presion en el estómago, así como en la boca de este; punzadas y picotazos en la boca del estómago y en el estómago.—*En la region hepática*, punzadas, ó bien presion con dolor de excoriacion.—*Pellizcos en el vientre*, sobre todo en la *region umbilical*, algunas veces con punzadas y presion en el lado derecho del ombligo; retortijones violentos y punzadas en la region umbilical despues de desayunarse, sobre todo al lado derecho; sensacion de calor en el vientre, particularmente en la region umbilical; sensacion de ardor encima del ombligo; timpanitis y plenitud de vientre, seguida de pellizcos como antes de la deposicion; *borborigmos en el vientre*, sobre todo por la noche, ó bien cada vez que se vomita; emision de gases por la boca y el ano, con olor al medicamento, en particular despues de haber bebido agua; **retencion y desarrollo de gases por mucho tiempo* (síntoma característico).—*Necesidad de deponer*, muy frecuente sobre todo al medio dia; **deposiciones frecuentes, liquidas y abundantes*, las que son *violentas* algunas veces, y de un color amarillo oscuro, ó bien *parduscas y espumosas* (tambien característico); °*diarreas crónicas, verdes, liquidas*, mezcladas de mucosidades y de sangre; ¯*lienteria*.—*Orina* poco abundante, ó bien **con mas abundancia que la cantidad de liquido que se ha bebido*; ¯necesidad de orinar con emision poco abundante: tarda mucho tiempo en orinar, á pesar de los esfuerzos; orina pálida, de un amarillo súcio, con sedimento parecido al del poso de la cerveza; °orina turbia con ardor en la uretra al orinar.—En el *testículo* derecho tirones y dislaceracion, y despues en la planta del pié derecho.

Laringe, pecho y extremidades. — *Tos* con abundante acúmulo de mucosidades en la garganta como en un catarro bronquial.—El aliento que exhala tiene el olor al medicamento.—*Dolores en el pecho*, sobre todo comiendo y tosiendo, mas no en bebiendo; *dolores* presivos y lancinantes, desde la boca del estómago hasta el hoyuelo del cuello, y á veces hasta el dorso; calor exterior en la mama derecha; palpitaciones de corazon rápidas y vio-

Digitized by Google

lentas.—*En el dorso*, sensacion de ardor prurítoso, dislacerante en los lomos al bajarse; picotazos en el hueco de la axila izquierda.—Temblor en los *miembros*.—En *los brazos*, punzadas en la articulacion cúbito radio-humoral izquierda, como en los huesos, debilidad, dislaceracion, y picotazos en la muñeca derecha.—En la *pierna* izquierda, sensacion de parálisis, estando acostado; frio en las rodillas y en los piés, con gana de dormir y atontamiento en la cabeza, dolor sordo en la frente y conato al vómito; calambre en la pantorrilla por la noche en la cama; dolor de dislaceracion en un lado del pié derecho; punzadas y hormigueo en la planta del pié derecho; *rubicundez é hinchazon* del talon derecho, con pellizcos violentos apoyando el pié y andando, formándose despues una ampolla llena de agua clara y un poco rojiza, que desaparece despues de levantarse de la cama.

162.—RHABARBARUM (RHEUM).

RHAB.—Ruibarbo.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 9, 50.—*Duracion de accion*: 2 á 3 dias en las enfermedades agudas.
ANTÍDOTOS: Camph. cham. n-vom.
COMPÁRESE CON: *Ars.* bry. carb-v. *cham. n-vom.* puls. rhus. samb. tart.

CLINICA.—Hasta hoy no se ha empleado este medicamento mas que contra:—*Diarreas* de los niños ó de las mujeres recien paridas; *Acedias*, *cólicos*, *insomnio y gritos de los niños*.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolor de las articulaciones*, durante el movimiento.—Dolores pulsativos.—Palpitaciones en los músculos, sobre todo alrededor de las articulaciones.—*Adormecimiento de los miembros* sobre los que se está echado.—Laxitud y *pesadez en todo el cuerpo*.

Sueño.—Sueño y bostezos.—*Sueño por la noche agitado, con anhelacion, gritos*, gemidos y ronquido, ó con estremecimientos convulsivos de los párpados, de los músculos de la cara y de los dedos, sobre todo *en los niños*.—Manos colocadas por encima de la cabeza, al dormirse

Digitized by Google

y durante el sueño.—Divagaciones nocturnas é inquietud en la cama, aun cuando se tienen los ojos cerrados. —Despues del sueño, dolores de cabeza y aturdimiento ó mucosidades fétidas, olor y gusto pútrido en la boca. —*Ensueños angustiosos*, *tristes* y vivos.

Fiebre.—Horripilacion sin frio exterior.—Alternativa de calofrios y calor con ansiedad y repugnancia para todo. —Calor en las manos y en los piés con el rostro fresco. —*Sudor excitado fácilmente por el menor ejercicio*, sobre todo en la frente y en la piel del cráneo.

Moral.—Indiferencia.—Pereza y aversion á la conversacion.—Humor apesadumbrado con llantos.—Deseo impetuoso de cualquier objeto.—Entorpecimiento de los sentidos como en un sueño incompleto.—Divagaciones.

Cabeza.—*Obnubilacion estupefaciente de la cabeza*, como despues de la embriaguez, con ojos prominentes.—Vértigo que hace caer de lado estando de pié.—Dolor de cabeza, como un aturdimiento, con ansiedad.—Dolores de cabeza presivos, sobre todo en el sincipucio, las sienes y el vértice.—*Pesadez de cabeza*, con calor y dislaceraciones.—Tension sorda y calambroídea en la cabeza.—*Pulsacion en la cabeza*; la que algunas veces sube desde el vientre.—Movimientos del cerebro bajándose.

Ojos.—Ojos lánguidos y abatidos, con dolor presivo, sobre todo fijándolos en un objeto con perseverancia.—Presion y tirones en los párpados.—Escozor en los ojos como por efecto del polvo.—*Pulsaciones dolorosas en los ojos.*—Estremecimiento convulsivo de los párpados.—Lagrimeo, sobre todo al aire libre.—Pupilas contraidas.

Oidos y nariz.—Otalgia con prurito en la oreja.—Presion y *pulsacion en los oidos.*—Embotamiento del oido, como por laxitud del timpano, con ruido sordo en los oidos.—Traccion con aturdimiento en la raiz de la nariz y hasta la punta de esta con hormigueo en dicha parte. —Sensacion de calor en la nariz.

Cara y dientes.—Tension en la piel de la cara.—Frunciemiento y contraccion de los músculos de la frente.—Sudor fresco en la cara, sobre todo en los labios y en la nariz.—Estremecimiento de las comisuras de los labios. —Dolores con sensacion como si escarbaran en los dientes cariados.—Sensacion dolorosa de frio en los dientes.

Digitized by Google

Sensacion de entorpecimiento é insensibilidad de la lengua.—Contraccion de la faringe.

Estómago.—Pérdida del gusto.—*Gusto insulso, pastoso ó ágrio.*—Amargor de los alimentos.—*Deseo de diversos alimentos, que repugnan, sin embargo, al primer bocado.*—Aversion á los alimentos grasos ó insípidos.—Repugnancia al café (sin azúcar).—Hambre sin apetito.—*Náuseas*, como provenientes del vientre, con cólicos.—*Plenitud de estómago* con presion como por saburra.—Contraccion en el estómago.—Punzadas y *latidos en la boca del estómago.*

Vientre.—*Timpanitis con tension.*—Presion en la region umbilical.—*Retortijones en el vientre que obligan á doblarse sobre sí mismo*, frecuentemente poco despues de la comida, agravándose estando en pié.—Encarcelacion de flatuosidades con presion y tension en el pecho.—Palpitacion y temblor en los músculos abdominales.

Deposiciones.—*Conato frecuente y urgente de deponer, sin resultado*, agravado por el movimiento y el andar.—**Deposiciones diarréicas*, generalmente *de olor ácido*, líquidas ó de consistencia de papilla, *precedidas y seguidas* de tenesmo, con *pellizcos constrictivos en el vientre*, y horripilacion durante la evacuacion.—*Diarreas* grises ó pardas, *mezcladas de mucosidades.*—°Diarrea abundante con vómitos y mucha debilidad.

Orinas.—*Secrecion mas abundante de orinas.*—Orina roja ó amarillo verdosa.—Debilidad de la vejiga; la orina no puede ser evacuada sin esfuerzo.—Sensacion ardiente en la vejiga.—Orinas ardientes.

Pecho.—Disnea respirando profundamente, como por un peso sobre el pecho.—Lancinaciones en el pecho.—Palpitacion de los músculos del pecho.—Dolores y lancinaciones en los pezones.—Leche amarga y amarilla.

Tronco y miembros.—Rigidez en los riñones y en las caderas, que no permite tenerse en pié.—Lancinaciones en los brazos.—Dolores de dislaceracion en los brazos, los antebrazos y las articulaciones de los dedos.—Estremecimientos en los brazos y en las manos.—Palpitaciones musculares en las articulaciones de los codos.—Venas tumefactas y calor en las manos.—Sudor, algunas veces frio, en la palma de las manos.—Estremecimientos en los dedos.—Mucha laxitud en los muslos.—Estreme-

Digitized by

cimiento en los músculos de los muslos.—Adormecimiento de las piernas cuando están cruzadas.—Palpitaciones musculares en las corvas, en las piernas y en los dedos de los piés.—Rigidez de la corva, con dolor durante el movimiento.—Punzadas en las rodillas y en las piernas.

163.—RHODODENDRON CHRYSANTHUM.

RHOD.—Rosal de flores blancas; Rosa de Siberia; Oleandro de flores blancas.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 12, 18, 30.—*Duracion de accion*: 4 á 6 semanas en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. c'em. rhus.

COMPÁRESE CON: *Calc.* canth. *carb-an. carb-v. clem.* lyc. n-vom. *rhus.* sep. sil. sulf.

CLINICA.—Hasta ahora no se ha empleado este medicamento mas que contra *Afecciones artríticas*, una especie de *hidrocele* y una *induracion de los testículos*.

SINTOMAS GENERALES.—**Traccion reumática y artritica y dislaceraciones como en el periostio*, en los miembros, provocadas por un tiempo crudo y *agravadas durante el reposo*.—Dolores de luxacion y *tracciones con sensacion como si escarbaran en las articulaciones*, con rubicundez é hinchazon.—°*Nudosidades artríticas*.—*Inquietud*, *hormigueo*, debilidad y *sensacion de rigidez paralítica* en algunos miembros.—Mucho abatimiento y cansancio sumo despues del mas ligero ejercicio.—Hinchazones hidrópicas.—*Remitencia frecuente de los padecimientos*, y aparicion generalmente por la mañana.—**Los padecimientos son provocados ó agravados por un frio húmedo*, ó al acercarse *una tempestad*, como tambien estando en *reposo*.

Sueño.—*Mucha propension al sueño de dia, con sensacion de ardor en los ojos.*—*Sueño* profundo *antes de media noche*, despues de haberse dormido temprano, al principio de la noche.—*Insomnio despues de media noche.*—*Sueño por la mañana, turbado por una agitacion en el cuerpo*, y por dolores.

Digitized by Google

Fiebre.—Calofrios alternando con calor.—*Calor aumentado*, sobre todo en las manos.—Fiebre por la tarde con calor en la cabeza, frio en los piés, sensacion de ardor en los ojos y en la nariz, cansancio sumo y falta de sed, seguido de calor nocturno y de insomnio.—Sudor con prurito y hormigueo en la piel.—Sudor de olor aromático.

Moral.—Humor sombrío, moroso.—*Indiferencia* excesiva, con temor á todo trabajo y toda ocupacion.—Olvido excesivo.—Pérdida repentina de las ideas.

Cabeza.—*Cabeza atontada por la mañana despues de levantarse*, con sueño.—Embriaguez.—Vértigo con angustia.—Vértigo rotatorio en la cama como si la cabeza fuese á volverse hácia atrás.—*Dolores de cabeza provocados ó agravados por el vino*, ó por *un frio húmedo*.—Tension en la frente.—*Presion tractiva en el sincipucio y las sienes*, principalmente en los huesos.—Lancinaciones en el sincipucio y en los lados de la cabeza.—Dislaceracion en los huesos de la cabeza.—Pulsacion en la cabeza.—Sensibilidad dolorosa al exterior de la cabeza, como por ulceracion subcutánea.—Dolor como por contusion ó golpes en el occipucio.—*Prurito* corrosivo en *la piel del cráneo*, sobre todo por la tarde.

Ojos.—Punzadas presivas en los bordes de la órbita, con contraccion espasmódica de los párpados.—Presion en los ojos, que proviene de un lado de la cara.—*Sensacion de sequedad y ardor en los ojos*, alternativamente, sobre todo á la claridad viva del dia y mirando fijamente un objeto.—Aglutinacion de los párpados.—Temblor con estremecimiento de los párpados.—Contraccion de una pupila mientras que la otra está dilatada.—Turbacion de la vista leyendo ó escribiendo.

Oidos.—*Otalgia con dolores dislacerantes y que causan estremecimiento.*—Dislaceracion y terebracion en los oidos y cerca de las orejas.—Sensacion como si hubiese un gusano dentro del oido.—Zumbido sordo continuo en los oidos que se aumenta deglutiendo.

Nariz.—*Epistaxis.*—Olfato disminuido.—*Obturacion semilateral de la nariz* en su raiz, sobre todo por la mañana.—Coriza fluente con obturacion de *un* lado de la nariz, y pérdida del olfato y del gusto.—Secrecion de mucosidades nasales al aire libre, mas abundante que de ordinario.

Digitized by

Cara.—Horripilacion que recorre la cara.—Labios secos, quemantes.—Vesículas en los labios con dolor de excoriacion comiendo.

Dientes.—**Odontalgia con dislaceracion tractiva* en las muelas *por un frio húmedo* ó *un tiempo tempestuoso*, agravada por el contacto.—Odontalgia nocturna, con otalgia.—Prurito en las encías.—Hinchazon y dolor de excoriacion entre las encías inferiores y la mejilla.—*°Odontalgia artrítica, agravada por las bebidas frias y calientes*, y mejoradas por el calor exterior.—*°Terebracion en un diente*, con *punzadas hasta el oido*, reaparicion de los dolores *por un viento crudo de Este*, ó en primavera y en otoño, agravacion por la noche.

Boca y garganta.—Acumulacion abundante de saliva en la boca con sequedad en la garganta, y vesículas en la lengua que causan escozor.—Arañamiento en la garganta como por acúmulo de mucosidades.—Constriccion y *sensacion quemante en la garganta.*

Estómago.—Embotamiento del gusto.—Los alimentos no tienen sabor.—Sed aumentada.—*Pronta saciedad* con buen apetito, seguida de malestar.—*Náuseas* con gana de vomitar, *presion en el estómago* y flujo de agua por la boca, como pituitas, que se alivian con erutos.—*Presion en el estómago* por la noche, ó despues de haber bebido agua fria.—*Presion* contractiva en *la boca del estómago, con dificultad en la respiracion.*—Punzadas presivas en la boca del estómago y en los hipocondrios.

Vientre.—Dolores calambroídeos en los hipocondrios.—Tension en la region del bazo despues de haberse bajado.—*Punzadas en el bazo*, andando muy de priesa.—*Timpanitis*, sobre todo en la parte superior del vientre con sensacion de plenitud que dificulta la respiracion por la mañana y por la tarde.—Encarcelacion dolorosa de gases en los hipocondrios y los riñones.—Ruido confuso y borborigmos en el vientre, con erutos y expulsion de gases fétidos.

Deposiciones.—*Conato urgente de deponer con retardo de la deposicion.—Evacuacion difícil*, aun cuando esta sea blanda.—*Deposiciones de consistencia de papilla.*—Evacuaciones mucosas.—*Diarrea despues de haber comido frutas*, ó por un frio húmedo.—Pulsacion en el ano.—Traccion desde el recto hasta las partes genitales.

Digitized by Google

Orinas.—Gana muy frecuente de orinar, con traccion en la region de la vejiga y de las ingles.—*Orina mas abundante y fétida.*

Partes genitales.—Sensacion de excoriacion entre las partes genitales y los muslos.—Pulsacion y punzadas por debajo del glande.—*Traccion y dolor de contusion en los testículos*, y hasta en el vientre y los muslos.—*Testículos hinchados* y retraidos.—Prurito, sudor y *acortamiento del escroto.*—°Hinchazon trasparente del escroto como por hidrocele.—°*Induracion de los testículos.*—*Supresion de las reglas.*—Reglas muy adelantadas y muy abundantes.

Laringe.—*Catarro y ronquera* en la tráquea-arteria.—*Tos seca*, con estremecimiento, opresion de pecho y aspereza de la garganta, sobre todo por la noche y por la mañana.—Tos como si escarbaran, con expectoracion poco abundante de mucosidades.

Pecho.—*Presion en el pecho con dificultad de la respiracion.*—*Constriccion* opresiva *de pecho.*—Ondulacion caliente en el pecho y en el corazon.—*Congestion sanguinea en el pecho.*—Dolor de quebrantamiento al exterior del pecho.

Tronco.—*Dolores en el dorso*, y en los riñones, como de luxacion ó de quebrantamiento.—Traccion reumática y dislaceracion en el dorso y en las espaldas.—*Rigidez de la nuca.*—*Tension y traccion* reumáticas *en los músculos de la nuca y del cuello.*

Brazos.—*Dolores tractivos en los brazos*, á causa de un tiempo crudo.—Sensacion como si la sangre no circulara en los brazos.—Debilidad con hormigueo y pesadez en los brazos hasta la punta de los dedos durante el reposo.—*Tirantez y dislaceracion en los antebrazos y en las manos*, como en el periostio, *que se agravan durante el reposo.*—Dolor de luxacion en las articulaciones de las manos.—Calor de las manos aumentado.

Piernas.—Dolor de luxacion en la articulacion coxo-femoral y en la de las rodillas.—*Sensacion de frio y acortamiento de la piel* en algunas partes de las piernas.—Sudor en las piernas.—Hinchazon de las piernas y de los piés.—*Traccion y dislaceracion en las piernas y en los piés*, como en el periostio, sobre todo *durante el reposo.*—*Frio excesivo en los piés.*—Callos en los piés con dolor lancinante.

Digitized by Google

164.—RHUS TOXICODENDRON.

RHUS.—Arbol con veneno, zumaque venenoso.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* —Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion*: 3 á 6 semanas en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Bry. camph. coff. sulf.—*Se emplea como antídoto de:* Bry. rhod. tart.

COMPÁRESE CON: Alum. *amm.* ant. *arn. ars.* asa. *bell. bry.* calc. *caus.* cham. chin. *clem.* cocc. coff. con. cupr. *dulc.* graph. hyos. ign. iod. kal. lach. laur. led. *lyc.* magn. merc. mur-ac. natr. *nitr-ac.* n-vom. *phos. phos-ac.* plat. *puls. rhod. rut. samb.* sabad. *sep. sil. sulf. veratr.*—El rhus será eficaz siempre que por otra parte se halle indicado, sobre todo, despues de: *Arn. bry. calc-ph. cham. lach. phos. phos-ac. sulf.* — Despues de rhus conviene algunas veces: *Amm. ars. bry. calc. con. phos. phos-ac. puls. sulf.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—*Afecciones*, *sobre todo de los tendones*, *de los ligamentos y las membranas sinoviales*; *Falta de plasticidad en la sangre*, *con tendencia á la cesacion de la actividad orgánica hasta la parálisis*; Afecciones reumáticas con hinchazon; Inflamaciones locales con afecciones cerebrales; Afecciones raquíticas y escrofulosas; Infarto é induracion de las glándulas; Convulsiones y otros padecimientos á consecuencia de un baño frio; *Parálisis*; Hinchazones edematosas é inflamatorias; Atrofia; Exóstosis, cáries y otras afecciones de los huesos?; Herpes húmedos ó secos, ó liquenoides; *Penfigo*; *Inflamaciones erisepelatosas*, *sobre todo la erisipela vesiculosa*; *Zona*; *Petequias*; Ulceras; Verrugas; Escarlatina y sarampion, y afecciones á consecuencia de estas enfermedades; Prodromos de la viruela; *Malas consecuencias de una derrengadura*, *de una luxacion*, *de una conmocion y de otras lesiones mecánicas*, *sobre todo con padecimientos de las articulaciones y de las membranas sinoviales*, ó con sugilacion y extravasacion de sangre; *Fiebres intermitentes*, reumáticas, gástricas y *tifoideas*; Hipocondría; Melancolía; Cefalalgias nerviosas, histéricas y otras; Jaqueca; *Hidrocéfalo agudo* (segundo periodo); *Tiña*; *Oftalmías escrofulosas* (y artríticas)?; *Fotofobia escrofulosa*; Ambliopia amaurótica; *Parotitis*, aun á consecuencia de la escarlatina; Hemorragia nasal; *Erisipela en la cara*, *sobre todo la*

Digitized by Google

vesiculosa; *Costra láctea*; Odontalgia artrítica?; Anginas; *Afecciones gástricas*; Dispepsia aun con vómito de los alimentos; *Estrechez de la garganta* y *del esófago*; Cólicos inflamatorios; Enteritis; Ictericia; Diarreas y disenterías; Incontinencia de orina; Fiebre puerperal; Tumor blanco y loquios morbosos de las recien paridas; *Incomodidad á consecuencia del destete*, ó por la supresion de la leche; *Grippe*; Neumonía con síntomas tifoídeos y sed nocturna (despues del uso de *Acon y de Bry.*); Hemoptisis; Enfermedades del corazon; Dolores de riñones reumáticos, ó producidos por un enfriamiento; Coxalgia y luxacion espontánea; *Inflamacion erisipelatosa de los piés*; Edema de los piés aun á consecuencia de herpes repercutidos.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Traccion, tension y dislaceraciones reumáticas y artríticas*, en los miembros, *llevadas hasta el mas alto grado durante el reposo*, °así como por un mal temporal, *por la noche*, y al calor de la cama, frecuentemente con sensacion de torpeza y adormecimiento de la parte afecta, despues de haberla movido. —Calambres y tension en diversas partes, como por acortamiento de los tendones.—Contraccion de algunos miembros.—**Punzadas tensivas* y rigidez *en las articulaciones*, que se agravan al levantarse del asiento y al aire libre.—**Rigidez* paralítica *en los miembros*, sobre todo al empezar á mover la parte que estaba en reposo.—*Facilidad á adormecerse las partes del cuerpo que estaban en quietud.—*Entorpecimiento de algunas partes con hormigueo é insensibilidad.—**Hormigueo en las partes afectas.*—**Dolor de fácil luxacion en los miembros.*—**Parálisis*, algunas veces semilateral.—**Hinchazones rojas y lustrosas*, con dolor lancinante de excoriacion al tacto.—*Dolores de quebrantamiento, ó bien *sensacion como si la carne se hallara desprendida de los huesos* en algunas partes.—Tracciones presivas en el periostio, como si se *rasparan los huesos*.—Sensacion como si alguna cosa se arrancase en los órganos internos.—Hinchazon é induracion de las glándulas.—Ictericia.—Estremecimiento de los músculos y los miembros.—°Movimientos convulsivos y otros padecimientos despues de haber to-

Digitized by Google

mado un baño frio.—Afecciones semilaterales.—**Exacerbacion y aparicion* de los dolores y de los síntomas, *durante el reposo*; ó por la noche, así como entrando en la habitacion despues de haber estado al aire libre; *mejoría por el movimiento* y el andar.—°Reproduccion ó agravacion de muchos padecimientos durante un mal temporal.—Sobreexcitacion general del sistema nervioso, la cual se aumenta aunque sea por una ligera incomodidad.—*Tirones en todos los miembros estando acostado.*—Temblor de los miembros despues de la mas ligera fatiga.—Anda con poca seguridad.—**Mucha laxitud y debilidad con necesidad de acostarse.*—Accesos de desvanecimiento.—**Imposibilidad de poder soportar el aire libre*, caliente ó frio, el que impresiona dolorosamente la piel.

Piel.—Prurito por todo el cuerpo, principalmente en las partes cubiertas de vello.—*Inflamaciones erisipelatosas.*—*Erupciones urticarias.*—**Erupciones generalmente *vesiculosas*, *costrosas*, *con prurito ardiente*, que aparecen sobre todo en primavera y en otoño.—**Erupciones de pequeñas pústulas, sobre un fondo rojo como la zona.—°Ulceras gangrenosas, que resultan de pequeñas vesículas, con fiebre violenta.—°Petequias con excesiva debilidad, que ocasiona una postracion general.—Pústulas negras.—°Erupciones *dartrosas*, algunas veces alternando con padecimientos asmáticos y deposiciones disentéricas.—°*Verrugas*, principalmente en las manos y en los dedos.—Ragades en las manos.—Panadizos.—*Hormigueo* ó punzadas, ó bien escozor ardiente en las úlceras, sobre todo por la noche.—Sabañones.—Clavos en los piés con sensacion ardiente y dolor de excoriacion.—**Anasarca general*, *despues de la escarlatina.*

Sueño.—*Bostezos frecuentes*, *violentos*, *calambroideos.*—*Mucha propension al sueño por el dia*, y aun por la mañana en la cama.—**Somnolencia llena de desvaríos penosos é interrumpidos.—*Insomnio* sobre todo *antes de media noche*, y generalmente causado por una sensacion de calor, un hervidero de sangre y una inquietud que no permite estar echado.—**Sueño agitado con ensueños angustiosos y espantosos.*—°Coma somnoliento con ronquido, murmullos y carfologia.—Sueño impedido por ideas tristes.—Desvelo causado por amargor y sensacion de sequedad en la boca.—Sueño de la noche impedido por

Digitized by Google

una presion en el estómago, *pellizcos como si escarbaran en el vientre* y ganas de vomitar.—Imposibilidad de permanecer echado de costado, por la noche.—Sobresaltos con espanto y estremecimiento del cuerpo, durante el sueño.—Sueño incompleto y agitado, con ansiedad y afluencia de ideas penosas.—*Ensueños vivos de los negocios del dia*, con palabras durante el sueño.—Llantos estando dormido.—*Ensueños de incendios.*—Sueño con la boca abierta y respiracion corta.

Fiebre. —*Calofrios y frio* generalmente por la tarde y *acompañado de dolores por accesos y otros síntomas.*—*Calofrio tembloroso al aire libre*, con mucha sed.—Calofrios pasajeros, contínuos, como si estuviera dentro de un baño de agua fria.—Sensacion de frio por poco que uno se mueva.—Frio y palidez de la cara que alternan con calor y rubicundez.—Calofrios y calor alternativos, ya sean generales y semilaterales (calofrios interiores con calor exterior, y *vice-versa*), bien se sientan en partes diferentes.—**Fiebre por la tarde*, al principio, calofrios, despues *calor y sed* (y sudor), acompañada ó seguida de retortijones y de diarrea.—*Fiebres tercianas ó cotidianas.—**Fiebre terciana doble*, al principio calofrio con sed, despues calor general con calofrios al menor movimiento, y al fin sudor.—**Durante el calofrio dolor en los miembros*, dolores de cabeza, vértigo, odontalgia pulsativa con acumulacion de saliva en la boca, y gana de vomitar.—Durante el calor nocturno, tirones en todos los miembros.—Calor fugaz con sudor que parte de la region umbilical, y alterna bruscamente con calofrios. —*Durante ó despues de la fiebre*, *estremecimientos*, retintin en los oidos, sordera, coriza seca, insomnio con estrema agitacion, color ictérico y erupcion urticaria, presion en la boca del estómago, palpitacion del corazon con ansiedad, cólicos, diarrea y otras afecciones gástricas, sed nocturna.—°*Fiebres malignas con delirio locuaz, dolores violentos en todos los miembros*, *debilidad excesiva*, lengua seca ó negra, labios secos, parduscos ó negruzcos, calor y rubicundez de las mejillas, *carfologia*, pulso acelerado y pequeño, coma soñoliento, con ronquido y gemido.—Sudor durante los dolores.—Sudor estando sentado, frecuentemente con temblor violento.—*Sudor nocturno*, algunas veces con erupcion miliar y pruritosa.

Digitized by Google

—*Sudores por la mañana temprano*, algunas veces de olor ácido.—Sudor contínuo.

Moral.—**Tristeza ansiosa, y angustia mortal*, sobre todo *por la tarde y por la noche*, con deseo de estar solo, *y necesidad de llorar.*—*Agitacion* que no permite permanecer sentado.—*Angustia con temor de la muerte y suspiros.—Miedo de ser envenenado.—Manía de suicidarse.—Irritabilidad y mal humor con repugnancia á todo trabajo.—°Abatimiento moral con antropofobia.—*Inquietud por sus hijos, sus negocios, su porvenir, con falta de confianza en sí mismo.—Debilidad de la memoria y olvido.—Falta de ideas y de espíritu.—Lentitud en la marcha de las ideas, é inteligencia obtusa.—Errores de la imaginacion y visiones.—°*Delirios.*

Cabeza.—*Atolondramiento de cabeza como en la embriaguez.*—Estupor de la cabeza.—**Vértigo y vacilacion como si se fuera á caer*, sobre todo al levantarse de la cama.—Vértigo por la noche al acostarse con temor de morirse.—Dolores de cabeza inmediatamente despues de la comida, ó despues de haber bebido cerveza, é igualmente moviendo los brazos.—°Accesos de dolores de cabeza, con necesidad de acostarse; toda contrariedad y todo ejercicio al aire libre renueva los accesos.—°Dolores de cabeza periódicos.—*Dolor de cabeza, *como si el cerebro estuviera contundido*, sobre todo por la mañana, que se agrava moviendo ó elevando los ojos.—*Pesadez y plenitud presiva de la cabeza*, con sensacion *al bajarse*, como si el cerebro fuera á estallar.—Sensacion de compresion ó de espansion en la cabeza.—Tracciones y dislaceraciones en la cabeza, y sobre todo en las sienes, principalmente por la tarde y por la noche.—°*Dolores de cabeza lancinantes* dia y noche hasta en los oidos, la raiz de la nariz y los pómulos, con dentera.—Latidos y pulsaciones en la cabeza, sobre todo en el occipucio.—Dolores, especialmente en las protuberancias occipitales.—Congestion sanguínea en la cabeza.—Sensacion ardiente, sobre todo en la frente y en el occipucio.—**Hormigueo doloroso en la cabeza.*—Zumbido y ruido en la cabeza.—*Distension como por gases y sensacion de fluctuacion en la cabeza* á cada paso que se da, *como si el cerebro vacilara.*—Sensibilidad dolorosa en el exterior de la cabeza, como por ulceracion subcutánea, sobre todo al peinarse hácia

Digitized by Google

arriba, y al tacto.—Contraccion en la piel del cráneo, como si se arrancaran los cabellos.—Traccion y dislaceracion en la piel del cráneo.—*Hinchazon de la cabeza.*—Hormigueo corrosivo en la piel del cráneo.—°*Herpes secos en la piel del cráneo.*—°*Tiña* periódica que reaparece todos los años.—°*Tiña* de costras gruesas, *que destruyen los cabellos con pus* verdoso *y prurito* violento *por la noche.*—Tuberosidades blandas en la piel del cráneo, de pequeño volúmen.

Ojos.—*Dolores en los ojos, moviéndolos.—Presion y sensacion ardiente en los ojos.—°Ojos fijos, empañados y abatidos.—Escozor en los ojos y en los párpados.—**Inflamacion de los ojos y de los párpados*, con *rubicundez y aglutinacion nocturna.*—Lagrimeo abundante con hinchazon edematosa alrededor de los ojos.—°Fotofobia.—Hinchazon de los párpados.—*Hinchazon de todo el ojo y de las partes que le rodean.*—Orzuelo en los párpados.—Rigidez paralítica de los párpados.—Estremecimiento y conmocion de los ojos y de los párpados.—Como un velo delante de los ojos y debilidad de la vista; todos los objetos parecen pálidos.—**Ambliopia por la supresion de la transpiracion habitual de los piés*, con sensacion de un velo delante de los ojos.

Oidos.—Otalgia.—Latidos dolorosos en el oido, por la noche.—Hinchazon de las orejas.—°Flujo de pus sanguinolento por los oidos con sordera.—**Hinchazon é inflamacion de las parótidas* con fiebre.

Nariz.—Rubicundez de la raiz de la nariz, con *dolor de excoriacion* al tacto.—Hinchazon de la nariz.—°Sequedad de la nariz.—°Flujo de pus verdoso, fétido, por la nariz.—**Epistaxis*, aun *por la noche y bajándose* ó sonándose.—Estornudos frecuentes, violentos, casi calambroídeos.—Secrecion abundante de mucosidades nasales sin coriza.

Cara.—**Rostro pálido*, enfermizo, macilento, con los ojos rodeados de un cerco azul y nariz afilada.—*Semblante desfigurado, convulso.—*Cara roja con calor quemante.—**Inflamacion erisipelatosa é hinchazon de la cara*, con punzadas presivas y tensivas, y hormigueo ardiente.—**Erisipela vesiculosa* con serosidad amarilla en las vesículas.—°*Erupciones húmedas y costras espesas en la cara* con exudacion de serosidades fétidas y sanguinolentas.—*Erupcion en la cara como el acné rosa.—Erupcion her-

Digitized by Google

pética costrosa alrededor de la boca y la nariz con estremecimiento pruritoso y sensacion quemante.—Descamacion de la piel y de la cara.—Contracciones incisivas y dolores calambroídeos quemantes en las mejillas (con calor y dureza de estas últimas).—°Sudor frio en el rostro.—Erupcion de granos quemantes alrededor de los labios y de la barba.—Dolor calambroídeo en la articulacion de las mandíbulas con crujido al menor movimiento.—°*Calambres en la mandíbula.*—Hinchazon dura y dolorosa de las glándulas sub-maxilares.—*Labios secos, de un color moreno.

Dientes.—**Odontalgia* como por excoriacion, ó con *dolores dislacerantes*, *punzadas*, *estremecimientos* y como si escarbaran y *hormigueo*, con frecuencia *por la noche*, ó agravada al aire libre y *aliviada por el calor exterior*, algunas veces tambien á consecuencia de un enfriamiento.—Vacilacion de los dientes.—Exhalacion de un olor fétido en los dientes cariados.—Dolor de excoriacion quemante en las encías aun por la noche.

Boca.—*Sequedad de la boca con mucha sed.—*Acumulacion abundante de saliva en la boca.—Fluye por la noche de la boca una saliva amarilla*, y aun á veces sanguinolenta.—Acumulacion abundante de mucosidades viscosas en la boca, con expuicion frecuente.—*Lengua seca, °roja ó pardusca.—Sensacion como si la lengua estuviera cubierta de una piel.

Garganta.—Ligera inflamacion de la garganta como por hinchazon interior, con dolor de contusion, aun solo por hablar, y con *presion y punzadas durante la deglucion.*—Sensacion en la garganta como si se desprendiese alguna cosa.—**Dificultad de tragar y dolor al ingerir los alimentos sólidos, como por estrechez de la garganta y del esófago.*—El aguardiente causa una sensacion extraordinariamente quemante en la garganta.—Abundante acumulacion de mucosidades en la garganta, con ruido muy estrepitoso y frecuente de estas, por la mañana.—Dolor pulsativo en el fondo de la garganta.

Apetito.—*Gusto pútrido*, sobre todo por la mañana y despues de la comida.—Sabor soso, pastoso ó ácre, de una acidez amarga ó metálica.—Sabor dulce en la boca.—*Gusto amargo de los alimentos*, sobre todo *del pan*, que parece áspero y seco.—**Falta total de apetito, con repugnan-*

cia á todos los alimentos, sobre todo *al pan*, *la carne*, el café y el vino. —Sensacion de plenitud y de saciedad en el estómago, que quita todo apetito.—*Despues de la comida mucha gana de dormir*, presion y *plenitud en el estómago* y en el vientre, náuseas con gana de vomitar, laxitud, vértigos y horripilacion.—El pan hace peso en el estómago.—Dolor y calor en la cabeza despues de haber bebido cerveza.—**Sed*, lo mas frecuente *por una sensacion de sequedad en la boca*, aun por *la noche* ó por la mañana, con deseo principalmente de agua ó leche fria.—Mucho deseo de comer golosinas.

Estómago.—Erutos con gusto á los alimentos.—Erutos en seco despues de la comida ó de haber bebido.—*Erutos violentos con sensacion como si escarbaran en el estómago*, aliviados estando acostado, renovándose siempre que uno se incorpora.—Pituitas del estómago.—*Náuseas y conato al vómito*, principalmente despues de la comida y despues de haber bebido, como tambien por la noche ó por la mañana, despues de levantarse; se alivian echándose.—Vómito inmediatamente despues de haber comido.—°*Vómitos frecuentes* como en el cólera, con *frio general* y *disminucion de la circulacion sanguinea*.—**Dolores en el estómago como si contuviera piedras*, sobre todo despues de la comida.—**Presion en el estómago y en la boca de esta viscera*, frecuentemente con dificultad de la respiracion. —*Palpitacion y punzadas en la region epigástrica.—°Apretamiento, sensacion de hinchazon y *dolor de ulceracion en la boca del estómago*.—Sensacion de frio en el estómago.—Sensacion en la boca del estómago, como si de ella se hubiera desprendido algo, sobre todo al bajarse ó cuando se tropieza con el pié.

Vientre.—*Timpanitis, sobre todo despues de la comida. —Pesadez presiva en el vientre como por algun cuerpo pesado sobre él.—*Calambres abdominales*, contractivos, que obligan á estar encorvado.—Contraccion dura y visible del vientre á través del ombligo.—Sensacion como si alguna cosa diera vueltas en el vientre (como un gusano).—Dislaceraciones incisivas, estremecimientos y *pellizcos en el vientre*.—Sensacion ardiente en el vientre.—Laxitud en el vientre con estremecimiento interior á cada paso que se da.—°*Cólicos violentos*, con frecuencia *por la noche*, ó agravados por cualquier bebida ó alimento, á

Digitized by Google

veces con deposiciones sanguinolentas.—Sensacion en el vientre como si alguna cosa se desprendiera de él.—°Rubicundez de color escarlata en el bajo vientre.—Tegumentos del vientre doloridos, como si estuviesen ulcerados, sobre todo por la mañana estirándose.—Presion hácia el exterior de las ingles como si fuera á presentarse una hernia.— Emision abundante de gases con ruido sordo, fermentacion y movimientos punzantes en el vientre.—Ventosidades muy fétidas.

Deposiciones.—*Estreñimiento, que algunas veces alterna con diarrea.—Evacuaciones duras y tardas.—**Tenesmo*, algunas veces con náuseas y dislaceraciones, ó pellizcos en el vientre.—**Deposiciones diarréicas*, *sanguinolentas*, *serosas* ó *mucosas*, espumosas, gelatinosas, rojas ó estriadas de blanco y de amarillo.—**Diarreas tenaces* ó disentéricas, como tambien á consecuencia *de afecciones de las glándulas del mesenterio*.—Deposiciones del todo blancas.—°*Diarreas nocturnas* con cólicos violentos, cefalalgia y dolores en todos los miembros.— Evacuaciones involuntarias estando dormido por la noche.—Durante la deposicion, respiracion corta.—Hormigueo y prurito en el ano y en el recto.—Despues de una deposicion blanda, salida de los granos hemorroidales del ano con dolor de excoriacion.

Orinas.—°Retencion de orina.—**Conato urgente y frecuente de orinar*, dia y noche *con flujo mas abundante*.—°*Incontinencia de orina*, sobre todo durante el reposo.—°Emision gota á gota de orina de color rojo de sangre, con tenesmo.— Emision de orina disminuida, aunque se beba mucho.—Orina oscura que se enturbia prontamente.—Orina de un blanco turbio.—Orina clara como el agua, con sedimento de un blanco como la nieve.— Tumefaccion de la uretra.—Chorro de orina doble.

Partes viriles.—Erupcion muy considerable en las partes genitales.—Inflamacion del glande.—Vesículas fluentes en el glande.—*Inflamacion del glande y del prepucio*.—Parafimosis del prepucio.—Mancha roja en la cara interna del prepucio.—Inflamacion y espesor del escroto.—Erupcion húmeda en el escroto.—Erecciones frecuentes por la noche con conato á orinar.— Mucha propension á la eyaculacion por la mañana.

Reglas.—Reglas muy adelantadas y muy abundantes.

Digitized by Google

—Reglas de muy larga duracion.—°Flujo de sangre durante la preñez.—Dolor de excoriacion y punzadas en la vagina.—Flujo de sangre y de coágulos por la matriz, con dolores de parto.—Disminucion de la secrecion de la leche.

Laringe.—Ronquera y aspereza en la garganta, con sensacion en el pecho como si estuviera en carne viva.—Sensacion de frio en la garganta al respirar.—Disposicion á la asfixia.—Exhalacion quemante en la laringe.—Sensacion de constriccion en el hoyuelo del cuello despues de un corto paseo.—*Tos provocada por un cosquilleo en las vias aéreas*, generalmente *corta y seca*, con angustia y respiracion corta, y principalmente *por la noche antes de media noche.*—Tos con vómito de los alimentos, sobre todo por la tarde y estando acostado sobre el dorso.—*Tos por la mañana despues de despertarse.*—Tos corta con amargor de boca por la noche despues de acostado, y por la mañana despues de despertarse.—Tos con dolor de estómago ó con sacudidas en el pecho y en la cabeza.—°*Tos con expectoracion de una sangre* de color rojo vivo, y sensacion de desabrimiento en el pecho.—**Tos como de grippe por la noche, despertando á consecuencia de ella*, con *expectoracion blanquecina*, *difícil*, *por la mañana*, mucha debilidad, angustia, respiracion profunda, inquietud de cuerpo con necesidad constante de cambiar de posicion, °*grippe á consecuencia de un frio húmedo.*

Pecho.—Respiracion difícil despues de una marcha moderada.—*Opresion angustiosa de pecho*, aun por la noche.—Respiracion difícil por presion y apretamiento en la boca del estómago.—Respiracion corta por la tarde con tension en el pecho.—Necesidad frecuente de respirar profundamente.—Debilidad de pecho despues de un paseo al aire libre, la que difícilmente permite hablar.—Sensacion de constriccion en el pecho.—**Punzadas y lancinaciones en el pecho y en los costados de este*, ¯sobre todo estando sentado, encorvado, hablando, respirando profundamente, rara vez andando ó haciendo movimientos fuertes.—*Hormigueo en el pecho*, con tension en los músculos de este y agravado por el reposo.—Congestion sanguínea en el pecho.—°Debilidad *y sensacion de temblor en el corazon.*—Latido violento en el corazon estando sentado tranquilamente.—*Punzadas en la region del cora-

Digitized by Google

zon con sensacion dolorosa de parálisis y entorpecimiento del brazo izquierdo. — Frio en el dorso, de poca duracion.

Tronco. — **Dolor de quebrantamiento en los riñones*, sobre todo al tacto y durante el reposo.—Rigidez dolorosa en los riñones.—*Exóstosis dolorosa en el sacro.—°Desviacion de la columna vertebral.—**Dolores en los riñones, en el dorso y en la nuca, como si hubiera sufrido una derrengadura.*—Traccion y punzadas en el dorso, sobre todo estando sentado y doblándose hácia adelante.—Dislaceracion reumática entre los omóplatos, agravada por el frio, aliviada por el calor.—°*Emprostótonos*.—*Rigidez* reumática *de la nuca* y del cuello, con tension dolorosa durante el movimiento.—Hinchazon dolorosa de las glándulas axilares.

Brazos.—°*Dislaceracion y sensacion ardiente en la espalda*, con *parálisis del brazo*, sobre todo durante un mal temporal, *estando en reposo* y con el calor de la cama.—**Frio, parálisis é insensibilidad de los brazos*.—°Exóstosis en el brazo, con sensacion quemante y úlceras que dan un pus sanioso.—**Hinchazon erisipelatosa* y pústulas con prurito quemante, *en los brazos*, en las manos y en los dedos.—Manchas rojas en los brazos.—Estremecimiento, punzadas y dislaceraciones en los brazos.—Dislaceracion con estremecimiento en los codos, las muñecas, y en las articulaciones de los dedos.—Como si escarbaran en los huesos del antebrazo.—Debilidad y rigidez de los antebrazos y de los dedos durante el movimiento y temblor de estas partes al menor esfuerzo.—Hinchazon caliente de las manos por la tarde.—Erupcion vesicular confluente en la muñeca.—*Escozor en el dorso de las manos*.—°*Verrugas en las manos y en los dedos*.—Hinchazon de los dedos.—Estremecimiento de los pulgares.—Contraccion de los dedos.

Piernas.—*Punzadas y dislaceracion en la articulacion coxo-femoral* hasta la cabeza, sobre todo apoyándose en el pié, ó con tirones sordos y sensacion ardiente estando en reposo, *y sensibilidad dolorosa de las articulaciones al levantarse del asiento*, y al subir una escalera.—Tension y rigidez en los músculos y en las articulaciones de las caderas, de los muslos, de las piernas, de las rodillas y de los piés.—*Parálisis de las extremidades inferiores.—*Calambres* en la region glútea, los muslos y las pantorri-

Digitized by

llas, sobre todo *por la noche*, en la cama, ó *estando sentado*, despues de haber andado. —Tension en la rodilla, como si los tendones fuesen demasiado cortos.—Traccion y dislaceracion con estremecimiento en los muslos y en las piernas.—Lancinaciones en los muslos, las piernas, las rodillas, los piés y los dedos.—*Torpeza en las piernas*, sobre todo en las corvas y en las pantorrillas.—*Parálisis de las piernas y de los piés.—Punzadas y *dolor de luxacion* en los maléolos, apoyando el pié. —**Hinchazon inflamatoria del empeine*, °algunas veces con pústulas y granos miliares en la parte afecta.—**Hinchazon erisipelatosa de los piés.*—Hinchazon de los piés por la tarde. —Torpeza y palidez de los piés (piés como muertos).—Distorsion de los dedos.—Clavos en los piés con sensacion quemante y dolor de excoriacion.

165.—RUMEX CRISPUS.

RUM. CR.—Romaza crespa, ó rizada.—Véase HERING, *Estudios patogenéticos americanos*, en el medicamento que sigue.

AVISOS CLINICOS.—Este medicamento, poco conocido todavia en sus efectos fisiológicos, ha sido empleado con éxito contra: —*Gastritis*, con dolores lancinantes, fugaces como exhalaciones, en diferentes direcciones hácia el pecho, con dolor en la boca del estómago, dolor y punzadas en la parte superior del pecho; sensacion y plenitud en el epigastrio hasta la foseta del cuello, que vuelve á descender hácia el estómago, por un momento, tragando en vano; flatulencia, erutos é inflacion presiva del estómago, despues de comer.—*Catarro intestinal*, con diarrea matutina y tos excitada por un cosquilleo en la foseta del cuello.—*Catarro de la laringe y de la tráquea*, con accesos de tos seca, provocados por inspiraciones profundas, ó aceleradas, así como por la palabra, el aire frio, ó por una presion ejercida en la foseta del cuello.—*Bronquitis*, con largos accesos de una tos seca, provocada por las mismas causas, con agravacion por la noche despues de acostarse, que obliga á cubrirse la cabeza, porque el menor aire frio excita un cosquilleo penoso en la foseta del cuello.—*Peri-*

Digitized by Google

carditis reumatismal, con dolor lancinante en la region del corazon, al respirar profundamente por la noche en la cama.—*Erupciones escabiosas*; Sarna de los soldados, que no afecta sino la nuca, la espalda, los omóplatos y la cara dorsal de los miembros, y se alivia por el calor de la cama. —Sífilis secundaria con úlceras en la garganta?; Caquexia mercurial?; Tumores y úlceras cancerosas?; Escrófulas?; Cáries y necrosis?; Escorbuto?.

Nota.—Para aquellos que nos han demandado el *Rumex crispus*, para tener la *Patientia (ó Romaza) officinalis*, les diremos que el solo *Rumex* de que poseemos una patogenesia aceptable, es el que sigue mas abajo, bajo el título de *Rumex patientia*, y que es la *verdadera Patientia officinalis*. —El uso puramente empírico que se ha hecho hasta aquí del *R. crispus* podrá aplicarse á la *Patientia*, en atencion á que esta es recomendada ya por los autores antiguos contra los males mismos que hemos enumerado anteriormente.

166.—RUMEX PATIENTIA.

RUM.—Romaza oficinal.—Hering, *Estudios patogenéticos de la América del Norte.—Hist nat. y prep.* Véase Farmac. homeop.
Compárese con: *Ox-ac. rhab.*

CLINICA.—Examinando los síntomas característicos de este medicamento, se verán los casos en que se le podrá consultar, sobre todo contra las afecciones siguientes: Erupciones costrosas; Afecciones cancerosas; Ulceras en las piernas; Dispepsias; Gastritis; Cáncer del estómago; Diarreas; *Catarros brónquicos*; Dolores de pecho, etc.

SINTOMAS GENERALES.—Grande laxitud, debilidad y fatiga corporal é intelectual.—En la posicion *echada*: dolor en la mandibula inferior; tos.—Durante el *movimiento*: dolor en la cabeza, en el cartílago xifóides, el epigastrio, el pecho y el omóplato.—Durante la *marcha*: tos; dolores en los oidos, el costado derecho del vientre, el ano, el hipocondrio derecho, el muslo y la rodilla.—

Digitized by Google

Al *aire libre*: abatimiento, tos, caducidad; dolor de pecho; dolor en el hueso frontal, con flatuosidades; sensibilidad al aire libre; el aire *frio* ocasiona tos y dolores de pecho.—*La mayor parte de los sufrimientos parece manifestarse por la tarde y por la noche.*

Piel.—Prurito en diferentes sitios.—*Erupciones: vesículas en la nariz y en el cuello.—Ulceras en las piernas.—*Erisipela con calor fugaz.*

Sueño.—Bostezos frecuentes, con movimientos de flatuosidades y dolor en la region umbilical.—Grande deseo de dormir.—*Sueño agitado con ensueños de todas clases*, en los que los objetos pequeños parecen constantemente agrandarse; ensueños de peligros, de inundaciones, de quejas, de cuidados, de desgracias, etc.

Fiebre.—Escalofrios y horripilaciones sobre todo por el dorso.—Sensacion de *calor* general, pero principalmente en las mejillas.—Sudor al despertarse de un buen sueño.—Pulsos frecuentes, sobre todo despues de haber subido las escaleras.

Moral é inteligencia.—Abatimiento moral, como la aprension de una gran desgracia; aire muy sério, así como el lenguaje.—Carácter irascible, irritable.—Los objetos pequeños parece que se agrandan, durante un sueño agitado.—Detencion de los pensamientos y grande indiferencia, con abatimiento moral; repugnancia por la meditacion, por la mañana.

Cabeza.—*Cargazon de cabeza durante la tos.—Sensacion de plenitud, presion, pesadez y dolor sordo en la cabeza.—Dolor agudo en el hueso frontal, al aire libre, con flatuosidades; dolor sordo en la frente, mas fuerte durante el movimiento.—Por la *noche* presion en las sienes y en el lado derecho del occipucio; *dolor en el occipucio*, por la noche al despertarse.

Ojos.—*Dolores* (quemantes, lancinantes) *en la region de las cejas.*—Ojos dolorosos como si los párpados estuviesen secos é inflamados, sobre todo por la tarde, sin alteracion visible.—Picotazos en el ojo derecho.

Oidos.—*Prurito en el fondo del conducto auditivo*; en el conducto izquierdo, seguido de bostezos.—Dolor presivo en el oido.

Nariz.—Rubicundez, vesícula y costras en el tabique de la nariz; ardor en el lado derecho de la nariz y en la

Digitized by Google

mejilla.—Epistaxis.—Obturacion de la nariz derecha, por la noche.—Violento estornudo, por la noche.—*Coriza*; con voz tomada; con expectoracion amarilla, que proviene de las fosas nasales.—**Coriza fluente*; *con estornudo; con dolor en la nariz derecha y agravacion por la tarde; °mas fuerte por la noche; muy violenta, con tos.

Cara y Dientes.—Calor en la cara, sobre todo *en las mejillas* y particularmente por la tarde.—Grande palidez por la mañana.—Prurito en la cara y el labio superior.—Punzadas en la mandíbula inferior y en la raiz de un diente canino, despues de haberse acostado.

Boca.—Tialismo por la noche.—*Lengua seca* y caliente *en su parte anterior*, por la tarde, desolladura de los bordes, por la tarde; blanca; cargada de una capa amarilla; de un pardo rojizo, costra seca, que se levanta fácilmente.

Garganta.—**Acumulacion abundante de mucosidades en las fosas nasales* y la garganta.—*Sensacion como si las partes estuviesen en carne viva*, en la garganta y velo del paladar; excoriacion en la garganta; sensacion como si hubiese un cuerpo atravesado.

Gusto y apetito.—Mal gusto de boca; amargo; sobre todo por la mañana.—Apetito disminuido; ó muy aumentado, con hambre despues de haber comido.—Fuerte sed por la tarde.—*Despues de la comida* (del medio dia): erutos, dolor en el hipocondrio derecho y oido; dolor en el hipocondrio izquierdo al andar de prisa; tos desde que se acuesta; punzadas violentas en el pecho; cólicos ventosos.—*Despues del desayuno*; plenitud en el estómago; sensacion como si estuviese detenida la digestion; coriza fluente.—*Antes del desayuno*: tos.

Síntomas gástricos.—*Erutos á vacío*, despues de la comida, con dolor en el hipocondrio derecho.—Desgana con punzadas en el pecho.—*Náuseas*: al despertarse á media noche, con gusto de los alimentos ingeridos, plenitud en el vientre y dolor en el occipucio; con erutos, punzadas por cima de las cejas y *dolor en la region umbilical*; por la tarde, mejoría despues de erutar, y con sensacion como si tuviese diarrea; con dolor en el estómago y el vientre; por la mañana al vestirse.

Estómago.—Dolores sordos en el estómago; al toser, y cosquilleo en este órgano, que provoca la tos.—Sensa-

Digitized by Google

cion como si hubiese desaparecido; plenitud en él despues del desayuno.—Dolor lancinante en el cartílago xifóides y las partes vecinas del epigastrio y el pecho.—°Cáncer en el estómago?—°Gastritis?

Vientre.—Dolor en el hipocondrio derecho.—*Dolores en el izquierdo*: por la noche, estando acostado sobre el lado izquierdo, que obliga á mudar de posicion, lo que alivia; al andar de prisa despues de la comida del medio dia.—Dolor en el epigastrio, el vientre y el hipogastrio, por la tarde con náuseas; en la region del cólon ascendente, al marchar.—*Dolores en la region umbilical*: con náuseas, erutos y punzadas por cima de la ceja derecha; súbitas, estando en la cama, unas veces al bostezar, otras al respirar profundamente; por la tarde, con náuseas, á los lados del ombligo.—*Cólicos ventosos*: *alrededor del ombligo, por la mañana*; empezando durante la comida, despues de medio dia, y aliviados por la emision de vientos; sensacion de vientos que discurren por los intestinos y el recto, por la tarde, precedida de bostezos y seguida de dolor en la region pelviana; plenitud en el vientre, por la noche, al despertarse; inflacion y dureza del vientre; flatuosidades con dolor en el hueso frontal. —Dolores de vientre, que cambian de sitio.—Dolor de vientre con desgana, punzadas en el pecho y escalofrios. —Prurito en el vientre.—Dolor en la ingle, partiendo del recto.

Ano y defecacion.—°Constipacion con acumulacion de excrementos duros y tenaces; deposiciones insuficientes. —*Cámaras liquidas*, *diarréicas por la mañana*: *oscuras*, y acuosas, ó en forma de papilla; con tenesmo; precedidas de cólicos.—En el *recto*, *sensacion como si estuviese introducido en él un palo*; *prurito*, irritacion y calor alrededor del ano, sobre todo al andar; aparicion de un pequeño grano hemorroidal.

Orinas.—Gana urgente de orinar.—Orinas muy pálidas. —Orinas raras, rojas, turbias, con sedimento y superficie grasienta.—Sedimento laterício.

Partes viriles.—Dolor en la region pelviana.—Prurito en el prepucio; rubicundez y excoriacion en su borde.

Laringe y tos.—*Voz* mas aguda; apagada, como cuando hay coriza; gangosa.—*Ronquera*, sobre todo por la tarde; °sensacion como si la laringe estuviese desollada, al to-

Digitized by Google

ser; **cosquilleo en la foseta del cuello*, que provoca la tos; °la presion en esta parte hace toser.—Sonido de mucosidades en la laringe y la garganta.—**Tos, provocada por un cosquilleo en la garganta: los bronquios, el pecho y el estómago*; **sobre todo por la tarde y por la noche*; *desde que se acuesta*, ya sea por de noche ó por el dia.—*Al toser*: dolor agudo en el pecho; *punzadas dolorosas en el estómago*, con dolor por cima de la ceja derecha; °sensacion como si el pecho estuviera en carne viva.

Pecho y respiracion.—**Al respirar*, dolor de desolladura en el pecho; inspirando el aire frio, tos y punzadas en el pulmon izquierdo.—**Dolores de pecho como si los pulmones estuviesen en carne viva*; dolor en el esternon; °dolor inveterado en el pulmon izquierdo; *dolores al toser.—**Punzadas*; **sobre todo en la izquierda*; por el aire frio, en la posicion acostada y al acostarse.—°Dolor de luxacion en el esternon.—*Dolores en la region del corazon*: á la izquierda, por la noche al despertarse; *quemantes*, por la tarde y á primera noche.—Prurito en el esternon, por la noche.

Tronco.—Dolor de riñones por la mañana.—*Dolores* (presivos, agudos) *en la columna vertebral y en el lado*; *sensacion de calor en el dorso y en la cara*, por la tarde; *prurito en la espalda y entre los omóplatos.*—Dolor calambroso en la nuca, á la izquierda; vesículas en el lado derecho del cuello, cerca de la mandíbula.

Miembros torácicos.—Dolores en las escápulas y alrededor de las clavículas.—*Dolor en el brazo izquierdo, por la tarde*, como despues de un esfuerzo.—Dolor en las articulaciones de las manos; entorpecimiento de la derecha, por la tarde.—°Dedos frios, durante la tos.

Miembros pelvianos.—*Dolores reumatismales en muslos y piernas*; Sensacion de fatiga en los huesos.—°Ulceras en las piernas.—*Sensibilidad dolorosa en los piés*, sobre todo en los callos, con dolores lancinantes.

Digitized by Google

167.—RUTA GRAVEOLENS.

RUTA.—Ruda fétida, ruda de los jardines.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep. Farmac. hom. Dósis usadas*: 12, 30.—*Duracion de accion*: 8 á 15 dias.

COMPÁRESE CON: Aeon: *amm. arn.* ars. asa. bell. bry. con. hyos. *ign.* n-vom. op. plumb. puls. rhus stram. veratr.—Se puede administrar la *ign.* algunas veces, alternando con *ruta.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que deberá ser consultado este medicamento contra: —Padecimientos á consecuencia de lesiones mecánicas (contusion, caida, luxacion, lesion de los huesos ó del periostio); Cáries?; Dolores osteócopos?; Parálisis á consecuencia de lesiones exteriores; Padecimientos por la influencia de un tiempo lluvioso y frio; Afecciones reumáticas, principalmente en las articulaciones de las manos y de los piés; Ambliopia amaurótica, sobre todo por efecto de trabajos finos, de la lectura, etc.; Acnérosa; Afecciones verminosas de los niños, sobre todo con vómito; Dispepsia, en particular cuando es el resultado de vómitos frecuentes; Cólicos verminosos; Neumonía crónica con supuracion, á consecuencia de lesiones mecánicas de pecho; Parálisis de las articulaciones de las manos y de los piés, ya provenientes de afecciones reumáticas, ya de luxacion, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Dolores de quebrantamiento* ó como á consecuencia de una *contusion*, de una *caida* ó una *magulladura en los miembros, las articulaciones y los huesos*, sobre todo, al tacto.—**Dolores en el periostio de los miembros*, ardientes ó corrosivos.—Dislaceracion y tracciones presivas calambroídeas en los miembros.—Sensacion de plenitud en todo el cuerpo con dificultad de la respiracion.—Laxitud, *debilidad y pesadez en todos los miembros*, sobre todo estando sentado, con mucha inquietud en las piernas.—*Andar inseguro, con poca confianza* por debilidad de los muslos.—En estando sentado despues de cortos paseos, *sensacion* de un quebranta-

Digitized by

miento excesivo, en todos los miembros, con sensibilidad dolorosa del sacro y de los lomos.

Piel.—Prurito corrosivo en la piel.—Inflamaciones erisipelatosas.—Excoriacion fácil en los niños, ó bien andando, ó montando á caballo.—Ulceras inflamadas.—Anasarca.—Verrugas.

Sueño.—Bostezos frecuentes y pandiculaciones.—*Mucha propension al sueño*, por la tarde y *despues de comer*, con desvelo, sobresalto y gritos penetrantes al mas ligero contacto.—Agitacion por la noche con desasosiego y desvelo frecuente.

Fiebre.—*Horripilacion*, *frio y calofrio*, aun cuando esté cerca del fuego.—Frio en las manos y en los piés, con calor en la cara, pesadez en la cabeza y sed.—Calor general con agitacion é inquietud moral, dificultad opresiva de la respiracion y dolor de cabeza presivo.—Calor pasajero y frecuente.

Moral.—Ansiedad como por turbacion de la conciencia.—Propension á reyertas y á contradecir.—Inaptitud para el trabajo.—*Se está descontento de sí y de los otros* y dispuesto á llorar.—Melancolía y abatimiento moral.—Lentitud en la marcha de las ideas.—Frecuentemente, falta de vivacidad.

Cabeza.—Cabeza pesada, ó como si no se hubiese dormido lo bastante.—Vértigo rotatorio hasta el punto de caer, por la mañana al levantarse, como tambien estando sentado ó paseándose al aire libre.—*Dolores de cabeza*, como por una *presion con aturdimiento* sobre todo el cerebro, con excesiva inquietud.—Dolor pulsativo ó dislacerante en la frente, con aturdimiento de la cabeza por la noche, antes de acostarse, y por la mañana al despertarse.—Calor en la cabeza.—*Dolores* de traccion tensiva ó lancinante en lo exterior de la cabeza, como *despues de un golpe ó una contusion*, sobre todo en el periostio.—*Prurito corrosivo en la piel del cráneo*.—Nudosidades ó bultos y chichones en la piel del cráneo, con dolor de excoriacion al tacto, formándose despues de haber sentido una dislaceracion en la parte que ocupan.—Ulceras pequeñas, y costras que exudan en la piel del cráneo.

Ojos.—*Dolores en los ojos mirando fijamente á un objeto*.—Escozor pruritoso en los ángulos de los ojos.—*Presion en los ojos*.—Sensacion quemante en los ojos, leyendo á

Digitized by Google

la luz de las bujías.— Lagrimeo al aire libre.—Mancha en la córnea.—**Aureola roja alrededor de la luz, por la noche.*— Estremecimiento y conmocion de los músculos de las cejas.—*Espasmo de los párpados.*—Propension á mirar fijamente.—**Vista turbia, como á través de una niebla* y oscuridad completa en lontananza.—Puntos que revolotean delante de la vista.—*°Miopia.*

Oidos y nariz.—Otalgia con presion como si arañaran. —Lancinaciones pruritosas en el oido.—Dolor de contusion en el cartílago de la oreja, y por bajo de la apófisis mastoídea.—Presion aguda y dura en la raiz de la nariz.—Sudor en el dorso de la nariz.—Epistaxis con presion en la raiz de la nariz.

Cara y dientes.—*Dolores en la cara como á consecuencia de contusion ó de golpes* en el periostio.—Dislaceracion calambroídea en los huesos de los pómulos.—Prurito y corrosion en la cara y en las mejillas.—Erisipela en la frente con hinchazon.—Erupcion de granos en los labios.—*°Acné rosa.*—Otalgia *con dolor como si escarbaran.—Sensibilidad dolorosa en las encías, las que sangran fácilmente.

Boca y garganta.—Boca seca, pegajosa.—Calambre en la lengua con palabra balbuciente.—Ligera inflamacion de la garganta como por una tuberosidad hácia el fondo del gaznate, al deglutir en seco.—Sensacion de excoriacion y presion en el velo del paladar al deglutir.

Apetito.—Gusto de los alimentos soso y seco, como si fuese madera.—Mucho deseo de agua fria despues de medio dia.—Disgusto desde el primer bocado con sensacion de plenitud y de saciedad en el vientre, y sin embargo, con buen apetito.—**En comiendo náuseas rápidas, con vómito de los alimentos.*—Despues de haber comido pan, ó bien alimentos indigestos, dolores en el estómago.

Estómago.—Erutos á vacío, ó con sabor á los alimentos. —Hipo cuando se fuma.—Erutos pútridos despues de haber comido carne.—Erutos como en las mujeres histéricas.—**Náuseas en la boca del estómago.*—Vómitos aun de los alimentos.—Dolores de estómago despues de haber comido cosas crudas ó alimentos indigestos.—Pellizcos en el estómago despues de haber comido pan.—*Dolores de estómago corrosivos*, ardientes ó presivos.—Punzadas dislacerantes en el epigastrio.

Digitized by Google

Vientre.—*Presion* corrosiva *en la region hepática.*—°*Hinchazon dolorosa del bazo.*—Pulsacion y picotazos en el hipocondrio izquierdo.—*Dolor de contusion en el vientre*, con sensacion como si escarbaran en la region lumbar. —Pellizcos presivos en el bajo vientre.—Pellizcos incisivos en los costados del vientre.—Punzadas que suben al vientre cuando uno se sienta.—Sensacion de frio, ó calor y sensacion quemante en el vientre.—°*Corrosion en el vientre.*—*Cólicos como por lombrices.*—Lancinaciones en los músculos abdominales que obligan á deprimir el vientre.

Defecacion.—*Deposiciones difíciles*, expelidas á costa de violentos esfuerzos, como por inactividad del recto.—Deposiciones raras, duras, nudosas, caprinas.—°*Diarrea mucosa que alterna con estreñimiento.*—°*Conato frecuente de deponer, con evacuaciones poco abundantes, pero blandas.*—Deseo inútil de deponer, con prolapsus del recto.—°*Procidencia del recto á cada deposicion.*—Flujo de sangre con la deposicion.—Dislaceracion y punzadas en el recto.

Orinas y partes viriles.—°*Conato á orinar, algunas veces muy urgente*, con presion sobre la vejiga y emision de *orina escasa y verde.*—*Presion en la vejiga*, algunas veces aun despues y fuera del tiempo de la emision.—Emision de orina frecuente y abundante, aun por la noche. —°*Conato continuo de orinar, aun inmediatamente despues de la emision.*—Retencion de orina.—°*Emision de orina involuntaria, por la noche en la cama*, y por el dia durante el movimiento.—°*Orina cargada de arenillas.*—Exaltacion del apetito venéreo.—Poluciones.

Reglas.—Esterilidad.—°*Reglas muy irregulares, abundantes y anticipadas.*—°*Reglas de muy corta duracion*, precedidas y seguidas de leucorrea.—°*Flores blancas corrosivas*, despues de la cesacion de las reglas.

Laringe.—Dolor de contusion en la laringe.—Tos por la noche despues de haberse acostado, con expectoracion abundante de mucosidades viscosas, y náuseas como para vomitar.—Tos como de grasnido por la noche con arañamiento en el pecho.—Tos con expectoracion abundante de materias purulentas.—°*Expectoracion de mucosidades espesas, amarillentas, casi sin tos, pero con sensacion de fatiga en el pecho.*

Digitized by

Pecho.—*Respiracion corta, con disnea.*—*Presion en el pecho*, con sensacion de plenitud.—Compresion nocturna de la parte inferior del pecho.—*Lancinaciones en el pecho frecuentemente con suspension de la respiracion*, y con particularidad subiendo una escalera.—Sensacion de frio ó calor en el pecho.—Sensacion de corrosion en el pecho.—**Dolor al tacto en un punto del esternon.*—**Palpitacion de corazon con ansiedad.*

Tronco.—*Dolores de quebrantamiento en el dorso y en los riñones*, frecuentemente con dificultad de la respiracion.—Traccion en la nuca y en los omóplatos.—Dolor contusivo en los riñones y en el sacro.—**Punzadas en los riñones, andando y bajándose, ó solamente estando sentado.*

Brazos.—Dolor de luxacion en la articulacion de la espalda, sobre todo dejando los brazos péndulos ó apoyándolos.—Sacudidas en los brazos, como si fuesen los huesos.—Dislaceracion sorda en los huesos de los brazos y las articulaciones del codo.—*Dolor de contusion* en la articulacion del codo.—*Dolor de quebrantamiento en los antebrazos*, así como en los huesos y en las articulaciones de las manos.—Tracciones presivas y calambroídeas, y dislaceracion en los antebrazos, en las manos y en los dedos.—**Rigidez paralítica en la muñeca.*—**Dolor de luxacion ó punzadas en las muñecas.*—**Dolor en la muñeca, al levantar alguna cosa de peso.*—**Entorpecimiento y hormigueo en las manos despues de haber hecho algunos esfuerzos.*—Contraccion calambroídea en los dedos.—Venas en las manos hinchadas.

Piernas.—Traccion calambroídea en los muslos, hasta en la articulacion coxo-femoral y el sacro.—*Dolor de quebrantamiento en la articulacion coxo-femoral y en los huesos de las piernas*, como por una contusion, sobre todo al tacto, y extendiéndolas.—*Debilidad en los huesos de los muslos*, al levantarse del asiento, como si estuviesen rotos.—*Debilidad, temblor*, y pesadez paralítica *de las rodillas y de las piernas*, que no permite estar en pié.—Fatiga y pesadez de las piernas despues de haber andado.—**Sensacion de acortamiento de los tendones de la rodilla.*—**Ulceras fistulosas en las piernas.*—*Genuflexion de las rodillas*, sobre todo al bajar una escalera.—Dolor quemante, corrosivo en los huesos de los piés, que no permite apoyarlos.—**Rigidez paralítica del empeine, como por luxacion.*

Digitized by Google

168.—SABADILLA.

SABAD.—Cebadi'la.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeop. —*Dósis usadas*: 30 —*Duracion de accion*: 2 á 3 semanas.
ANTÍDOTOS: Camph. puls.
COMPÁRESE CON: Ant. ars. caps. cham. chin. cin. con. ign. natr-m. n-vom. *plat.* plumb. *puls.* rhus. *sep.* veratr.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Fiebres intermitentes, con especialidad, las de primavera; Anginas crónicas, tenaces; Afecciones verminosas, sobre todo por padecimientos del ténia; Exofagitis?; Gastritis; Grippe, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Tracciones* dolorosas *en los miembros* como en la médula de los huesos, con propension á estirar los miembros, los cuales se alivian durante el reposo.—*Flojedad y dolores incisivos en los huesos*, como por cuchillos, sobre todo en las articulaciones, agravados al tacto y aliviados moviendo prontamente la parte.—Lancinaciones como picotazos, presivas y sordas en diversas partes.—Hormigueo en los miembros.—Convulsiones.—Torpeza en el andar y en los movimientos.—*Sensacion dolorosa de parálisis en los miembros, y sobre todo en las rodillas.—*Laxitud y *pesadez en todos los miembros*, agravada *por la tarde, ó hácia medio dia, en cuyo tiempo los dolores de los miembros tambien se agravan.*—Estando acostado se encuentra mejor que en pié ó andando.—Muchos síntomas aparecen *al principio en el lado derecho, y despues en el izquierdo.*—**Mucha sensibilidad al frio* que agrava el malestar y los dolores.

Piel.—Punzadas con hormigueo, y ardientes debajo de la piel.—*Bandas, manchas y puntos de un color encendido* en diferentes partes de la piel, que aparecen *mas intensas con el frio.*—°*Color súcio, pardusco de la piel.*

Sueño.—*Mucha propension al sueño por el dia*, con boste-

en la boca.—*Sabor amargo de la boca y amargor de los alimentos, sobre todo de la leche y del café.*—Deseo de ácidos, sobre todo de limonada.—Despues de la comida, accedías en el estómago.

Estómago.—*Eructos vacios.*—Náuseas con plenitud de estómago.—*Vómito de bilis*, *ó de los alimentos.—Plenitud y meteorismo en la region del estómago.—*Presion en el estómago.*—Lancinaciones en la boca del estómago que atraviesan hasta el dorso.

Vientre.—Presion en la region hepática.—Timpanitis.—Dolores contractivos en el vientre.—Pellizcos presivos en el vientre, como por un enfriamiento, ó por una diarrea.—Inflamacion de los intestinos.—Dolor de contusion en los músculos abdominales al principio de la noche en la cama.

Deposiciones.—Evacuaciones alvinas, al principio blandas, despues duras.—**Deposiciones diarréicas*, blandas, con ruido y abundante expulsion de gases.—Flujo de mucosidades sanguinolentas por el ano.—*Protorragia*, despues de una deposicion dura.—Granos hemorroidales en el ano, dolorosos.—Hormigueo en el ano.

Orinas.—Retencion de orina con emision gota á gota, y sensacion quemante.—Mucha gana de orinar con emision poco abundante.—Emision de orina abundante, aun por la noche.—Inflamacion dolorosa de la uretra, con flujo de pus, como en una gonorrea.

Partes viriles.—Tumor duro en el dorso del miembro.—Punzadas en el glande.—Rubicundez oscura en el glande.—Sensibilidad dolorosa del prepucio con dificultad de sacarle.—El frenillo hinchado y tirante.—Dolor de excoriacion en los condilomas.—*Exaltacion del apetito venéreo*, con erecciones violentas y prolongadas.

Reglas.—Mucha exaltacion del apetito venéreo en la mujer.—Dolor contractivo en la region de la matriz.—Congestion sanguínea en el útero.—**Metrorragias* con flujo de una *sangre coagulada*, ó de *un rojo vivo*, y dolores como de parto en los riñones y en las ingles.—**Reglas muy abundantes.*—°Supresion de las reglas con flores blancas.—*Aborto.—Hinchazon sensible de las mamas.—Hormigueo en los pechos.—**Leucorrea* pruritosa, amarillenta, fétida, espesa como almidon.—°*Hidropesía del ovario.*

Digitized by Google

siendo, bostezando y al mas ligero dolor de otro cualquier punto.— Debilidad de la vista.

Oidos.—Otalgia, con presion penosa.—*Cosquilleo en las orejas*.—Prurito quemante y punzadas en los lóbulos de las orejas.—Sordera como si los oidos estuvieran cubiertos con una venda.—Zumbido, ruido sordo y detonacion en los oidos.—Terebracion en las parótidas.

Nariz.—*Hormigueo pruritoso en la nariz* y escozor contractivo.—Epistaxis.—Excesiva sensibilidad al olor del ajo.—Estornudo con estremecimiento.—Obturacion ya de la una, ya de la otra nariz.—**Coriza fluente, con semblante alterado y atolondramiento de cabeza*.—Sonándose se expelen gruesas masas de mucosidades blancas y trasparentes, sin coriza.

Cara.—*Calor del rostro con rubicundez ardiente*, sobre todo despues de haber bebido vino.—Círculos azules alrededor de los ojos.—Piel jaspeada, herpética en la cara.—Sensacion quemante, dolor de excoriacion, picotazos y hormigueo pruritoso en los labios.—Terebracion en la mandíbula inferior y en las glándulas submaxilares.

Dientes.—Odontalgia, con dolor tractivo y pulsativo.—*Dolores lancinantes en las muelas*.—Cáries de los dientes.—Encías azuladas.—Picotazos en las encías.—**Dolor en los dientes inferiores del lado izquierdo*.

Boca.—Sensacion en la boca y la lengua, como si estuviesen quemadas y excoriadas.—Picotazos en la punta de la lengua.—Punta de la lengua azulada.—*Lengua cubierta de una costra espesa, amarillenta.—**Sequedad de la boca sin sed*.—*Acumulacion abundante de saliva (dulce) en la boca*.

Garganta.—*Irritacion de la garganta, como si estuviera comprimida por un clavo*, ó por una hinchazon interior durante y fuera del tiempo de la deglucion.—Sensacion de constriccion en la garganta.—*Presion y sensacion quemante en la garganta*, durante y fuera del tiempo de la deglucion.—*Sequedad de la garganta*.—*Aspereza y arañamiento en la garganta*, con necesidad contínua de deglutir y ruido de mucosidades.—Inflamacion de la úvula.

Apetito.—*Gusto amargo (ó de un sabor soso repugnante)*.—*Mucho deseo de agua fria*, de leche y de cerveza, aun por la mañana.—Hambre con *repugnancia á todos los alimentos*, sobre todo *á la carne* (al café, vino y los ácidos).—

Digitized by Google

contra: —Afecciones hidrópicas; Fiebres intermitentes; Hidrocele á consecuencia de lesion mecánica; Coriza de los recien nacidos; Crup; *Asmas espasmódicas y calambres de pecho*, en los adultos, sobre todo en sujetos artríticos ó á consecuencia de un enfriamiento; Angina de pecho?; Coqueluche?; *Asma de Millar*; Padecimientos tísicos, etc.
Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Ebullicion general de sangre, por la noche, despues de acostado, con sensacion de temblor.—Con frecuencia traccion repentina de toda la superficie del cuerpo estando sentado.—La mayor parte de síntomas se manifiestan durante el reposo, y se disipan por el movimiento.—°Anasarca general.—°Enflaquecimiento excesivo.—*Necesidad de dormir sin poderlo conseguir*.—*Despierta frecuentemente con sobresalto y angustia, temblor y opresion en la respiracion hasta la sofocacion.—*Sueño incompleto con la boca y los ojos medio abiertos.—Ensueños lascivos.—Horripilacion con calofrio, frio glacial de las manos y de los piés, y hormigueo con picotazos en la piel.—Calofrio tembloroso antes de dormirse.—*Calor* insoportable, *sin sed*, con temor de descubrirse.—**Fiebre con sudores excesivos*, sobre todo *por la noche*.—*Mucha disposicion á asustarse*.—Humor apesadumbrado durante el cual todo impresiona desagradablemente.—*Delirios* de tiempo en tiempo con visiones espantosas.

Cabeza.—Cara.—Aturdimiento y pesadez de cabeza, sobre todo durante el movimiento.—Cefalalgia como por embriaguez.—Tension en la cabeza durante el movimiento, como si esta contuviese agua.—Presion y expansion en la cabeza.—*Dolores de cabeza*, *presivos*, *dislacerantes* en la frente y en las sienes.—Sacudidas prontas en el cerebro.—Dolor en el vértice con sensacion como si escarbaran.—Pupilas al principio contraidas, despues fuertemente dilatadas.—Lancinaciones y dolores calambroídeos en los oidos.—Hormigueo pruritoso en los oidos.—*Sensacion de entorpecimiento en la nariz*, con prurito en el dorso de esta.—Aglomeracion de sangre á la nariz, con sensacion de pesadez en la punta.—Obturacion en la nariz, con acumulacion de mucosidades

Digitized by Google

lis.—Presion en el estómago.—Lancinaciones agudas debajo del estómago, agravadas por la presion.—*Pellizcos en el vientre*, como por enfriamiento, con expulsion de gases.—Punzadas en el lado izquierdo del bajo vientre.—Dolor de contusion en el vientre.—Dislaceraciones calambroídeas, punzadas y pellizcos en los músculos abdominales.—Dolor presivo en el vientre con náuseas, apoyándole contra un cuerpo duro.—*Conato frecuente de orinar con emision abundante*, aun por la noche.—Orina de un amarillo oscuro.—Emision de orina á chorro delgado.—°*Hinchazon del escroto.*—**Reglas muy abundantes* como una metrorragia.

Laringe.—Pecho.—Ronquera por acumulacion de mucosidades viscosas en la laringe.—Tos profunda, bronca, hueca, con agitacion y sed.—°Tos contínua con *expectoracion abundante* de un gusto salado, ó de mucosidades de un sabor dulce.—**Accesos de tos sofocante, con gritos* en los niños.—**Tos con ruido penetrante*, ó con gritos como por un dolor en la garganta.—**Respiracion sibilante* y acelerada.—Suspension de la respiracion estando acostado.—*Accesos de sofocacion calambroídea por la noche*, con llantos, mucha agitacion y temblor de las manos.—*Excesiva dificultad de la respiracion.—Opresion de pecho con punzadas en el costado, ó con presion debajo del esternon.—°Dolor presivo en el pecho.—Sensacion repentina de contraccion en los costados del pecho.

Tronco y miembros.—Dolores de riñones con presion tractiva.—Golpes incisivos en los riñones.—*Presion en* medio de *la espina dorsal*, durante el reposo y el movimiento.—Lancinaciones en los omóplatos.—Pesadez presiva en la nuca.—Lancinaciones profundas, incisivas en los músculos del cuello.—Traccion en los antebrazos y en los huesos de las manos.—Pesadez paralítica de la articulacion del codo.—Lancinaciones en las muñecas.—Temblor de las manos (escribiendo).—Dislaceracion en las articulaciones de los dedos.—Tracciones calambroídeas y punzadas en los muslos.—Tension de los tendones de la corva, como si estuvieran demasiado cortos.—Lancinaciones agudas en la tibia.—°Hinchazon edematosa de los piés, hasta las rodillas.—Dolores de dislaceracion en las piernas y en los tobillos.

Digitized by Google

presiva en la nuca.—Lancinaciones profundas, incisivas en los músculos del cuello.—Traccion en los antebrazos y en los huesos de las manos.—Pesadez paralítica de la articulacion del codo.—Lancinaciones en las muñecas.—Temblor de las manos (escribiendo).—Dislaceracion en las articulaciones de los dedos.—Tracciones calambroídeas y punzadas en los mus os.—Tension de los tendones de la corva, como si estuvieran demasiado cortos.—Lancinaciones agudas en la tibia.—°Hinchazon edematosa de los piés, hasta las rodillas.—Dolores de dislaceracion en las piernas y en los tobillos.

171.—SANGUINARIA CANADENSIS.

SANG.—Sanguinaria del Canadá.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.—*Dósis usadas?*
ANTÍDOTOS?

CLINICA.—Examinando los síntomas que expongo á continuacion, se verá los casos en que podrá esperarse un verdadero recurso de esta sustancia contra las afecciones siguientes.—*Afecciones reumáticas y artríticas*; Parálisis, debilidad; Erupciones urticarias; Ulceras crónicas; Excrecencias fungosas; Verrugas; Ictericia; *Fiebres intermitentes*; *Fiebres lentas*; *Fiebres de los pantanos*; Jaqueca; Pólipo nasal; *Anginas* de diferentes especies; *Padecimientos gástricos*; Gastritis; Afecciones hepáticas; Inflamaciones en general de los órganos abdominales; Induraciones en el vientre?; Cólicos espasmódicos; Diarreas; Hemorróides; Gonorreas?; Metrorragias; Aborto; Amenorrea; Padecimientos de la edad crítica; Crup; Grippe; Coqueluche; Asma; *Neumonias*; Tísis pulmonar; *Panadizos*.

GENERALIDADES.—°*Dolores reumáticos y artríticos en los miembros*, á veces con rigidez.—Por la tarde dolor en las partes del cuerpo ó en los huesos que están menos resguardados; el dolor desaparece al tacto para volver á aparecer inmediatamente en otro punto.—*Mucha debilidad*, sobre todo durante y despues de los vómitos,

Digitized by Google

ó por la tarde en las piernas paseándose al aire libre.—Debilidad como de desfallecimiento.—Insensibilidad general y frio.—Rigidez espasmódica de los miembros.—Entorpecimiento y languidez.—°*Parálisis del lado derecho.*—*Mutacion continua de los síntomas*, cuando un nuevo síntoma se manifiesta, el antiguo desaparece.—La mayor parte de síntomas parece se manifiestan por la tarde y por la mañana.

Piel.—°*Sequedad continua de la piel.*—°*Erupcion urticaria*, pruritosa precedida de dolor de corazon.—°*Ulceras crónicas*, indolentes, callosas é icorosas.—°*Excrecencias fungosas.*—°*Verrugas.*—°*Ictericia.*

Sueño.—Insomnio.—Despierta sobresaltado, como por una caida.—Ensueños de viajes por mar, especie de vértigos.—Ensueños de un ahorcado.

Fiebre.—*Calofrios*, por la noche en la cama, con horripilacion en el dorso, ó con temblor de frio y dolor debajo del omóplato durante el movimiento, con náuseas, y durante el dolor de cabeza.—*°Calor pasajero, °a veces como si una porcion de agua hirviendo, se esparramara desde el pecho al vientre*; calor fugaz desde la cabeza hasta el estómago.—Calor abrasador, alternando rápidamente con calofrios y horripilacion.—°Calor con la piel seca, y pulso frecuente.—Pulsacion en todo el cuerpo.—*Las fuertes dósis de este medicamento, hacen el pulso mas frecuente*; las cortas dósis, por el contrario, disminuyen la frecuencia.—*°*Pulso alterado, duro, frecuente*; ó bien °flexible, lleno, vibrante y fácil á ceder por la presion como en las pulmonías.—Pulso suprimido, con desmayos, por el uso de fuertes dósis.—Sudores abundantes.

Moral.—Irri abilidad con tristeza.—Angustia antes de los vómitos.—(Delirios).

Cabeza.—*°Vértigos, °volviendo rápidamente la cabeza y en elevando la vista*; °con zumbido en los oidos, regurgitaciones de aire y cosquilleo en la garganta, que obliga á toser; *vértigos* con oscurecimiento de la vista antes y despues de los vómitos, ó con desazon en el corazon.—Aturdimiento y peso en la cabeza con eructos.—Congestion á la cabeza, con ruido sordo en los oidos y calor fugaz, seguido de evacuacion de agua por la boca como vómito, y terminando por una deposicion.—Peso en el cerebro.—Cefalalgia como si la frente fuera á estallar,

Digitized by Google

con calofrios y sensacion de ardor en el estómago.—Dolores de cabeza que pasan rápidamente de un lado á otro.— Punzadas en la frente y en la sien izquierda.— Dolor fuerte en todo el lado izquierdo de la cabeza, sobre todo hácia el ojo, y al mismo tiempo en el pié izquierdo.—Cefalalgia con dolores reumáticos, rigidez de los miembros, de la nuca, y precedida de gana de vomitar.—**Cefalalgia con vómitos amargos*, °á veces cantando por la mañana, soportable tan solo con el reposo absoluto, y mejorada por el sueño.—*Cefalalgia pulsativa*, agravada por el movimiento, y á veces con vómitos amargos.—*Durante la cefalalgia*, cosquilleo en la garganta, *calofrios* á veces con náuseas, seguidos de calor fugaz desde la cabeza hasta el estómago, ó vértigos y dolor en el oido.—*Los dolores de cabeza se agravan particularmente por el movimiento y bajándose*, y se presentan á veces por accesos.—°*Cefalalgia con dolor de excoriacion, sobre todo en las sienes.*—°*Cefalalgia que sube desde la nuca como un rayo.*—Sensacion como si alguna cosa tirara de la cabeza hácia adelante.—Dolor de excoriacion en los tegumentos de la cabeza, al tacto y sin tocar.—*Sensacion como si la piel de la cabeza estuviera desprendida del lado derecho*, con tirones en elevando los ojos.—**Entumecimiento de las venas de la cabeza*, particularmente en las sienes.

Ojos.—*Ojos lagrimosos*, con sensacion de ardor, ó bien con dolor al tacto, seguido de coriza.—Sensacion como si hubiera vapores ácidos introducidos en los ojos.—Ojos empañados con sensacion como si hubiera pelos delante de estos.—Centelleo delante de los ojos.—Oscurecimiento frecuente de la vista.—Pupilas dilatadas.

Oidos.—Latidos debajo de las orejas.—°Otalgia con cefalalgia.—°*Calor ardiente en las orejas, con mejillas de un color encendido.*—Punzadas en el oido izquierdo.—Zumbido y retintin en los oidos.—Oidos muy sensibles, á cada golpe de martillo (de una fragua) se resienten dolorosamente.

Nariz.—Sensacion de calor en la nariz.—Pérdida del olfato.—Olor en la nariz, como á cebollas asadas.—Repugnancia al olor de la melaza.—*Estornudos frecuentes.—Coriza fluente, corrosiva, con excoriacion de las ventanillas de la nariz*, ó bien con lagrimeo violento del ojo de-

Digitized by Google

Dientes.—*Dolor en los dientes cariados*, sobre todo al contacto de los alimentos, ó en usando el mondadientes.—Corrosion en una muela.—*Dolor en las muelas al despertar*, con cefalalgia del mismo lado (derecho); *agravacion de la odontalgia por el agua fria*, y mejoría por las bebidas calientes.—*Vacilacion de los dientes*, hasta el punto de creer que puede quitarlos todos.

Boca.—*Salivacion* con vacilacion de los dientes.—*Hormigueo y sensacion de picor en la lengua*, sobre todo en la punta.—*Sensacion de excoriacion* y de *sequedad* en la lengua, como despues de haber comido cosas ácres, por la mañana, al despertar.—°Lengua muy encendida, con dolor de ulceracion.—Punzadas en el lado izquierdo de la lengua.—Lengua cubierta de una capa blanca.—Pérdida del gusto.

Garganta.—Sensacion de sequedad en la garganta, sin sentir alivio con beber.—Calor en la garganta aliviado por la inspiracion del aire fresco.—Sensacion de acritud, como despues de haber comido alguna cosa ágria.—*Sensacion de ardor en la garganta*, sobre todo despues de haber comido cosas azucaradas.—*Sensacion de hinchazon*, como si la garganta estuviera cerrada, y hubiera un tumor que le quisiese ahogar, con afonía; ó bien por la tarde, *muy fuerte durante la deglucion*, y sobre todo del lado derecho.—°*Ulceracion en la garganta.*

Apetito y gusto.—°*Falta de apetito*, con lengua cubierta de una capa blanca.—El azúcar parece amarga, y causa una sensacion de ardor en la garganta.—Sabor graso ó mucoso en la boca.—Repugnancia á la cerveza, que deja un gusto insípido.—Deseo de cosas indeterminadas con falta de apetito.—Deseo de cosas picantes.—°*Mucha debilidad de la digestion.*—Despues de la comida, sensacion de vacuidad en el estómago.

Estómago.—*Erutos* espasmódicos y á vacío, de un olor desagradable, con gana de vomitar y rostro pálido, alivio del atolondramiento de cabeza.—Pirosis y *repugnancia.*—Hipo en fumando.—Pituitas con gana de vomitar.—°*Náuseas*, despues de la comida; *periódicas*, con falta de apetito; *náuseas* en bajándose, *con necesidad de escupir mucho*; *náuseas con salivacion*, y sensacion como si se fuera á morir; *náuseas con calofrios* y calor, como tambien durante la cefalalgia; *náuseas* °antes de la erupcion

Digitized by

falta de apetito.—Deseo de cosas picantes.—**Mucha debilidad de la digestion.*—Despues de la comida, sensacion de vacuidad en el estómago.

Estómago.—*Eructos* espasmódicos y á vacío, de un olor desagradable, con gana de vomitar y rostro pálido, alivio del atolondramiento de cabeza.—Pirosis y *repugnancia*.—Hipo en fumando.—Pituitas con gana de vomitar.—**Náuseas*, despues de la comida; *periódicas*, con falta de apetito; *náuseas* en bajándose, *con necesidad de escupir mucho*; *náuseas con salivacion*, y sensacion como si se fuera á morir; *náuseas con calofrios* y calor, como tambien durante la cefalalgia; *náuseas* °antes de la erupcion urticaria, ¯ó antes de la cefalalgia.—*Vómitos*, precedidos de angustia excesiva, de conato inútil para deponer ó de otros muchos padecimientos; *vómitos* con deseo de comer, para apaciguar las náuseas; *vómitos* con diarrea; *vómitos* con mucha debilidad; *vómitos amargos.*—*Sensacion de calor, ardor y quemazon en el estómago.*—Movimientos en el estómago, como si alguna cosa viva saltase dentro.—°Inflamacion en el estómago?.

Vientre.—*Dolores en los hipocondrios*, con vértigos continuos y laxitud.—°Dolor en el hipocondrio izquierdo, mas fuerte en tosiendo, menos en apretando encima y en doblando el cuerpo hácia la izquierda.—*°Entorpecimiento y atonia del higado.*—**Sensacion de una corriente de calor, que pasa desde el pecho al vientre*, °seguido de diarrea.—Latidos en el vientre.—Calambre en el vientre, pasando de un sitio á otro.—*°Timpanitis por la tarde con emision de gases por la vagina.*—Emision de gases por arriba y por abajo, enderezándose á causa de la tos, la que desaparece en seguida.—Los dolores de vientre se presentan por accesos.—Retortijones tractivos.—Dolor como si escarbaran en el vientre, por la noche, con dolores de riñones.—Punzadas violentas en el vientre, como por cuchillos, seguidas de diarrea acuosa.—Por la mañana, cólico, seguido de diarrea.—Emision frecuente de gases fétidos.

Ano y deposiciones.—*Gana inútil de deponer*, con sensacion como de un grueso tapon en el ano, ó bien seguida de vómitos, y además *con emision de gases.*—*Diarrea*, con emision frecuente de gases; *diarrea* precedida de *retortijones*, de cólicos, de dolores violentos.—*Despues de las*

Digitized by Google

deposiciones diarréicas, cesan la coriza, la tos y los dolores de pecho.—Deposiciones con evacuacion de alimentos no digeridos.—Deposiciones blandas, mas frecuentes, los primeros dias.

Orinas.—*Miccion frecuente, sobre todo por la noche*, con *emision frecuente de orinas claras, acuosas.*

Partes viriles.—Poluciones, dos noches seguidas.

Reglas.—*Frecuentemente dolor de vientre, como cuando van á presentarse las reglas.*—Reglas muy abundantes, ocho dias con sangre negra.—Reglas mas abundantes con dolor de cabeza sobre todo del lado derecho, como si los ojos fueran á salirse de sus órbitas.—Metrorragias.—Aborto.—°Expulsion *de gases por la vagina, con el orificio abierto de la matriz.*—Punzadas en las mamas.—Dolor de excoriacion encima del pezon derecho, muy sensible al tacto.—Excoriacion y sensibilidad dolorosa de los pezones.

Laringe.—*Accesos frecuentes de tos*, sobre todo en comiendo; ó bien *con cosquilleo en la garganta, por la tarde*, á veces sobre todo despues de acostado, ó con dolor de cabeza.—Tos seca durante el sueño, y despertando, no cesa mas que por la emision de gases por un lado, y por otro despues de incorporarse estando sentado.—*°Tos °con ó °sin expectoracion*, °á veces *violenta, continua*, con *rubicundez circunscrita de las mejillas*, y dolor de pecho.—Facilidad de expectorar.

Pecho.—*°Dolores de pecho, con tos periódica, con ó sin expectoracion.*—°Respiracion difícil con color lívido de las mejillas y de las manos, el pecho vibrante y fácil de comprimirse (en una pulmonía tifoídea).—°Presion y ardor en el pecho, seguidos de calor en el vientre, y diarrea.—*°Opresion y sensacion de debilidad en el pecho.*—Sensacion de una corriente abrasadora en el lado derecho del pecho, partiendo desde la clavícula y del sobaco derecho, y descendiendo hasta la region del hígado.—*Punzadas en el pecho*, de derecha á izquierda.—Presion en el pecho, el dorso y region del corazon.—Palpitacion de corazon con mucha debilidad.

Tronco.—°Dolores de riñones á consecuencia de una derrengadura.—°Dolores en el dorso.—Dolor en los riñones, aliviado encorvándose hácia adelante.—*°Dolores reumáticos en la nuca, las espaldas y en los brazos, °á veces mas*

Digitized by Google

fuertes por la noche en la cama, y sobre todo en volviéndose.—Dolor de excoriacion en la nuca.—Dolor en el cuello, como á consecuencia de una derrengadura.

Extremidades superiores. — *Dolores reumáticos en los brazos* y la palma *de las manos*.—Dolor de ulceracion en la palma de las manos.—*Sensacion de ardor en la palma de las manos*, á veces con rubicundez.—°Color lívido de las manos.—°*Rigidez de las articulaciones de los dedos*.—Dolor de ulceracion por debajo de la uña del pulgar. —°*Panadizos en todos los dedos*.

Extremidades inferiores.—°*Dolores reumáticos y de consion en la cadera izquierda*, °así como en la cara interna del muslo derecho, °ó bien alternando con sensacion de ardor y presion en el pecho.—*Rigidez y tension en las corvas*.—Calambre y traccion en las pantorrillas.—Punzadas en la articulacion del pié y de los maléolos.—°Piés frios despues de medio dia.—°*Sensacion de ardor en la planta de los piés y palma de las manos, mas fuerte por la noche en la cama*.—Dolores en los callos.—Mucha debilidad en las piernas.

172.—SARRACENIA PURPUREA.

SARRAC.—Véase Hale, *Remedios americanos*.

Este medicamento, del que no poseemos todavía ninguna patogenesia formal, debe únicamente su grande reputacion á la constancia con que algunos *empíricos* lo han preconizado como un *absoluto específico* contra la *viruela*, pretendiendo que él neutraliza en la sangre el vírus, de la manera mas radical. Desde entonces, esta sustancia ha sido, tanto en América, como en Inglaterra, en Francia y en Bélgica, usada muy frecuentemente contra la viruela; pero mientras que sus encomiadores no tenian tiempo para contar maravillas de su uso, otros la han negado toda eficacia contra esta enfermedad. Respecto á nosotros, hemos experimentado lo uno y lo otro: los mas graves casos, en que *sarracenia* producia milagros, y otros, en que permanecia absolutamente inactiva. Lo que nos falta son

Digitized by Google

las indicaciones características para su uso en cada caso individual.

173.—SASSAPARILLA.

SASS.—Zarzaparrilla.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: hasta 5 semanas en las enfermedades crónicas.
ANTÍDOTOS?
COMPÁRESE CON: Amm. cham. clem. cocc. *merc.* puls. ran. sep. sil. *sulf.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá consultarse este medicamento contra:—Afecciones reumáticas y artríticas, sobre todo á consecuencia de un enfriamiento en el agua, ó despues de la supresion de una gonorrea; *Ulceras* y otros padecimientos por el abuso del mercurio; Herpes; Cálculos urinarios y renales; Estreñimiento, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores lancinantes, de dislaceracion*, presivos.—*Dislaceracion* paralítica *en todas las articulaciones de los miembros*, frecuentemente acompañada de temblor en las manos y en los piés, dislaceracion dolorosa en la cabeza, y pellizcos en el vientre.—°Dolores artríticos, con disminucion de la secrecion de las orinas.—Rigidez é inmovilidad de los miembros.—Hinchazon caliente y densa.—Mucha laxitud, sobre todo en los miembros inferiores.—Laxitud en las manos y en los piés.—*Enflaquecimiento.*—Los dolores atacan la moral y abaten el espíritu.

Piel.—*Prurito*, algunas veces *por todo el cuerpo*, sobre todo por la noche en la cama y por la mañana al levantarse.—Granos rojos y secos que solo pican con el calor.—Erupcion miliar al contacto del aire fresco, saliendo de un cuarto caliente.—Erupciones urticarias.—Vesículas purulentas.—*Herpes* en casi todas las partes del cuerpo.—Verrugas.—*Piel arrugada.*—*Ragades* profundas, quemantes, dolorosas (en los dedos).

Digitized by Google

Sueño.—Sueño muy temprano por la noche.—Insomnio nocturno y desvelo frecuente.—*Ensueños violentos*, con sobresaltos frecuentes.

Fiebre.—Calofrios dia y noche.—*Frio*, aun cerca del fuego, por todo el cuerpo, excepto la cara y el pecho, pero principalmente *en los piés.*—Calor por la tarde con ebullicion de sangre, palpitaciones de corazon y sudor en la frente.

Moral.—Ansiedad con temblor de los piés.—Morosidad y mal humor, con aptitud al trabajo.—Irascibilidad y susceptibilidad.—Humor inconstante.

Cabeza.—Vértigo fijando mucho tiempo la vista en un objeto.—Vértigos con náuseas y eructos ácidos.—Dolores de cabeza con náuseas y vómitos ágrios.—Dolores de cabeza *lancinantes* ó presivos, ó bien *presivos y lancinantes á la vez.*—Dolores de cabeza calambroideos, semilaterales, como si la cabeza estuviese comprimida con un lazo, con oscurecimiento de los ojos, necesidad de acostarse y ruido sonoro en el cerebro á cada palabra que se pronuncia.—*Dolores como si golpearan en la cabeza.*—Ruido y zumbido en la cabeza.—*En el exterior de la cabeza dolores* presivos é incisivos, °*lancinantes*, *presivos*, tractivos y dislacerantes, que se agravan por el contacto y la marcha.—Sensibilidad de la piel del cráneo.—Caida de los cabellos.

Ojos.—Dolores en los ojos por la claridad del dia.—Presion en los ojos, sobre todo por la noche, leyendo á la luz de las bujías.—*Punzadas en los ojos.*—Sensacion quemante en los ojos y en los párpados.—Aglutinacion de los párpados por la mañana.—Angulos internos de los ojos, azules é hinchados.—*Oscurecimiento de la vista* como por una niebla.—Reflejo rojo del papel blanco, por la noche.

Oidos y nariz.—Punzadas en los oidos.—Contraccion y presion en los oidos.—Costras quemantes, pruritosas, en los lóbulos de las orejas.—Epistaxis.—Erupcion costrosa, debajo y por dentro de la nariz.—Coriza seca y obturacion de la nariz.—Mucosidades nasales y muy espesas.

Cara.—*Erupcion facial.*—Erupcion pruritosa en la frente, con sensacion quemante y resudacion despues de haberse rascado.—Manchas escabrosas de un color rojo pálido en la frente.—°Costras espesas en la cara.—Rigi-

Digitized by Google

dez y *tension en los maseteros*, y en las articulaciones de la mandíbula.—Herpes en el labio superior.—Vesículas purulentas y pruritosas en la barba.

Dientes.—Odontalgia con dislaceraciones tractivas por una corriente de aire frio, ó por bebidas frias.—Dentera en los dientes superiores.—Dislaceracion en las encías.—Encías hinchadas con dolor de excoriacion.

Boca y Garganta.—Sequedad de la boca.—Aftas en la lengua y en el paladar.—Ligera inflamacion de la garganta; con dolor lancinante al deglutir.—Presion calambroídea en la garganta, *como una estrangulacion*, con dificultad de la respiracion.—Sequedad y aspereza en la garganta, sobre todo por la mañana.—Acumulacion de mucosidades viscosas en la garganta.

Apetito.—*Gusto amargo*, ó ácido y pastoso, ó bien insípido, metálico y herbáceo.—Amarga el pan.—Insipidez de los alimentos.—Despues de la comida, sensacion de vacío en el estómago, como si se estuviera en ayunas, ó bien disgusto con solo pensar en las cosas que se han comido.—Sed, sobre todo de agua, aun por la mañana.

Estómago.—*Eructos y regurgitacion*, sobre todo *durante y despues de la comida*, generalmente *amargos*, ó ágrios.—°Náuseas frecuentes ó contínuas, con conato inútil de vomitar.—Vómitos ágrios.—Dolores constrictivos en el estómago.—Presion en la boca del estómago.—Calor y sensacion ardiente en el estómago, sobre todo despues de haber comido pan.

Vientre.—Dolor de quebrantamiento en el hipocondrio izquierdo.—Punzadas en el hipocondrio izquierdo.—Mucha sensibilidad de vientre á la presion exterior.—Dolores intestinales contractivos y calambroídeos.—Retortijones, sobre todo en la region umbilical.—*Punzadas en los lados del vientre*, sobre todo *en el izquierdo*.—Sensacion de frio ó calor y sensacion quemante en el vientre.—*Sensacion de vacuidad y borborigmos en el vientre*.—Abundante expulsion de gases fétidos.—Inercia de los intestinos.

Deposiciones.—Deposiciones duras, tardas y raras, frecuentemente con necesidad urgente.—*Evacuaciones alvinas, dolorosas, difíciles*, con dolores contractivos en el vientre y considerable presion hácia abajo.—°Estreñimiento tenaz, con gana frecuente de orinar.—Deposi-

Digitized by

cion glutinosa tenaz. — Deposiciones diarréicas, ácres, corrosivas, con dolores de vientre. — Durante la deposicion, accesos de desvanecimiento.—Dolor de excoriacion y prurito quemante en el ano.

Orinas.—*Tenesmo vesical*, con presion sobre la vejiga y secrecion de una materia blanca y turbia mezclada de mucosidades.—Conato frecuente de orinar, sin resultado ó con emision escasa.—*Emision frecuente y abundante de orina pálida dia y noche*, frecuentemente sin sensacion en las vías urinarias.—Orina turbia, cenagosa.—Orina inflamada, rara, roja.—Copos filiformes en las orinas. —Sangre en las orinas hácia el fin de la emision.—Orinas cargadas de arenilla y de pequeños cálculos.—*Sensacion quemante al orinar*.—Calambre de la vejiga, con dolor contractivo.—Flujo de pus por la uretra como una gonorrea.

Partes genitales.—Exhalacion fétida de las partes genitales.—Inflamacion y rubicundez del glande.—Dartros en el prepucio.—Deseo del cóito, con poluciones frecuentes y dolorosas.—Reglas retardadas, escasas y ácres. Durante las reglas gana de orinar, excoriacion entre los muslos, pellizcos en el vientre y apretamiento como por gárfios en los riñones y boca del estómago.—Leucorrea mucosa.

Laringe.—Tos violenta, y sensacion de ulceracion con cosquilleo, ó por aspereza en la garganta.—Respiracion corta y oprimida.—Disnea considerable y sofocacion por una sensacion de constriccion en la garganta, que obliga á desembarazarse de todos los vestidos que cubren el cuello y el pecho.—*Opresion calambroidea en el pecho*.—Respiracion, con frecuencia, profunda.—Al respirar profundamente, sensacion como si hubiese un cuerpo detenido en el dorso.—Aliento fétido.—Presion en el pecho, por lo regular con respiracion corta.—Punzadas en los costados del pecho que obligan, en general, á encorvarse.—Palpitaciones de corazon.—Dolor tensivo en el exterior del pecho como por acortamiento, al enderezarse.—Pezones flácidos, insensibles.

Tronco.—Dolor de quebrantamiento en los riñones, sobre todo cuando uno se baja, ó despues.—Hormigueo en los riñones.—Dolor tensivo desde los riñones hasta las caderas al menor movimiento.—Presion dolorosa y

Digitized by Google

tension en el dorso y en la nuca, con *lancinaciones al menor movimiento* del tronco ó de la cabeza.— Lancinaciones entre los omóplatos y en los músculos del cuello. —Hinchazon de un lado del cuello, dolorosa al tacto.

Brazos.— *Dolores de dislaceracion y punzadas presivas* en los brazos, los antebrazos y en las articulaciones de las manos y de los dedos.— Sudor en las manos.—Herpes en las manos.— Adormecimiento de los dedos.—Dolor en la punta de los dedos, como por ulceracion subcutánea.— Vesículas purulentas en los dedos.—*Ragades* profundas *en la piel de los dedos*.

Piernas.—*Dislaceracion presiva y punzadas* en los muslos, las rodillas y las piernas.— Laxitud en los muslos y en las articulaciones de las rodillas.— Hinchazon y rigidez de las rodillas con punzadas.— Manchas herpéticas rojas en las pantorrillas.—Rigidez de las piernas como por contraccion.— Calambres en las piernas y en las pantorrillas.— Sensibilidad dolorosa en la planta de los piés.— Tension é hinchazon de los piés, con calor y rubicundez.— °Frio en los piés, °sobre todo antes de acostarse.

174.—SECALE CORNUTUM.

SEC.— Centeno de cornezue'o.— HARTLAUB Y TRINKS.— *Hist. nat. y prep.*—Farmacopea homeop.— *Dósis usadas:* 3, 30.— *Duracion de accion;* hasta 7 semanas en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. (solan-nigr.).

COMPÁRESE CON: Arn. camph. ign. laur. veratr.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:— *Hemorragias*, sobre todo en sujetos débiles, caquécticos; Espasmos histéricos en las mujeres de una constitucion débil; Convulsiones causadas por un susto; Gangrena senil??; Ambliopia amaurótica; Hemorragia nasal; Padecimientos de los niños á consecuencia de la denticion; *Afecciones gástricas* y biliosas; Cólicos; Gastritis??; Enteritis??; *Cólera asiático y esporádico*; *Colerina*; Diarreas, sobre todo en los viejos; Metrorragias de

Digitized by Google

las mujeres débiles y caquécticas; Prodromos del aborto, sobre todo en el tercer mes; Falta de dolores de part Dolores de parto espasmódicos; Adherencia de la placenta; loquios de muy larga duracion; Metritis por supresion de los loquios; Afecciones histéricas por falta de vitalidad en el útero?; Afeccion gangrenosa de la matriz, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Traccion, dislaceracion, y *hormigueo en los miembros y en las articulaciones.—Dolores calambroideos*, violentos y erráticos.—Sensacion quemante en todas las partes del cuerpo, como por chispas.—*Distorsion de los miembros.—Espasmos* tóxicos.—Estremecimientos y *movimientos convulsivos de los miembros*, manifestándose sobre todo por *la noche*, y con frecuencia, tambien periódicamente, y aliviados estirando violentamente las partes.—Tétanos.—Ataques de epilepsia.—Atrofia general y *enflaquecimiento.*—Vacila al andar.—Desvanecimiento.—Mucha *laxitud y pereza.*—Temblor en los miembros.—*Debilidad, pesadez y entorpecimiento de los miembros.*—Parálisis.—Esfacelo de algunas partes.

Piel.—Piel sin color, aplomada, marchita y arrugada.—Piel áspera, seca.—Entorpecimiento é insensibilidad de la piel.—°Erupcion miliar, sobre todo en el pecho y en la nuca.—*Hormigueo subcutáneo.*—Descamacion general de la epidermis.—Petequias.—Forúnculos.—Pústulas negras, gangrenosas.—Vesículas sanguinolentas en los miembros, las que pasan á gangrena.

Sueño.—*Mucha gana de dormir y soñolencia.*—Sueño profundo, comatoso.—°Insomnio con agitacion y calor seco.—°Soñolencia con delirio, sobresaltos y espanto.

Fiebre.—Calofrio violento, seguido de calor quemante con mucha sed.—*Frio excesivo en el dorso, el vientre y los miembros.—°Calor seco, con pulso acelerado, agitacion é insomnio.—Pulso pequeño, suprimido.—*Sudores frios.

Moral.—Desánimo y carácter perezoso.—*Tristeza y melancolía.—*Angustia excesiva.—*Demencia furiosa* con deseo de arrojarse al agua.—Furor y gana de morder.—

Digitized by Google

°*Temor á la muerte.*—Manía.—Debilidad de las facultades intelectuales.—Enajenacion mental.—*Delirios.—*Pérdida del conocimiento.*

Cabeza.—*Cabeza embarazada, aturdida.*—Embriaguez.—**Accesos de vértigos de diferente naturaleza*, pero tenaces.—*Cefalalgia* con atontamiento sordo y doloroso, sobre todo *en el occipucio.*—Dolor de cabeza semilateral.—*Caida de los cabellos.*

Ojos.—**El globo de los ojos hundido.*—Pupilas contraidas espasmódicamente, ó bien dilatadas.—Ojos convulsos.—*Mirar fijo*, extraviado.—Diplopia.—Niebla, manchas y un velo delante de la vista.—Debilidad de la vista.—Se ven chispas y hay oscurecimiento de la vista.

Oidos y nariz.—Zumbido de oidos y *dureza.*—Sordera pasajera.—**Epistaxis.*

Cara y dientes.—**Rostro descolorido, pálido, amarillo*, cóncavo, *con los ojos hundidos, y cercos azules alrededor de ellos.*—Distorsion de los rasgos del semblante.—Manchas lívidas en la cara.—*Hormigueo en la cara.*—Labios y boca dolorosamente contraidos.—*Trismus.*—Rechinamiento de dientes.—*Vacilacion y caida de los dientes.*

Boca y garganta.—Sequedad de la boca con sed.—*Esputos de sangre.—Espuma en la boca*, sanguinolenta ó de un color verde-amarillento.—Lengua descolorida, parda ó negra, °ó bien cubierta de una costra espesa.—*Hormigueo* doloroso en la lengua.—Hinchazon de la lengua.—*Tartamudez*, palabra entorpecida, confusa, débil.—Sequedad de la garganta.—*Sensacion quemante ú hormigueo penoso en la garganta.*—(Inflamacion del esófago).

Estómago.—Gusto embotado.—**Sed ardiente, inextinguible.*—Hambre insaciable, sobre todo de alimentos ácidos.—°Erutos frecuentes.—**Disgusto y náuseas.—*Vomituricion y vómito de materias biliosas, crudas.*—Vómito fácil.—°Vómito de alimentos con mucha debilidad.—Vómito de lombrices.—*Vómito de mucosidades.*—Vómito de bílis negra.—*Presion en el estómago.*—Calambre de estómago.—*Sensibilidad dolorosa excesiva*, opresion penosa y *angustia en la boca del estómago*, con conato inútil de vomitar.—*Sensacion quemante en el estómago y en la boca de este.*—Inflamacion y cáncer del estómago.

Vientre.—*Vientre excesivamente timpanítico y tirante.—°Retortijones y dolores dislacerantes en el vientre.—

Digitized by Google

Dolores fijos, quemantes, en las regiones esplénica y lumbar.—°Cólicos con dolores de riñones, dolores en los muslos, erutos frecuentes y vómitos.— *Cólicos dolorosos con convulsiones.*—Sensacion de un frio excesivo en el vientre y en el dorso.—*Sensacion quemante en el vientre.—°Borborigmos.

Defecacion. — Estreñimiento con conato contínuo é inútil de deponer.—*Diarreas frecuentes con evacuaciones serosas, mucosas*, ó bien descoloridas ó parduscas.—Diarrea de olor pútrido.—**Diarreas* con °postracion repentina de fuerzas.—*Deposiciones involuntarias.*— Expulsion de lombrices.

Orinas.—Supresion de la secrecion de las orinas.—°Orinas raras, calientes, quemantes.—Orina emitida gota á gota, difícil, rara, con necesidad contínua de expelerla. —*Orina clara como el agua*, blanca.—Secrecion de orina aumentada.—*Hemorragia* por la uretra.

Reglas.—**Reglas muy abundantes y de muy larga duracion*, algunas veces con espasmos violentos.—**Metrorragias* de una sangre negra, líquida, que fluye, sobre todo, durante un movimiento un poco fuerte, algunas veces con hormigueo en las piernas y mucha debilidad.—**Aborto.*—°Despues del aborto, falta de contraccion del útero.—°Hinchazon y verrugas en el cuello de la matriz el que está dilatado.—*Congestion sanguínea en el útero.—Loquios raros, fétidos ó de muy larga duracion y sanguinolentos.—°*Descenso de la matriz.*—**Inflamacion de la matriz.*

Pecho.—Voz ronca, hueca.—Respiracion angustiosa y oprimida con suspiros y sollozos.—Disnea y opresion de pecho.—*Opresion de pecho con sofocacion* y calambre en el diafragma.—*Palpitaciones de corazon espasmódicas*, violentas.

Tronco.—*Hormigueo é insensiblidad en el dorso.*—Rigidez de la nuca.—Sensacion de frio en el dorso.—°Fuerte erupcion miliar en la nuca *y en el pecho.

Brazos.—Cansancio sumo, espasmódico, de los brazos con tirantez de la parte.—*Sensacion ardiente en las manos.*—Hinchazon de las manos con pústulas negras.—Hinchazon edematosa en la articulacion de la mano.—Distorsion de las manos.—*Hormigueo en la punta de los dedos*, con torpeza é insensibilidad de estas partes.—

Digitized by Google

Contraccion, distorsion y torcedura de los dedos.—Esfacelo de los dedos.

Piernas.—Laxitud y dolor de las piernas.—Contraccion de las piernas y de los dedos de los piés.—**Calambres penosos en las pantorrillas* y en la planta de los piés, sobre todo por la noche.—*Sensacion ardiente en los piés.*—Distorsion de los piés.—*Hinchazon de los piés*, con pústulas negras.—Esfacelo de los dedos.—*Hormigueo en los dedos de los piés.*

175.—SELENIUM.

SEL.—Selenio.—Hering.—*Hist. nat. y prep.*—Farmacop. homeop.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion*: 5 á 6 semanas en las afecciones crónicas.

Antídotos: Ign. puls.—El *cin.* y la *chin.* agravan los padecimientos.

Compárese con: Carb. cinnab. graph. ign. lach. merc. nitr-ac. puls. rhus. sull. thuj.—Sobre todo despues de *cinnab.* es cuando el selenio será eficaz, si desde luego se halla indicado.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores en todos los miembros como por un enfriamiento.—*Enflaquecimiento* excesivo sobre todo de la cara, de las manos y piernas.—La china produce padecimientos extraordinarios y agrava los ya existentes de un modo insoportable.—*Mucho deseo de estar acostado* y de dormir, sobre todo durante el calor del dia.—*Agravacion de los síntomas despues de haber dormido.*—*Imposibilidad de soportar las corrientes del aire.*—*Accesos de vértigos con desfallecimiento, sudor angustioso, cara pálida y descompuesta*, *náuseas y vómitos*, sobre todo despues del desayuno y de la comida, con debilidad excesiva, deposiciones biliosas, punzadas en el pecho como por encarcelacion de gases, cabeza dolorosamente oprimida, hipo y erutos frecuentes.

Piel—Hormigueo frecuente en partes circunscritas de la piel, con mucha gana de rascarse.—Erupciones miliares.—*Resudacion prolongada de las partes que han sido rasadas.*—Ulceras lisas.—**Erupcion sarnosa á consecuencia de la escarlatina.*

Sueño.—Soñolencia por la noche muy temprano, con sueño incompleto despues, y desvelo frecuente.—Sueño tardo al principio de la noche.—Estremecimiento del

Digitized by Google

cuerpo al dormirse.—*Sueño ligero por la noche*, con desvelo al menor ruido.—*Despierta muy de mañana y siempre á la misma hora.*—Ensueños de querellas y de crueldades.—Sueño lleno de ensueños, de cuentos y de cálculos.—Ensueños de viajes.

Fiebre.—Ardor quemante en algunas partes de la piel bastante extensa (del pecho, del vientre, de los lomos y de los costados).—Calor y frio que alternan constantemente.—*Disposicion excesiva á traspirar*, durante la marcha y en la siesta.—Sudor que forma manchas blancas en el lienzo y le enrojece (en el pecho y las axilas).

Moral.—*Desvarios religiosos y melancólicos.—Locuacidad excesiva.*—Olvido considerable, sobre todo respecto á los negocios.—Incapacidad absoluta de ejecutar un trabajo cualquiera.

Cabeza.—Fatiga en la cabeza por un trabajo intelectual.—Vértigo por la tarde yendo en carruaje, hasta hacer caer.—Vértigo al levantarse.—Dolor cotidiano de cabeza despues de medio dia.—*Dolores de cabeza despues de haber bebido limonada, vino ó té.*—Violentos accesos de dolores de cabeza, lancinantes por encima de los ojos, con necesidad de acostarse, sensibilidad á lo exterior de la cabeza, emision de orina abundante, falta de apetito y melancolía, provocado todo por el andar y por olores fuertes.—Caida de los cabellos al peinarlos.—Dolor en la piel del cráneo como si á uno le arrancaran los cabellos.—Punzadas en la frente, en las sienes y en los ojos, en pasando del aire frio al calor del cuarto.

Ojos.—Nariz.—Dolores en el fondo de las órbitas.—Vesículas pruritosas en las cejas y en el borde de los párpados.—Caida de los pelos de las cejas.—Secrecion muy abundante de un cerúmen, el que se endurece en un oido, del cual se está sordo.—Prurito en la nariz, en las ventanillas y en los bordes.—Necesidad de introducir los dedos en la nariz.—Obturacion de la nariz.—Coriza fluente por la tarde.—Mucosidades nasales amarillas, espesas, gelatinosas.

Cara.—Garganta.—Piel de la cara aceitosa.—Estremecimiento de los músculos de la cara.—Labio superior con grietas.—Odontalgia que obliga á servirse del mondadientes hasta que sale sangre.—Dolor en un diente cariado con sensacion de frio hasta la mejilla, agraván-

Digitized by Google

dose por la noche en la cama y aliviándose al aire libre, por el agua fria, la cerveza, el comer y el humo del tabaco.— Terebracion en las muelas.— Los dientes se ponen duros, lisos y rechinan cuando se frotan.— Sequedad de la garganta.— Especie de tartamudez que hace que se confundan las sílabas con las palabras.— Dolor debajo de la raiz de la lengua.—Lengua cubierta de una capa blanca y espesa por la mañana.— Mucha sequedad en la garganta, sobre todo por la tarde.

Apetito.—Gusto dulce, desagradable despues de haber fumado.—Falta de apetito por la mañana.—Hambre por la noche.—Repugnancia á las cosas saladas.— *Deseo frecuente de aguardiente.*—Hipo y erutos despues de haber fumado.—Despues de la comida, *latido en las arterias* de todo el cuerpo, *sobre todo en el vientre.*—Mucha sed por la tarde.

Vientre y deposiciones.— *Dolor en el hígado*, sobre todo *al inspirar*, extendiéndose hasta la region de los riñones, con sensibilidad á la presion exterior.—Miliar roja, pruritosa en la region hepática.—Punzadas violentas en el bazo al andar.—Constipacion.—Deposiciones duras, seguidas de flujo de mucosidades ó de sangre.—Deposiciones casi líquidas, con tenesmo.— Filamentos como cabellos en la deposicion.

Orinas.—Orina rara y de color oscuro, ó de olor de violeta.— *Orina roja por la tarde.*—Emision involuntaria de algunas gotas, andando.— *Sedimento rojo*, como de arcilla, ó como arena gruesa en las orinas.— Se orina con frecuencia, por la noche.— °*Gonorrea crónica.*

Partes genitales.—Cosquilleo y prurito en las partes genitales, sobre todo en el escroto.—*Impotencia* con ideas lascivas.—Poluciones con flacidez del miembro.—Flujo de esperma gota á gota, durante el sueño.— *Flujo de licor prostático* durante y fuera del tiempo de deponer.— Esperma seroso y sin olor.— Durante el cóito, erección débil, lenta y eyaculacion muy pronta.— Despues del cóito, debilidad y mal humor.

Laringe.—Ronquera al principiar á cantar.—Estertor mucoso y de pequeños globulitos de sangre.— Tos matutina que fatiga todo el pecho, con expectoracion de sangre y de pequeños glóbulos de mucosidades.— Dificultad de respirar durante la marcha al aire libre.—Ne-

Digitized by Google

cesidad frecuente de respirar profundamente, como suspiros.—Sofocacion por la noche estando ya acostado, causada por dolores en el pecho, en el costado y en los riñones.

Tronco y extremidades. —Sensacion de parálisis en los riñones.—Rigidez en los músculos del cuello y de la nuca, que no deja volver la cabeza.—Miliar en los antebrazos.—Dislaceracion nocturna en las manos.—Prurito en la muñeca, en la palma de las manos, como tambien en los dedos y entre estos.—Granos sarnosos en la mano.—Enflaquecimiento de las manos.—Granos pruritosos en las nalgas y en los muslos, cerca del escroto.—Enflaquecimiento de las piernas.—Crujido de las rodillas al doblarlas.—Ulceras lisas en las piernas.—*Prurito en los piés por la tarde*, sobre todo *alrededor de los maléolos*.

176.—SENECIO AUREUS.

SENEG.—Véase HALE, *Remedios americanos*.

AVISOS CLINICOS.—Este medicamento ha sido usado hasta aquí con éxito contra: *Ascitis*, con fuerte tirantez de vientre, dolor en las regiones de los lomos y de los ovarios, edema de los miembros inferiores, orinas escasas y oscuras, que alternan á veces con otras abundantes y acuosas.—*Dismenorrea*, con reglas muy anticipadas y abundantes, dolores incisivos en la region del sacro, hipogástrica é inguinal, cara pálida, estado nervioso y tos nocturna.—*Supresion de las reglas*, con irritabilidad nerviosa, insomnio, desgana, lengua súcia, estreñimiento, laxitud contínua, horror al movimiento y dolores errantes en el dorso y las escápulas.—*Hemoptisis*, á consecuencia de la detencion de las reglas, así como despues de las evacuaciones sanguíneas.—*Amenorrea*; *Dismenorrea*; *Metrorragias*; *Leucorreas*; *Clorósis*; *Lóquios* muy prolongados y abundantes. *Afecciones catarrales de la cabeza*, de los ojos, nariz y oidos.—*Insomnio habitual*.—*Hidropesias*; Orinas su-

Digitized by Google

primidas; grande irritabilidad de la vejiga; *Disuria* de las mujeres y de los niños; *Hematuria.*

SINTOMAS PRINCIPALES.—Ensueños vivos, de un carácter intelectual; sueño agitado; frecuente despertar por la noche; despertar de tal modo que no se sabe dar razon de si se ha dormido ó no.—Calor en el sincipucio; dolor de cabeza pesado, con estupor; plenitud desagradable en la cabeza; punzadas agudas, que pasan de dentro áfuera.—Vértigo, muchas veces al dia, pasando como un vapor del occipucio alsincipucio.—Punzadas agudas en los ojos, de dentro afuera.—Sensacion de plenitud en la nariz, aliviada por un estilicidio mucoso abundante.—Lagrimeo al aire libre.—Orinas aumentadas, acuosas; frecuentes y abundantes; disminucion de la orina; orinas escasas y oscuras; orina de sangre; tenesmo en la vejiga.

177.—SENEGA.

SENEG.—Polígala de Virginia.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* 5 semenas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Arn. bell. bry. camph.

COMPÁRESE CON: Arn. ars. bar. *bell. bry.* canth. euphr. squill. *stann.* sulf.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—*Padecimientos de las membranas mucosas*; Afecciones de personas pletóricas con laxitud de la fibra; Anasarca é infiltracion serosa en los órganos internos?; Inflamaciones internas; Ulceras por mordedura de animales venenosos; Anginas catarrales y mucosas?; Grippe; Laringitis crónica?; Tísis laríngea?; Blenorrea de los pulmones; Tísis mucosa?; Neumonía?; Hidrotorax?; etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Sensacion de una excesiva laxitud*, general, con temblor, sobre todo en los miembros inferiores.—*Mucho abatimiento moral y físico*, con pandiculacion de los miembros, torpeza, sensacion de vacío y latidos en la cabeza.—Debilidad suma que parece proceder del pecho.—*Desvanecimiento*, paseándose al aire libre.—Muchos sufrimientos, sobre todo los del pecho, se agravan con el reposo y se mejoran andando al aire libre.—Mucha tendencia al sueño por la tarde y *sueño profundo y adormecimiento* á poco de haberse acostado.—Sueño agitado por afecciones de pecho, ó bien calambres de estómago hácia la mañana.—Calofrios frecuentes, que provienen de laxitud en las piernas.—Horripilacion en el dorso, con calor en la cara, sensacion quemante en los ojos, disnea, punzadas en el pecho y latidos en la cabeza.—*Melancolía hipocondriaca* con mucha *susceptibilidad á las ofensas.*—*Angustia excesiva*, frecuentemente con respiracion acelerada y precipitada.—Alegría con irritabilidad y disposicion á entregarse á accesos de cólera y de furor.

Cabeza.—Atontamiento de cabeza, con aturdimiento.—*Turbacion y sensacion de vacio en la cabeza*, con presion en los ojos.—Vértigo con ruido en los oidos.—*Dolores de cabeza que afectan al mismo tiempo los ojos, se agravan con el calor de la habitacion y se alivian* al aire libre ó *al frio.*—*Cefalalgias presivas* en la frente y en las órbitas.—Traccion en el sincipucio y en las sienes, hasta la cara.—Congestion de sangre á la cabeza y los ojos, en bajándose.—Cefalalgia pulsativa, con presion en los ojos.—*Horripilacion en la piel del cráneo* y prurito.—Erupcion en la cabeza.

Ojos.—Dolor en los ojos, como si se dilatasen *y se les impeliera hácia afuera de sus órbitas.*—*Presion en los ojos por la noche*, sobre todo á la luz artificial y en bajándose.—Congestion de sangre á los ojos, en bajándose.—Sensacion de ardor en los ojos en leyendo ó escribiendo (por la tarde).—Hinchazon de los párpados con presion quemante y hormigueo.—Sequedad en los ojos.—*Lagrimeo* al aire libre y mirando fijamente un objeto.—*Por la mañana acumulacion de legañas secas en los párpados.*—Estremecimiento y traccion espasmódica en los párpados.—Los párpados inferiores contraidos convulsamente.—Mi-

Digitized by

rar fijo.—*Opacidad de la córnea.*—*Ambliopia*, con resplandores delante de los ojos aumentados, frotándolos.—Confusion de los caractéres y deslumbramiento al leer.—Todos los objetos parece que están en la sombra.—Se ven manchas brillantes.—Fotofobia.

Oidos y nariz. —*Presion en los oidos* durante la masticacion.—Sensibilidad dolorosa del oido.—Prurito en el interior de la nariz.—*Olor de pus en la nariz.*—Estornudo con dolor de excoriacion en el pecho.—Sequedad penosa en la nariz.

Cara y dientes.—Sensacion de parálisis en los músculos de la cara.—*Vésiculas* quemantes *en las comisuras de los labios*, y en el labio superior.—Dentera.—Hormigueo en los dientes, inspirando (el aire húmedo y frio).

Boca.—*Sequedad de la boca*, sobre todo por la mañana.—*Secrecion de saliva muy abundante.*—Aliento pútrido.—Lengua cubierta de una capa blanca.—Sensacion quemante en la lengua y en el paladar.

Garganta.—Irritacion en la garganta, como si estuviera excoriada y en carne viva.—Arañamiento, *sensacion quemante y sequedad en la garganta*, con irritacion que provoca la tos y locucion difícil.—Sensacion de constriccion en la garganta.—*Hinchazon inflamatoria del paladar y de la úvula.*—*Abundante acumulacion de mucosidades viscosas en la garganta* y en el paladar, que se desprenden en pequeños glóbulos.

Apetito.—Gusto menos pronunciado de los alimentos.—*Gusto metálico en la boca*, ó como de orina.—Gusto pastoso en la boca.—*Falta total de apetito* sobre todo *por la mañana.*—Hambre corrosiva con sensacion de vacío en el estómago.—*Sed ardiente.*

Estómago.—Erutos.—Disgusto y *náuseas*, con propension al vómito, *que parece proceden del estómago*, con vomituricion.—Vómitos con diarrea y mucha angustia.—*Calambre en el estómago con dolor presivo*, aun por la noche.—Sensacion ardiente en el estómago.—Sensacion de vacío en el estómago.

Vientre.—*Incomodidad en el vientre con dolores terebrantes* y como si escarbaran, sobre todo en la parte superior del vientre y en los hipocondrios.—Como si royeran en el bajo vientre.—Ardor y apretamiento en la parte superior del vientre al inspirar.—*Traccion entre los tegu-*

Digitized by Google

mentos del vientre como por un cuerpo extraño.—Afecciones flatulentas con sensacion como si todo se dirigiese hácia el bajo vientre.

Deposiciones.—*Deposiciones lentas, duras y raras*, con esfuerzos y seguidas de presion en el ano y en el recto.—Evacuaciones diarréicas, frecuentes, y de la consistencia de papilla.

Orinas.—*Secrecion de orina disminuida.*—Secrecion mas abundante de orina.—*Se orina en la cama por la noche.*—Orina espumosa, ó mezclada de filamentos mucosos, y que se vuelve turbia y nebulosa en cuanto se enfria.—Sedimento rojizo en las orinas, con copos mucosos.—Sensacion al orinar como si la uretra estuviese obstruida.—Punzadas y *sensacion quemante en la uretra*, despues y *durante la emision de orinas.*

Partes genitales.—Exaltacion del apetito venéreo con erecciones dolorosas.—Leucorrea mucosa.

Laringe.—Excesiva sequedad de la laringe, sobre todo por la mañana y antes de medio dia.—*Ronquera* y aspereza en la garganta.—Cosquilleo y sensacion quemante en la laringe, sobre todo estando acostado, con peligro de sofocacion.—*Acumulacion abundante de mucosidades en la laringe y en la tráquea-arteria* con respiracion corta.—*Tos* seca y conmovente, *provocada por un cosquilleo en la laringe*, mas fuerte al aire libre.—Con la tos, expectoracion de mucosidades trasparentes y amarillas.—*Tos con expectoracion abundante de mucosidades viscosas.*

Pecho.—*Disnea* con sensacion de *estancacion de sangre en los pulmones.*—Respiracion corta andando ligero, ó subiendo una escalera.—*Opresion de pecho* penosa, sobre todo *al aire libre*, y bajándose como si el torax fuese demasiado estrecho.—*Presion en el pecho*, sobre todo *durante el reposo*, y por la mañana y por la noche al despertarse.—Mucha sensibilidad de las paredes internas del pecho al tacto.—Apretamiento y dolores calambroídeos en el pecho, con agitacion y ansiedad, sobre todo cuando se está acostado sobre el costado.—*Punzadas en el pecho*, sobre todo al inspirar y al toser.—*Dolor de excoriacion en el pecho*, agravado por la presion exterior, el movimiento, tosiendo y estornudando.—Traccion y *sensacion quemante en el pecho.*—Hormigueo en el pecho.—Fuerte *congestion de sangre en el pecho, con pulsacion* y

Digitized by Google

hervidero hasta el punto de hacer caer en desvanecimiento.—Latido del corazon, violento, conmovente.—Presion y terebracion en la region del corazon,—La mayor parte de los *sufrimientos del pecho son mas fuertes durante el reposo*, y no dificultan la respiracion.

Tronco y extremidades.—Presion y traccion en el dorso y en los omóplatos, así como tambien entre y debajo de estos.—Sensacion quemante y prurito subcutáneo en todo el dorso.—Traccion paralítica en los antebrazos hasta los dedos.—Dolor de luxacion en la articulacion de la mano.—*Sensacion de laxitud en las piernas* con *sensacion de parálisis en las articulaciones*.—Dolor de luxacion en la articulacion coxo-femoral.—Temblor en las piernas.

178.—SEPIA.

SEP.—Jugo de la gibia ordinaria ó sepia, Tinta de gibia.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 7 á 8 semanas en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Acetum. acon. nitr-sp. tart.—*Se emplea como antídoto de*: Calc-ph. chin. merc. sassap.? sulf.

COMPÁRESE CON: *Acon.* ambr. ant. *ars. bar. bell. carb-v.* caus. cham. *chin.* coff. con. fer. graph. ign. led. *lyc. merc.* natr. natr-m. *nitr-ac.* n-mos. *n-vom.* petr. phos. phos-ac. plumb. *puls. rhod. rhus.* sabad. sass. *sil. sulf. tart. verat.* zinc. Cuando la sepia se mostrará eficaz, siempre que se halle indicada, será sobre todo despues de: *Caus. led. merc. puls, sil.* y *sulf.*—Despues de sepia, conviene algunas veces: *Car-v. caus. puls.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—*Afecciones del sexo femenino* y sobre todo de las mujeres de una constitucion débil, que tienen la piel delicada y sensible; Afecciones de los vasos capilares y del sistema nervioso; Afecciones debidas á una contrariedad; Debilidad física y nerviosa á causa del onanismo; Afecciones escrofulosas (y raquíticas?); Infarto é inflamacion de las glándulas; Tumores linfáticos, inflamatorios; Afecciones reumáticas, sobre todo en las personas de una talla elevada; *Extension de los ligamentos* (despues de *rhus*); Erupciones y dartros crónicos; Sarna; Manchas lívidas de

Digitized by Google

las mujeres embarazadas ó nerviosas; Induraciones escirrosas; Verrugas; Fiebres intermitentes; Manía; Histeria; Cefalalgias nerviosas é *histéricas; Jaqueca*; Tiña; Oftalmías escrofulosas y otras; Ambliopia amaurótica; Hemorragia nasal; Costra láctea; Estomacace y afeccion escorbútica de las encías?; *Odontalgias sobre todo en las mujeres histéricas ó embarazadas*; Disposicion crónica á las anginas; Dispépsia, acedías, gastralgia y otras afecciones gástricas; *Abultamiento del vientre en las mujeres de edad*; Ascitis; Diarreas aun en los sujetos escrofulosos; Blenorrea del recto?; Estreñimiento crónico; Gonorrea crónica; Poluciones á consecuencia del onanismo; Dismenia de las jóvenes, *Dismenorrea*; Metrorragias; *Amenorrea*; Clorósis?; *Leucorreas*; Odontalgia; constipacion ó diarrea, afecciones gástricas con vómito, manchas amarillentas en la piel y otros *padecimientos de las embarazadas*; Disposicion al aborto; Excoriacion de los pechos; Excoriacion en los niños; Tos de diferentes especies; Coqueluche?; Neumonía?; Hemoptísis; Padecimientos tísicos; Panadizos; etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Punzadas y dolores como picotazos* en los miembros y otras partes del cuerpo.—*Dolores quemantes en diversas partes del cuerpo.—*Tension en los miembros como si fuesen demasiado cortos.—Traccion y dislaceracion en los miembros y en las articulaciones.—Dolores que se alivian por el calor exterior.—Dolores por accesos con horripilacion.—*Dolor de luxacion, sobre todo el que es debido á un esfuerzo de la parte afecta, así como tambien por la noche con el calor de la cama.—*Dolores reumáticos con hinchazon de las partes afectas, sudor excitado fácilmente, despeluzamiento ó calofrios alternando con calor.—**Incomodidades muy considerables á consecuencia de contrariedades.*—*Adormecimiento fácil de los miembros (brazos y piernas), sobre todo despues de un trabajo manual.—**Rigidez y falta de flexibilidad en las articulaciones.*—Luxaciones y fáciles torceduras de los miembros.—*Disposicion á derrengarse.—**Conmociones y estremecimiento de los miembros* dia y noche.—*Estremecimientos en los músculos.—Accesos de malestar y espasmos histéricos.—Hincha-

Digitized by Google

zon y supuracion de las glándulas.—Exacerbacion y renovacion de muchos sufrimientos durante é inmediatamente despues de la comida.—*Los síntomas se disipan mientras dura todo ejercicio violento*, excepto el de equitacion, y *se agravan* durante el reposo, así como *por la tarde*, por la noche al calor de la cama (y antes de medio dia).—Sensibilidad dolorosa en todo el cuerpo.—Traccion en todos los miembros.—*Pandiculaciones frecuentes.—***Inquietud y pulsacion en todos los miembros*, con agitacion que no permite estar quieto en ninguna parte.—**Excesiva ebullicion de sangre aun por la noche*, con pulsacion en todo el cuerpo.—Hinchazon general del cuerpo, con respiracion corta, sin sed.—Torpeza y pereza física.—°Falta de firmeza en los miembros.—*Accesos de debilidad y de desfallecimiento histéricos ú otros.—Desvanecimiento.—*Laxitud con temblor.—**Falta de vigor*, algunas veces tan solo *al despertarse*.—*Se fatiga pronto paseándose al aire libre.—*Mucha disposicion á acatarrarse*, y *sensibilidad al aire frio*, sobre todo al viento norte.—Despues de haberse mojado, calofrio febril, accesos de desvanecimiento y coriza.

Piel.—Excesiva sensibilidad de la piel.—Prurito en diversas partes, que se cambia en sensacion quemante.—Prurito y erupcion granulosa en las articulaciones.—*Excoriacion, sobre todo en las articulaciones.—**Erupciones como la sarna*, secas y pruritosas.—*Manchas *pardas*, ó de color de vino, ó *rojizas y herpéticas*, en la piel.—*Descamacion en forma de anillo (herpes anulares).—°Herpes húmedos, costrosos, con prurito y sensacion quemante.—*Forúnculos*.—*Glándulas infartadas.—°Induraciones escirrosas.—°Erupcion de vesículas, semejantes al pénfigo.—*Ulceras* pruritosas, lancinantes, quemantes ó algunas veces *indolentes*.—Clavos en los piés con dolor lancinante.—Deformidad de las uñas.—°Manchas hepáticas.—°*Hidropesia de los borrachos*.

Sueño.—**Mucha tendencia al sueño de dia* y por la noche muy temprano.—Accesos de somnolencia que reaparecen con tipo terciana.—Sueño tardo por la noche.—Insomnio por sobreexcitacion.—Despierta muy temprano y vigilia prolongada.—**Se desvela con frecuencia sin causa apreciable*.—**Sueño agitado con excesiva ebullicion de sangre*, agitacion continua, *ensueños* fantásticos, *angustiosos y es-*

Digitized by

pantosos, y sobresaltos frecuentes con espantó.—Durante el sueño, se le figura estar oyendo que le llaman.—*Sueño no reparador; por la mañana parece que no ha dormido lo bastante.—*Ensueños lascivos.*—Habla durmiendo, grita y los músculos se estremecen.—Por la noche, divagaciones, angustia, calor febril y agitacion en el cuerpo, dolores de muelas, cólicos, tos y otros muchos padecimientos.

Fiebre—Horripilacion durante los dolores.—**Falta de calor vital.*—Despeluzamiento frecuente, sobre todo por la tarde al aire libre.—**Accesos de calor* (*fugaz*), sobre todo estando sentado y paseándose al aire libre, como tambien cuando se enfada ó durante una conversacion interesante.—Accesos de calor (y de calofrios), con sed.—Calor contínuo, con rubicundez de la cara y mucha sed.—°*Fiebre con sed durante los calofrios,* dolores en los miembros, frio glacial de las manos y de los piés, dedos como muertos.—°Sudor mientras se está sentado.—**Sudor abundante al mas ligero movimiento.*—**Sudores nocturnos*, algunas veces frios.—*Sudores matutinos*, algunas veces de *olor ácido.*

Moral.—**Tristeza y abatimiento con llantos.*—*Melancolía y morosidad.—**Angustia* é inquietud, algunas veces con calor fugaz, generalmente *por la tarde*, y á veces en la cama.—*Excesiva inquietud sobre su estado de salud.*—°Carácter pensativo.—*Mucha propension á asustarse.—**Desaliento*, muchas veces hasta llegar á disgustarse de la vida.—**Indiferencia* hácia todas las cosas y aun para sus mas allegados.—°Repugnancia á ocuparse de negocio alguno.—*Carácter susceptible*, *áspero*, con propension á encolerizarse y arrebatarse.—Humor querelloso y mordaz.—**Debilidad de la memoria.*—Distraccion.—Disposicion á equivocarse hablando y escribiendo.—*Inaptitud para los trabajos intelectuales.—Lentitud en la marcha de las ideas.

Cabeza.—**Atolondramiento de cabeza.—Accesos de vértigo*, sobre todo *paseándose al aire libre*, ó escribiendo, ó bien al menor movimiento de los brazos.—*Vértigo*, como si todos los objetos se moviesen, ó como si alguna cosa rodara dentro de la cabeza.—Vértigo por la mañana al levantarse, ó despues de medio dia.—**Accesos de dolores de cabeza*, *con náuseas*, *vómitos* y dolores lancinantes ó tere-

Digitized by Google

brantes que obligan á gritar.—**Dolores de cabeza todas las mañanas.*—*Dolores de cabeza que no permiten abrir los ojos.—*Dolores de cabeza con deseo excesivo del cóito. —*Cefalalgia sacudiendo ó moviendo la cabeza, así como tambien á cada paso que se da*, como si el cerebro estuviese conmovido.—*Dolores de cabeza semilaterales*, algunas veces por la noche despues de acostarse, precedidos de *pesadez de cabeza.*—*Pesadez de la cabeza.—*Cefalalgia presiva por encima de los ojos, y á la fuerte claridad del dia.—**Presion espansiva en la cabeza*, algunas veces *al bajarse*, como si fuera á estallar.—Contraccion en la cabeza. —Traccion y dislaceracion en la cabeza, algunas veces de un solo lado.—*Cefalalgia lancinante*, frecuentemente semilateral ó frontal.—*Estremecimiento y sacudidas en la cabeza.—**Cefalalgia pulsativa*, sobre todo en el occipucio.—**Considerable congestion de sangre á la cabeza*, con calor sobre todo bajándose.—Frio al exterior de la cabeza. —*Temblor involuntario y *sacudidas de la cabeza.*—Movilidad de la piel del cráneo.—**Prurito en la cabeza.*—*Costras húmedas en la cabeza.—Caida de los cabellos.—Hinchazon de la cabeza, sobre todo en la frente.

Ojos.—°Pesadez y caida del párpado superior.—**Presion en el globo de los ojos.*—Prurito y escozor en los ojos y en los párpados.—°Picotazos en los ojos por la noche á la luz artificial.—Sensacion quemante en los ojos, sobre todo por la mañana al despertar.—*°Inflamacion de los ojos*, con rubicundez de la esclerótica y *punzadas.*—*Inflamacion, rubicundez é hinchazon de los párpados*, con orzuelos.—°Pústulas en la córnea.—*Hinchazon de los ojos, °sobre todo por la mañana al despertar.—Costras en las cejas.—Ojos vidriosos, anegados en lágrimas, por la tarde.—°Fungus hematodes en la córnea.—Costras secas en los párpados, sobre todo por la mañana al despertar.—Color amarillo de la esclerótica.—Lagrimeo, sobre todo por la mañana, ó **aglutinacion nocturna de los párpados.*—Temblor y estremecimiento de los párpados. —°Parálisis de los párpados é **imposibilidad de abrirlos*, sobre todo *por la noche.*—Vista turbia leyendo ó escribiendo.—*°Presbiopia.*—°Debilidad de la vista, como por amaurosis, con las pupilas contraïdas.—*°Velo, *manchas negras*, °puntos y señales luminosas delante de la vista. —Reflejo verde alrededor de la luz de la bujía, al prin-

Digitized by Google

cipio de la noche.—**Mucha susceptibilidad de los ojos á la luz del dia.*

Oidos.—Otalgia.—*Punzadas en los oidos.*—Dolor de excoriacion en el oido.—Hinchazon y erupcion purulenta en el exterior de la oreja.—Herpes en el lóbulo de la oreja.—Otorrea purulenta, con prurito.—°Sensibilidad excesiva del oido á la música.—°Dureza de oido.—Sordera pronta, como por un tapon en los oidos.—Ruido y *zumbido de oidos.*—°Herpes detrás de las orejas y en la nuca.

Nariz.—**Hinchazon* é inflamacion *de la nariz*, sobre todo *en la punta.*—Costras en la punta de la nariz.—*Ventanillas de la nariz, costrosas y ulceradas.*—Mucosidades endurecidas en la nariz.—*Epistaxis con estrias de sangre al sonarse*, °y aun por el mas leve acaloramiento, ó la mas ligera contusion en la nariz.—°*Falta de olfato.*—°Olor fétido en la nariz.—**Obturacion ó sequedad* penosa *de la nariz.*—Coriza seca.—Mucosidades secas que obstruyen la nariz.—Violenta coriza fluente, con estornudo, dolor en el occipucio y traccion en los miembros.

Cara.—*Palidez del rostro* con ojeras azules y ojos de un color encendido y empañados.—**Color amarillo de la cara.*—°Enflaquecimiento de la cara.—°*Señal amarilla en la nariz y las mejillas.*—Mucho calor en la cara.—Abotagamiento pálido de la cara.—°Inflamacion erisipelatosa é hinchazon *de un* solo lado de la cara (proveniente de una muela cariada).—Hinchazon inflamatoria de la cara con granos aproximados, cubiertos de una costra amarilla.—°Dartros y costras en la cara.—°Verrugas en la cara.—Puntos negros en la cara.—Prurito y *erupcion en la cara y en la frente*, algunas veces como barros, y aspereza de la piel.—Tumores en la frente.—*Dolores faciales*, tractivos.—Dolor calambroídeo y dislaceracion en los huesos de la cara.—**Prosopalgia en la region supraorbitaria*, como chispas eléctricas mas fuertes durante el excesivo calor del verano.—°Sequedad y exfoliacion de los labios.—Tension del labio inferior.—**Color amarillo y erupcion herpética alrededor de la boca.*—Erupciones húmedas y costrosas en la parte roja de los labios y en la barba.—Ulceras dolorosas en la cara interna de los labios.—Infarto y sensibilidad dolorosa de las glándulas submaxilares.

Digitized by

Dientes.—Odontalgia cuando se aprietan los dientes, ó cuando se les toca, en hablando y por la mas leve corriente de aire frio.—Odontalgia nocturna con mucha sobreexcitacion.—**Odontalgia* pulsativa ó *lancinante*, ó bien *tractiva* que se extiende algunas veces hasta el oido, y aun llega á sentirse el dolor en los brazos y los dedos. —*°Dolores de muelas con dificultad de la respiracion*, fluxion á la mejilla, infartacion de las glándulas sub-maxilares, y tos, ó bien con mucho hervidero de sangre y pulsacion en todo el cuerpo.—Sacudidas dislacerantes en la dentadura.—Embotamiento, vacilacion, facilidad á dar sangre y *cáries de la dentadura*.—*Hinchazon, excoriacion, ulceracion y facilidad á sangrar las encías.

Boca.—*Aliento fétido.*—Hinchazon en el interior de la boca.—*Sequedad de la boca y de la lengua.—Salivacion salada.—Dolor en la lengua y el paladar como si estuviesen quemados.—Excoriacion de la lengua.—Vesículas en la lengua.—*Lengua cubierta de una costra blanca.

Garganta.—Ligera irritacion en la garganta con hinchazon de las glándulas del cuello.—*Sensacion* presiva como si hubiese *un tapon en la garganta*, ó *dolor de excoriacion y *punzadas* durante la deglucion.—*Estremecimiento en la garganta.—Hinchazon é inflamacion de la faringe.—Inflamacion, hinchazon y supuracion de las amígdalas.—Sequedad en la garganta con tension y arañamiento.—°Garganta como pastosa.—Acumulacion de mucosidades en la garganta y en el velo del paladar. —**Estertor mucoso*, sobre todo por la mañana.—Expulsion de mucosidades sanguinolentas por acumulacion, y ruidosas.

Apetito.—*Sabor pútrido ó ácido.*—Sabor muy salado de los alimentos.—*Adipsia ó *sed excesiva*, *sobre todo por la mañana* y por la tarde; algunas veces con anorexia.—**Voracidad excesiva.*—*Bulimia ¯con sensacion de vacío en el estómago.—Deseo ardiente de vino.—**Repugnancia y disgusto á los alimentos*, sobre todo á la carne y °la leche, ¯que produce diarrea.—El humo del tabaco se hace insoportable.—°Despues de tomar alimentos grasos, erutos desagradables con náuseas.—°Debilidad de la digestion.—**Despues de la comida*, *acedías en la boca*, ¯erutos frecuentes, arañamiento y sensacion ardiente en la gar-

Digitized by

ganta, pulsacion en la boca del estómago, hipo, *timpanitis*, sudor, calor febril, palpitaciones de corazon, cefalalgia, náuseas, vómitos, dolores de estómago, etc.

Estomago. —**Eructos frecuentes*, generalmente *ácidos* ó amargos, ¯ó bien como huevos podridos, ó con el gusto á los alimentos que se han tomado.—*Eructos dolorosos*, durante los cuales viene alguna sangre á la boca.—°Accesos con disgusto de la vida.—*Náuseas*, algunas veces *por la mañana en ayunas*, que se alivian tomando alguna cantidad de alimento.—Náuseas con sabor amargo y eructos.—*Náuseas por el movimiento del carruaje.*—°*Náuseas* y vómitos *despues de la comida.*—**Vómitos de bilis* y de alimentos.—**Dolores de estómago despues de la comida*, algunas veces al anochecer.—Dolor violento en el cardias, durante la ingestion de los alimentos.—°Dolor en la boca del estómago al andar.—**Presion en el estómago* como por una piedra, sobre todo mientras ó *despues de la comida*, ó bien por la noche.—°Calambres de estómago contractivos.—**Pituitas del estómago*, °sobre todo despues de haber bebido, ó precedidas de una sensacion de trastorno en el estómago.— Vómito de serosidades lechosas (en las embarazadas).—Vómito nocturno con cefalalgia. —Calambres de estómago y de pecho.—Terebracion dislacerante en la region estomacal, extendiéndose hasta los riñones.—**Punzadas* presivas *en la boca del estómago* y en la misma region.—**Sensacion ardiente en el estómago y en la boca del mismo.—Palpitacion en la boca del estómago.* —*Sensacion de vacio en el estómago*, dolorosa.

Vientre.—Dolores en el hígado andando en carruaje.—Presion, palpitaciones y *punzadas en la region hepática.*—°Terebracion, ¯ó *punzadas* tensivas *en los hipocondrios*, sobre todo durante el movimiento.—Punzadas en el hipocondrio izquierdo.—Dolores de vientre por la mañana en la cama.—**Presion y peso en el vientre*, con sensacion de expansion como si fuese á estallar.—*Timpanitis excesiva.*—Pesadez y *dureza en el bajo vientre.—°*Abultamiento de vientre (en las mujeres que han parido).*—*Ascitis. —*Calambres abdominales* con dolor de arañamiento como si pellizcaran, y si estuvieran retorciendo los intestinos. —**Cólicos incisivos*, sobre todo *despues de un ejercicio corporal*, ó por la noche con propension á evacuar el vientre.—*Sensacion como si escarbaran, retortijones y *pre-*

Digitized by Google

sion en el bajo vientre.—*Dolor de contusion en los intestinos.—°Frio en el vientre.—**Sensacion quemante y punzadas en el vientre*, sobre todo en el costado izquierdo y algunas veces hasta el muslo.—Sensacion de vacío en el vientre.—Lancinaciones en las ingles.—Manchas parduscas en el vientre.—**Movimientos y borborigmos en el vientre*, sobre todo despues de la comida.—Produccion abundante y retencion de gases.

Defecacion.—**Gana de deponer sin resultado, ó solamente con evacuacion de mucosidades* y de gases.—*Evacuaciones insuficientes, lentas y caprinas.—Evacuaciones escasas con esfuerzos y tenesmo.—**Deposiciones muy blandas.*—Deposiciones gelatinosas con retortijones.—**Diarreas debilitantes.*—**Diarreas verdosas*, frecuentemente con olor pútrido ó ácido, sobre todo en los niños.—*Flujo de sangre por el ano con la deposicion.—Dolor contractivo y tension, *prurito*, hormigueo, *sensacion quemante* y *punzadas en el ano y en el recto.*—Exudacion por el recto.—°Flujo mucoso por el recto con dolores lancinantes y de dislaceracion.—**Prolapsus del recto*, sobre todo *en el acto de la deposicion.*—Congestion de sangre al ano.—*Salida de granos hemorroidales.—Hemorróides fluentes.—Excoriacion en las nalgas.—Dolor contractivo en el periné.

Orinas.—*Necesidad frecuente de orinar* y sin resultado.—**Presion en la vejiga.*—*Emision de orina por la noche.—**Se orina en la cama* al primer sueño.—*Orina oscura de un rojo color de sangre.—*Orina turbia, con sedimento rojo, arenoso ó color de ladrillo.—Orina fétida, abundante, con sedimento blanco.—Orina que deposita sangre.—Calambre de la vejiga.—Sensacion quemante en la vejiga y en la uretra.—**Escozor en la uretra*, sobre todo al orinar.—Dolores incisivos y punzadas en la uretra.—°Flujo mucoso por la uretra, como una gonorrea crónica.

Partes genitales.—**Sudor abundante en las partes genitales*, y sobre todo en los testículos.—*Prurito alrededor de las partes genitales.—Erupcion pruritosa en el glande y prepucio.—**Gonorrea bastarda*, de olor ácido, salado.—Ulceras en el glande y en el prepucio.—*Dolores en los testículos.—°Hinchazon del escroto.—°Debilidad de las partes genitales.—Exaltacion del apetito venéreo,

Digitized by Google

con erecciones frecuentes.—*Poluciones frecuentes.*—Flujo de licor prostático, despues de haber orinado y durante una deposicion difícil.—Despues del cóito y las poluciones, fatiga física, moral é intelectual.

Reglas.—*Excoriacion en la vulva y entre los muslos*, algunas veces antes de las reglas.—°Calor interior y exterior en las partes genitales.—Dolor contractivo en la vagina.—*Hinchazon y *erupcion* pruritosa, *húmeda en los pequeños labios.*—**Presion* hácia abajo *en la matriz*, que oprime la respiracion.—°Prolapsus de la matriz.—°Metrorragias.—°Reglas muy abundantes.—°Induracion del cuello de la matriz.—°Reglas suprimidas, °ó muy débiles, *ó muy anticipadas.—Cólicos antes de las reglas.—*Durante las reglas*, melancolía, odontalgia, cefalalgia, *y *cansancio sumo en los miembros*, ó cólicos espasmódicos y presion en las partes genitales.—Esterilidad.—**Leucorrea* de un agua amarilla ó rojo-verdosa, °ó purulenta, fétida, °algunas veces con timpanitis, ó punzadas en la vagina.—*Leucorrea pruritosa, corrosiva.—Punzadas en las mamas.—°Excoriacion de los pezones.—*Excoriacion de la piel en los niños.

Laringe.—*Ronquera* con coriza.—Sensacion de sequedad en la tráquea-arteria.—*Tos provocada por un cosquilleo* en la laringe ó en el pecho.—**Tos seca*, que parece proviene del estómago, sobre todo *al principio de la noche en la cama*, y frecuentemente con *náuseas y vómito amargo.* Tos gruesa, despues de un enfriamiento.—°*Tos de las embarazadas.*—**Tos con expectoracion abundante de mucosidades*, generalmente pútridas, ó de *gusto salado*, frecuentemente solo *por la mañana*, ó *á la tarde*, y regularmente acompañada de ruido, de debilidad, y de dolor de excoriacion en el pecho, como si estuviera en carne viva.—*Tos nocturna con gritos, sofocacion y vomiturición.—°Tos semejante á la coqueluche.—°Tos provocada por un cosquilleo, y acompañada de estreñimiento.—*Expectoracion difícil.—En tosiendo, expectoracion amarilla, verdosa, purulenta.—Tos con expectoracion sanguinolenta por la mañana y al anochecer, y de mucosidades por el dia.—Durante la tos, lancinaciones en el pecho y en el dorso.

Pecho.—**Disnea*, *opresion en el pecho y respiracion corta al andar* y al subir una escalera, así como estando acostado

Digitized by Google

en la cama al anochecer y *por la noche*.—*Al respirar y toser, dolor en los costados del pecho.—**Opresion de pecho, producida por una acumulacion de mucosidades*, ó *por una expectoracion muy abundante*.—*Dolor de pecho por el movimiento.—*Presion en el pecho, sobre todo al anochecer en la cama.—Pesadez, plenitud y tension en el pecho.—°Dolor de excoriacion en el pecho.—Calambres en el pecho.—**Punzadas y picotazos en el pecho y los costados*, *respirando* y tosiendo, así como por un trabajo intelectual.—**Ebullicion de sangre en el pecho, y violentas palpitaciones de corazon*.—Intermitencia en las pulsaciones del corazon.—*Manchas parduscas en el pecho.

Tronco.—**Dolores en los riñones y en el dorso*, con dislaceracion quemante.—°Latido en los riñones.—Debilidad en los riñones al andar.—°Dolores incisivos, presion, sensacion como si escarbaran y *dislaceracion* calambroídea *en el dorso*.—**Rigidez del dorso y de la nuca*.—°Despeluzamiento en el dorso.—Manchas parduscas en el dorso.—Manchas rojizas, herpéticas en la region lumbar y en los dos lados del cuello.—°Erupcion pruritosa en el dorso.—°Herpes en la nuca y detrás de las orejas.—Manchas de color de vino en el cuello y debajo de la barba.—Forúnculos en el cuello.—**Sudor debajo de los sobacos de un olor fuerte*.—Hinchazon y supuracion de las glándulas axilares.—°Herpe húmedo en los sobacos.

Brazos.—*Dolor de luxacion en la articulacion del hombro, sobre todo en levantando ó teniendo asido algun objeto.—Laxitud en los brazos.—Sensacion de rigidez y de frio en los brazos, como si estuviesen paralizados.—**Dolor de traccion paralítica* en los brazos y en la articulacion del hombro, hasta los dedos.—*Punzadas en los brazos* y *articulacion de la mano*, fatigando ó moviendo estas partes.—**Tension* dolorosa *en los brazos* y en las articulaciones del codo y de los dedos, como por acortamiento.—Hinchazon inflamatoria, roja, oscura, dura, jaspeada, en medio del brazo.—Pústulas en los brazos con prurito violento.—°*Rigidez de las articulaciones del codo y de las manos*.—Manchas parduscas, piel herpética y *costras purulentas en el codo*.—*Vesículas purulentas en el dorso de las manos, y en la punta de los dedos.—°Herpes en el dorso de la mano.—°Hinchazon de la mano con erupcion de vesículas, semejantes al pénfigo.—°Punzadas

Digitized by

en la muñeca moviendo la mano.—°Calor ardiente en la palma de las manos.—°Sudor frio en las manos.—°*Sarna maligna y costras en las manos.*—Traccion artrítica y *punzadas en las articulaciones de los dedos.*—Distorsion de los dedos.—°*Ulceras* indolentes en las articulaciones y *en la punta de los dedos.*—Verrugas en las manos.—Padrastros en los dedos.—°Deformidad en las uñas.—*Panadizos con dolores pulsativos y lancinantes.

Piernas.—Dolores en las caderas con punzadas de dislaceracion.—Dolor en las nalgas y en los muslos despues de haber estado sentado.—°*Debilidad paralítica de las piernas*, sobre todo despues de un arrebato de cólera.—*Rigidez de las piernas*, hasta la articulacion coxo-femoral, *despues de haber estado sentado un poco de tiempo.*—**Frio en las piernas y en los piés.*—*Hinchazon de las piernas y de los piés.*—Calambres en los muslos andando.—**Lancinaciones* dislacerantes ó *sacudidas en los muslos* y en la tibia, hasta el punto de hacer chillar.—*Forúnculos* en el muslo y *en las corvas.*—Traccion y *punzadas* dislacerantes *en las rodillas*, las piernas y *los talones.*—Hinchazon dolorosa de la rodilla.—°*Rigidez de las articulaciones de la rodilla y del pié.*—**Calambres en las pantorrillas*, algunas veces por la noche.—Inquietud en las piernas por la tarde.—Granos pruritosos en las piernas y en el empeine.—°Dolor tractivo en las piernas y en los dedos pulgares de los piés.—°Punzadas en la tibia y en el empeine.—Sensacion en las piernas, como si corriese por ellas un raton.—*Estremecimiento en los piés, durmiendo.—Ulceras en el empeine.—Rigidez en los talones y en las articulaciones del pié, como por acortamiento.—*Picotazos y *sensacion ardiente en los piés.*—Hormigueo y adormecimiento de la planta de los piés.—°*Sudor de piés abundante y fétido* ó suprimido.—°*Ulceras en el talon* provenientes de vesículas corrosivas.—°*Ulceras* indolentes en las articulaciones y *en la punta de los dedos de los piés.*—*Clavos en los piés con dolor lancinante.—°Deformidad de las uñas de los dedos de los piés.

Digitized by Google

179.—SILICEA.

SIL.—Silice.—Hahnemann. *Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 7 á 8 semanas, en las afecciones crónicas.

Antídotos: Camph. hep.—*Se emplea el silice como antídoto de:* Merc. sulf. (psorinum).

Compárese con: *Alum.* amm. bar-c. bell. *calc.* carb-an. *carb-v.* chin. cin. cycl. *graph. hep.* kal. *lich. lyc.* magn. *merc.* natr. petrol. *phos.* puls. ran. rhod. *rhus.* sass. *sep.* spig. *sulf.* veratr.—Cuando el silice será eficaz, siempre que se halle indicado, será sobre todo despues de: *Calc. hep. lyc. sulf.*—Despues de silic. conviene algunas veces: *Hep. lach. lyc. sep.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas* se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Malas consecuencias del abuso del mercurio; Padecimientos histéricos; Debilidad física en los niños, con dificultad de aprender á andar; Parálisis; Epilepsia; Sobreexcitacion nerviosa con insomnio; Afecciones reumáticas y artríticas, crónicas; *Inflamaciones flegmonosas*; *Tumores linfáticos*; Afecciones escrofulosas y raquíticas, aun de los que tienen la cabeza gruesa y las fontanelas que tardan en osificarse; *Obstruccion, inflamacion, induracion, y ulceracion de las glándulas*; *Inflamacion, reblandecimiento, ulceracion y otras enfermedades de los huesos*; Abscesos; Induraciones escirrosas; *Ulceras casi de todas naturalezas*, sobre todo en las personas poco aseadas, caquécticas y entregadas á bebidas espirituosas; *Ulceras escrofulosas, mercuriales y escorbúticas*; *Ulceras carcinomatosas*; Hidartros?; Histeria; Vértigos; Jaqueca; Tiña; Caida de los cabellos á consecuencia de graves enfermedades agudas; Fungus hematodes en el ojo; Ulceras de la córnea; Catarata; *Ambliopia* amaurótica; Dureza de oido; Cáncer de los labios; Fiebre de denticion; Bulimia, pituitas de estómago, gastralgia, dispépsia y otras afecciones gástricas; Abscesos hepáticos; Afecciones verminosas, sobre todo en los sujetos escrofulosos; Gonorrea crónica; Hidrocele, sobre todo en los sujetos escrofulosos; Excoriacion de los pezones; Ulceracion y aun afeccion carcinomatosa de los pechos; *Coriza crónico y disposicion lenaz á acatarrarse*; *Padecimientos tísicos*, aun en los escultores;

Hinchazon inflamatoria de la rodilla; Panadizos; Parálisis de las manos, aun en los leprosos, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Traccion, dislaceracion y punzadas en los miembros (brazos y piernas).—°Punzadas nocturnas en todas las articulaciones.—*Disposicion de los miembros á adormecerse.—*Dolor de quebrantamiento y debilidad paralítica en los miembros, sobre todo por la tarde.—*Disposicion á derrengarse.—*Calambres en los brazos y en las piernas.—*Hinchazon é *induracion de las glándulas*, generalmente sin dolor, algunas veces tan solo con prurito penoso.—*Estremecimiento de los miembros dia y noche.—*Chasquidos dolorosos y como con chirrido en los tendones, en los obreros ocupados en trabajos pesados y fatigosos.—*Ataques de epilepsia.* —Muchas afecciones y *dolores* que se agravan ó *se manifiestan por la noche* y por la tarde, así como durante el movimiento.—**Agravacion de los síntomas en el novilunio* ó °en la luna llena.—Dolores al cambio de tiempo.—*Inquietud en todo el cuerpo despues de haber estado mucho tiempo sentado.*—°Ebullicion de sangre y sed despues de haber bebido un poco de vino.—Enflaquecimiento excesivo.—°Los niños tardan en romper á andar.—Andar con pereza, dejadez.—Debilidad de las articulaciones; las que están en genuflexion.—*Laxitud y temblor de los miembros, sobre todo por la mañana.—*Inercia general y *mucha debilidad nerviosa.*—°Desvanecimiento echándose sobre el costado.—Excesiva fatiga, laxitud y gana de dormir al acercarse alguna tempestad.—**Mucha disposicion á resfriarse*, aun solo descubriéndose los piés.

Piel.—*Sensibilidad dolorosa de la piel.*—*Prurito por todo el cuerpo, frecuentemente con hormigueo, ó lancinante. —Erupcion como viruelas locas por todo el cuerpo.—°Manchas tuberosas, *color de rosa* en la piel.—*Tumores y accesos linfáticos, aun con úlceras fistulosas.—Infarto y endurecimiento de las glándulas.—°Inflamacion, reblandecimiento y ulceracion de los huesos.—°Induraciones escirrosas.—°Ulceras fistulosas, pútridas, fagedénicas, fungosas, etc., con vegetacion ó sánies fétida y corrosiva.—*Supuraciones benignas y malignas*, sobre todo

Digitized by

en las partes membranosas.—Piel enfermiza; toda lesion tiende á ulcerarse.—**Cáncer en la piel.*—*Presion, prurito, escozor y *punzadas* terebrantes en las úlceras.—Forúnculos.—°*Carbunclos* de naturaleza maligna.—°Tumores.—Verrugas.—*Panadizos.—°*Lobanillos en supuracion.*

Sueño.—**Sueño excesivo*, sin poderse dormir.—*Bostezos frecuentes.—*Sueño por la tarde al anochecer.*—*Sueño tardo.—°Sueño muy ligero por la noche, como si se estuviese en un estado de sopor.—**Insomnio*, causado sobre todo por *ebullicion de sangre*; *calor en la cabeza*, ¯y mucha afluencia de ideas.—*Visiones horrorosas por la noche y *afluencia de ensueños angustiosos y fantásticos*, ¯con llantos, palabras, gritos y *desvelo frecuente con sobresalto.—**Estremecimiento del cuerpo durante el sueño.*—Ensueños lascivos.—*Ronquido, durmiendo.—Pesadilla.—*Somnambulismo.*—Ensueños de bandidos, de asesinos, de perros, de viajes, de espectros, etc.—*Por la noche congestion de sangre á la cabeza, con dolores pulsativos, y latidos en el cerebro, dolor de estómago, náuseas y vómitos ó punzadas en todas las articulaciones, sequedad de la nariz, y otros muchos padecimientos.

Fiebre.—**Mucha disposicion al frio* y horripilacion con calofrios frecuentes, aun al mas ligero movimiento.—Calor frecuente, algunas veces fugaz.—*Fiebre con mucho calor*, generalmente sin calofrio y con sudor poco abundante, ordinariamente desde las diez de la mañana hasta las ocho de la noche.—*Sudor durante una marcha moderada.—**Sudor abundante por la noche*, °algunas veces *de olor ácido.*—°Sudor debilitante por la mañana.

Moral.—Humor melancólico y gana de llorar.—Nostalgia.—**Ansiedad y agitacion.*—Humor taciturno; se está concentrado en sí mismo.—*Inquietud y mal humor por la menor cosa, °lo que proviene de mucha debilidad nerviosa.—Escrúpulos de conciencia.—*Mucha propension á asustarse, sobre todo al menor ruido.—*Desaliento.—**Morosidad*, mal humor y desesperacion, con disgusto profundo de la vida.—*Propension á enfadarse, tenacidad y excesiva irritabilidad.—°Repugnancia al trabajo.—°Apatía y falta de interés.—*Debilidad de la memoria.—*Incapacidad para reflexionar.—Mucha distraccion.—Facilidad á equivocarse hablando.—°Ideas

Digitized by Google

fijas; no se piensa mas que en alfileres, se les teme, se anda buscándolos y se está siempre contándolos.

Cabeza.—**Obnubilacion.*—**Fatiga de la cabeza por un trabajo intelectual* (leer, escribir, ó reflexionar).—*Aturdimiento, °sobre todo por la tarde como si se estuviese ébrio.—**Vértigos de diversa naturaleza*, sobre todo *por la mañana* y principalmente levantando los ojos, ó andando en carruaje, ó bajándose, ó despues de emociones morales.—*Vértigo con náuseas* y vomituricion, *que del dorso se extiende* hasta la nuca y cabeza.—*Vértigo que hace caer de espaldas.—**Dolor que sube desde la nuca hasta* el vértice, quitando algunas veces el dormir por la noche.—°Cefalalgia en acalorándose.—Cefalalgia con calofrio, laxitud y necesidad de acostarse.—**Dolores de cabeza todas las mañanas.—Presion en la cabeza* con mal humor y pesadez en todos los miembros, algunas veces por la mañana.—**Pesadez de cabeza*; parece que la frente se va á hendir, algunas veces *todos los dias*, desde la mañana al anochecer.—*Tension y presion en la cabeza, *como si fuera á hendirse.*—Distension en la cabeza que parece salir por la frente.—**Dolores dislacerantes en la cabeza*, °frecuentemente semilaterales, con punzadas que parecen salir de los ojos, y se extienden hasta los huesos de la cara y los dientes, ó se manifiestan todas las mañanas, con **calor en la cabeza*, principalmente en la frente.—*Lancinaciones en la cabeza,* sobre todo en las sienes.—**Cefalalgia pulsativa*, generalmente por *congestion de sangre á la cabeza.*—Sacudidas dolorosas en la cabeza.—Movimientos y ruido como de remolino en la cabeza, y como si todo lo que hubiera en ella estuviera vivo.—Sacudidas y resonancia en el cerebro á cada paso que se da.—Los dolores de cabeza se agravan principalmente por el trabajo intelectual, por hablar y bajándose.—Despues de los dolores de cabeza, oscurecimiento de la vista.—Sensibilidad dolorosa al exterior de la cabeza, al menor contacto.—°*Sudor en la cabeza por la tarde.*—°Prominencias tuberosas en la piel del cráneo.—Mucho prurito en la piel del cráneo.—°*Tiña húmeda*, *pruritosa.—Alopecia.

Ojos.—Dolores en los ojos por la mañana, como provenientes de una gran sequedad, ó de arena que se hubiese introducido en ellos.—Presion y escozor en los ojos y en los párpados.—Punzadas que parecen salir por

Digitized by Google

los ojos.—*Prurito, escozor y ardor en los ojos.—**Rubicundez de los ojos* con dolor que produce escozor en los ángulos.—*Inflamacion de los ojos.—*Hinchazon de la glándula lagrimal.*—°Fístula lagrimal.—*Lagrimeo*, sobre todo al *aire libre.*—**Aglutinacion de los párpados* por la noche.—°*Fungus* y *hematodes*, y *úlceras en la córnea.*—°Manchas y cicatrices en la córnea.—Estremecimiento de los ojos.—Oclusion espasmódica en los párpados.—°Presbiopia.—*Los caractéres se confunden al leer.—Los objetos parecen pálidos leyendo.—*Vista turbia como á través de un velo gris.—*Accesos momentáneos de ceguera pronta.—°Oscurecimiento del cristalino.—°Oscurecimiento de la vista como por una amaurosis.—°Se ven chispas y **manchas negras.*—**Fotofobia* y deslumbramiento á la luz fuerte del dia.

Oidos.—Otalgia con dolor tractivo.—°Terebracion y *pulsacion en los oidos.—°Punzadas que parecen salir por los oidos.—Prurito en las orejas.—Inflamacion y resudacion del borde de las orejas.—Costras detrás de las orejas.—Hinchazon al exterior de la oreja, con *flujo por el oido*, acompañado de una especie de silbido.—Acumulacion abundante de cerúmen líquido.—Sensibilidad escesiva del oido al ruido.—**Obturacion de los oidos*, °que se disipa algunas veces sonándose, ó bien *oyendo una detonacion.*—**Dureza de oido*, algunas veces sin ruido en estos, ó exclusivamente por la voz humana.—°Dureza de oidos que se aumenta á la luna llena.—Retintin, cloqueo y ruido en los oidos, como si un pájaro batiese las alas.—Cáries de las apófisis mastóides.—*Hinchazon é induracion de las parótidas.

Nariz.—Los huesos de la nariz están doloridos al tacto.—*Dolores corrosivos en lo alto de la nariz*, con peso al bajarse y sensibilidad excesiva á la presion.—Dolor pulsativo de ulceracion en la nariz hasta la cabeza.—*Inflamacion de las ventanillas de la nariz.—*Prurito y rubicundez de la nariz (en la punta), que está cubierta de vesículas costrosas.—Forúnculos en la nariz.—*Costras, granos y *úlceras en la nariz.*—**Epistaxis.*—°Pérdida del olfato.—°Estornudos abortados, interrumpidos.—**Estornudo muy frecuente, inmoderado.*—**Obturacion de la nariz*, tenaz, °algunas veces *por mucosidades.*—°*Sequedad* penosa *de la nariz*, algunas veces por la noche.—*Coriza seco.

Digitized by Google

—*Coriza contínuo.—*Coriza fluente* frecuentemente, °ó que destruye una obturacion tenaz de la nariz.—Mucosidades nasales, ácres y corrosivas.

Cara.—Cara pálida, térrea.—Manchas blancas en las mejillas de tiempo en tiempo.—Manchas rojas, ardientes, en las mejillas y en la nariz, sobre todo despues de la comida.—Calor en la cara.—°Punzadas en los huesos de la cara.—Prurito en las patillas.—Forúnculo en la mejilla.—°Grietas y ragades en la piel de la cara.—°Induracion escirrosa en la cara y en el labio superior.—Hinchazon de los labios.—Ulceracion en las comisuras de los labios.—*Erupciones costrosas en los labios*, con dolor que causa escozor.—**Ulceras en la parte roja del labio inferior.*—°*Cáncer en los labios.*—Forúnculos en la barba.—**Herpes en la barba.*—°Calambres en la articulacion de la mandíbula.—°Punzadas y tracciones nocturnas en la mandíbula inferior.—°Hinchazon y cáries de los huesos de la mandíbula inferior.—**Tumefaccion de las glándulas submaxilares*, con dolor al tacto, ó con induracion.

Dientes.—*Odontalgia por los alimentos calientes ó por la introduccion del aire frio en la boca.—*Traccion, estremecimiento y *dislaceracion en los dientes* y en la mejilla, *que se agravan por la noche*, ó bien solamente cuando se come.—**Odontalgia*, generalmente *lancinante*, por la noche, que impide dormir y que se agrava por las cosas frias ó calientes.—°Dolores de muelas con hinchazon del hueso y del periostio de la mandíbula, y calor nocturno general que no deja dormir.—°Sensacion como si escarbaran y terebracion en los dientes.—Dientes embotados.—Inflamacion dolorosa, hinchazon, excoriacion y *facilidad á dar sangre las encías.

Boca.—*Sequedad de la boca.*—Aliento fétido, sobre todo por la mañana.—°Estomacace.—°Mucosidades contínuas en la boca.—Sensacion como si hubiese un cabello sobre la lengua.—*Excoriacion de la lengua.—Hinchazon en un solo lado de la lengua.—Ulcera en el paladar.—Lengua cubierta de mucosidades parduscas.

Garganta.—Ligera inflamacion de garganta, con *acumulacion de mucosidades en ella.*—Dolor de excoriacion y *picotazos como por alfileres en la garganta, durante la deglucion.—Hinchazon de la úvula.—Deglucion difícil, como por parálisis de la garganta.—Tendencia de los

Digitized by Google

alimentos á subir á las fosas nasales, durante la deglucion.

Apetito.—°*Pérdida del gusto.*—**Amargor de boca*, aun *por la mañana.*—*Sabor ácido*, pútrido ó como si se tuviese sangre ó mucosidades en la boca.—**Mucha sed*, algunas veces sin apetito.—**Repugnancia á* todos los alimentos, en particular los *cocidos* y *calientes*, con apetito solo de cosas frias.—°*La carne disgusta* y no se digiere bien.—°Repugnancia del niño al tomar el pecho de la madre, y vómito despues de haber mamado.—**Despues de la comida* propension al sueño, pirosis, *acedías en la boca*, *erutos* ágrios, plenitud en el estómago y en el vientre, ó bien (por lo regular consecutivamente), *presion en el estómago*, *flujo de agua como pituitas*, *vómitos*, calofrios febriles, congestion á la cabeza y calor en las mejillas.

Estómago.—°*Erutos con gusto á los alimentos*, algunas veces despues de cada comida.—**Erutos ágrios.*—Pirosis.—Hipo, algunas veces al principio de la noche en la cama.—**Náuseas todas las mañanas*, con dolor en la cabeza y en los ojos al volverlos, ó bien seguidas de vómito de un agua amarga.—°*Náuseas continuas y vómitos*, aun por la noche.—°*Flujo de agua por la boca como pituitas*, algunas veces con horripilacion.—°Vómito siempre que se bebe.—*Vómito de los alimentos aun por la noche.—**Presion en el estómago*, algunas veces *despues de cada comida*, ó bebiendo de prisa.—°*Sensibilidad dolorosa en la boca del estómago á la presion.*—Peso en el estómago.—**Apretamiento en la boca del estómago*, *como por un gárfio*, algunas veces despues de la comida.—*Sensacion ardiente en la boca del estómago.

Vientre.—°Hinchazon é induracion de la region hepática.—°Dolor de ulceracion en la region hepática, con latidos; los dolores se agravan al tacto y andando.—Punzadas en los hipocondrios, sobre todo en el izquierdo.—Cólicos durante los cuales las manos se ponen amarillas, y las uñas azules.—Presion en el vientre sobre todo despues de la comida.—**Vientre duro*, *tirante*, caliente (aun en los niños), y algunas veces doloroso al tacto.—*Abultamiento de vientre.—**Cólicos por constipacion.*—**Retortijones ó pellizcos en el vientre*, con ó *sin diarrea.*—Sensacion ardiente en el vientre.—Los dolores de vientre se alivian con la aplicacion de lienzos calientes.

Digitized by Google

—**Hernia inguinal*, *dolorosa*.—Inflamacion é hinchazon de las glándulas de la ingle.—*Encarcelacion de gases. —Ruido como de agua y borborigmos en el vientre, sobre todo moviendo el cuerpo.—*Expulsion difícil de gases.—Flatuosidades muy fétidas.

Deposiciones.—**Constipacion y deposiciones lentas*, *duras*, difícites, nudosas.—**Dureza de las deposiciones*, con tenesmo frecuente.—*Deposiciones de la consistencia de papilla, muchas veces al dia.—Diarrea con cólicos.—Deposiciones rojizas, ó con mucosidades sanguinolentas. —Flujo frecuente de serosidades fétidas, de un olor cadavérico.—Punzadas y **prurito en el ano*, y en el recto, aun durante la defecacion.

Orinas.—*Tenesmo vesical*.—Necesidad contínua de orinar, con emision poco abundante.—*Emision frecuente de orina aun por la noche.—°Se orina en la cama.*—Arena roja, ó sedimento amarillo arenoso en las orinas.

Partes genitales.—Prurito y manchas rojas en el glande.—*Excoriacion, prurito y rubicundez del prepucio. —Hinchazon del prepucio, que está cubierto de granos pruritosos y húmedos.—**Hidrocele*, sobre todo en los sujetos escrofulosos.—Sudor y prurito del escroto.—**Mancha pruritosa y húmeda en el escroto.*—*Falta de apetito venéreo, con debilidad de las funciones genitales, ó bien con *exaltacion inmoderada del apetito venéreo*, y con afluencia de ideas lascivas, fuertes y frecuentes erecciones.—Flujo de licor prostático, durante las deposiciones fecales.—Despues del cóito, cansancio sumo de los miembros ó sensacion de parálisis en un lado de la cabeza.

Reglas.—*Reglas muy adelantadas y muy débiles*, ó bien *muy abundantes.—Supresion de las reglas.—Metrorragia.*—°Antes de las reglas, diarrea.—°Durante las reglas, dolores en el vientre, ó aspecto pálido, ó sensacion quemante y excoriacion en la vulva.—**Prurito en la vulva.*—°Flujo de sangre por la matriz durante la lactancia.—*Aborto.—Leucorrea* al orinar, ó despues de las reglas.—°Leucorrea como leche, que corre á intervalos y es precedida de retortijones en la region umbilical.—**Leucorrea ácre*, *corrosiva.*—°Inflamacion de los pezones.—°Absceso en una mama, aun con úlceras fistulosas.—Dureza en la mama.

Laringe.—*Ronquera con aspereza y excoriacion de la laringe.—Tos producida por las bebidas frias ó á poco

Digitized by Google

que se hable.—Tos conmovente, provocada por un cosquilleo sofocante en el hoyuelo del cuello.—*Tos fatigosa dia y noche, agravada por el movimiento, con expectoracion mucosa poco abundante.—*Tos nocturna sofocante.—*Tos espasmódica.—Tos seca, con dolor de excoriacion en el pecho.—Tos con vómito de mucosidades.—*Tos con expectoracion abundante de mucosidades trasparentes.—*Tos *con expectoracion purulenta.*—Expectoracion de sangre, con tos hueca, profunda.

Pecho.—**Disnea*, °estando acostado sobre el dorso, ó bien bajándose, corriendo ó tosiendo.—Respiracion profunda, suspirosa.—°*Respiracion corta*, durante un trabajo manual poco fatigoso, ó bien caminando ligero, algunas veces con disnea durante el reposo.—°Respiracion estertorosa andando de prisa.—Dificultad de la respiracion como por constriccion de la garganta.—**Presion en el pecho*, algunas veces, solo al toser ó al estornudar.—**Punzadas* y picotazos *en el pecho* y el costado, que algunas veces atraviesan hasta el dorso.—Latidos en el esternon.—Dolor como de quebrantamiento en el pecho, cuando se respira y tose.

Tronco.—**Dolor en los riñones*, al tacto, y aun cuando no se toque.—°Traccion calambroídea en los riñones, que no permite incorporarse, y obliga á permanecer acostado.—**Absceso inflamatorio en la region lumbar.*—*Debilidad y rigidez paralítica en el dorso, en los riñones y en la nuca.—*Dislaceracion y punzadas en el dorso.—°Punzadas en las regiones lumbares, estando sentado ó acostado.—°*Hinchazon y desviacion de la columna vertebral.*—°Dolor de quebrantamiento entre los omóplatos.—Tracciones tensivas, dolor de dislaceracion, y lancinaciones en y entre los omóplatos.—°Ulcera purulenta en la nuca.—Granos y forúnculos en la nuca.—**Hinchazon de las glándulas de la nuca*, del cuello y de las axilas, algunas veces con induracion.—°*Supuracion de las glándulas axilares.*—°Cários en la clavícula.

Brazos.—*Tracciones y *dislaceraciones en los brazos*, las manos y los dedos.—**Pesadez y laxitud paralítica de los brazos, que tiemblan* al menor trabajo.—**Adormecimiento de los brazos, cuando se está echado sobre ellos*, ó en recostándose sobre una mesa.—Latidos y estremecimiento en los músculos de los brazos.—Grietas en la piel de los

Digitized by Google

brazos y en las manos.—Forúnculos y verrugas en los brazos.—**Debilidad paralítica en los antebrazos*; se deja caer todo de las manos.—Induracion del tejido celular del antebrazo.—°Punzadas nocturnas en la articulacion de la mano, hasta cerca del hombro.—Dolor calambroídeo en las manos y en los dedos.—Adormecimiento de las manos por la noche.—*Debilidad paralítica de las manos.*—Tumor en el dorso de la mano.—°Ulcera en el dorso de la mano.—°Hormigueo en los dedos.—*Sensacion ardiente en la punta de los dedos.*—Dolor en las articulaciones de los dedos á la presion.—*Debilidad, rigidez y falta de flexibilidad en los dedos.—Vesículas corrosivas, purulentas, con sensacion de ardor en los dedos.—**Panadizos*, sobre todo con vegetaciones, gritos y dolores insoportables dia y noche.

Piernas. — *Tracciones, dolor de dislaceracion, y tension en las piernas.*—Adormecimiento fácil de las piernas, sobre todo estando sentado.—Debilidad paralítica de las piernas.—*Presion, dislaceracion y punzadas en los músculos de los muslos.—°Ulceras pruritosas en los muslos y en los maléolos.—**Forúnculos en los muslos* y en las pantorrillas.—°Reblandecimiento y ulceracion del fémur.—**Dolor de* dislaceracion en la rodilla.—°*Hinchazon* inflamatoria *en la rodilla.*—°Fungus en la rodilla.—Dolor tractivo en las piernas.—Frio en las piernas.—Hinchazon de las piernas hasta los piés.—°*Ulceras en las piernas*, frecuentemente con color enfermizo.—Mancha roja, que causa escozor en la tibia.—°*Cáries en la tibia.*—*Tension en las pantorrillas*, como por acortamiento.—*Calambres en las pantorrillas; sobre todo por la tarde, despues de un trabajo corporal.—°Torpeza en las pantorrillas.—Miliar pruritosa en las pantorrillas.—Dislaceracion y punzadas en las pantorrillas, los talones y los dedos.—°Lancinacion en el maléolo, en apoyando el pié.—Adormecimiento de los piés por la tarde.—**Frio en los piés*, °algunas veces despues de la supresion de la transpiracion de estos.—Sensacion quemante en los piés y en la planta de estos, sobre todo por la tarde y por la noche.—**Hinchazon de los piés*, generalmente por la mañana.—**Olor fétido de los piés.*—**Sudor en los piés*, con excoriacion entre los dedos.—°El sudor de los piés se suprime.—°Callos duros y dolorosos en la planta de los piés.—°Cosquilleo volup-

Digitized by Google

tuoso en la planta de los piés, hasta el punto casi de hacer perder la razon despues de haberse rascado, por poco que sea.—Calambre en la planta de los piés.—Vesículas corrosivas en el talon.—Rigidez de los dedos de los piés.—**Ulceracion del dedo pulgar del pié*, con dolor lancinante.—***Callos en los piés con dolores lancinantes.

180.—SPIGELIA.

SPIG.—Espigelia antihelmíntica.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeopática.—*Dósis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* 3 á 4 semanas en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph.—*Se emplea como antídoto de:* Merc.

COMPÁRESE CON: Acon. aur. chin. *dig. euphr. laur. merc.* natr.-m. sil. spong. tar. *veratr.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser *consultado* este medicamento contra:—Convulsiones; *Embriaguez*; Fiebres mucosas y verminosas?; Fiebres intermitentes larvadas?; *Cefalalgias, prosopalgias y odontalgias intermitentes, nerviosas y reumáticas*, sobre todo en las mujeres de una constitucion nerviosa; Oftalmías reumáticas y artríticas; Dolores neurálgicos de los ojos, sobre todo despues de haberse fatigado la vista; Afecciones verminosas; Grippe; Fiebres catarrales; Hidrotorax; *Enfermedades del corazon*, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores artríticos, lancinantes ó dislacerantes* en los miembros.—Dislaceracion cerca de las articulaciones, como si se rayeran los huesos.—Sensacion de pesadez y de quebrantamiento en los miembros.—°Convulsiones.—*Laxitud*, sobre todo *despues de un ligero ejercicio al aire libre.*—°Accesos de desvanecimiento sobre todo haciendo esfuerzos para defecar, ó estando en una habitacion caliente.—Mucha sensibilidad al aire frio, con padecimientos, por andar al aire libre.—***Mucha facilidad á resfriarse.

Piel.—Sensibilidad dolorosa de la piel en todo el cuerpo al tacto.—Granos rojos, con dolor de excoriacion al tacto.

Digitized by Google

Sueño.—Mucha *gana de dormir por el dia*, y aun desde por *la mañana*, ó al anochecer; sin embargo, no se coge el sueño hasta mucho tiempo despues que se ha acostado. —Sueño por la noche no reparador, *agitado* por inquietud en los miembros. — Sueño pesado con adormecimiento.

Fiebre.—*Calofrios* frecuentes, sobre todo *por la mañana ó durante un ligero ejercicio*.— Calor frecuente, algunas veces fugaz.—Durante el calor, deseo de la cerveza.

Moral.—Tristeza y desaliento.—Agitacion y *ansiedad*, con *desasosiego é inquietud sobre el porvenir*.—Carácter perezoso.—Morosidad hasta la manía de suicidarse.—*Debilidad de la memoria*.—Falta de ideas.—Inaptitud para los trabajos intelectuales.

Cabeza.—Atontamiento de cabeza como por embriaguez ó aturdimiento.—Vértigos con peligro de caer cuando se anda, estando en pié, ó cuando se mira hácia abajo. —Vértigo con náuseas.— Dolores de cabeza, cuando se la oscila, con vértigo y sensacion de pesadez.—**Dolores de cabeza, agravados por el mas ligero movimiento*, un ruido un poco fuerte, ó en abriendo la boca.—*Sensibilidad dolorosa del occipucio*, con sensacion de adormecimiento y de rigidez en la nuca.—**Dolores de cabeza periódicos*.—*Presion en la cabeza*, compresiva y expansiva, que se agrava bajándose.—*Dolor como si la cabeza fuese á hendirse, al toser ó hablando fuerte.—*Dolores de la cabeza dislacerantes*, con sensacion como si escarbaran ó terebrantes, sobre todo durante el movimiento.— Lancinaciones pulsativas y extendidas hasta la frente, con ruido como de martilleo en los oidos.— *Conmociones y golpes en la cabeza*, durante el tiempo que se anda al aire libre.—Vaivenes del cerebro á cada paso que se da y á cada movimiento de la cabeza.—*Dolor ardiente al exterior de la frente, en las sienes y hasta en los ojos.—Tension de la piel del cráneo.—Sensibilidad dolorosa de la piel del cráneo al tacto.

Ojos.—**Dolores en los ojos, en lo profundo de las órbitas*.— **Presion en el globo de los ojos*, sobre todo volviéndolos.— *Dolores en los ojos durante el movimiento *como si los globos fuesen demasiado voluminosos*.—*Sensacion como si escarbaran, terebracion y *punzadas en los ojos* y hasta la cabeza, algunas veces con dolores que conducen á la desesperacion.—*El movimiento de los ojos y de los

Digitized by Google

músculos de la cara agravan los dolores.—Hormigueo en los ojos.—Calor seco y *sensacion quemante en los ojos* que obliga á cerrarlos.—**Rubicundez de la esclerótica*, con inyeccion de los vasos sanguíneos.—**Inflamacion de los ojos* y de la córnea.—**Inflamacion* y *ulceracion de los párpados*, con dolor de excoriacion que causa escozor.—*Ojos turbios sin brillo.—*Lagrimeo abundante*.—Lágrimas ácres, que escuecen.—°Mucha sensibilidad de los ojos á la luz artificial.—*Caida de los párpados como por parálisis.—°Tendencia á pestañear.—Dificultad de levantar los párpados, con sensacion de rigidez dolorosa.—Contraccion y movimientos involuntarios de los ojos.—Pupilas dilatadas.—Pérdida (suspension momentánea) de la vista.—Presbiopia.—*Se ven rayos luminosos.

Oidos.—*Otalgia con dolor presivo, penoso*, como si hubiera una clavija en la oreja.—Dolor de dislaceracion con estremecimiento en los oidos.—Compresion, prurito y sensacion quemante en el oido externo.—*Obturacion de los oidos* con ó sin dureza de oido.—**Sordera periódica*.—Mugido, zumbido y pulsacion en los oidos.—Ruido como de martillazos en los oidos.

Nariz.—*Prurito en la nariz*, con *cosquilleo*.—Hormigueo, punzadas, terebracion, *escozor y comezon en la nariz*.—Erupcion dartrosa en la nariz, con dolor de excoriacion.—Obturacion y sequedad de la nariz, con *flujo abundante de mucosidades* blanquecinas y amarillentas, por las fosas nasales.—°Con frecuencia coriza fluente, sobre todo despues del mas ligero enfriamiento.

Cara.—**Cara pálida, descompuesta*, con ojeras amarillas.—°Mejillas y labios, tan pronto de color encendido oscuro, como pálidos.—**Abotagamiento de la cara*, °sobre todo despues de haber dormido.—*Dolor de dislaceracion con estremecimiento, sensacion ardiente y *presion en la region de los huesos zigomáticos*, ó °dolores violentos que hacen insoportable el mas ligero contacto y el menor movimiento, con hinchazon lustrosa del lado afecto.—°Dolores semilaterales en la cara, con angustia de corazon y mucha agitacion.—Exóstosis á un lado de la órbita, cerca de la sien.—Labios tirantes y quemantes.—Granos pequeños negruzcos en el labio superior.—*Dolor presivo en el ángulo de la mandíbula inferior*, como en la mandíbula ó las muelas, que provienen del oido.

Digitized by Google

Dientes.—Odontalgia despues de haber fumado.—*Dolor* de presion dislacerante *en los dientes inmediatamente despues de la comida*, ó *por la noche*, que no deja estar acostado.—**Dolores de muelas*, con estremecimiento, ó dislacerantes, *pulsativos*, sobre todo en los dientes cariados, *agravados por el agua fria*, ó por el contacto del aire libre.—°Dolores de muelas con prosopalgia, cara pálida y tumefacta, círculos amarillentos alrededor de los ojos, palpitaciones de corazon, despeluzamiento y agitacion.

Boca y garganta.—*Exhalacion fétida por la boca*.—Sequedad lancinante por la mañana al despertarse.—Acumulacion abundante de saliva, blanca, espumosa en la boca.—Mucosidades blancas ó amarillas en la boca y en el paladar.—Lengua hendida.—Vesículas con dolor quemante en la lengua y en el paladar.—Ligera irritacion de garganta con lancinaciones é hinchazon del paladar.

Apetito.—Gusto pútrido, fétido.—*Falta de apetito con mucha sed*.—Repugnancia al tabaco y al rapé.—Repugnancia al café.—*Bulimia*, algunas veces con náuseas y sed.

Estómago.—Eructos despues de tomar cualquier alimento.—Eructos ágrios.—*Náuseas en ayunas con sensacion como si alguna cosa subiese del estómago á la garganta.—Acumulacion de mucosidades en el estómago.—*Presion en el estómago* y en la boca de este, *como por un cuerpo pesado*.—Lancinaciones en la boca del estómago y en el diafragma, algunas veces con disnea.—°Imposibilidad de soportar los vestidos apretados alrededor de la boca del estómago; el menor contacto causa angustia, con rubicundez y calor de la cara, y sensacion como si alguna cosa se desgarrase en el pecho.

Vientre.—Vientre duro y dolorosamente tirante.—*Presion en la region umbilical como por un cuerpo duro*.—Cólicos con dolores como si pellizcaran y retortijones en la region umbilical con calofrio, diarrea y secrecion abundante de orina.—Lancinaciones en el vientre.—Dolor tensivo en las ingles al tacto.—Ruido sordo y borborigmos en el vientre.—Expulsion de ventosidades fétidas.

Deposiciones.—Conato frecuente de deponer y sin resultado.—Evacuaciones blandas, líquidas.—*Deposiciones* duras, con esfuerzos y *mucosidades abundantes*.—*Flujo de mucosidades por el ano*, sin deposicion.—*Diarreas* líquidas de materias fecales y de *mucosidades*.—Diarrea con pe-

Digitized by Google

llizcos en el vientre y frio en el cuerpo.—*Lombrices y ascárides del recto.*—Prurito y sensacion como si alguna cosa serpease en el recto y en el ano.

Orinas.—Orina con sedimento blanquecino.—*Gana frecuente de orinar con emision abundante*, aun por la noche.—Enurecis, con sensacion quemante en la parte anterior de la uretra.

Partes genitales.—Hormigueo alrededor del glande.—Hinchazon semi-lateral del glande.—Erecciones con ideas lascivas sin excitacion voluptuosa.—(Flujo de licor prostático).

Laringe.—Catarro con ronquera, flujo contínuo de mucosidades nasales, calor seco sin sed, ojos prominentes, cefalalgia penosa y gana de llorar.—Catarro nocturno con tos.—Tos al aire libre con dolor de excoriacion en el pecho.—*Tos seca*, violenta, hueca *con disnea* que produce sofocacion.

Pecho.—Presion en el pecho, con opresion dolorosa.—°Respiracion corta sobre todo hablando, con ansiedad y rubicundez de las mejillas y de los labios.—°*Peligro de sofocacion al menor movimiento y sobre todo levantando los brazos.*—°Mucha dificultad de respirar moviéndose en la cama, con imposibilidad de estar echado sino sobre el costado derecho y casi sentado.—°Accesos repentinos de sofocacion con palpitacion de corazon y angustia.—*Contraccion de pecho con angustia* y respiracion oprimida.—°Ruido en el pecho, como el de un torno de hilar, sobre todo en la region del corazon.—°Presion, sensacion ardiente é incisiva, dolor de ulceracion y *dislaceracion en el pecho*, sobre todo levantando el brazo.—°Sensacion de un temblor en el torax, agravado por el movimiento de los brazos.—Sensacion calambroídea en el pecho, °que parte de la boca del estómago, y produce sofocacion.—*Lancinaciones* tensivas *en el pecho*, sobre todo al respirar.—*Latidos violentos de corazon*, sensibles á la vista y al oido, *frecuentemente con opresion angustiosa en el pecho*, que se agrava encorvándose y tambien sentándose.—*Lancinaciones en la region del corazon.—Sensacion de temblor en el corazon.—Los latidos del corazon no corresponden á los del pulso.—Movimientos del corazon como por ondulacion.

Tronco.—Dolor de quebrantamiento en el dorso aun du-

Digitized by Google

rante el movimiento.—*Lancinaciones en el dorso*, algunas veces al respirar.—Granos rojos en el cuello, con dolor de excoriacion al tacto.—Hinchazon dura y dolorosa de las glándulas del cuello.

Brazos.—Pesadez y temblor de los brazos.—Adormecimiento fácil de los brazos y de las manos.—Estremecimiento de los músculos de los brazos y de los antebrazos.—*Lancinaciones* violentas y tirones *en el pliegue del codo* y en las articulaciones de las manos y dedos.—Tracciones y dislaceracion calambroídeas en los huesos de las manos.—Nudosidades duras en las palmas de las manos, con prurito quemante.—Manos de un color amarillo pálido.—Contraccion de los dedos.—Granos purulentos en los dedos.

Piernas.—Dolor como de quebrantamiento, tension y *punzadas en los muslos*, casi exclusivamente *al andar y durante los movimientos prontos*.—Lancinaciones violentas en las rodillas al doblarlas.—Rigidez dolorosa de la articulacion de la rodilla.—Sacudidas lancinantes en las articulaciones de los piés.—Excrescencias como verrugas en los dedos de los piés.

181.—SPONGIA MARITIMA TOSTA.

SPON.—Espongia marítima tosta.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 2, 3, 30.—*Duracion de accion*: 3 á 4 semanas en las enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph.

COMPÁRESE CON: Acon. ars. cupr. d os. hep. iod. merc. phos. spig.—Con preferencia despues de *acon.* es cuando la esponja será eficaz (en el crup, si se halla indicada.—Despues de spong., conviene frecuentemente (en el crup) *hep.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que deberá ser consultado este medicamento contra:—*Afecciones de las glándulas y de los vasos linfáticos*; *Crup* (antes de emplear *hepar.* ó alternando con él); Laringitis crónica; (Tísis laríngea); Bronquitis; Padecimientos asmáticos; Enfermedades del corazon; *Tubérculos en los pulmones*, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—**Hinchazon é induracion de las glándulas.*—Cansancio sumo de los brazos y de las piernas.—Sensacion de torpeza en la parte inferior del cuerpo.—Pesadez del cuerpo.—*Abatimiento excesivo moral y físico.*—Estando acostado tranquilamente se encuentra uno mejor que en cualquiera otra posicion.—Punzadas pruritosas en la piel, principalmente entrando en calor en la cama.—Sensacion como de alguna cosa que serpea por la piel, con rubicundez y calor de la parte, despues de haberse rascado.—Mancha roja pruritosa en la piel.—Erupciones pruritosas.—Erupciones miliares.—*Herpes.*—*Insomnio con desvarios fantásticos y delirio al dormirse.*—Ensueños tristes, angustiosos, espantosos.—Calofrios frecuentes por todo el cuerpo, sobre todo en el dorso.—Accesos de calor fugaz.—*°Calor febril con piel seca y caliente*, sed contínua, cefalalgia y delirio.—°Pulso duro, acelerado.—Sudores nocturnos.—*Accesos de angustia* con dolor en la region del corazon.—Humor inconsolable y llantos.—Carácter tímido y facilidad á asustarse.—Humor brusco y fuerte.—Alegría excesiva y maliciosa.—Mucho deseo de cantar.—Espíritu obtuso con incapacidad completa de entregarse á un trabajo intelectual.

Cabeza.—*Vértigo* con aturdimiento *hasta el punto de caer*, algunas veces por la tarde, ó bien con sensacion, como si la cabeza fuera á caer á un lado.—Vértigo con náuseas por la noche al despertar.—Pesadez y plenitud de cabeza.—Cefalalgia sorda semilateral, entrando en una habitacion caliente cuando se viene del aire libre.—Cefalalgia con lagrimeo, fijando la vista en un objeto.—**Dolores de cabeza presivos*, algunas veces con compresion.—*Dolores en la cabeza como si fuera á estallar*, sobre todo en la frente.—*Latidos y pulsacion en la cabeza.—*Congestion de sangre á la cabeza.*—Sensibilidad desagradable al exterior de la cabeza.—Prurito penoso en la piel del cráneo.

Ojos.—Ojos empañados y turbios con abotagamiento de los párpados.—*Presion y punzadas en los ojos.*—*Ojos ardientes, rojos y lagrimosos.—Aglutinacion de los párpados.—Erupcion de costras amarillas en las cejas.—*Pesadez* presiva *en los párpados.*—Contraccion de los párpados por la mañana.—Miopia.

Oidos y nariz.—Otalgia con dolor contractivo.—Presion

en los oidos.—Ulceracion del oido exterior.—*Dureza de oido.*—*Epistaxis*, sobre todo despues de haberse sonado. —Erupcion en la punta de la nariz.

Cara.—Semblante pálido con ojos abatidos.—°*Cara abotagada, roja ó azulada, con fisonomia angustiosa.*—*Hinchazon de las mejillas.*—Prurito y punzadas en las mejillas.—*Erupciones en los labios.*—Dolor calambroideo en las articulaciones de la mandíbula.—*Hinchazon de las glándulas submaxilares*, con dolor tensivo.

Dientes.—Sensacion de embotamiento y de vacilacion en los dientes cuando se mastica.—Prurito y punzadas en las muelas.—Hinchazon de las encías, con dolores cuando se mastica.

Boca.—Boca y lengua cubiertas de vesículas, con dolor quemante y lancinante.—*Salivacion.*—Palabra débil.—°Lengua seca, pardusca.—Sensacion quemante y punzadas en la garganta.

Apetito.—Disminucion del sentido del gusto.—°*Gusto amargo*: algunas veces, *solamente en la garganta.*—Gusto dulce en la boca.—Apetito moderado y pronta saciedad. —*Hambre violenta, insaciable.*—°Sed °algunas veces inextinguible.—El humo del tabaco molesta.—Despues de la comida plenitud y sufrimientos en el abdómen como por una digestion difícil.

Estómago.—°Erutos, °algunas veces con retortijones y dislaceraciones en el estómago.—Erutos amargos.—Regurgitaciones ácidas.—Hipo frecuente.—Náuseas con fuertes regurgitaciones acedas en la boca.—Vómito despues de haber tomado leche.—°*Laxitud del estómago con sensacion como si estuviera abierto.*—Presion en el estómago y en la boca de este.—Presion de los vestidos sobre el estómago.—Dolores contractivos en el estómago.

Vientre.—Vientre duro y tirante.—Calambres abdominales.—Sensacion como si escarbaran y estrangulacion en el vientre.—Retortijones de vientre, despues de la comida.—*Ruido sordo en el vientre*, sobre todo por la tarde y por la mañana, estando acostado.—Dolor como de una hernia en el anillo inguinal.—Hinchazon de las glándulas de la ingle.

Deposiciones.—°Deposiciones duras y retrasadas.—Deposiciones diarréicas blanquecinas.—Antes de la deposicion, punzadas en el ano y ruido sordo en el vientre.

Digitized by Google

— *Durante la deposicion, tenesmo en el ano.*—Prurito, corrosion y dolor de excoriacion en el ano.—Ascárides en el recto y hormigueo.

Orinas.— Secrecion de orinas muy abundantes.—°*Conato frecuente de orinar con emision escasa.*—Incontinencia de orina.—Chorro de orina delgado.—Orina espumosa.—Sedimento espeso, blanquecino, gris ó amarillo de las orinas.

Partes genitales.—Estrangulacion calambroidea en los testículos.—*Hinchazon dura de los testículos* y del cordon espermático, con dolor presivo.—Apetito venéreo poco pronunciado.— Falta de erecciones.— Reglas muy adelantadas y muy abundantes.— Antes de las reglas palpitacion de corazon y dolor en el dorso.— Durante las reglas, traccion en los muslos.

Laringe.—**Ronquera*, algunas veces con *tos y coriza.*— Voz débil, poco despejada y que falta cuando se canta y en la conversacion.—**Dolor en la laringe al tacto, y volviendo la cabeza.*—Presion en la laringe cuando se canta. —**Sensacion de obturacion en la laringe*, con respiracion impedida.—*Aspereza y sequedad en la garganta.—*Dolor quemante en la laringe y en la tráquea-arteria.—Tos que viene del fondo del pecho con dolor de excoriacion y sensacion de ardor.—*Tos con expectoracion amarillenta y ronquera.—**Tos hueca, seca, °como si aullara*, ó sibilante, *dia y noche*, aumentada por la tarde, y algunas veces con dolor en la laringe.—*Tos con expectoracion de mucosidades °viscosas. — Tos seca provocada por un cosquilleo quemante en la laringe.

Pecho.—Respiracion lenta y profunda, como por debilidad.—**Asma y disnea por una dificultad en la laringe.*— °*Inspiracion con silbido.*— °Accesos de estertor mucoso en la tráquea-arteria.—°Respiracion acelerada, ansiosa y difícil algunas veces con accesos de sofocacion y de estertor mucoso en el pecho.— Dolor fijo, lancinante y presivo en la region de los bronquios.— Dolores calambroídeos, constrictivos en todo el pecho.— Dolor de pecho con disnea.—Plenitud y opresion en el pecho.— Punzadas en el pecho.—*Sensacion de ardor que sube al pecho.—Ebullicion de sangre en el pecho despues del mas ligero esfuerzo y el menor movimiento*, con dificultad de respirar, angustia, náuseas y debilidad hasta el punto de

Digitized by Google

caor en desvanecimiento.— Dolores y ansiedad en la region del corazon.

Tronco.—Sensacion de torpeza en los riñones y en las caderas.—°Padecimientos de riñones con dolores tractivos, dislacerantes y presivos.—*Tension dolorosa y rigidez de los músculos del cuello y de la nuca.*—*Bocios* hinchados, voluminosos y duros, con presion, hormigueo y punzadas.—Calambres en los músculos del cuello.

Brazos.—Estremecimiento de los músculos en las articulaciones escapulares.— Pesadez y temblor de los antebrazos y de las manos.— Tirantez en los antebrazos y en las articulaciones de las manos.—Gruesas ampollas en el antebrazo.— Hinchazon de las manos con rigidez de los dedos.— Rubicundez é hinchazon de las articulaciones de los dedos, con tension moviéndolos.— Torpeza en la punta de los dedos.

Piernas.— Estremecimiento de los músculos glúteos.— Traccion espasmódica de las piernas hácia adelante y hácia atrás.— Rigidez de las piernas.— Traccion y dislaceracion en las piernas y en los piés, algunas veces tan solo por la noche.

182.—SQUILLA MARITIMA.

SQUIL.—Escila maritima.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop. —*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 2 á 4 semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTO: Camph.

COMPÁRESE CON: Bry. magn. mur-ac. n-vom. puls. rhab. rhus. seneg. spong.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de sintomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones hidrópicas?; Gastritis?; Enteritis?; Ascitis?; Afecciones catarrales; Grippe; *Pulmonia*; *Pleuresía* y padecimientos á consecuencia de estas enfermedades, cuando han sido tratadas por evacuaciones sanguíneas; Hidrotorax; etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

Digitized by

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores* sordos, reumáticos, en todo el cuerpo, *agravados por el movimiento y aliviados por el reposo.*—Palpitaciones musculares.—*Convulsiones* y accesos de calambres.—Induracion de las glándulas.—Pesadez, fatiga y tiron en los miembros.—Inquietud en los miembros.—Sensacion de ardor y de prurito en la piel.—Erupcion como una sarna pustulosa con prurito quemante.—Excoriacion en la flexion de los miembros.—Esfacelo.—Sueño inquieto con ensueños frecuentes y agitacion.—Insomnio.—Disposicion al frio.—Frio glacial de los piés y de las manos, con calor en el cuerpo.—°*Calor seco, ardiente*, °con despeluzamiento y dolor por poco que se descubra.—°Despues del calor, palidez de la cara sin calofrio.—Angustia con temor de la muerte.—Gemidos.—Irritabilidad con pesar.—Aversion al trabajo intelectual y corporal.

Cabeza.—Vértigo con náuseas.—Vértigo por la mañana, que hace caer de costado.—Cefalalgia por la mañana *despues de despertarse*, como una pesadez presiva y dolorosa.—Sensibilidad dolorosa en el vértice, todas las mañanas.—Dolor compresivo en los lados de la cabeza.—Contraccion en las sienes.—*Dolores de cabeza tractivos, lancinantes.*—°Pulsacion en la cabeza levantándola.

Ojos.—Dolor en los ojos con sensacion de contraccion.—Dislaceracion en los ojos, como detrás de los globos.—Sensacion quemante en los ángulos exteriores de los ojos.—Hinchazon de los párpados superiores.—Ojos excesivamente abiertos.—Mirar fijo.—Pupilas contraidas ó excesivamente dilatadas.—Los objetos parece que dan vueltas, y la vista se oscurece.

Oidos y nariz.—Dislaceracion en los oidos.—Ventanillas nasales doloridas como si estuviesen excoriadas.—Erupcion que exuda debajo de la nariz, con prurito lancinante.—Coriza fluente, con las ventanillas de la nariz ulceradas y estornudo frecuente.—Mucosidades nasales, ácres, corrosivas.

Cara.—Cara tan pronto muy alterada como animada.—Calor en la cara, excitado fácilmente por el mas ligero movimiento, ó con solo hablar.—Rasgos del semblante como consumidos, contraidos, sobre todo durante el calor febril; despues del calor, palidez.—°Labios y dien-

Digitized by Google

tes negros.—°*Grietas en los labios*, con costras morenuzcas.—**Color de la cara de un rojo oscuro subido.*

Boca y garganta.— *Boca* pastosa y *llena de mucosidades.* —°*Boca seca y abierta.*— Vesículas en la lengua.—Aspereza y arañamiento en la garganta.—*Sensacion de ardor en el paladar y en la garganta.*—Sequedad en la garganta.

Apetito.— Insipidez de los alimentos.—Gusto empireumático en la garganta al comer.—*Gusto dulce*, *insípido*, *ó *amargo de los alimentos*; sobre todo de la carne y de la sopa.—**Repugnancia á los alimentos.*— Deseo de los ácidos.—**Pérdida del apetito.*—**Mucha sed*, sobre todo de agua fresca.—°*A pesar de la sed*, *no se puede beber mas que gota á gota*, á causa de la dificultad en la respiracion.—*Voracidad y bulimia.*—°*Debilidad de la digestion.*

Estómago.— Náuseas algunas veces con gana de vomitar.—°Náuseas contínuas por la mañana durante la tos. —Náuseas con conato al vómito, alternando constantemente con movimientos, como para diarrea.— Vomituricion violenta.—°*Eructos amargos.*—*Presion en el estómago*, como por una piedra.

Vientre.—**Sensibilidad dolorosa del vientre con meteorismo, sin dureza.—Traccion y dislaceracion á través del vientre.— Pellizcos, ruido sordo y borborigmos en el vientre.— Expulsion frecuente de gases.—°*Ascitis.*

Deposiciones.— Estreñimiento.— Deposicion dura, insuficiente.— *Diarrea de mucosidades* parduscas, con expulsion abundante de gases.— Deposiciones diarréicas, negras.— Ascárides y filamentos blancos, abundantes en los excrementos.— Deposiciones fétidas, lientéricas.— Evacuaciones sanguinolentas.

Orinas.— Disminucion de la secrecion de la orina.—*Mucha gana de orinar con emision* abundante *de una orina acuosa.*—Flujo de orina.—**Emision frecuente de orina por la noche.*—**Presion contínua en la vejiga*, que está muy sensible.—**Orinas rojas*, calientes, oscuras, con sedimento rojo.—*Hematuria.*—Despues de la emision tenesmo.

Partes genitales.— Dolor en los testículos, con sensacion compresiva.— Metrorragias.

Laringe.—Tos provocada por un cosquilleo por debajo del cartílago xifoides, ó al respirar profundamente.—Tos hasta provocar vomituriciones.—*Tos violenta con lancina-*

Digitized by Google

ciones en los costados del pecho.—Tos con estremecimiento doloroso en el vientre.—**Tos corta, seca, cada vez que se respira*, °sobre todo por la tarde y por la noche.—**Tos despues de haber bebido frio.*—Estertor mucoso antes de la tos.—**Tos con expectoracion de mucosidades* y respiracion corta.—°*Tos con esputo de sangre.*—**Expectoracion de mucosidades rojizas.*—**Cefalalgia y sofocacion al toser*, ó *presion en la vejiga, y emision de orina involuntaria.*—**Tos con respiracion corta, anhelosa.*

Pecho.—Respiracion acelerada y angustiosa, con disnea y necesidad de estar acostado con la cabeza y el pecho elevados.—Respiracion á manera de gemido, con la boca abierta.—Presion en los dos costados del pecho, sobre todo inspirando.—**Lancinaciones extensas, presivas ó con estremecimiento en el pecho y los costados*, al respirar y al toser.—Sensacion de peso en el pecho.—**Congestion de sangre al pecho.*—Dolores en el pecho agravados por la mañana.

Tronco y miembros.—Erupcion pruritosa en el dorso.—*Rigidez de la nuca y del cuello.*—Traccion reumática y compresion en los músculos del cuello.—Granos en el cuello, dolorosos solamente cuando se rascan.—Sudor en los sobacos.—Estremecimiento convulsivo en los brazos.—Punzadas en las articulaciones de las manos.—*Estremecimiento convulsivo en las piernas.*—Tracciones reumáticas en los muslos y en las piernas.—Sensacion quemante en la parte carnosa del pié, como si hubiera estado helado.—Sudor en los dedos de los piés.—Sudor frio en los piés.

183.—STANNUM.

STAN.—Estaño.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 6 á 7 semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Puls.

COMPÁRESE CON: Ars. bell. cann. *caus.* cham. *chin.* hell. ign. *puls. seneg.* stram. valer. verb.—Es sobre todo despues de: *Caus.*, cuando el estaño será eficaz, si se hallase indicado.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medica-

Digitized by Google

mento contra:—Parálisis; Epilepsia, sobre todo durante la denticion; Fiebres lentas?; Prosopalgia; Gastralgia y cólicos espasmódicos, sobre todo en las mujeres histéricas, ó en las personas hipocondríacas; Ténia?; *Leucorreas*; Catarro bronquial; Grippe; *Tisis mucosa*; Tísis laríngea; Hidrotorax; etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores presivos y tractivos*, sobre todo *en los miembros*, agravados insensiblemente hasta que se hacen muy violentos, y disminuyen del mismo modo.—**Ataques de epilepsia* °con retraccion de los pulgares y agitacion, ó bien con renversamiento de la cabeza, palidez del rostro, movimientos convulsivos de las manos y de los ojos, y pérdida del conocimiento; los accesos se presentan á veces por la tarde.—**Enflaquecimiento excesivo*.—°*Parálisis*.—Mucho entorpecimiento y pereza.—*Abatimiento excesivo y *postracion física* y moral, con temblor, sobre todo haciendo un ejercicio ligero, °y con disposicion á traspirar fácilmente.—°Sobreexcitacion nerviosa.—°Inquietud insoportable en el cuerpo.—°Fatiga excesiva para hablar.—Los padecimientos parece que ceden cuando se anda, á excepcion del abatimiento, que es considerado en este caso; aquellos aparecen en cuanto uno se queda tranquilo.

Piel.—Punzadas pruritosas (quemantes) en todo el cuerpo.—Sabañones.—Padrastros en la raiz de las uñas.

Sueño.—Gana de dormir por el dia.—Bostezo frecuente con opresion de pecho, como si se hallase ceñido con una faja.—*Sueño tardo*.—**Insomnio nervioso*, ó *continuo*.—Por la mañana, le parece á uno que no ha dormido bastante.—Sueño profundo.—*Agitacion nocturna y *afluencia de ensueños vivos*, angustiosos ó lascivos.—Gemidos, llantos y lamentos lastimosos, cuando se duerme.

Fiebre.—Calofrios y horripilacion por la mañana, con frio en las manos y entorpecimiento en la punta de los dedos.—Despeluzamiento que recorre el dorso, ó solamente la cabeza por la tarde con sed.—°Calor ardiente en los miembros, sobre todo en las manos.—*Sensacion de calor angustioso al menor movimiento*.—°Pulso pequeño

Digitized by Google

y acelerado.—*Sudores nocturnos muy debilitantes.—*Sudores matutinos abundantes.

Moral.—Humor sombrío, hipocondríaco.—**Mucha agitacion y angustia*, melancolía y disposicion á llorar.—Se anda muy ocupado sin llegar á hacer nada.—*Desaliento.—*Mal humor, con taciturnidad y áversion á la sociedad y á la conversacion.—Arrebato colérico, pronto.—*Sobreexcitacion nerviosa.

Cabeza.—Vértigo como si todos los objetos estuvieran muy apartados.—Vértigo al sentarse con pérdida de ideas.—*Cefalalgia con náuseas* y vomiturician, algunas veces con sensacion quemante en el sincipucio, en los ojos y en la nariz, ó bien por la mañana con mal humor.—**Pesadez y presion aturdiente* en la cabeza, sobre todo recorriendo *la frente*.—*Dolores lancinantes en la cabeza, sobre todo en la frente, y *principalmente despues de un acceso violento de tos.—Dolores calambroídeos en la cabeza como por una tension ó un apretamiento.—Traccion presiva y dislaceracion en la cabeza.—Dolores terebrantes en la cabeza.—Dolores como si golpearan en las sienes.—Sacudidas dolorosas á través de la cabeza.

Ojos.—Ojos dolorosos y como excoriados por la frotacion.—*Presion en los párpados* y en los ángulos.—Lancinaciones quemantes en los párpados.—Prurito, escozor y sensacion de ardor en los ojos.—Orzuelos.—*Aglutinacion nocturna de los párpados.*—Ulcera en el ángulo interno del ojo, como una fístula lagrimal.—*Ojos empañados, turbios.*—Estremecimiento y conmocion en los ojos.—Ojos convulsos ó prominentes.—Aureola irídea alrededor de la luz artificial.

Oidos y nariz.—Otalgia con dislaceraciones tractivas.—Ulceracion de las perforaciones del lóbulo de las orejas.—Tintineo en los oidos.—Ruido en los oidos, sonándose.—Pesadez y sensacion de obturacion en la parte superior de la nariz.—Inflamacion en el interior de la nariz.—Sensacion quemante en la nariz.—Coriza seco de un solo lado, con hinchazon y rubicundez de la nariz.

Cara.—**Cara pálida, macilenta*, con *ojos hundidos.*—**Dolores en la cara*, con traccion presiva, sobre todo en los pómulos y en las órbitas.—Dolor quemante, lancinante, en los músculos de la cara.—*Hinchazon de las mejillas* y

Digitized by Google

de la mandíbula superior.—Calambre en la mandíbula. —Hinchazon dolorosa de las glándulas submaxilares.

Dientes.—Odontalgia despues de la comida, con dolor que causa estremecimiento y calor en la cara.—**Sensacion de prolongacion y vacilacion de los dientes*.—Ulcera en las encias con hinchazon de las mejillas.

Boca y garganta.—Exhalacion fétida por la boca.—Flujo de saliva ácida.—*Palabra dificil*, *abatida*, por debilidad.—°Lengua roja.—Irritacion en la garganta como por hinchazon interior, con traccion y tension.—*Sensacion de sequedad en la garganta*, con lancinaciones.—Aspereza y arañamiento en la faringe, sobre todo por la tarde.—*Acumulacion de mucosidades en la cámara posterior de la boca*, con necesidad de expectorar, seguida de sensacion de excoriacion.

Apetito.—Sabor amargo y ágrio.—Sabor amargo de todos los alimentos.—Gusto amargo, herbáceo de la cerveza.—Hambre aumentada con imposibilidad de satisfacerla.—Aumento de sed.—Despues de la comida, náuseas y vómitos.—°*Debilidad excesiva de la digestion*.

Estómago.—Erutos amargos, ó con sabor á huevos podridos.—**Erutos ágrios*, con *arañamiento en la garganta*. —Hipo frecuente.—**Náuseas sobre todo despues de la comida*, seguidas de *vómito amargo* y acuoso.—**Vomituricion violenta*, seguida de vómito de los alimentos.—**Presion en el estómago*, algunas veces muy violenta.—*Presion* tensiva *en la boca del estómago* que está dolorosa al tacto, como por ulceracion subcutánea.—**Calambres de estómago*, °algunas veces con erutos amargos, sensacion de hambre y diarrea; ó bien con náuseas y rostro pálido, enfermizo.—Apretamiento como por un garfio en el estómago y en la region umbilical, con náuseas.

Vientre.—Golpes obtusos á través de los hipocondrios.—*Calambres en la region del diafragma*.—**Presion y sensacion de ardor en la region hepática*.—**Presion, dolor calambroideo y punzadas en el hipocondrio izquierdo*.—Vientre timpanítico, dolorido y sensible al tacto.—*Calambres abdominales* con dolores por encima y debajo del ombligo. —Sensacion como si escarbaran, pellizcos y retortijones en el vientre.—Sensacion de ardor y punzadas en el abdómen.—Sensacion de excoriacion en el vientre agravada al tacto.—Apretamiento como por gárfios en la re-

Digitized by

gion umbilical seguido de náuseas.—Sensacion de vacío en el abdómen.—*Encarcelacion de gases.*

Deposiciones.—Constipacion de vientre.—**Gana de deponer*, frecuente é inútil.—Deposiciones duras, secas, nudosas ó escasas y verdosas.—*Deposiciones mucosas.*—*Fuerte diarrea.

Orinas.—Retencion de orina.—Emision de orina rara.—**Conato frecuente de orinar*, algunas veces con emision en corta cantidad.—No siente la necesidad de orinar, como por insensibilidad de la vejiga.

Partes genitales.—*Exaltacion del apetito venéreo.*—Excitacion violenta y voluptuosa en la eyaculacion.—*Poluciones frecuentes.

Reglas.—Menstruacion mas abundante que de ordinario.—Antes de las reglas ansiedad y melancolía.—°Durante las reglas, cólicos.—Calambres de la matriz.—**Leucorrea de mucosidades trasparentes ó amarillentas con caida considerable de las fuerzas.*—El niño deja el pecho de la madre y no quiere mamar.

Laringe.—**Ronquera y aspereza en la garganta* con cosquilleo que provoca la tos.—°*Catarro con voz ronca*, sensacion de fatiga en el pecho, dificultad de la respiracion, y tos con expectoracion.—**Acumulacion abundante de mucosidades en la tráquearteria*, que se desprenden fácilmente por una ligera tos.—Voz muy alta para el canto, despues de haber expectorado.—°*Tos provocada por la risa, la palabra y el canto*, *ó por un cosquilleo en el pecho.—**Tos seca*, violenta, con estremecimiento en la cama desde *la tarde* hasta media noche, ó mas violenta por la mañana.—°*Tos que se presenta en acostándose del lado derecho.*—°Tos con vomituricion y vómito de los alimentos.—°*Tos con expectoracion frecuente de mucosidades.*—**Expectoracion en tosiendo, verdosa, dulce* ó amarilla, salada, ó bien viscosa y en grumos, ó serosa y de mucosidades líquidas, ó de un olor pútrido.—**Durante y despues de la tos, dolor de excoriacion y punzadas en el pecho.*

Pecho.—**Disnea por la noche*, sobre todo estando acostado ó por el dia al menor movimiento.—**Disnea por la tarde*, sobre todo con sensacion de vacío en la boca del estómago y angustia que obliga á aflojar los vestidos.—**Opresion de pecho andando y en subiendo una escalera.*—**Estertor mucoso y silbido en el pecho.*—Al respirar profunda-

Digitized by Google

mente, sensacion agradable de agilidad.—Dolor de quebrantamiento en el pecho.—**Presion profunda en el pecho como por un peso.*—*Tension en el pecho.—**Constriccion de pecho*, algunas veces por la tarde con angustia.—**Lancinaciones en el costado izquierdo del pecho* al respirar y estando echado sobre el derecho.—**Dolor de excoriacion en el pecho.*—**Sensacion de debilidad en el pecho, como si estuviese vacio*, sobre todo despues de haber hablado ó expectorado.

Tronco.—Opistótonos.—Lancinaciones en los omóplatos y en la nuca.—Debilidad de los músculos de la nuca y crujido de las vértebras del cuello, sacudiendo la cabeza.

Brazos.—Dolor paralítico en la articulacion del hombro.—*Pesadez paralítica en los brazos.*—Dislaceraciones presivas en los muslos y en las articulaciones de los brazos, las manos y los dedos.—Debilidad y temblor de las manos.—**Hinchazon de las manos*, sobre todo por la tarde.—Estremecimiento de las manos.—Violenta *sensacion de ardor en las manos.*—Manchas pequeñas, rojas en el dorso de las manos.—Sabañones en las manos.—Contraccion de los dedos.—Retraccion de los pulgares.—Punzadas en la punta de los dedos.—Respigones dolorosos en las uñas.

Piernas.—Traccion y dislaceracion presiva en las caderas, hasta encima del sacro, como igualmente en las piernas y en las rodillas.—*Laxitud paralítica y pesadez de las piernas.*—Genuflexion de las rodillas al andar.—Rigidez y tension en las corvas.—Sensacion de calor y *de ardor en los piés.*—Sacudidas dislacerantes en los maléolos, las que se extienden hasta los dedos.—**Hinchazon en los piés*, sobre todo por la tarde.—Hinchazon rojiza en los piés.

184.—STAPHYSAGRIA.

STAPH.—Estafisagria.—Hahnemann.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 3 á 4 semanas en las afecciones crónicas.

Antídotos: Camph.—*Se emplea como antídoto de*: Thui.

Compárese con: Amb. arn. *coloc.* con. ign. lyc. *merc.* mosch. magn-m. *phos-ac.* puls. sabin. *thui.*—Cuando la estafisagria será eficaz, si se hallase indicada, será sobre todo despues de *thui.*

Digitized by Google

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser *consultado* este medicamento contra:—*Malas consecuencias de una contrariedad con despecho é indignacion*, ó de un pesar con inquietud; Debilidad nerviosa debida al onanismo; Padecimientos por abuso del mercurio; Afecciones escrofulosas y escorbúticas; Heridas por instrumentos cortantes; Afecciones carcinomatosas?; Inflamacion, reblandecimiento, ulceracion y otras afecciones de los huesos; Erupciones costrosas; Fiebres intermitentes con afecciones escorbúticas; Histeria, Hipocondría; Tiña, Prosopalgia; Blefaroftalmía; Pólipos de la nariz y de los oidos; Estomacace y afecciones escorbúticas de las encías; Odontalgia; Afecciones gástricas y biliosas; Gastralgia, Disentería; Disuria; Cáncer de la matriz?; Bócio?; Ciática?; Coxalgia con tendencia á la supuracion?; etcétera, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—**Traccion paralítica en las articulaciones*, sobre todo durante el movimiento, ó una falsa posicion de la parte.—*Dislaceracion tractiva en los músculos*, sobre todo en estando sentado.—Lancinaciones agudas, penetrantes, profundas en diferentes partes.—Calambres en los miembros.—°Inflamaciones dolorosas en los huesos.—°Hinchazon de los huesos.—*Parálisis semilateral, despues de haberse encolerizado.—Accesos de desvanecimiento.—Sensibilidad dolorosa de todos los músculos al tacto, y de las articulaciones moviéndolas.—*Cansancio sumo y excesiva laxitud*, sobre todo durante el movimiento aliviándose en estando sentado ó acostado.—Necesidad contínua de estar acostado.—Mucha fatiga por la mañana muy temprano, con rigidez de todas las articulaciones.—Despues de la siesta, obnubilacion y pesadez en los miembros.

Piel.—Hormigueo como por insectos que bullen por todo el cuerpo, sobre todo por la mañana.—**Erupciones miliares crónicas*, algunas veces con estremecimientos convulsivos por la noche.—Erupciones de nudosidades pruritosas que exudan, con dolor quemante.—Erupciones dartrosas, con prurito por la tarde y sensacion de ardor despues de haberse rascado.—*Herpes secos, costrosos

Digitized by

en las articulaciones.—*Infarto é induracion de las glándulas.—*Piel enfermiza, que supura fácilmente.—*Forúnculos frecuentes.—Ulceras con punzadas dislacerantes ó escozor pruritoso.—Estremecimiento y dislaceracion alrededor de las úlceras, sobre todo por la tarde y por la mañana.

Sueño.—*Mucha gana de dormir por el dia.—Pandiculaciones y bostezos violentos* que hacen verter lágrimas.—**Sueño tardo por afluencia de ideas*, ó á causa de un prurito, y de una sensacion de ardor en los herpes y en las úlceras, ó de dolores violentos en las pantorrillas.—Estremecimiento de los miembros durmiendo.—Sueño agitado con ensueños inquietos y desvelo frecuente con sobresalto.—*Ensueños lascivos.

Fiebre.—Calofrios frecuentes y horripilacion aun por la noche.—°*Fiebre por la tarde que consiste solamente en frio.*—°Fiebre terciana, con gusto amargo, hemorragia de las encías, anorexia y constipacion.—Calor quemante exterior, con ebullicion de sangre y sed.—Por la noche calor ardiente en los piés y en las manos, que obliga á descubrirlos.—*Mucha disposicion á transpirar por el dia*, aun estando tranquilamente sentado, ó bien imposibilidad de traspirar, con palidez del rostro y cefalalgia.—**Sudores nocturnos*, abundantes, algunas veces *con olor pútrido*.—Sudor frio en la frente y en los piés.

Moral.—*Humor hipocondriaco*, con indiferencia para todo.—*Tristeza*, con temor sobre el porvenir.—**Llantos* y tristeza acerca de su estado.—*Carácter susceptible.—Deseo de la muerte.—Ansiedad y agitacion que no deja permanecer en ninguna parte.—**Mal humor, irascibilidad y excesivo despecho*, que induce á arrojar violentamente cuanto se tiene á mano.—Aversion á la conversacion, á la meditacion y á todo trabajo intelectual y sério.—*Debilidad de la memoria.*—Instabilidad en las ideas.—*Imaginacion excesivamente obtusa*, con imposibilidad de entregarse á trabajo alguno.—Errores de la imaginacion, relativos á los acontecimientos pasados.—Ilusion como si todos los objetos que le rodean fuesen bajos, y que él fuese mucho mas alto.

Cabeza.—Cabeza confusa y pesada.—*Vértigos rotatorios*, algunas veces al principio de la noche en la cama, ó por el dia, estando sentado ó acostado, aliviándose en pa-

Digitized by Google

scando.—Dolores de cabeza por la mañana al despertar, como si el cerebro estuviese confundido.—*Dolor con aturdimiento en la cabeza*, alternando algunas veces con terebracion.—*Pesadez de la cabeza*, sobre todo en la frente por encima de la raiz de la nariz.—*Presion en la cabeza*, tractiva, dislacerante ó lancinante.—Dolores de cabeza, como si la frente fuera á abrirse, en bajándose y moviéndose. —*Dolores de cabeza compresivos ó expansivos.*—Dolor de cabeza semilateral, como por un clavo introducido en el cerebro.—Dolores de cabeza lancinantes.—Sensacion de vacilacion del cerebro.—Dolores reumáticos y tractivos al exterior de la cabeza.—Prurito con hormigueo algunas veces tambien corrosivo en la piel del cráneo, con dolor de excoriacion.—*Abundante produccion furfurácea, con prurito en la piel del cráneo.*—**Tiña húmeda, fétida con prurito violento.*—*Alopecia.

Ojos.—Los ojos como cuando se tiene sueño.—Presion en los ojos, los párpados y los ángulos.—Prurito en los bordes de los párpados.—Prurito y *escozor mordiente en los ángulos internos de los ojos.*—Escozor y sensacion de ardor en los ojos, escribiendo.—Lancinaciones violentas en los ojos, fatigándolos.—**Inflamacion de los ojos*, que están rodeados de granos.—**Inflamacion del borde de los párpados.*—**Nudosidades en el borde de los párpados.*—*Excesiva sequedad de los ojos.* — Mucosidades abundantes, purulentas, secas, en los ángulos de los ojos.—**Aglutinacion nocturna de los ojos.*—Oclusion espasmódica de los párpados, —Disminucion de la vista.—*Vista turbia*, como si se tuviese agua en los ojos.—Se ven reflejos negros, como relámpagos y chispas luminosas.—Se ven chispas en la oscuridad.—Aureola alrededor de la luz artificial.

Oidos y nariz.—*Punzadas en los oidos.*—Erupcion detrás de las orejas.—°*Dureza del oido por un desarrollo considerable de las amigdalas*, principalmente *despues del abuso del mercurio.*—Retintin en los oidos.—*Nariz ulcerada* con costras profundas en el interior.—Fuerte coriza fluente, con obturacion de un lado de la nariz, estornudo frecuente y lagrimeo.—**Coriza con ulceracion de las ventanillas nasales.*—Obturacion de las fosas nasales, con voz gangosa.

Cara.—**Cara cóncava, nariz afilada, con ojos hundidos, ojeras azules.*—*Cara azulada y pardusca, cuando se enco-

Digitized by Google

leriza.—**Dolor facial*, penoso, presivo y lancinante, desde los dientes hasta el ojo.—*Inflamacion de los huesos de la cara*, con punzadas quemantes, ó tracciones incisivas y dislaceracion presiva.—*Erupcion facial*, con prurito y punzadas.—*Labios cubiertos de úlceras* y de costras, con dolor quemante.—*Hinchazon de los labios.—Luxacion fácil de la articulacion de la mandíbula.—**Hinchazon* dolorosa é *induracion de las glándulas submaxilares.*

Dientes.—*Odontalgia con hinchazon de las mejillas y de las glándulas submaxilares.—**Odontalgia inmediatamente despues de la comida* y la masticacion, como tambien *despues de haber tomado bebidas frias*, *principalmente por la mañana* ó por la noche, *y de la introduccion del aire frio* en la boca.—**Dislaceracion y tracciones* presivas *en los dientes cariados*, ó en la raiz de los sanos y tambien en las encías.—**Dolor corrosivo en las muelas cariadas.*—Ennegrecimiento, melladura y *cáries de la dentadura.*—Sensibilidad dolorosa, hinchazon de las encías, y *hemorragia.*—°*Nudosidades y excrescencias dolorosas en las encias.*—Encías pálidas, blancas, ulceradas.

Boca.—Boca y lengua cubiertas de vesículas.—°Excrescencias dolorosas en lo interior de la mejilla.—Ulceras en la boca.—Salivacion.—Saliva sanguinolenta.—Hinchazon de las glándulas sublinguales.—Punzadas en la lengua como por espinas.—Palabra con abatimiento por debilidad de los órganos de la locucion.

Garganta.—*Aspereza en la garganta* y arañamiento, con sensacion de excoriacion al deglutir y al hablar.—Deglucion contínua cuando se habla.—Sequedad y *punzadas en el paladar* y en la garganta.—Hinchazon de las amígdalas.—Tiron doloroso desde el arco del hióides hasta la faringe.

Apetito.—*Sabor soso y acuoso*, con gusto normal de los alimentos.—Sabor amargo de todos los alimentos.—Sabor ácido del pan.—Apetito con insipidez de los alimentos.—**Hambre voraz.*—**Bulimia, aun despues de la comida, algunas veces con pituitas de estómago.*—**Mucho deseo de leche.*—El tabaco pica y produce pirrosis.—**Solo se apetecen alimentos liquidos.*—**Aficion excesiva al vino y al tabaco.*

Estómago.—**Eructos generalmente vacios*, ó que producen arañamiento.—**Eructos amargos despues de los alimentos ácidos.*—°*Eructos salados y amargos despues de haber comido*

Digitized by Google

carne.—**Eructos á manera de sollozos.*—Secrecion de agua por la boca como pituitosa.—Náuseas con propension al vómito todas las mañanas.—*Náuseas frecuentes.—**Presion en el estómago como por un peso*, ¯por la mañana en la cama.—°*Tension y presion en el estómago que se agravan ó se alivian comiendo, sobre todo pan.*—Plenitud, presion y punzadas en la boca del estómago.—Dolor como si escarvaran en el estómago.—Tension angustiosa á través de los hipocondrios por la mañana con opresion de la respiracion.

Vientre.—*Presion tensiva en el vientre.*—°*Vientre abultado en los niños.*—Traccion á través del vientre.—Sensacion de debilidad en el vientre, como si fuera á caer.—Retortijones despues de tomar toda clase de alimentos ó de bebidas.—*Retortijones calambroideos*, con gana de deponer.—Abundante produccion y encarcelacion de gases.—Expulsion frecuente de gases calientes ó fétidos.—**Hinchazon de las glándulas inguinales.*—**Hernia inguinal* °*como á consecuencia de un esfuerzo.*

Deposiciones.—**Constipacion.*—*Dureza de las deposiciones.*—Conato frecuente de deponer con *evacuaciones escasas, duras*, ó bien deposiciones blandas.—Deposiciones tardas sin ser duras.—Evacuacion difícil.—**Deposiciones disentéricas*, precedidas, acompañadas y seguidas de tenesmo y retortijones.—*Deposiciones diarréicas, ¯con expulsion frecuente de gases fétidos.—Evacuacion involuntaria de una deposicion líquida.—*Durante la deposicion* retortijones ardientes, presion y *constriccion en el ano.*

Orinas.—**Necesidad muy urgente de orinar con emision, gota á gota*, ó á chorro delgado de una orina oscura.—*Emision de orina excesivamente dolorosa.—Emision frecuente de una orina clara, acuosa.—Emision frecuente de una orina roja.—Emision de orina involuntaria al toser.—Despues de haber orinado, siente gana como si la vejiga estuviese llena.—*Sensacion de ardor en la uretra, sobre todo al orinar.*

Partes viriles.—Excrescencias blandas, húmedas, en y detrás del glande.—*Inflamacion de los testículos*, con punzadas quemantes ó traccion presiva y dislacerante.—*Exaltacion pronunciada del apetito venéreo*, con erecciones frecuentes, sobre todo por la noche.—Prurito voluptuoso en el escroto, que provoca la eyaculacion.—*Polu*

Digitized by Google

ciones frecuentes, aun durante la siesta.—Despues del cóito, disnea.—Secrecion de licor prostático durante una deposicion dura.

Reglas.—Sensibilidad dolorosa de las partes genitales. —Escozor y prurito lancinante en la vulva.—Reglas muy adelantadas.

Laringe.—**Ronquera* con acumulacion de mucosidades adherentes en la laringe y en el pecho.—*°Sensacion de presion y contraccion en el hoyuelo del cuello*, despues de haberse encolerizado, agravada por la deglucion.—*°Aspereza en la laringe despues de haber hablado mucho.—*Tos seca, hueca, provocada por un cosquilleo en la laringe.—Tos violenta, con expectoracion de mucosidades viscosas*, al principio de la noche, despues de haberse acostado.—**Tos con expectoracion purulenta, amarilla*, sobre todo por la noche.—Expectoracion de sangre al toser.—Durante la tos, dolor en el pecho, como por ulceracion.

Pecho.—*Presion en el pecho con pesadez del mismo estando sentado, y se alivia andando.—*Opresion contractiva y mucha *agitacion en el pecho.*—Lancinaciones en el pecho.—*Dolor de excoriacion y de ulceracion en el pecho.*—Calambre en el diafragma despues de haberse encolerizado.—*Palpitaciones de corazon* temblorosas, *al mas ligero movimiento*, y á la menor fatiga intelectual, tambien al oir la música y despues de la siesta.—Erupcion miliar en el pecho con rubicundez y prurito al calor.—Erupcion herpética sobre las últimas costillas con prurito quemante.

Tronco.—*Dolor como de quebrantamiento en los riñones ó sensacion como de luxacion de esta parte*, sobre todo estando en reposo *y principalmente por la noche y por la mañana.*—Dolores en los riñones al levantarse del asiento, ó por la noche en la cama.—Lancinaciones violentas que suben al dorso.—*°Absceso en el músculo lumbar.—Presion tractiva*, reumática *y tension en la nuca con rigidez.*—Debilidad de los músculos de la nuca y del cuello.—Erupcion de granos pruritosos en la nuca.—**Hinchazon de las glándulas del cuello, de la nuca y de los sobacos.*—Lancinaciones debajo de las axilas.

Brazos.—Presion en las espaldas.—Rigidez de la articulacion de la espalda, por la mañana.—*Dolor osteócopo en los brazos*, durante el movimiento.—*Traccion* presiva,

Digitized by Google

paralítica y *dislaceracion* lancinante *en los brazos y en los antebrazos*, los hombros, las manos y los dedos.—Presion dolorosa en los huesos de los brazos.—Herpes en las manos.—Entorpecimiento en la punta de los dedos.—Dislaceracion con estremecimiento en los dedos, sobre todo en las puntas.—°*Nudosidades artríticas en las articulaciones de los dedos.*—Calambres en los dedos.—Movimientos convulsivos de los dedos.

Piernas.—Rigidez de la articulacon coxo-femoral por la mañana.—*Debilidad dolorosa de los muslos y las piernas*, sobre todo *de la articulacion de la rodilla.*—Dolor de quebrantamiento en los muslos, andando.—Herpes pruritosos en los muslos y en las piernas.—*Punzadas* tractivas *en las rodillas y sus articulaciones.*—Tracciones y dislaceraciones presivas en la tibia y en los huesos de los piés.—Calambres nocturnos en las pantorrillas y en la planta de los piés.—Hinchazon del empeine.—Hinchazon de los huesos del metatarso.—*Prurito ardiente en los dedos*, como si se hubieran helado.

185.—STICTA PULMONARIA.

STICT.—Véase Hale, *Remedios americanos*.

Este medicamento, de que tampoco poseemos sino patogenesias demasiado fragmentarias para referirlas, ha sido empleado con mucho resultado, *aunque empiricamente*, contra: *Catarros brónquicos, Grippes* y *Toses catarrales*, sobre todo cuando estas afecciones se distinguian por los caractéres siguientes: *sequedad excesiva* de las mucosas de la nariz, de la garganta, de la faringe y del pecho, que se aumenta principalmente por la tarde.—En los *tísicos*, este medicamento parece, mejor que ningun otro, para apaciguar la tos fatigosa.

Digitized by

186.—STRAMONIUM.

STRAM.—Manzana e pinosa.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeopática.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 24 horas.

ANTÍDOTOS: Acetum. citr-ac. n-vom. tabac. ácidos vegetales.—*Se emplea como antídoto de:* Merc. plumb.

COMPÁRESE CON: Acon. asar. *bell.* bry. camph. canth. carb-v. cham. cocc. *hell.* hep. *hyos.* merc. mosch. *n-vom. op. plumb.* puls. rut. stann. *veratr. zinc.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que deberá ser *consultado* este medicamento contra:—Convulsiones, accesos de epilepsia, baile de San Vito, catalepsia y otras *afecciones espasmódicas*, sobre todo á consecuencia de un espanto, ó de la respiracion del vapor del mercurio; Afecciones á consecuencia del sarampion; Fiebres tifoídeas; Imbecilidad; *Delirium tremens*, sobre todo por el abuso de la cerveza; Manía; Hidrofobia; Ninfomanía de las recien paridas; Encefalitis; Hidrocéfalo; Hipo convulsivo; Calambre de pecho, etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores calambroideos*, tractivos, paralíticos *en los músculos y en las articulaciones de los miembros.*—Sensacion como si los miembros estuviesen separados del cuerpo.—Calambre contractivo en los miembros.—*Hormigueo en los miembros.*—Contraccion y extension lenta de los miembros.—**Accesos de calambres*, de diversa naturaleza.—*Tétanos.*—Emprostótonos.—°*Calambres y otros padecimientos histéricos.*—Rigidez y contraccion de algunos miembros.—*Accesos de rigidez cataléptica del cuerpo, con pérdida del conocimiento, ¯precedidos de dolores de cabeza con vértigos.—*Movimientos fáciles de los miembros*, ó excesiva pesadez de estas partes.—*Convulsiones parecidas al baile de San Vito.—*Estremecimientos convulsivos de los miembros, ¯con llantos.—**Movimientos convulsivos y estremecimiento*, sobre todo al tacto, ó en fijando la vista sobre objetos brillantes (una luz, un espejo, el agua), ó bien que aparecen periódicamente.—°*Convulsiones*, como en la epilepsia,

Digitized by Google

pero sin pérdida del conocimiento.—Accesos de desvanecimiento con ronquido.—*Temblor de los miembros.*—Vacilan los miembros al andar y estando en pié.—*Parálisis*, algunas veces despues de un *ataque de apoplejia.*—Debilidad con necesidad de estar acostado.—*Supresion de todas las secreciones y excreciones.*

Sueño.—Mucha gana de dormir por el dia.—**Sueño profundo con ronquido*, gritos y alaridos.—*Soñolencia comatosa*, con fisonomía ridículamente solemne al despertar.—Sueño agitado con ensueños vivos.—*Posicion de rodillas en la cama, y sobresaltos al menor contacto con gritos y gestos desordenados.

Fiebre.—*Frio por todo el cuerpo*, sobre todo *en los miembros*, con calofrios, horripilacion y estremecimiento general.—Frio en las manos y en los piés con rubicundez de la cara.—*Calor con ansiedad* y rubicundez de las mejillas, ó bien con sed y vómitos.—Calor en la cabeza al principio, despues frio general, seguido de calor y de sed.—*Pulso pequeño, acelerado.*—*Sudores frecuentes, abundantes*, como por la noche.

Moral.—*Melancolía.*—Tristeza con angustia mortal y llantos abundantes, sobre todo por la noche en la cama.—Conciencia aflictiva.—*Humor inconsolable y facilidad á irritarse por pequeñeces.*—Mucha actividad y prontitud en los movimientos.—Tenacidad y encaprichamiento.—**Risa á carcajadas* que alterna con arrebatos coléricos ó con gemidos.—Alaridos y gemidos.—Murmullos ó gritos contínuos.—*Furor indomable, ganas de morder, de andar á golpes y de matar.*—°Unas veces mucha indiferencia por los negocios, otras se cree incapaz de desempeñarlos.—*Intentos de escaparse.—°*Deseo de la sociedad*, de la luz y de la claridad del sol, porque la oscuridad y la soledad agravan su estado moral.—*Despues del equinoccio de otoño se agrava el estado moral.—Pérdida de la memoria.—**Embotamiento de los sentidos*, ó insensibilidad á las influencias exteriores.—*Aturdimiento con agitacion interior.—**Delirio*, generalmente espantoso, *con visiones de fantasmas que causan miedo.*—Pérdida del conocimiento hasta el extremo de no reconocer á los suyos.—Idea fija: le parece que su cuerpo está dividido por la mitad.—*Errores de imaginacion*: todo lo que le rodea se le figura muy pequeño, y que él es el mas grande

Digitized by Google

y elevado.—*Divagaciones* con ideas extraordinarias.—*Enajenacion* mental con oraciones y gestos piadosos (plegarias, cánticos, aire devoto, etc.).—*Mania*, generalmente, con *ficciones inagotables de la imaginacion*, *locuacidad*, lascivia; pasatiempo con los espíritus, *importancia afectada*, bailes, risas, y golpes ó *bufonerías ridículas* que *alternan* constantemente con gestos tristes y circunspectos.—*Enajenacion mental y delirio furibundo, á consecuencia de una erisipela en la cara.*

Cabeza.—Embriaguez y aturdimiento.—*Vértigo* con *aturdimiento y vacilacion*, ó con oscurecimiento de la vista y cefalalgia.—*Cefalalgia* con *oscurecimiento de los ojos* y dureza de oido.—Sensacion penosa de ligereza y de debilidad en la cabeza.—Dolores de cabeza pulsativos en el vértice, con accesos de desfallecimiento.—*Congestion de sangre en la cabeza*, con calor.—Inversion y *movimientos convulsivos de la cabeza*.—Se levanta frecuentemente la cabeza cuando se está echado.

Ojos.—*Ojos rojos é hinchados*.—Presion y tension en los ojos y en los párpados.—*Inflamacion de los bordes de los párpados*.—Párpados ulcerados.—*Ojos lagrimosos*.—Aglutinacion nocturna de los ojos.—*Ojos fijos, centellcantes*.—Mirar vago, triste.—Parálisis y oclusion espasmódica de los párpados.—Ojos convulsos.—*Pupilas dilatadas* é insensibles.—*Oscurecimiento de la vista*.—Ceguera pasajera.—*Miopia*.—Diplopia.—Mirar indiferente, confuso.—*Ambliopia*.—Confusion de las letras al leer.—Errores de la vista, los objetos parecen estar trastornados, ó se presentan como coloreados.—*Ilusiones de la vista*.

Oidos y nariz.—Salida del aire por los oidos.—*Sordera*.—Obturacion de la nariz.—Estornudo espasmódico.

Cara y dientes.—Aire de torpeza y de extravío, con gestos tímidos.—*Distorsion* dolorosa *de los rasgos del semblante*.—Cara surcada por arrugas profundas.—*Cara tumefacta como congestionada*, algunas veces con fisonomía estúpida.—Rubicundez circunscrita de las mejillas.—*Cara de un color rojo subido*, ó muy pálido.—Erisipela en un solo lado de la cara y de la nariz.—Labios secos y que al mismo tiempo se pegan.—Línea amarilla en la parte roja de los labios.—Estremecimiento de los labios.—Distorsion de la boca.—*Rechinamiento de dientes*.—Odontalgia pulsativa, como si los dientes fueran á caerse.

Digitized by

Boca.—*Sequedad de la boca.*—Salivacion abundante.—*Espuma* sanguinolenta *en la boca.*—Esputos de sangre.—**Lengua hinchada*, paralizada.—**Tartamudez y pronunciacion tarda.*—Murmullos contínuos.—**Pérdida completa del habla.*

Garganta.—**Constriccion espasmódica de la garganta.*—*Deglucion difícil, con punzadas en la garganta, ó con presion en las glándulas submaxilares.—**Deglucion impedida*, algunas veces por sequedad de la garganta.

Apetito.—Pérdida del gusto.—*Los alimentos parecen insípidos.*—Amargor contínuo de la boca, con gusto amargo de los alimentos.—*Sed ardiente*, generalmente *con horror al agua y á todos los líquidos.*

Estómago.—Erutos con gusto ágrio.—Vómito acuoso con cólicos y diarrea.—*Vómito de mucosidades* verdosas ó de olor ágrio.—*Vómito de bilis* verde, despues de un ligero ejercicio.—°Hipo convulsivo.—Dolor de estómago, con sensacion presiva, ó que causa escozor.—*Ansiedad* excesiva *en la boca del estómago*, con dificultad de la respiracion.—(Inflamacion de estómago).

Vientre.—Vientre doloroso al tacto.—*Vientre timpanítico*, duro y tirante.—Dolor de quebrantamiento en el vientre durante el movimiento.—Dislaceraciones violentas en el vientre, como si se arrancara el ombligo.—*Calambres abdominales*, histéricos.—Hinchazon de las glándulas de la ingle.—Borborigmos y fermentacion en el vientre.—Expulsion abundante de gases.

Deposiciones y orinas.—**Constipacion.*—Tenesmo.—Deposiciones fétidas de olor cadavérico.—Diarrea con dolores y borborigmos en el vientre.—Flujo de sangre coagulada por el ano.—*Supresion de la secrecion renal.*—Emision de orinas gota á gota, con necesidad frecuente de orinar.—Emision involuntaria de orinas.—(Flujo de orinas).

Partes genitales.—Lascivia.—Impotencia.—°Polusiones sanguinolentas.—*Reglas mas abundantes*, con flujo de sangre negra en gruesas masas coaguladas.—*Metrorragias.*—Durante las reglas, fetidez, lascivia, mucha locuacidad, tirones en el vientre y en los muslos.—Despues de las reglas, sollozos y gemidos.

Pecho.—Voz alta, chillona.—Disnea.—Respiracion difícil, suspirosa.—Agitacion con sofocacion de la respira-

Digitized by

cion.—Opresion constrictiva de pecho.—Presion en el pecho, provocada por la palabra.—Sensacion como si alguna cosa se moviese dentro del pecho.

Tronco y miembros.—Dolor como de quebrantamiento en el dorso, durante el movimiento.—Traccion y dislaceracion en el dorso y en los riñones.—**Emprostótonos.*—**Movimientos convulsivos de los brazos* cuando se tienen por encima de la cabeza.—Dolor contractivo en los brazos con lancinaciones agudas en el antebrazo.—*Distorsion de las manos.—°Puños cerrados.—Calambres en las manos.—**Estremecimiento de las manos.*—Adormecimiento de los dedos.—*Estremecimiento de las piernas*, como por sacudidas, con retraccion de estas partes.—Traccion en los muslos.—Genuflexion de las piernas al andar.—**Temblor de los piés.*—Calambres contractivos en los piés.

187.—STRONTIANA CARBONICA.

STRONT.—Carbonato de estronciana.—HARTLAUB Y TRINKS.—*Hist. nat. y prep. Farmacop. homeop.—Dosis usadas:* 30.—*Duracion de accion:* Cerca de 40 dias en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTO: Camph.

COMPÁRESE CON: Merc. plat.

CLINICA.—Hasta ahora no se ha empleado este medicamento mas que contra un caso de *Gastralgia*.

SINTOMAS GENERALES.—*Dislaceraciones* en los miembros y sobre todo *en las articu aciones*, mas violentas por la tarde y por la noche en la cama.—Inmovilidad de los miembros de un solo lado como por parálisis, por la tarde.—*Demacracion excesiva.*—Temblor de los miembros.—La mayor parte de los dolores, cuyo punto de asiento es difícil determinar, parecen estar en la médula de los huesos (?).—Las afecciones aumentan insensiblemente hasta un cierto grado de intensidad, y disminuyen de la misma manera.—Predominio de los síntomas de un solo lado del cuerpo.—Mejoría al aire libre, principalmente al calor del sol, como tambien al calor en

general.—Laxitud excesiva y abatimiento por la mañana y por la tarde.

Piel.—Tension de la piel en diversas partes por la noche estando en la cama.—Erupcion de pequeños granos en diversas partes, con prurito quemante; sobre todo despues de haberse rascado.

Sueño.—Sueño tardo.—Estremecimiento en el cuerpo y sobresaltos al quererse dormir.—*Desvelo frecuente por la noche*, sobre todo á causa de una tos seca.—Sueño con afluencia de ensueños fantásticos.

Fiebre.—Calofrios por la mañana y por la tarde.—Calor que procede de la nariz y de la boca con sed.—Calor seco por la noche.—*Sudor abundante por la noche*, y en descubriendo un miembro, dolor inmediato á esta parte.—Sudor en las partes afectas.

Moral.—Inquietud y angustia.—Humor apesadumbrado, con predisposicion á encolerizarse.—Olvido excesivo.

Cabeza.—Cefalalgia con náuseas y vértigo.—Presion penosa en la frente.—*Cefalalgia tensiva*, como si la piel estuviese tirada hácia el vértice, ó como si todo se estuviera empujando hácia afuera.—*Cefalalgia lancinante.*—Sonoridad en las sienes por la tarde.—Sensacion de calor ardiente en la cabeza y en la cara, despues de medio dia, andando, con rubicundez de la cara, angustia y sueño.

Ojos.—Sensacion de ardor en los ojos.—Presion en la parte superior del globo del ojo.—Fuerte estremecimiento y conmocion de los párpados.—Se ven círculos rojos y azules despues de haber frotado los ojos, con presion como por arena.—Se ven chispas.—Se ven manchas verdes en la oscuridad.

Oidos, nariz y cara.—Dislaceracion en los oidos.—Zumbido sordo en los oidos.—Estremecimiento de un solo lado de la nariz.—Salida entre el moco, de costras sanguinolentas sonándose.—Rubicundez de la cara con calor quemante.—Prurito en la cara.—Estremecimiento, dislaceracion y *terebracion en los pómulos.*

Dientes.—Odontalgia con dolor que causa estremecimiento.—Dislaceracion en la raiz de los dientes.—Dolor como si arrancaran los dientes, precedido de una acumulacion abundante de saliva.—Encías hinchadas, dolorosas al tacto.

Digitized by Google

Boca y garganta.—*Sensacion de entorpecimiento* y sequedad *en la boca* por la mañana sin falta de saliva.—Aspereza y sequedad en la garganta.—Inflamacion del paladar con dolor durante la deglucion.

Apetito.—Sabor de tierra en la boca.—Mucha sed, sobre todo de cerveza.—Deseo, solamente por el pan moreno.—Hambre despues de comer.

Estómago.—Náuseas con calor quemante de la cara.—Hipo violento.—*Presion en el estómago con sensacion de plenitud en el vientre, sobre todo despues de la comida.

Vientre.—Vientre tirante y dolorosamente timpanizado.—Cólicos en la region umbilical.—*Retortijones con diarrea* y calofrio.—Punzadas en los lados del vientre.—Ruido sordo en el vientre con expulsion abundante de gases fétidos.

Deposiciones.—*Deposiciones tardas, duras, nudosas*, que se evacuan solamente á costa de esfuerzos y de grandes dolores.—*Diarrea* de una agua amarilla con retortijones y pellizcos en el vientre.—Sensacion quemante en el ano durante y despues de la defecacion.—Dolores de los granos hemorroidales del recto.

Orinas.—Reglas.—Secrecion de orina disminuida.—Secrecion mas abundante de orina de un color amarillo oscuro.—Emision de orina por la noche.—*Orina pálida* con olor fuerte amoniacal.—Reglas retrasadas, al principio serosas, despues en coágulos.

Pecho.—Ronquera y aspereza en la garganta que excita la tos.—Tos seca provocada por una irritacion en la tráquearteria, agravada por la noche.—Disnea cuando se anda, con ardor en la cara.—Presion en el pecho.—Dolores tractivos en los músculos del pecho.—Palpitaciones de corazon.

Tronco y miembros.—Dolor de quebrantamiento en los riñones y en el dorso.—Dolor tractivo en el dorso y en la region lumbar.—Dislaceracion en los brazos, las manos y los dedos, sobre todo en las articulaciones.—Torpeza casi paralítica en los antebrazos y las manos.—Traccion paralítica en las piernas.—Estremecimiento en las piernas.—Estremecimiento y dislaceraciones en las piernas, los piés y los dedos, sobre todo en las articulaciones.—Hinchazon de los piés.

Digitized by

188.—SULFUR.

SULF.—Azufre.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmacop. hom op.—*Dósis usadas:* 0, 30.—*Duracion de accion:* 35 á 40 dias, y mucho mas tiempo (en las enfermedades crónicas).

ANTÍDOTOS: Acon. camph. cham. chin. merc. n-vom. puls. sep.—*Se emplea como antídoto de:* Chin. iod. merc. nitr.-ac. rhus. sep.

COMPÁRESE CON: Acon. amm. ant. *ars.* bar. *bell.* bry. *calc.* canth. caps. caus. *cham. chin. coff.* con. *cupr.* dulc. graph. ign. *iod.* ipec. lach. *lyc.* magn. magn-m. *merc.* natr. natr-m. *nitr-ac. n-vom.* phos-ac. *puls. rhus. sass.* seneg. *sep. sil.* sulf-ac. veratr.—Cuando el azufre es eficaz, si se halla indicado, será sobre todo despues de: *Acon. ars. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls.* rhus.—Despues del azufre conviene algunas veces: *Acon. bell. calc. cupr. merc. nitr-ac. n-vom. puls. rhus. sep. sil.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que debe ser consultado este medicamento contra:—Afecciones principalmente de las personas de una *constitucion linfática*, *dispuestas á erupciones*, *herpes*, *obstrucciones glandulares*, etc., etc., ó bien de constitucion *biliosa* con *disposicion á hemorróides*, *á la hipocondria*, *y á la melancolía*, ó bien de constitucion débil y leucoflegmática ó deteriorada, con *color del rostro enfermizo*, *disposicion á blenorragias y resfriados*, *sudores fáciles y abundantes*, *catarros* y diarreas con cólicos; *Padecimientos por el abuso del vino*, *del mercurio y de otros venenos minerales*; *Padecimientos á consecuencia de un enfriamiento al viento* (corriente de aire) ó *en el agua*; Padecimientos periódicos é intermitentes; Artritis y reumatismos agudos y crónicos, con ó sin hinchazon; Artritis vaga; Artrocace; Hidrartros; *Reumatismo articular*; *Inflamaciones locales crónicas*; Accesos de espasmo y de convulsiones, aun durante la denticion; *Epilepsia*; *Debilidad nerviosa á consecuencia del onanismo y otras pérdidas debilitantes*, *como tambien por el exceso de estudio y vigilias prolongadas*; Debilidad muscular, vacila al andar, el cuerpo está encorvado, ó dificultad (en los niños) para aprender á andar; Temblor de los miembros aun en los borrachos; Parálisis, principalmente por debilidad; *Atrofia de los niños escrofulosos* y de las personas deterioradas; Afecciones á consecuencia de una luxacion de los riñones ú otras lesiones mecánicas; Ictericia; *Clorosis*; Caquexia por

Digitized by

abuso de la quina; *Afecciones hidrópicas*; Supuraciones: *Inflamacion, infarto y supuracion de las glándulas y otros padecimientos escrofulosos y raquíticos*; Hinchazon, inflamacion y otras enfermedades de los huesos; *Herpes miliares y costrosos*; *Erupciones crónicas*; Erupciones despues de la vacunacion; *Sarna y consecuencias de esta afeccion, ó herpes repercutidos*; Manchas hepáticas; Sugilaciones y otros padecimientos á consecuencia de una contusion; *Manchas de nacimiento*; Aneurismas; Verrugas; Sabañones; *Sarampion* y afecciones á consecuencia de esta enfermedad; Escarlatina (maligna) y afecciones procedentes de la repercusion de esta erupcion; Viruela (período de erupcion); *Inflamaciones erisipelatosas*; *Excoriaciones*; *Ragades; Ulceras* (aun las que son producidas por abuso del mercurio); *Ulceras fistulosas*; Tumores enquistados; *Abscesos*; *Somnambulismo nocturno*; Fiebres inflamatorias con afecciones gástricas y nerviosas; Fiebres tifoídeas; Fiebres intermitentes; Fiebres hécticas; Melancolía; Exaltacion religiosa y filosófica; Manía; Fatiga de la cabeza y aun enajenacion mental por exceso en el estudio; Hipocondría; Histeria; Imbecilidad; Congestion cerebral; Cefalalgias reumáticas, catarrales, nerviosas, etc.; Jaqueca; Cefalalgia de los obreros en metales; Encefalitis? *Tiña*; *Caida de los cabellos* aun despues de graves enfermedades agudas, en las recien paridas, á consecuencia de frecuentes jaquecas, etc.; *Oftalmias escrofulosas, traumáticas*, catarrales, etc.; Oscurecimiento y úlceras de la córnea; *Blefaroftalmia*; Ambliopia amaurótica; Miopia; Presbiopia; Catarata; Dureza de oido; Otorrea purulenta; Inflamacion flegmonosa de la nariz; *Coriza seca ó fluente, aguda ó crónica*; Hemorragia nasal; Erisipela de la cara; Costra láctea y otros herpes faciales; Efélides?; Cáncer de los labios?; Inflamacion de las encías; Odontalgias reumáticas ó congestivas; Denticion difícil con disposicion á las convulsiones; *Aftas en la boca*; Salivacion por el abuso del mercurio; Anginas catarrales crónicas; Padecimientos gástricos; Dispepsia con *acedías*, vómito de los alimentos y *pirosis*; Blenorrea gástrica; *Anorexia tenaz*; *Gastralgias*; *Propension á la embriaguez*; Afecciones hepáticas crónicas; Hinchazon é induracion del hígado; Ictericia; Tabes mesentérica; *Cólicos gaseosos, espasmódicos y hemorroidales*; *Ascitis*; Enteritis?; Peritonitis?; Hernias que salen fácilmente; *Hernias estranguladas* (despues del uso

Digitized by Google

del acónito); *Bubones escrofulosos y mercuriales*; *Estreñimiento tenaz ó disposicion á la diarrea*; Diarreas mucosas; Disenterías; Lienterías?; Prolapsus del recto; Afecciones verminosas; *Hemorróides ciegas ó que sangran*; Malas consecuencias de la supresion del flujo hemorroidal; Iscuria; Disuria, Diabetes?; Hematuria?; Incontinencia de orina en los niños (se orinan en la cama); Uretritis?; Gonorrea secundaria; Blenorrea de la vejiga?; Fístula urinaria; Estrechez de la uretra?; Inflamacion y fímosis del prepucio; Gonorrea bastarda; Induracion de los testículos?; Hidrocele?; Impotencia; Debilidad de las partes genitales á consecuencia del onanismo; *Menostasia*; *Dismenorrea*; Cólicos menstruales; Metrorragia?; Esterilidad?; Aborto? *Leucorreas*; Clorósis; Excoriacion, inflamacion y ulceracion de los pechos; Induracion (y cáncer?) de los pechos; Excoriacion, estreñimiento, *aftas* y oftalmías de los recien nacidos; *Catarro pulmonar con ronquera*, aun á consecuencia del sarampion; Catarros inveterados; Blenorrea de los pulmones en los viejos; Grippe; Afonía; Tos catarral, espasmódica, nerviosa, etc.; Coqueluche?; *Hemoptisis*; *Padecimientos asmáticos*; *Neumonía crónica*; *Tisis*; *Dolor de pecho á consecuencia de esfuerzos ó de una derrengadura*, Afecciones del corazon; Afecciones de los riñones; Desviacion raquítica de la columna vertebral; *Temblor de las manos*, aun en los borrachos; Ragades en las manos; *Panadizos*; Coxartrocacia?; Coxalgia; Luxacion espontánea; *Gonitis artrítica ó reumática*; Tumor blanco?; Gota en las manos y en los piés; Ulceras en las piernas; Ulceracion erisipelatosa de los piés, ó de las piernas, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—Dolores vivos ó tractivos *ó *punzadas en los miembros*, principalmente en las articulaciones, y algunas veces con falta de fuerza, rigidez y sensacion de torpeza en las partes afectas.—*Dolores de luxacion, tension como por acortamiento de los tendones, calambres y contraccion en muchas partes.—*Crujido en las articulaciones, principalmente del codo y de las rodillas.—*Hinchazon inflamatoria en las articulaciones*, con calor y rubicundez.—*Hormigueo en los miembros,

Digitized

principalmente en las pantorrillas y en los brazos.—*Disposicion de los miembros á adormecerse fácilmente.—*Palpitaciones musculares. —*Estremecimientos y sacudidas en ciertas partes, ó en todo el cuerpo, principalmente estando sentado ó acostado.—**Accesos de espasmos.—**Convulsiones epilépticas*, provocadas por un susto, ó cuando se corre, y algunas veces con gritos, *rigidez de los miembros*, apretamiento de los dientes y sensacion como si un raton corriese por los brazos, ó por el dorso. —**Accesos de desvanecimiento*, ó de malestar histérico, ó hipocondríaco, algunas veces con vértigos, vómitos y sudor.—*Temblor en los miembros principalmente de las manos. Sensacion de temblor en lo interior del cuerpo.—Accesos *de inquietud en todo el cuerpo*, que no permiten estar sentado, con necesidad de extenderse y de contraer alternativamente los miembros.—*Fuerte ebullicion de sangre*, algunas veces con calor ardiente en las manos.—*Postracion excesiva*, con **mucha fatiga*, *despues de la menor conversacion*, y del paseo mas corto, necesidad de estar siempre sentado, y *sudores abundantes*, aun estando en dicha posicion, ó cuando se lee, se come ó estando acostado y en paseando.—La sensacion de fatiga se disipa algunas veces por la marcha. —Debilidad muscular principalmente en las rodillas y en los brazos, como tambien en las piernas con marcha poco segura.—**Anda encorvado.—Enflaquecimiento extraordinario*, algunas veces con debilidad, fatiga y sensacion de ardor en las manos y en los piés.—**Mucha sensibilidad al aire libre y al viento*, con dolores en los miembros al cambio de tiempo, disposicion á resfriarse fácilmente, y muchos de los padecimientos son producidos por el aire libre.—Las afecciones de la cabeza y del estómago son principalmente las que se agravan al aire libre.—La mayor parte de los padecimientos *aparecen ó se agravan por la noche*, ó por la tarde, así como tambien con el reposo, *estando en pié* y exponiéndose *al frio*; desaparecen andando y moviendo la parte enferma, y tambien con el calor de la habitacion; pero *el calor de la cama hace insoportables los dolores nocturnos* —*Muchos padecimientos aparecen periódicamente, ó por intermitencia.

Piel.—**Prurito en la piel*, aun de todo el cuerpo, mas violento *por la noche* ó por la mañana *en la cama* y frecuen-

Digitized by Google

temente con dolor de excoriacion, calor, comezon y hemorragia de la parte que se rasca.—*Erupciones como las que siguen algunas veces á la vacuna.—**Erupciones y dartros costrosos* de color amarillo verdoso, que proceden de pequeñas flíctenas pruritosas, con aureola roja.—°Manchas herpéticas rojas, irregulares, furfuráceas ó cubiertas de pequeñas flíctenas que exhalan una linfa serosa.—**Erupciones sarnosas.*—**Erupciones miliares*, principalmente en las extremidades.—*Urticaria.—**Prurito quemante en las erupciones.*—*Manchas hepáticas de color amarillo ó pardusco.—°*Inflamaciones erisipelatosas* con dolores pulsativos y lancinantes.—°Sugilacion, aun por la mas ligera contusion.—°Rubicundez viva escarlata por todo el cuerpo.—**Sabañones* rojos hinchados y ulcerados, con prurito al calor de la habitacion.—*Verrugas callosas, principalmente alrededor de los dedos.—*La piel se esquebraja fácilmente, sobre todo al aire libre; grietas con dolor de excoriacion.—*Descamacion y *excoriacion de la piel* en muchos sitios.—Piel enfermiza; las menores lesiones se inflaman y se ulceran.—**Ulceras con bordes elevados, granos pruritosos alrededor, los cuales dan sangre fácilmente* y segregan un pus fétido y sanioso, ó amarillo y espeso, con aureola roja ó azulada, dolores vivos, lancinantes y tensivos.—*Carnes y vegetaciones en las úlceras.—Ulceras fistulosas.—Forúnculos.—Tumores enquistados; ó °tumores pálidos, tirantes y calientes; abscesos inflamatorios.—**Inflamacion, hinchazon é induracion*, ó *supuracion de las glándulas.*—°Nudosidades en la piel de todo el cuerpo por hinchazon de las glándulas subcutáneas, principalmente en los pechos.—°Inflamacion, hinchazon y sensibilidad dolorosa de los huesos.—*Repugnancia á lavarse.

Sueño.—**Gana de dormir insoportable*, principalmente *despues de medio dia y al anochecer*, á la luz artificial.—*Bostezos frecuentes.—*Sueño nocturno tardo*, *ó *insomnio*, algunas veces á causa de una excesiva afluencia de ideas, ó como por sobreexcitacion.—**Sueño muy ligero*, ó agitado con *desvelo frecuente*, y generalmente *con sobresalto y espanto.*—Despierta muy temprano y no puede volverse á dormir.—**Sueño por la mañana muy prolongado*, algunas veces profundo y comatoso, *con dificultad de levantarse por la mañana.—**Sueño que no satisface.—**Por la no-*

che dolores, *inquietud y hormigueo en los miembros*, *ansiedad y calor*, *cólicos*, ¯*gastralgia*, vértigos, cefalalgia, visiones é ilusiones de los sentidos, palpitaciones de corazon, *padecimientos asmáticos*, *sed y hambre.—Imposibilidad de dormir no siendo acostado sobre el dorso con la cabeza alta.—*En durmiendo*, *agitacion y ansiedad*, *sacudidas en el cuerpo y estremecimiento de los miembros*, *sobresaltos y espanto*, *palabras*, *gritos*, murmullos, divagaciones, delirios, lamentos y gemidos, ronquido, ojos medio abiertos, *decúbito dorsal*, con los brazos por encima de la cabeza, pesadilla y sonambulismo.—**Al despertarse ilusiones de los sentidos*, ¯visiones espantosas y miedo de espectros.—**Ensueños frecuentes*, *fantásticos*, *angustiosos*, *espantosos y horribles*, molestos, desagradables y agitados; ensueños de incendios, de perros mordedores, de preciosos vestidos que se poseen, de peligros que se corren, de caidas, de muertes; ensueños con presentimientos de lo que sucederá al dia siguiente.

Fiebre.—**Despeluzamiento*, ¯frio, calofrio y horripilacion, principalmente *por la tarde ó por la noche* en la cama, como igualmente *despues de medio dia* y paseándose al aire libre.—Calofrios parciales, principalmente *en el dorso*, en el pecho, en los brazos; *frio en las manos, en los piés y en la nariz.—Durante los calofrios, palidez ó calor á la cara, cefalalgia, y algunas veces calor pasajero.—*Accesos frecuentes de calor fugaz.—**Calor*, principalmente *por la noche*, por la *mañana* ó por *la tarde*, como tambien despues de medio dia, y frecuentemente *con rubicundez* (circunscrita) *de las mejillas*, *sed ardiente*, sensacion de ardor en las manos y piés, ¯calofrios parciales, *sudores tambien parciales, principalmente en la cabeza, en la cara y en las manos; *fatiga y cansancio sumo en los miembros*, ronquera y tos, ansiedad, etc.—*Accesos febriles, así antes como despues de medio dia, ó al caer la tarde, que consiste en calor precedido de calofrios y seguido ó mezclado de sudores, ó bien en *calor de la cara* seguido de calofrios.—*Durante *la fiebre palpitaciones de corazon*, delirio, debilidad, obturacion y costras en la nariz, mucha sed, aun antes de los calofrios.—*Pulso duro, acelerado y lleno.—**Sudores frecuentes y abundantes dia y noche*, por la tarde y por la mañana en la cama; **suda fácilmente cuando trabaja*; *sudores parciales*, princi-

Digitized by Google

palmente *en la cabeza*, en la nuca y en las manos, etc.; *sudores ácidos.

Moral.—**Melancolía y tristeza*, con ideas tristes, inquietud sobre su suerte y sobre sus negocios, hasta el punto de creerse sumamente desgraciado, disgustarse de la vida, y desesperar de la salvacion eterna.—**Excesiva disposicion á llorar*, y llantos frecuentes, alternando algunas veces con risas involuntarias.—*Humor inconsolable y escrúpulos de conciencia, aun por los actos mas inocentes.—**Accesos de angustia*, principalmente por la tarde, *carácter perezoso y *mucha disposicion á asustarse*. —Precipitacion, inquietud é impaciencia.—*Mal humor, morosidad, humor querelloso, deseo de criticar, y aversion á la conversacion.—°*Irritabilidad*, humor colérico, *disposicion á enfadarse* y á encolerizarse.—Mucha pereza y repugnancia á todo trabajo de cuerpo y espíritu.—*Indecision*, torpeza en todo cuanto se dice ó hace, inadvertencia, antropofobia y estado de aturdimiento.—Estupidez é imbecilidad, con dificultad de comprender y de responder con exactitud y prontitud.—**Mucha debilidad de memoria*, principalmente de los nombres propios.—Se olvida hasta de lo que iba á decir.—*Excesiva afluencia de ideas*, por lo regular tristes y penosas; pero algunas veces tambien alegres y mezcladas con recuerdos de aires de música.—**Excesiva propension á desvarios religiosos y filosóficos*, *con ideas fijas.—Divagaciones.—Manía con idea fija de tener todo con abundancia y muchas cosas de valor, etc.—*Delirios con carfologia.—Errores sobre los objetos; se toma un sombrero por un gorro, un vestido estropeado por un rico traje, etc.

Cabeza.—**Atontamiento de cabeza con dificultad para meditar*, ó debilidad y **aturdimiento*, y estupor, algunas veces con necesidad de acostarse y principalmente *por la mañana* ó *por la tarde*, ó paseándose al aire libre, ó subiendo una escalera.—**Vértigos y vacilacion*, principalmente *estando sentado*, ó despues de la comida, ó paseándose al aire libre, en bajando la cabeza ó andando, *ó subiendo una escalera*, levantándose del asiento, estando acostado sobre la espalda, pasando sobre una corriente de agua, como tambien por la mañana, por la tarde, ó por la noche, y frecuentemente con *náuseas*, desvanecimiento, debilidad y epistaxis, cefalalgia como si existie-

ran gases en la cabeza, por un romadizo, ó como á consecuencia de una vigilia prolongada.—*Sensibilidad dolorosa de la cabeza, y principalmente del vértice al menor movimiento, con dolor á cada paso, igualmente cuando se tose, se suenan las narices ó se mastica.—**Plenitud, presion y pesadez en la cabeza*, principalmente en la *frente*, ó en el occipucio.—Tension y contraccion dolorosa en el cerebro, algunas veces con sensacion como si la cabeza estuviese comprimida con una venda.—*Presion expansiva, como si la cabeza fuera á abrirse, *principalmente en las sienes.—*Dolores vivos* y con estremecimiento, ó **tirantez* y *punzadas en la cabeza.*—Sensacion dolorosa como si el cerebro estuviese herido ó contundido.—Al mover la cabeza el cerebro parece chocar contra el cráneo.—**Congestion de sangre á la cabeza, con dolores pulsativos y ruido como de cloqueo y calor en el cerebro.* —*Hormigueo, *zumbido sordo y ruido* oscilatorio en la cabeza.—*Los dolores de cabeza son *semilaterales*, ú ocupan el vértice, el occipucio, *ó la frente por encima de los ojos*, con *necesidad de fruncir las cejas*, ó de cerrar los ojos, turbacion de la vista, **inaptitud para la meditacion*, zumbido de oidos y *náuseas* con conato al vómito.—**Dolores de cabeza cotidianos*, periódicos é intermitentes, que aparecen principalmente *por la noche ó al principio de esta en la cama, ó por la mañana*, ó despues de la comida.—*El movimiento, la marcha, *el aire libre y la meditacion* provocan ó agravan frecuentemente los dolores de cabeza.—Prurito y granos en la cabeza, principalmente en la frente.—°*Costras en la piel del cráneo secas ó densas, amarillentas*, con secrecion de un pus espeso y fétido; pero siempre *con mucho prurito.*—**Frio en la cabeza*, algunas veces solamente en sitios circunscritos.—Sensibilidad dolorosa *en la raiz de los cabellos y de la piel del cráneo al tacto.*—Movilidad de la piel del cráneo.—**Alopecia.*—°Está inclinada la cabeza cuando se anda.—Prurito en la cabeza, con impaciencia.

Ojos.—Pesadez y *presion en los ojos y en los párpados*, con sensacion de una frotacion como por arena.—*Prurito*, **comezon y sensacion de ardor en los ojos, en los ángulos y en los párpados.*—Dolores de contusion, ó como en las úlceras, y escozor en los ojos y en los párpados.—**Los dolores de los ojos responden frecuentemente hasta dentro de*

la cabeza, y se agravan moviendo los ojos, así como por la *luz del sol*, que los aumenta algunas veces hasta hacerlos insoportables.—**Inflamacion*, *rubicundez é hinchazon de la esclerótica*, *de la conjuntiva y de los párpados*.—*Ulceracion de los bordes de los parpados.—*Pústulas y úlceras alrededor de las órbitas hasta las mejillas*.—Rubicundez inflamatoria del iris.—**Córnea empañada*, como cubierta de polvo, °ú oscurecida, con depósito de una linfa gris entre las láminas.—°Manchas, *vesículas y °úlceras en la córnea.—Inyeccion de los vasos de la conjuntiva.—Pupila desigual, ó dilatada é inmóvil.—°Oscurecimiento del cristalino.—Nudosidad en el párpado á manera de orzuelo.—**Lagrimeo abundante*, ¯sobre todo al aire libre, *ó mucha sequedad de los ojos*, principalmente en la habitacion.—Lágrimas acetosas.—*Secrecion abundante de mucosidades de los ojos dia y noche.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—*Palpitacion y temblor de los párpados*.—*Contraccion matutina de los párpados.—Temblor de los ojos.—**La vista se pone turbia*, como por una niebla, ó como si los ojos estuvieran cubiertos de pelusa, ó hubiera *un velo delante de ellos*.—**Presbiopia*.—°*Miopia*.—Oscurecimiento de la vista cuando se lee.—Deslumbramiento por la luz del sol.—Se ven chispas y manchas blancas, ó moscas que revolotean, puntos y manchas negras.—Color amarillo de los objetos.—**Excesiva sensibilidad de los ojos á la luz*, principalmente *la del sol*, y durante un tiempo cálido y sofocante.—°Color amarillo de la esclerótica.

Oidos.—*Prurito en los oidos*.—**Dolores vivos ó tractivos*, ó *punzadas en los oidos*, algunas veces hasta en la cabeza y la garganta.—Calor quemante, que parece salir de los oidos.—Ruido como de agua en los oidos, como si la hubiera dentro.—*Otorrea*.—Forúnculos en el trago.—Sensibilidad excesiva del oido: el menor ruido se hace insoportable, y cuando se toca el piano, llega á veces á provocar náuseas.—**Dureza de oido*, principalmente *para la voz humana*.—**Obturacion* y *sensacion de oclusion del oido de un solo lado*, y frecuentemente al comer ó al sonarse.—Retintin, **zumbido*, *ruido confuso en los oidos*, ¯algunas veces con congestion de sangre á la cabeza.—Estallido en los oidos como si una vejiga llena de agua se rompiese.—°Excoriacion detrás de las orejas.

Digitized by

Nariz.— Terebracion en la raiz de la nariz.— Sensacion de ardor en las ventanillas nasales.—**Hinchazon inflamatoria en la nariz*, principalmente en la punta, ¯ó en las alas.—*Inflamacion, ulceracion y costras en las ventanillas de la nariz.*—Chasquido en la nariz, como si estallase una vejiga llena de agua.— Efélides y puntos negros en la nariz.—**Obturacion de la nariz*, algunas veces de un solo lado.—**Mucha sequedad en la nariz.*—**Coriza seca, ó* **fluente con secrecion abundante de mucosidades.*— Flujo de mucosidades quemantes, ó **secrecion de un moco espeso, amari lento* y puriforme por las narices.— **Mucosidades sanguinolentas al sonarse.*—**Epistaxis*, ¯principalmente *por la mañana*, y algunas veces con vértigos.— Estornudo frecuente, aun espasmódico, y precedido algunas veces de náuseas.—Olfato exaltado ó disminuido, y aun enteramente perdido.—Olor de un antiguo coriza, como á cuerno quemado ó á humo de tabaco.

Cara.— **Rostro pálido* ó amarillento con *tinte enfermizo* y ¯ojos hundidos y ojeras azuladas.—**Calor y sensacion de ardor en la cara, con rubicundez oscura de toda ella, ó rubicundez circunscrita de las mejillas*, ó bien *manchas rojas*, aun en el cuello.—*Abotagamiento pálido ó rojo de la cara.—Tumefaccion de las mejillas con dolor lancinante.—Tirantez, dolor vivo, sensacion de contusion, *presion y sensacion de ardor en los pómulos.*—°Erisipela flegmonosa en la cara, principalmente en los párpados, en la nariz y en la oreja (izquierda).— Dureza y rubicundez en la piel de la cara.—**Erupciones granosas en la cara* y en la frente.—°Herpe pruritoso y húmedo en la cara, principalmente por encima de la nariz alrededor de los ojos y en los párpados; pequeñas vesículas blancas, en grupos formando costras.— *Efélides y poros negros en la cara, principalmente en la nariz, en los labios y en la barba.— Labios secos, ásperos y agrietados.— Sensacion *de ardor y calor continuo en los labios.*—°Manchas hepáticas en el labio superior.—Temblor y estremecimiento en los labios.—**Tumefaccion de los labios.*—Ulcera costrosa en la parte roja del labio.—Erupcion herpética en las comisuras de la boca.—Erupcion dolorosa alrededor de la barba.—Dolores vivos, lancinantes y tractivos, é **hinchazon dolorosa en las mandibulas.*—*Hinchazon*

Digitized by Google

de las glándulas submaxilares, con dolores al tacto y punzadas.

Dientes.—Excesiva sensibilidad en los dientes.—Estremecimiento, sacudidas, **dolores vivos y tractivos*, *¯punzadas*, **dolores pulsativos*, ¯terebracion y sensacion de ardor, *así *en los dientes cariados*, ¯como en los sanos.—*Los dolores de dientes se extienden frecuentemente hasta los oidos ó hasta la cabeza, y van acompañados algunas veces de congestion de sangre á la cabeza con calofrios y propension al sueño, ó de hinchazon de la mejilla.—*Aparicion ó agravacion de las odontalgias, *principalmente por la tarde*, *¯por la noche* ó *al aire libre*, como tambien por una corriente de aire, *por el agua fria*, por la masticacion, *y algunas veces tambien tomando alguna cosa caliente.—Mucosidades parduscas en los dientes.—*Vacilacion dolorosa, ¯prolongacion, dentera y disposicion de las encías á la hemorragia.—Sensacion de desprendimiento, é *hinchazon de las encias*, con disposicion á la hemorragia, algunas veces con *dolores pulsativos*.—°Tumor duro, en las encías, con flujo de pus y de sangre, de forma redonda.

Boca.—Sequedad, calor y sensacion de ardor en la boca, algunas veces por la mañana, con lengua húmeda.—*Acumulacion de saliva en la boca*; *saliva sanguinolenta*, ó *salada*, ó ácida, ó amarga.—*Olor fétido* de la boca, algunas veces ácido, principalmente *por la mañana*, ó por la tarde, ó *despues de la comida*.—Vesículas, ampollas y **aftas en la boca* y *en la lengua*, ¯algunas veces con sensacion de ardor ó con dolor de excoriacion al comer.—Exfoliacion de la piel de la boca.—Sensacion quemante y comezon en la lengua.—*Lengua seca, áspera y esquebrajada, °de color rojo de cinabrio; ó *cubierta de una costra blanca*, ó de mucosidades parduscas, espesas y viscosas.—Balbucea cuando habla.—Acumulacion de mucosidades de un gusto salado en la boca.

Garganta.—Arañamiento, aspereza y *sequedad en la garganta*.—**Presion como por un tapon*, ó *un tumor en la garganta*, algunas veces con dificultad de tragar.—Sensacion en la garganta, como si ascendiese una bola.—*Contraccion y *sensacion dolorosa de constriccion en la garganta* al deglutir.—Dolor de excoriacion, sensacion de ardor y *punzadas en la garganta*, principalmente al de-

Digitized by Google

glutir en seco, como si se tragase un trozo de carne.—Sensacion como si hubiese un cabello en la garganta, con gusto empireumático.—Ligera inflamacion en la garganta con hinchazon de las glándulas del cuello.

Apetito.—**Mal sabor de boca*, lo mas frecuentemente *ácido*, amargo, ó *pútrido y dulce*, ó soso, principalmente *por la mañana*, al despertarse.—*Gusto amargo ó muy salado, ó insípido de los alimentos.—*Anorexia completa y *disgusto de los alimentos*, principalmente *de la carne* y *del pan de centeno*, ¯de la grasa y de la leche.—**Repugnancia á las cosas azucaradas y ácidas*, ó excesivo deseo de estas cosas, con falta de apetito.—*Sed contínua aun por la noche, frecuentemente con deseo de beber cerveza.—°Deseo (en los borrachos) de beber vino.—**Apetito excesivo y accesos de bulimia*, algunas veces con cefalalgia, laxitud y necesidad de acostarse.—Mucha debilidad para hacer la digestion, principalmente de la carne, la grasa, *la leche*, *los ácidos* y los harinosos, alimentos que á veces ocasionan muchas incomodidades.—°Los alimentos azucarados agravan los dolores del estómago y del vientre.—La leche produce ertutos ágrios, ó un gusto ácido en la boca, y aun vómitos.—La cerveza deja por mucho tiempo sabor y produce excitacion en la sangre.—**Despues de la comida*, *opresion de pecho*, *náuseas*, *presion y calambres en el estómago*, *cólicos*, *timpanitis* y flatuosidades, *vómitos*, *mucha fatiga*, *despeluzamiento*, peso y dolor de cabeza, calor en la cara, sensacion de ardor en las manos, secrecion abundante de agua por la boca y otros muchos padecimientos.

Estómago.—**Erutos continuos*, principalmente *en vacío*, ó con gusto á los alimentos, ó **ácidos* y quemantes, ó *amargos*, ó fétidos; ¯con sabor á huevos podridos, *principalmente *despues de la comida*, ó por la noche.—*Erutos abortados.—**Regurgitacion de los alimentos y de las bebidas*, frecuentemente con sabor ácido.—**Pirosis*, ¯frecuentemente con sensacion de ardor y hormigueo en el pecho.—°Hipo.—**Náuseas*, ¯algunas veces hasta el desfallecimiento, con temblor, debilidad y regurgitaciones frecuentes, principalmente **despues de la comida*, ¯*por la mañana*, por la noche, ó °yendo en carruaje.—*Secrecion de agua como pituitas, principalmente *por la mañana*, *ó despues de la comida*, °algunas ve-

Digitized

ces con presion como si escarbaran en el vientre.—*Vomituricion y *vómitos*, tanto *de los alimentos*, como *de materias ácidas* ó amargas. ¯ó negruzcas, *ó sanguinolentas, etc., ¯principalmente por la mañana, por la tarde, **despues de la comida*, ¯ó por la noche y algunas veces con náuseas, dolores de estómago y sudor frio en la cara.—Pesadez y plenitud, *opresion y compresion, ó bien dolores contractivos y calambroideos*, ó *como si escarbaran* y ¯punzadas en el estómago y en la region precordial, *principalmente *despues de la comida, por la noche*, ¯ó por la mañana, *frecuentemente con náuseas y vómitos, ansiedad y timpanitis.—Sensacion de frio ó de calor, y sensacion *quemante en el estómago.*—Excesiva sensibilidad en la region del estómago al tacto.—Hinchazon en la region precordial.—Pulsacion en la boca del estómago.—Hinchazon de la region epigástrica.

Vientre. —Sensibilidad dolorosa de los hipocondrios, como si hubiese una úlcera interior.—Tirantez, presion, tension y *punzadas en la region del higado y del bazo*, **hinchazon y dureza en la region del higado*, °y del bazo.—Plenitud, **pesadez*, tension y *presion como por una piedra en el vientre,* y principalmente *en el epigastrio* y en los hipocondrios.—Abultamiento y dureza en el vientre.—Retortijones, ó *sensacion de dislaceracion, ó *dolores contractivos y calambroideos en el vientre.*—**Punzadas en el vientre*, principalmente *en su costado izquierdo*, *al andar* ó respirando profundamente.—°Los dolores de vientre afectan con preferencia *el costado izquierdo*, ó se extienden hasta el estómago, pecho y dorso, con opresion de la respiracion, náuseas, ansiedad y humor hipocondríaco.—**Dolores en el vientre, principalmente por la noche ó despues de haber bebido ó comido*, °ó bien periódicos; agravacion por los alimentos sacarinos; **se alivia manteniéndose encorvado.*—Movimiento y como si escarbaran en el vientre, ó sensacion como si alguna cosa impeliese hácia afuera.—Dolores contusivos en los tegumentos del vientre.—*Sensibilidad dolorosa del vientre al tacto, como si el interior estuviese en carne viva, ó hubiese una herida considerable.—*Timpanitis con *dolores presivos por retencion de gases*, principalmente en el costado izquierdo.—**Borborigmos y ruido sordo en el vientre.* —Salida frecuente de gases de un olor muy fétido.—

Digitized by Google

*Hinchazon dolorosa y aun supuracion de las glándulas inguinales.—*Salida violenta de las hernias*, °con encarcelacion.

Deposiciones.—*Estreñimiento y deposiciones duras*, ¯*nudosas é insuficientes.*—**Conato frecuente, y generalmente inútil, de deponer*, principalmente *por la noche*, y algunas veces con presion en el recto y en la vejiga, y dolor en el ano.—Conato urgente de deponer.—**Diarrea con evacuaciones frecuentes*, comunmente *por la noche*, y por lo regular *con cólicos y tenesmo*, ¯timpanitis, disnea, despeluzamiento y debilidad hasta el punto de caer en desvanecimiento.—**Evacuaciones mucosas* ó acuosas, ó espumosas ó ácidas, ¯ó de olor pútrido, ó de materias no digeridas.—**Deposiciones blanquecinas verdosas*, descoloridas ó de un rojo pardusco.—**Deposiciones involuntarias.* —*Deposiciones con *mucosidades*, *sangre*, °y materias purulentas.—Salida de mucosidades, aun con las deposiciones duras.—Salida de lombrices, de ascárides y aun de trozos del ténia por el recto.—**Prolapsus del recto*, principalmente durante las deposiciones.—Dolores vivos y presivos, *prurito*, *punzadas y sensacion de ardor en el ano y en el recto*, aun fuera del tiempo de las deposiciones.—**Hemorróides* que resudan y sangran.—Excoriacion é hinchazon del ano.

Orinas.—°Orinas suprimidas ó muy raras.—**Gana de orinar frecuente*, y algunas veces muy urgente.—*Orinas frecuentes*, *abundantes* y acuosas, que principian á veces á evacuarse con mucho esfuerzo, *aun por la noche.*—Emision involuntaria de orinas, principalmente al toser ó al expeler flatuosidades.—**Se orina en la cama.*— °Orinas de un encendido subido con sedimento, ¯ó bien blanquecinas, ó turbias ú oscuras.—Película oleosa sobre las orinas.—Orinas fétidas.—Sedimento harinoso, blanquizco, ó espeso ó rojizo en las orinas.—°*Evacuacion dolorosa de algunas gotas de orina* sanguinolenta con muchos esfuerzos.—*Salida de sangre y de mucosidades con las orinas.—Prurito, dolores vivos.—**Punzadas y sensacion de ardor en la uretra*, principalmente al orinar. —Rubicundez é inflamacion del orificio de la uretra, y dolor como al principio de una gonorrea.—*Flujo de mucosidades por la uretra.—Punzadas en la vejiga.—Chorro de la orina, delgado é intermitente.—Dolores

Digitized by Google

calambroideos en los riñones hasta las ingles.—*Gonorrea inveterada con olor como á queso rancio.*

Partes viriles.—°Sudores fétidos en las partes viriles.—*Excoriacion entre los muslos y las ingles*, principalmente andando.—Punzadas en el pene y glande.—Prepucio rígido, duro como cuero, con secrecion abundante en la corona del glande de un olor fétido.—Inflamacion, *hinchazon y fimosis del prepucio*, con grietas profundas, sensacion de ardor y rubicundez.—Ulcera profunda en el glande y prepucio, con bordes elevados.—Presion, tension y punzadas en los testículos y en los cordones espermáticos.—Hinchazon y espesamiento del epidídimo.—°Excoriacion y exudacion del escroto.—Exaltacion del apetito venéreo, é irritacion voluptuosa de las partes sexuales, frecuentemente sin ereccion.—*Debilidad de las funciones genitales*, frecuentemente con frio glacial, color azulado del glande, del prepucio y del pene y retraccion del prepucio.—*Impotencia.*—Testículos blandos y descendidos.—Poluciones frecuentes, aun durante la siesta.—Esperma acuoso.—*Salida del licor prostático*, principalmente al orinar y al defecar.—°(Endurecimiento del testículo).

Reglas.—*Presion en las partes genitales.*—°Excoriacion, prurito y sensacion quemante en las partes genitales.—Inflamacion de los labios de la vulva.—*Reglas muy adelantadas y muy abundantes*, ó demasiado débiles, ó *enteramente suprimidas*, con *cólicos*, *espasmos abdominales*, *cefalalgia*, *dolores en los riñones*, presion en el estómago, congestion á la cabeza y hemorragia nasal, agitacion y aun accesos de epilepsia.—*Antes de las reglas*, *dolor de cabeza*, prurito en las partes genitales, cólicos espasmódicos, inquietud, tos, odontalgias, pirosis, epistaxis, leucorreas y padecimientos asmáticos.—Despues de las reglas, prurito en la nariz.—Menstruacion de una sangre pálida, ó de un olor ácido.—*Leucorreas*, algunas veces corrosivas, corrosivas y amarillentas, precedidas de cólicos.—Excoriacion y prurito en los pezones.—*Grietas en los pezones*, con *sensacion de ardor* y facilidad de sangrar y ulcerarse.—°Inflamacion é induracion de las mamas.—°Inflamacion erisipelatosa de las mamas.

Laringe.—Catarro con coriza fluente, tos, dolor en el

pecho, como si estuviera en carne viva, y despeluzamiento.—*Ronquera, aspereza y arañamiento en la garganta*, con acumulacion de mucosidades en el pecho.—Dolor de excoriacion y *hormigueo ó cosquilleo en la laringe*, con necesidad de toser.—*Voz bronca y sorda*, ó enteramente *apagada*, principalmente por un tiempo frio y húmedo.—*Sensacion como si la laringe estuviera hinchada, ó hubiera en ella algun cuerpo extraño.—*Tos seca*, algunas veces fatigosa y que produce conmocion, *con vomituricion*, vómitos y constriccion calambroídea en el pecho, generalmente *por la tarde* ó *por la noche*, *estando acostado*, ó por la mañana, ó despues de comer.—*Tos húmeda*, con *expectoracion abundante de mucosidades espesas*, *blanquecinas*, ó amarillentas, como las de una coriza crónica.—°*Esputos fétidos*, *de un amarillo verdoso*, ó como de pus, ó de un gusto salado, y dulce, causado por la tos.—°*Tos febril*, *con* *esputos sanguinolentos.—*Al toser dolor de excoriacion* ó *punzadas en el pecho*, dolores de contusion, ó punzadas en la cabeza, incomodidad en el vientre, oscurecimiento de la vista, dolores en las caderas y riñones.—La respiracion y la conversacion provocan algunas veces la tos.

Pecho.—*Respiracion corta, ¯sofocacion frecuente, *dificultad de la respiracion*, *disnea y accesos de sofocacion*, principalmente *por la noche*, *estando acostado*, y aun *durante el sueño*, y tambien algunas veces en hablando ó paseándose al aire libre.—Imposibilidad de respirar profundamente con sensacion, como si el pecho estuviera contraido.—Respiracion frecuente, corta ó sibilante.—°*Ronquido* y *estertor mucoso en el pecho*.—Al respirar, punzadas en el dorso y en el sacro.—°Sensacion dolorosa en el pecho, como si alguna cosa cayese contra las paredes anteriores al volverse en la cama.—*Dificultad dolorosa de la respiracion *en el lado izquierdo del pecho*, con angustia é imposibilidad de echarse sobre el costado afecto.—*Pesadez, *plenitud* y *presion como por una piedra en el pecho y en el esternon*, principalmente *por la mañana*, °así como tambien tosiendo, estornudando y bostezando.—Dolor al toser, al estornudar, como si el pecho fuera á abrirse.—**Espasmos periódicos en el pecho*, con sensacion de constriccion, dolores calambroídeos, °respiracion corta, color azulado de la cara ó imposibilidad de ha-

Digitized by Google

blar.—Pulsaciones en el pecho y en el esternon.—**Debilidad en el pecho*, sensible. sobre todo cuando se habla, con mucha fatiga de los pulmones, despues de haber hablado ó cantado.—**Punzadas en el pecho ó el esternon, hasta en el dorso*, ó *el costado izquierdo*, principalmente en tosiendo, al respirar profundamente y al levantar el brazo.—*Parece que los dolores del pecho afectan el costado izquierdo con preferencia.—Sensacion de frio, ó **sensacion de ardor en el pecho*, algunas veces hasta la cara.— Punzadas y golpes en la region del corazon.—*Considerable congestion de sangre hácia el pecho* y el corazon, algunas veces con ebullicion de sangre en el pecho, malestar, desfallecimiento y temblor de los brazos.—Sensacion de vacío en la region del corazon, ó presion y sensacion como si el corazon no pudiese dilatarse bien.—**Palpitaciones de corazon frecuentes*, algunas veces *visibles*, con ansiedad, principalmente al subir una escalera.

Tronco.—*Dolor contusivo en el torax* al tacto.—*Debilidad y *dolores de luxacion* ó *de contusion en los riñones* y en el dorso, principalmente andando ó levantándose del asiento. —*Dolor en el dorso despues de un trabajo manual.—*Punzadas en los riñones*, *en el dorso*, y los omóplatos, algunas veces con dificultad de la respiracion.—*Dolores vivos y reumáticos, *tirantez*, *tension y rigidez en los riñones*, en el dorso y en la nuca.—Pellizcos y sensacion de ardor entre los omóplatos.—°Distorsion de la columna vertebral.—Herpes en la nuca.—*Hinchazon é inflamacion de las glándulas de la nuca y de las del cuello.—Sudor fétido en las axilas.—Hinchazon y supuracion de las glándulas axilares.

Brazos.—Presion sobre los hombros como por un peso. —*Estremecimiento de los hombros, de las manos y de los dedos.—**Tirantez*, *dolores vivos y punzadas en las articulaciones* y en los músculos de los brazos, de las manos y de los dedos, *asi como en las espaldas*, y principalmente *por la noche* en la cama.—Calambres nocturnos en los brazos.—*Hormigueo en los brazos, ¯y en los dedos.—**Hinchazon de los brazos*, °algunas veces con *calor*, dureza y dolores lancinantes ó tensivos.—Exóstosis en el brazo.—Verrugas en los brazos, *ó miliar pruritosa, ¯ó manchas rojas, quemantes, que aparecen despues de

Digitized by

lavarse.—Vesículas purulentas en la flexura de la articulacion húmero cúbito-radial.—*Debilidad paralítica de los brazos y de las manos.—Crujido del codo.—*Hinchazon de las manos y de los pulgares.—Rigidez y dolor de luxacion en las articulaciones de las manos y de los dedos.—**Temblor de las manos*, principalmente ocupándose en trabajos finos.—Contraccion involuntaria de las manos, como para coger alguna cosa.—Frio en las manos y los dedos.—**Sudor en las manos* y entre los dedos.—Erupcion de pequeños granos rojos en las manos y en los dedos, con prurito.—°Verrugas en los dedos.—Descamacion, sequedad y *grietas de la piel de las manos.*—Calambres y estremecimiento en los dedos.—Acortamiento de los tendones de las manos y de los dedos.—*Hinchazon voluminosa y lustrosa de los dedos.—**Dedos como muertos.*—°Nudosidades en los dedos.—Padrastros en la raiz de las uñas.—Sabañones en los dedos, con prurito á la accion del calor.—°Hinchazon é inflamacion de la punta de los dedos, con ulceracion subcutánea y dolores nocturnos, terebrantes y pulsativos.

Piernas.—Dolor de ulceracion subcutánea en las caderas y en las tuberosidades ciáticas, principalmente al tacto y permaneciendo mucho tiempo sentado.—Tumores purulentos y dolorosos en las caderas.—Dolor de luxacion y de contusion en la region lumbar, al menor movimiento, *con punzadas á cada paso.*—°Dolor en la cadera con acortamiento de la pierna.—*Dolores vivos y tractivos en las piernas*, principalmente *por la noche* en la cama.—**Pesadez de las piernas*, algunas veces con tension en los muslos y en las rodillas, principalmente por la noche.—Manchas rojas y dolorosas en la cara interna de los muslos, que exudan.—**Tension en las corvas, como por acortamiento de los tendones.*—°*Hinchazon voluminosa y lustrosa de la rodilla*, con rigidez y cansancio sumo de esta.—*Chasquido, *tirantez, dolores vivos y *punzadas en las rodillas.*—Empeines en las corvas.—*Agitacion en las piernas y en los piés.—Torpeza y adormecimiento de las piernas.—Fatiga dolorosa y **debilidad paralítica de las piernas*, principalmente *de las rodillas*, que se doblan frecuentemente.—*Manchas rojas y miliar pruritosa en las piernas.—°Hinchazon trasparente en las piernas.—°Erisipela en la pierna y en el pié.—*Manchas azuladas y

Digitized by Google

venas tumefactas ó varicosas en las piernas.—Dolor en las pantorrillas al andar.—*Calambres en las pantorrillas y en la planta de los piés*, principalmente *por la noche*.—Sensibilidad dolorosa en la planta de los piés andando.—Luxacion fácil del pié al andar.—Rigidez y dolor de luxacion en el empeine.—*Hormigueo en las piernas y en las pontorrillas.—°*Ulceras quemantes é inveteradas en las piernas ó en los piés*.— Herpes en el tobillo.—**Punzadas en los piés*.—**Frio en los piés*, principalmente al principio de la noche en la cama, ó *sensacion quemante* con particularidad en la planta de los piés.—**Sudor en los piés, los que están frios*.—Hinchazon de los piés, y sobre todo de los tobillos.—*Sabañones en los piés y en los dedos de estos.—Vesículas corrosivas en la planta de los piés.—Ulcera en el empeine.—Calambres y contraccion en los dedos.—°Frio y rigidez en los dedos.—*Hormigueo en la punta de los dedos.—**Hinchazon voluminosa y lustrosa en los dedos*.—Vesículas ulceradas y corrosivas en los dedos.—Callos con dolores presivos y lancinantes.

189.—SULFURIS ACIDUM.

SULF-AC.—Acido sulfúrico.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. hom.—*Dósis usadas*: 3, 20, 30.—*Duracion de accion*: 4 á 5 semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTO: Puls.

COMPÁRESE CON: Ammon. *arn.* con. *dig.* mur-ac. nitr.-ac. phos-ac. *puls.* rut. sulf.—Cuando sulf ac. se mostrará eficaz, será sobre todo despues de *arn.*, siempre que por otra parte se halle indicado.—Despues del ácido sulfúrico, conviene algunas veces: *Puls.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser consultado este medicamento contra:—Excoriaciones; Malos resultados á consecuencia de lesiones mecánicas, heridas, contusiones, etc.; Fiebres tifoídeas; Oftalmías crónicas; Aftas en los niños; Hemoptísis, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES. — Dislaceracion en todo el cuerpo y aun en la cara.—Calambres en los miembros.—

Digitized by Google

Dolores sensibles durante el sueño.—*Dolores que aumentan y desaparecen súbitamente*, generalmente como por una presion sorda.—Padecimientos ictéricos.—Saltos de tendones.—Aparicion ó exacerbacion de los síntomas por la mañana y por la tarde.—Agravacion de los padecimientos al aire libre.—El lado izquierdo parece que es el que se halla mas particularmente afectado.—Laxitud en todo el cuerpo, con sensacion de temblor.

Piel.—Prurito por todo el cuerpo.—Manchas rojas, pruritosas en la piel, ó pequeñas manchas rojas, lívidas y azuladas como equimosis.—Excoriacion de la piel, aun con ulceracion semejante á la gangrena.—Forúnculos.—Ulceras corrosivas.—Sabañones.—Callos en los piés con dislaceracion y punzadas.—Verrugas.

Sueño.—*Sueño tardo*, del que despierta muy temprano.—Insomnio por sobreexcitacion moral.—Estremecimientos durante el sueño.—Ensueños angustiosos.—Estremecimiento de los dedos durante el sueño.

Fiebre.—Predominio de la sensacion de calor.—Pulso pequeño, débil.—Sudor al menor movimiento.—Sudor matutino abundante.

Moral.—Abatimiento melancólico.—Necesidad de llorar.—Aprensiones angustiosas y desconfianza.—Agitacion, precipitacion é impaciencia.—Humor irritable, fatiga nerviosa, y disposicion á asustarse.—*Morosidad* penosa y aversion á la conversacion.—Disgusto de la vida.—Formalidad que alterna con humor muy jovial.—Distraccion excesiva.—Imaginacion obtusa.

Cabeza.—Atontamiento de cabeza de un solo lado, como si contuviese humo.—Vértigo estando sentado, que se disipa al aire libre.—*Dolores de cabeza que aumentan al principio y despues desaparecen súbitamente.*—Sensacion de debilidad en la cabeza.—Cefalalgia como si el cerebro estuviese desgarrado.—Dolores de cabeza presivos.—Sensacion de pesadez y de plenitud en el cerebro, como si fuera á abrirse la cabeza.—Sensacion de constriccion en la cabeza.—*Sacudidas y golpes en la cabeza.*—*Dolores de cabeza con lancinaciones* sordas ó tractivas y dislaceraciones.—*Sensacion de vacilacion en el cerebro.*—Sensacion de ulceracion al exterior de la cabeza.—Prurito y erupcion en la piel del cráneo.—Encanecimiento y caida de los cabellos.

Digitized by Google

Ojos.—Presion ardiente en los ojos, al aire libre, ó en fijándose sobre un objeto, cuando se está en el cuarto. —Tension en los párpados por la mañana.—Escozor, sensacion quemante en los ojos y *lagrimeo*, sobre todo leyendo.—Ojos rojos con fotofobia.—**Inflamaciones crónicas de los ojos.*—Dificultad de abrir los párpados.—Miopia.

Oidos.—Dislaceracion en los oidos.—Dureza de los oidos como si estuvieran tapados con una venda.—Sonido de campanas.—*Zumbido en los oidos* por la tarde.

Nariz.—Epistaxis por la tarde.—*Coriza seca con pérdida del olfato*.—Flujo de agua por la nariz, con obturacion de una de las ventanillas nasales.

Cara.—Palidez de la cara.—Dolor de contusion en los pómulos.—Dislaceracion en los huesos de la cara.—Sensacion de hinchazon en la cara y como si estuviera cubierta de clara de huevo seca.—Labios grietados y esfoliados.—Dolor de excoriacion en las comisuras de los labios.—Inflamacion y *tumefaccion de las glándulas submaxilares*.

Dientes.—*Odontalgia* mas violenta *por la noche en la cama*, agravada por el frio, y aliviada por el calor, y generalmente con dislaceracion y cáries.—*Dientes embotados*.—Hinchazon y hemorragia fácil de las encías.—Ulceras en las encías.

Boca y Garganta.—**Aftas en la boca*.—Sensacion de sequedad en la boca.—Lengua seca.—*Salivacion abundante*.—Expuicion sanguinolenta.—Ligera inflamacion de la garganta durante la deglucion, con dolor lancinante sobre todo por la tarde.—*Aspereza en la garganta*.

Apetito.—Gusto pútrido.—El pan tiene un sabor amargo, y hace peso en el estómago.—Bulimia con ruido obtuso y borborigmos en el vientre.—Deseo de frutas (ciruelas).—Despues de la comida, agitacion, retortijones y como si escarbaran en el vientre, ó acúmulo excesivo de gases en el estómago.—Sudor frio, inmediatamente despues de haber tomado alimentos cálidos.—Laxitud y flatuosidades despues de haber tomado leche.—Todas las bebidas enfrian el estómago, si no se las ha mezclado alguna cosa espirituosa.

Estómago.—*Eructos vacios* ó *amargos*.—Regurgitaciones ácidas, amargas ó saladas, ó bien insípidas.—*Pirosis*.—

Digitized by Google

Náuseas en el estómago con calofrio.—*Vómito de agua* al principio, despues de los alimentos.—Sensibilidad muy dolorosa en la region del estómago.—Plenitud y presion en el estómago.—*Apretamiento en el estómago al anochecer*, como por un enfriamiento.—Contraccion en el estómago y en la boca de este.—Retortijones alrededor del estómago.—Sensacion de frio ó de ardor en el estómago.

Vientre.—*Punzadas en el bazo.*—Punzadas en la region hepática.—Punzadas en las regiones lumbares.—*Cólicos abdominales como los dolores de parto*, que se extienden hasta las caderas y los riñones. Movimientos, *retortijones y pellizcos en el vientre*, algunas veces por la noche.—Sensacion de calor en la region umbilical.—Estremecimiento en toda la extension del bajo vientre, sobre todo en la superficie.—Pulsacion, dislaceracion y punzadas en las ingles.—Escozor en la region de la ingle.—**Hernia inguinal muy pronunciada.*—**Hernias encarceladas del lado izquierdo*, sobre todo en los individuos de un temperamento *melancólico y flemático.*—Cólico gaseoso en el bajo vientre, con *ruido sordo y borborigmos*, y sensacion como si fuera á salir una hernia.

Deposiciones.—*Tenesmo.*—Deposiciones retardadas, duras, nudosas y negras.—Deposiciones de un tamaño muy voluminoso.—**Relajacion ó diarrea crónica.*—*Diarreas pultáceas, ó verdosas, acuosas.—Diarrea solamente de mucosidades espumosas, con sensacion quemante en el recto.—Evacuaciones de mucosidades con estrias de sangre.—Deposiciones en forma de papilla (en los niños).—*Deposiciones de olor pútrido muy fétidas.*—Flujo de sangre con la deposicion.—Congestion sanguínea en el recto.—Hemorróides con punzadas, sensacion quemante, prurito y exudacion.

Orinas.—*Disminucion de la secrecion de las orinas*, con sensacion quemante al orinar.—Emision de orina por la noche.—Orina acuosa como mezclada con tierra.—Sedimento mucoso en las orinas.—Sedimento como sangre en las orinas, que están cubiertas de una película fina.—Dolores en la vejiga cuando la necesidad de orinar no se satisface inmediatamente.

Partes genitales.—Mucho calor en las partes genitales y en los testículos.—Espermatorrea sin sensacion voluptuosa.—Mucha disposicion al cóito por irritacion de las

Digitized by Google

partes genitales externas (en la mujer).—**Reglas muy adelantadas y muy abundantes.*—°Reglas de muy larga duracion.—Metrorragia.—Antes de las reglas, pesadilla.—Durante las reglas lancinaciones en el vientre y en la vagina.—*Esterilidad*, con reglas muy adelanta las y abundantes.—*Leucorrea* ácre y ardiente y como leche.—Flujo de mucosidades sanguinolentas por la vagina.

Laringe.—*Ronquera* con sequedad y **aspereza en la garganta y en la laringe.*—Dolor en la laringe, con balbuceo como si los órganos de la locucion estuvieran poco flexibles.—*Tos provocada por el aire libre.*—*Tos seca*, corta, estertorosa, algunas veces por la mañana despues de levantarse.—Tos gruesa con expectoracion mucosa.—**Tos con esputos de sangre.*— Despues de la tos, erutos con regurgitacion de los alimentos.

Pecho.—**Disnea.*—Excesiva debilidad del pecho, con dificultad para hablar.—Presion en el lado izquierdo del pecho y en la boca del estómago.—*Lancinaciones en el pecho.*—Palpitaciones de corazon.—Lancinaciones á través del corazon.

Tronco.—Sensacion de excoriacion y de quebrantamiento en el dorso y en los riñones.—Traccion en el dorso y en los riñones.—Diviesos en el dorso. —Rigidez del dorso por la mañana. —Sensibilidad dolorosa é hinchazon de las glándulas axilares.

Brazos.—Pesadez de los brazos.—Contracciones calambroideas, paralíticas en los brazos.—Punzadas en la articulacion del hombro al levantar el brazo.—Dolor tensivo en las articulaciones de los codos.—Manchas azuladas en el antebrazo como por equímosis.—Calambres en las manos.—Sacudidas y golpes en los huesos de la mano al escribir.—Erupcion en las manos y entre los dedos.—Lancinaciones en las articulaciones de los dedos.—Sabañones en los dedos.

Piernas.—Pesadez en las piernas.—Torpeza y adormecimiento de las piernas.—Necesidad de extender y estirar las piernas.—Dislaceracion en las várices de las piernas.—Debilidad dolorosa de las rodillas, con lancinaciones sordas, sacudidas y golpes en estas partes.—Manchas rojas, pruritosas en la tibia.—Rigidez de los tobillos.—Frio en los piés.—Hinchazon de los piés.—Dislaceracion y lancinaciones en los callos de los piés.

Digitized by Google

190.—TABACUM.

TAB.—Tabaco.—HARTLAUB Y TRINKS.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*¿Duracion de accion?*

ANTÍDOTOS: Camph. ipec. n-vom.—*El tabaco se emplea como antídoto de*: Cic. stram.

COMPÁRESE CON: Acon. ars. *bell.* cham. *cin.* cocc. c n. hell. hyos. *ipec. n-vom. op. estram. veratr.*

SINTOMAS GENERALES.—Dolores presivos, con agitacion en todo el cuerpo, y sudor angustioso.—*Calambres y hormigueo en los miembros.*—*Enflaquecimiento excesivo.*—*Debilidad paralítica y dolores en los miembros.*—*Temblor de los miembros.*—Laxitud general excesiva.—Estremecimiento en todo el cuerpo, con pulsacion y latido del corazon.—Se está mejor al aire libre.—°*Convulsiones generales con pérdida del conocimiento.*

Piel.—Prurito en la piel como por picaduras de pulgas.—Erupcion de granos pruritosos, ó de vesículas, con serosidad amarillenta y aureola roja.

Sueño.—*Mucha gana de dormir*, sobre todo despues de la comida y al caer la tarde, con bostezos frecuentes.—Sueño tardo por la tarde á primera hora de la noche y dificultad de despertar por la mañana.—Sueño agitado por la noche, con espanto.—Pesadilla durmiendo.

Fiebre.—*Frio y calofrio*, algunas veces con castaneteo de dientes.—Accesos frecuentes de horripilacion, algunas veces con calor fugaz.—Horripilacion permanente, desde la mañana hasta el anochecer.—Sudor nocturno.

Moral.—°*Melancolía sombría.*—*Angustia é inquietud*, generalmente despues de medio dia, y se alivian llorando.—*Agitacion que hace ir de un lado á otro.*—Aversion al trabajo y á la conversacion.—Sobreexcitacion y alegría exaltada, con cánticos, baile y mucha locuacidad.—Afluencia de ideas confusas.

Cabeza.—*Vacío y turbacion en la cabeza.*—*Aturdimiento.*—*Vértigo por lo regular hasta el punto de hacer perder el conocimiento*, con náuseas y dolores en la cabeza y en los ojos.—*Cefalalgia con náuseas* y vértigos.—*Pesadez excesiva de la cabeza.*—Dolores de cabeza presivos, sobre todo

Digitized by Google

por encima de los ojos, en el vértice y en las sienes.—Punzadas en la cabeza.—*Congestion de sangre á la cabeza* con *calor interior* y latidos en las sienes.—*Mejoria de los dolores de cabeza al aire libre.*—Sensacion ardiente y hormigueo al exterior de la cabeza.—Temblor de la cabeza.

Ojos.—Dolor en los ojos como despues de haber llorado mucho.—*Presion en los ojos* hasta el fondo de las órbitas.—Sensacion como si se tuviese un cabello en el ojo.—Escozor en los ojos.—*Calor y sensacion quemante en los ojos*, con rubicundez.—*Contraccion de los párpados.*—Pérdida de la vista mirando fijamente alguna cosa blanca.—*Al caer de la tarde, turbacion de la vista como si se mirase á través de un velo.*—Se ven chispas y puntos negros.—Fotofobia.

Oidos y nariz.—*Punzadas en los oidos*, sobre todo al aire libre y oyendo la música.—Calor quemante y rubicundez en las orejas.—Tumor duro, rojizo detrás de la oreja, con punzadas.—Sensacion quemante y hormigueo en la nariz.—*Disminucion del olfato*, que, sin embargo, es muy sensible al olor del vino.—Estornudo frecuente.—Sequedad y obturacion de la nariz.

Cara.—*Palidez mortal de la cara* (durante las náuseas).—*Calor ardiente en la cara* con rubicundez, *algunas veces de una sola mejilla* y palidez de la otra.—Manchas rojas en la cara.—Dislaceraciones en los huesos de la cara.—Tuberosidades granulosas en las mejillas.—Enflaquecimiento de la cara.—Labios secos, quemantes, ásperos y con grietas.—Erupcion en las comisuras de los labios.—Lancinaciones en la articulacion de la mandíbula al reirse.

Dientes.—*Odontalgia con dolores tractivos y dislacerantes.*—Lancinaciones en las muelas cariadas al masticar.—Dolor tractivo en las encías.

Boca y garganta.—Sequedad de la boca y de la lengua con mucha sed.—Hinchazon de las glándulas sublinguales.—Palabra débil, entrecortada.—Lectura sin sentido, monótona.—Aspereza, sequedad y arañamiento en la garganta, como por un cuerpo extraño.—*Acumulacion de mucosidades viscosas en la garganta.*

Apetito.—Sabor soso y pastoso, ó amargo y ágrio.—Sabor ácido de todos los alimentos.—Sabor acídulo del

Digitized by Google

agua como si tuviese algo de vino.—Falta de sed y *horror al agua*.—Anorexia.—Hambre contínua con náuseas si no se la satisface.

Estómago.—*Eructos frecuentes* á vacío y ruidosos.—Eructos ácidos, ardientes.—Pirosis.—*Hipo* espasmódico.—*Náuseas frecuentes*, sobre todo durante el movimiento, y *regularmente hasta el punto de caer en desvanecimiento*, con *palidez mortal del rostro*, disipándose generalmente al aire libre.—Náuseas con ganas de vomitar, sensacion de frio en el estómago, ó pellizcos en el vientre.—*Vómito solamente acuoso*, teñido de amarillo y verde.—*Vómito de serosidades ácidas, mezcladas frecuentemente de mucosidades.*—**Los vómitos se renuevan por el mas ligero movimiento.*—*Cólera asiático, con vómitos, diarrea, accesos de desfallecimiento y convulsiones generales.*—Presion en el estómago.—*Calambres en el estómago*, presivos, contractivos, algunas veces despues de la comida, acompañados frecuentemente de náuseas y de acumulacion de saliva en la boca.—*Punzadas en la boca del estómago*, extendiéndose á través del dorso.—Laxitud y sensacion de frio ó de ardor en el estómago.

Vientre.—Dolor hepático, oprimiendo la region del hígado.—Presion en la region hepática, como por un cuerpo pesado.—*Punzadas en la region hepática*.—Punzadas en el hipocondrio izquierdo.—Mucha sensibilidad en el vientre al mas ligero contacto.—Timpanitis dolorosa.—Dolores de vientre presivos, sobre todo en la region umbilical, con retraccion calambroídea de esta parte.—Dislaceracion nocturna en el vientre. Pellizcos y *borborigmos en el vientre*.

Deposiciones.—Constipacion de vientre.—Tenesmo frecuente.—Deposiciones blandas de la consistencia de papilla, aun por la noche.—*Diarreas violentas*, fétidas, ó de *color verde* amarillento, aun por la noche, acompañadas y seguidas de *tenesmo violento y de sensacion quemante en el ano*.—°*Cámaras coléricas, descoloridas*, con vómitos de la misma naturaleza, y desfallecimiento en los intervalos.—**Deposiciones involuntarias*.

Orinas.—Orinas rojas amarillentas y mas abundantes que de ordinario.—Inflamacion del orificio de la uretra.—°*Cólicos nefríticos, producidos por arenillas*.

Partes genitales.—Erecciones frecuentes.—Flujo de li-

Digitized by Google

cor prostático.—Reglas atrasadas y mas abundantes.—Leucorrea como agua sanguinolenta.

Laringe.—*Tos seca, provocada por un cosquilleo en la garganta*, por la mañana y al fin de la tarde.—*Tos con hipo*, hasta el punto de sofocar.

Pecho.—*Opresion de pecho* con angustia.—Constriccion de pecho.—Presion en el pecho y esternon.—*Punzadas en el pecho y los costados*, algunas veces *al respirar*.—Dolor de excoriacion en el pecho durante la comida.—*Palpitacion de corazon* estando acostado del lado izquierdo.—Granos pruritosos en el pecho.

Tronco.—Dolores contractivos en los riñones, sobre todo despues de una deposicion.—Enflaquecimiento del tronco.—Erupcion roja, pruritosa en el dorso.—Rigidez del cuello.

Brazos.—*Debilidad dolorosa de las manos* y de los brazos, *que están como paralizados*.—Necesidad contínua de estirar los brazos.—Punzadas y tracciones en los hombros.—Manchas rojas, quemantes al tacto en el hombro.—Tension en los brazos, sobre todo en los codos.—Dolor y *punzadas en los brazos*, que no permiten ni servirse de ellos, ni extenderlos.—*Temblor de las manos*.—Sudor frio en las manos.—Calambres y hormigueo en los dedos.—Hinchazon de los dedos.—Granos pruritosos en los dedos.

Piernas.—Dolor quemante en la rodilla y en la planta de los piés.—Punzada en la rodilla y en la corva.—Genuflexion de las rodillas al andar.—Calambres y hormigueo en los ojos, y hasta los dedos de los piés.—Tension en la pierna al andar, desde la rodilla hasta el pié.—Temblor y *debilidad paralítica de los piés*.

191.—TARAXACUM.

TAR.—Taraxacon, diente de leon.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.*—Farmacopea homeop.—*Dósis usadas:* 0, 30.—*Duracion de accion*.?

ANTÍDOTO: Camph.?

COMPÁRESE CON: Con. kal. n-vom. puls. spig. valer.

CLINICA.—Este medicamento se ha recomendado contra las *Afecciones gástricas* y una especie de *Cefalalgia*. El

Digitized by

médico homeópata, estudiando los síntomas siguientes, verá los casos en que podrá hacer uso de este medicamento.

SINTOMAS GENERALES.—Sensibilidad dolorosa de todos los miembros, sobre todo al tacto y en una falsa posicion.—Sensacion de debilidad y de malestar en todo el cuerpo, con necesidad contínua de estar sentado ó acostado. Casi todos los síntomas aparecen estando sentado, y se disipan andando.—*Mucha gana de dormir por el dia*, con bostezos frecuentes.—Sueño con afluencia de ensueños, por la noche, desvelo frecuente y agitacion.—Calofrios con dolores de cabeza presivos.—Calor general, sobre todo en la cara y en las manos, sin sed.—Sudor general por la noche al principio del sueño.—Irresolucion y repugnancia al trabajo.—Locuacidad y gana de reir.

Cabeza.—Vértigo con aturdimiento y vacilacion andando al aire libre.—Cefalalgia como por contraccion ó expansion del cerebro.—Pesadez y *presion en la cabeza*.—Lancinaciones en la frente y en las sienes.—*Dolores de cabeza violentos, sensibles solamente estando en pié ó andando*.—Tension de la piel del cráneo.

Ojos y oidos.—Dolor en los ojos, como si un grano de arena se hubiera introducido en el ángulo interno.—Sensacion quemante y punzadas ardientes en los ojos.—Inflamacion de los ojos, con lagrimeo y fotofobia.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—Punzadas en los oidos.—Dureza del oido por la tarde.

Cara y dientes.—Granos purulentos en la cara, en las mejillas, en las alas de la nariz y en las comisuras de los labios.—Sensacion de calor y rubicundez de la cara.—Punzadas y presion en las mejillas.—Labio superior grietado.—Odontalgia con dolor tractivo en los dientes cariados, hasta las cejas.—Golpes presivos en los dientes.—Hemorragia de las encías, de los dientes cariados, con sabor ácido.—*Embotamiento de la dentadura*.

Boca y garganta.—Acumulacion de saliva acídula en la boca.—*Lengua cubierta de una capa blanca con exfoliacion*.—Lengua seca, cubierta de una costra morenuzca, por la mañana, al despertar.—Ligera inflamacion en la garganta con dolor presivo, como por una hinchazon

Digitized by

interior.—Sequedad, punzadas y mucosidades amargas en la garganta.— *Ruido estertoroso de mucosidades ácidas.*

Apetito.—*Gusto amargo en la boca*, con sabor normal de los alimentos.—*Sabor salado ó ácido de los alimentos*, principalmente de la manteca y de la carne.— El humo del tabaco desagrada, produce pirosis y corta la respiracion.— *Mucha predisposicion al frio despues de haber bebido* ó comido.

Estómago.—Erutos amargos.—Erutos á vacío, sobre todo despues de haber bebido.—*Náuseas como despues de los alimentos muy grasientos*, con ansiedad y dolores de cabeza presivos que se mejoran al aire libre.

Vientre. — Pellizcos en el vientre. — *Punzadas* presivas *en el vientre y sus costados*, principalmente *en el izquierdo.* —Ruido sordo y movimientos en el vientre, como si en su interior estallasen vejigas.

Deposiciones y orinas.—Muchas deposiciones por dia, y sin embargo se efectúan con dificultad.—Deposiciones de la consistencia de papilla, seguidas de tenesmo. — Prurito voluptuoso en el periné.—*Conato frecuente de orinar con emision abundante.*

Partes genitales.— Dolor en los testículos.—Erecciones permanentes.—Poluciones frecuentes.

Pecho.— Presion en el pecho.— *Punzadas en el pecho y en los costados.*— Estremecimiento en los músculos de los costados.

Tronco.—Dolores presivos en los riñones.— Punzadas presivas y tensivas en el dorso y los riñones, estando acostado, con opresion de la respiracion.— Ruido é hinchazon en los omóplatos y en las espaldas, con calofrio general.—Estremecimientos presivos y punzadas en los músculos del cuello y de la nuca.

Brazos.—Latidos, pulsaciones y estremecimientos en los hombros y en los brazos.—Estremecimiento de los músculos de los brazos.—Punzadas en los brazos y en los codos.— Tracciones y dislaceraciones en el antebrazo y la muñeca.— Erupcion granulosa en las manos y en los dedos.—Frio glacial en la punta de los dedos.

Piernas.—Punzadas en los muslos, las rodillas, las pantorrillas, las plantas de los piés y los dedos.—Sensacion quemante en las rodillas, las piernas y los dedos.— Sudor abundante entre los dedos.

Digitized by

192.—TARENTULA HISPANICA.

TARENT.—Taréntula española.—Nuñez y Perry, *Estudios del veneno de la taréntula.*

Antídotos: 1) *Phosph.*—2) Acon. bar-m. bovis. chel. cupr. lyc. mang. mosch. natr. puls. rhus. spig. sulf. zinc.

Compárese con: Bell. canth. lach. merc. puls. phos-ac. secal.

CLINICA.—Dejándose guiar por el *conjunto de síntomas*, se verán los casos en que será particularmente eficaz este medicamento contra las afecciones siguientes: Afecciones de tipo intermitente; Hipocondría; Histeria; Corea; Erotismo, en el hombre y la mujer; Diabetes; Albuminuria, Reumatismo gotoso; Nefritis y ascitis calculosas é inflamatorias; Raquitismo escrofuloso (y tambien sifilítico?); Tumores fibrosos del útero y de sus anexos; Lesiones orgánicas del corazon y de los vasos gruesos, por consecuencia del reumatismo; Parálisis reumatismales y nerviosas.

SINTOMAS GENERALES.—Afecciones convulsivas con necesidad de *moverse continuamente*; *periodicidad de accesos*, acompañados de *espantos*, de *terror*, *temor de una muerte próxima*, *vértigos y ansiedad precordial.*—Agravacion de los sufrimientos por el *reposo* y la *cama*, un *tiempo seco* y frio, por el ruido y la conversacion, las causas morales deprimentes y los cambios de tiempo.—Los sufrimientos se producen con preferencia desde el medio dia á la noche, y vuelven periódicamente.—Necesidad de remover contínuamente todo el cuerpo y de cambiar de posicion, á causa de una inquietud general, con opresion.—*Ataques de nervios*; sensacion de un hormigueo general, con dolor en el occipucio, seguido de entorpecimiento del tronco y de los miembros hasta la pérdida del movimiento; despues inquietud general, temor de perder la razon, gana de morderse con rabia, sed, bostezos, horripilaciones y temblor con cefalalgia.

Piel.—Picotazos y ardor sobre todo el cuerpo.—Piel color escarlata.—Erupcion miliar de pequeños granos muy pruritosos, que pocas veces supuran.

Digitized by Google

Sueño. — Propension irresistible al sueño. — Adormecimiento, sueño pesado y prolongado.—Sueño ligero, turbado por agitacion nerviosa, inquietud, y ensueños de todas clases, pero tristes por lo regular.

Fiebre.—Ardor quemante por todo el cuerpo, alternando con un frio glacial, que hace temblar.— Alternativas de calor y de frio; al principio del frio, dolor en la region hepática; despues, grande agitacion y calor ardiente; en fin sudor copioso con gran necesidad de dormir, sin poder conseguirlo.—Aumento del calor en la superficie del cuerpo, con rubicundez de la piel.—Dolor de mortificacion por todo el cuerpo y la cabeza, por espacio de una hora, con sed extraordinaria; despues, sudor abundante de un olor muy ágrio, con alivio de todos los síntomas.— Durante el sudor, sueño; durante el frio, dolor presivo intenso en el corazon.— Fiebre cotidiana vespertina.

Moral é inteligencia.—Tristeza, afliccion y mal humor. —Delirios en que dominan las ideas tristes, las amenazas y los arrebatos; despues grande dolor de cabeza seguido de indicios de alegría y de buen humor.— Muy buen humor.— La música alegra y alivia, produce sudor y un movimiento general.—La música determina malestar, disgusto y agitacion con contracciones en los dedos. — La música disminuye los síntomas.— Ansiedad, partiendo de la boca del estómago, con tristeza y temor de una desgracia.— Debilidad de la memoria.— Poca aptitud para el trabajo intelectual.

Cabeza. — Dolores en la cabeza de diversa naturaleza, principalmente gravitantes y lancinantes, que se repiten á las mismas horas del dia y limitados por lo regular á las sienes, á la frente y al occipucio.—El dolor occipital es profundo y acompañado de un fuerte calor quemante, que se extiende á toda la cabeza, con sed ardiente.— Los dolores de cabeza van precedidos ordinariamente de mucho calor y terminados por sudores.— Durante los dolores de cabeza se presentan numerosos síntomas accesorios, sobre todo: inquietud general, gran tristeza, opresion, tos con fatiga de la respiracion, náuseas y vómitos, vértigos, postracion de fuerzas y rigidez de los músculos de la cabeza y del cuello.

Ojos, oidos y nariz.—Punzadas y dolores por interva-

Digitized by

los en los *ojos*, picotazos ó irritacion en los párpados; lagrimeo, vista turbia; ilusiones de óptica; manchas luminosas, centellas y otros objetos delante de los ojos.—Dolores en los *oidos*; dolor á la entrada del conducto auditivo externo; dolor en el oido interno y en la trompa de Eustaquio, que se extiende á toda la cabeza; ruidos y sonidos, que estallan en los oidos.—Excitacion de la mucosa *nasal*, con el olfato ya aumentado, ya disminuido; epistaxis.

Cara y dientes.—Neuralgias faciales del nervio maxilar inferior derecho, con síntomas gástricos, dolores en algunas articulaciones, que se terminan por un sueño prolongado.—Erupciones crónicas, frecuentemente confluentes, de pápulas pequeñas, rojas, sobre la cara (y otras regiones), con mucho calor, picotazos y escozor al rascarse. Herpes furfuráceos en la frente y la cara, con prurito, que se agrava por la noche.—*Odontalgia*, como si se arrancaran los dientes.

Boca, garganta y apetito.—Aftas en la *boca*, fetidez del aliento.—Dolor de *garganta* al tragar; hinchazon de las amigdalas; punzadas dolorosas en las amigdalas.—*Desgana*, con sed intensa; grande apetito; bulimia; mucha sed.

Estómago y vientre.—Dolores vivos en el *estómago*, sobre todo despues de comer por la noche, con vómitos, punzadas en el bazo, mucha sed, dolores en las articulaciones y abatimiento moral.—Dolor en la region del hígado, con alternativas de calor y frio, dolores en los hipocondrios.—Cólicos mas ó menos vivos; punzadas en diversos sitios del abdómen y del ano; dolores de vientre, que se extienden al pecho, donde se hacen intensos, con ruidos producidos por los gases, que recorren el vientre; borborigmos; sensibilidad excesiva de todo el vientre.

Defecacion y orinas.—Abundantes evacuaciones de vientre; diarreas; resecamiento de vientre; cámaras difíciles con tenesmo y pérdida de sangre.—Dolores en los riñones, en la vejiga y en la uretra, espasmo en la vejiga; dificultad de orinar; la orina sale gota á gota y es muy ardiente; orina espesa y sedimentosa; ardor en la uretra, durante y despues de la miccion; excrecion abundante de orina.

Digitized by Google

Partes viriles.—Aumento del apetito venéreo.—Testículos dolorosos, hinchados.—Tirantez á lo largo de los cordones espermáticos.—Erecciones sin deseos; erecciones, que cesan fácilmente.—Testículos flácidos y dolorosos al tacto.—Infarto de la próstata.—Ominosas consecuencias de las pérdidas seminales.

Partes sexuales de la mujer.—Anticipacion de las reglas, que se hacen mas abundantes, con dolores en el sacro.—Durante las reglas, grande agitacion, con espasmos eróticos.—Pérdidas uterinas con dolores en las ingles.—Flores blancas, alternando con estilicidio de sangre.—Dolores muy fuertes, contusivos, presivos é incisivos en la matriz, con extension á las caderas y al sacro.—Dolor quemante en el vientre y la matriz, con sensacion de un gran peso que fatiga la progresion y picotazos en la vulva.—Dolores espasmódicos é insoportables en la matriz, acompañados de temblor, hasta el punto de producir verdaderos gritos nerviosos, seguidos de postracion completa.—*Histerismo* bajo todas *formas*.—Exaltacion de los deseos venéreos en la mujer.

Laringe y tos.—Tos seca por consecuencia de un cosquilleo en la laringe, con grande fatiga y opresion.—Accesos de tos con ardor general y rubicundez de todo el cuerpo, que se termina por sudores, seguidos de postracion de fuerzas.—Tos, acompañada de dolores de cabeza, del pecho y del bajo vientre, con opresion y angustia.—Tos seca, fatigosa, convulsiva con náuseas.—Expectoracion difícil.—Agravacion de la tos por el humo del tabaco y el cóito.

Pecho y corazon.—Opresion de pecho, fatiga de la respiracion y ansiedad, con dolor como si el corazon se moviese en el pecho y sudor general.—Opresion por el mas ligero movimiento.—Opresion, con postracion de fuerzas.—Opresion con dolor en el corazon, abatimiento moral y fatiga.—Dolores reumatismales en la parte media y anterior del pecho.—Sofocacion y necesidad de aire incesantemente renovado.—Dolor en el corazon, como si se le comprimiese.—Palpitaciones de corazon y ansiedad precordial.—Palpitaciones con gran tristeza y opresion.—Latidos tumultuosos del corazon, y grande irregularidad de la circulacion.

Tronco.—Tension y rigidez de los músculos del tronco;

traccion muscular.—Dolores en la region lumbar y á lo largo de la columna vertebral.—Dolores de los riñones, que se repiten muchos dias de seguida, por lo comun compresivos, contusivos, á veces muy agudos, y acompañados de numerosos síntomas en otras partes.—Convulsiones y contínuos movimientos del tronco, de los brazos y de las piernas, con imposibilidad de contener en reposo ninguna parte, y precedidos de opresion y malestar general.—Rigidez de la nuca; retraccion muscular.

Extremidades.—Dolores vagos en los huesos de los brazos y en las muñecas, con hinchazon de estas últimas; dolores en los pulgares; erupciones pustulosas y callosidades dolorosas en las manos.—En los miembros inferiores, inquietud, que obliga á agitarlos; Dolores articulares, como en los reumáticos por el cambio de tiempo; Pesadez de las piernas y dificultad de moverlas; Parálisis incompleta de los miembros inferiores; Parálisis de los miembros inferiores con violento dolor de espaldas, que el menor movimiento lo hace insoportable; Parálisis de las piernas con incontinencia de orina y cámaras involuntarias.

193.—TARTARUS EMETICUS

TART.—Tártaro emético ó estibiado; Tartrato de potasa y antimonio.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.*—Farmacop. homeop.—*Dósis usad.s*: 30.—*Duracion de accion*: 3 á 5 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Cocc ipec. puls.—Se emplea el tártaro como antídoto de *sep.*

COMPÁRESE CON: Ant. asa. baryt. cham. cocc. ign. *ipec.* nitr-ac. n-vom. *pu's. sep.* veratr.—Cuando el tártaro emético será mas eficaz si se halla indicado, es sobre todo despues de: *puls.* ó *baryt.*—Despues del tártaro emético convienen algunas veces: *Baryt. ipec. puls. sep.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que deberá ser *consultado* este medicamento contra.—Fiebres reumáticas; Variolóides; Afecciones gástricas y biliosas; Asfixia de los recien nacidos; Coqueluche; Crup, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—*Dislaceracion y tracciones* artríticas y reumáticas *en los miembros*, con sensacion de quebrantamiento.—Contraccion de los miembros.—Estremecimiento de los músculos.—*Estremecimientos convulsivos y calambres.*—Ataques de epilepsia.—*Temblor de los miembros.*—Punzadas en las várices.—*Exacerbacion de los sintomas sentándose*, ó bien estando sentado al ir á levantarse.—Pesadez general de todos los miembros y mucha pereza.—Pulsaciones violentas en todo el cuerpo.—Debilidad suma, flojedad y laxitud excesiva.—El niño quiere que le tengan en brazos constantemente.—*Accesos de desvanecimiento.*—Sensibilidad excesiva de todo el cuerpo.—En tocando al niño, prorumpe en gritos.

Piel.—Prurito en la piel.—Granos pruritosos y *erupcion miliar.*—Erupciones como la sarna.—*Erupcion de pústulas semejantes á las varioloides, con aureola roja y que se cubren en seguida de una costra y dejan cicatriz.—Prurito alrededor de las úlceras crónicas.

Sueño.—**Excesiva propension al sueño por el dia* con pandiculaciones y bostezos frecuentes.—°*Somnolencia invencible con sueño profundo y sopor.*—Por la mañana parece que no ha dormido bastante.—Sueño tardo é insomnio nocturno.—*Sueño* ligero, *con afluencia de ensueños fantásticos.*—Palabras frecuentes durante el sueño.—Gritos durante el sueño con ojos fijos y temblor de los miembros.—*Sacudidas y golpes durante el sueño* que producen sobresaltos ó estremecimientos, ya en un solo miembro, ya en todo el cuerpo.—Cuando se acuesta sobre el dorso, durmiendo, tiene la mano izquierda pasada por debajo de la cabeza.

Fiebre.—*Calofrio y frio predominantes.*—Calofrio con palidez excesiva del rostro y temblor de todo el cuerpo.—*Calor ardiente en todo el cuerpo*, principalmente en la cabeza y en la cara, que se aumenta por el menor movimiento.—*Pulso acelerado*, débil ó lleno.—*Fiebre sin sed*, con somnolencia excesiva.—*Sudores abundantes, frecuentes* y algunas veces *frios.*—Sudor en las partes afectas.—Sudor nocturno abundante.

Moral.—Inquietud y agitacion con latidos del corazon y temblor.—Aprension angustiosa sobre el porvenir (por la tarde).—*Desaliento y desesperacion.*—Manía de suicidio.—*Alegria apacible* solamente de dia.

Digitized by Google

Cabeza.—Atontamiento, confusion y *embarazo en la cabeza* que se halla *como amodorrada*, con ganas de dormir.— Accesos de vértigo viendo chispas delante de los ojos y aturdimiento al andar.— Embotamiento de todos los sentidos.— Dolores de cabeza con palpitacion de corazon y vértigo.— Pesadez de la cabeza, sobre todo en el occipucio.— Dolor de cabeza semilateral.—*Dolores presivos en la cabeza, con tension compresiva como si el cerebro se hubiera contraido y convertido en una masa dura*, frecuentemente con aturdimiento hasta la raiz de la nariz, algunas veces *por la tarde y por la noche*.—Traccion, dislaceracion y como si escarbáran en la cabeza.—*Dolores lancinantes en la cabeza* que algunas veces se extienden hasta los ojos, con necesidad de cerrarlos.— Terebracion en la frente.— Latido en una mitad de la frente. —*Temblor crónico de la cabeza*.

Ojos.—*Ojos fatigados* y necesidad tal de dormir que obliga á cerrarlos fuertemente.— Dolor de contusion en el globo del ojo al tacto.—*Presion en los ojos*.—Punzadas, sensacion ardiente y escozor en los ángulos internos de los ojos con rubicundez de la conjuntiva.— Los ojos se hallan turbios, inundados de lágrimas.—*Amaurosis incipiente*.— Vista turbia *con chispas que se ven delante de los ojos*, sobre todo levantándose del asiento.

Oidos y nariz.—Zumbido de oidos.—*Violenta coriza fluente*, con estornudo frecuente, las ventanillas nasales ulceradas, calofrios y pérdida del olfato y del gusto.

Cara y dientes.—*Rostro pálido y macilento*, ó rojo y abotagado, con expresion angustiosa.—Presion sorda, tractiva, en el pómulo.—Estremecimiento convulsivo de los músculos de la cara.—Labios secos y que se exfolian. —Labios grietados.— Odontalgia muy violenta por la mañana.

Boca.— Acumulacion abundante de saliva en la boca.— Lengua húmeda, limpia ó cubierta de una costra morenuzca.— Afonía.

Apetito.— Insipidez de los alimentos.— Gusto salado en la boca.—*Gusto amargo en la boca.—Sed de agua fria. —Apetito moderado con sed ardiente.—*Apetito pronunciado* con disgusto pronto en cuanto se han tomado algunos alimentos.— Bulimia paseándose al aire libre.— *Deseo excesivo de ácidos* ó de frutas crudas (manzanas).—

Digitized by Google

Disgusto de los alimentos, sobre todo de la leche.—Cada bocado produce una sensacion dolorosa hasta el estómago.

Estómago.—*Erutos á vacio.*—Erutos á manera de sollozos. —*Erutos con sabor á huevos podridos* por la noche.— Regurgitacion de serosidades ácres, ó saladas, ó bien acídulas.—Regurgitaciones de la leche.—**Náuseas continuas*, algunas veces *con conatos al vómito, angustia*, presion en la boca del estómago y cefalalgia que se alivia expeliendo gases por arriba y por abajo.— *Vomituricion violenta*, con secrecion abundante de saliva, sudor en la frente y laxitud en las piernas; ó bien *con diarrea y debilidad excesiva.— *Vómito abundante con violentos esfuerzos*, dolores en el estómago y en el vientre, temblor del cuerpo, necesidad de encorvarse, calofrios y mucha propension al sueño.— *Vómito mucoso* con diarrea de la misma naturaleza.— Vómito ácido de los alimentos.— *Vómito de materias ágrias y amargas, sobre todo por la noche.—Sensibilidad excesiva del estómago; el mas pequeño bocado causa una sensacion dolorosa.—*Incomodidad en el estómago como por saburra.*—Malestar y sensacion de vacío en el estómago.—*Presion en el estómago y en la boca de este*, sobre todo despues de la comida.— Latidos violentos y pulsaciones en la region del estómago.—Punzadas en la boca del estómago.

Vientre.—*Dolores abdominales con excesiva agitacion moral* y física, y aversion á toda especie de trabajo.— Desazon en el epigastrio é hipogastrio que obliga á echarse y extenderse.—Plenitud y *presion en el vientre como si contuviese piedras*, sobre todo *estando encorvado ó sentado.*—Cólicos calambroídeos en el vientre con contraccion violenta de los párpados y necesidad invencible de dormir. —Dolores incisivos en el vientre como si los intestinos estuviesen cortados.—Pulsaciones en el vientre.—Produccion abundante de gases con ruido sordo, borborigmos y pellizcos en el vientre.

Deposiciones.—Estreñimiento que alterna con diarrea. —*Deposiciones de la consistencia de papilla.*— *Diarreas mucosas* ó amarillas, ó de color pardo claro, ó acuosas, precedidas frecuentemente de retortijones y de movimientos en el vientre.— *Deposiciones sanguinolentas.*—Evacuaciones involuntarias.—Durante la deposicion, palpitaciones de corazon.—Cosquilleo excesivamente quemante

desde el recto hasta el glande.—Lancinaciones en el recto.

Orinas y reglas.—*Emision de orina muy abundante y penosa*, con tension en el periné, sensacion ardiente en la uretra y *flujo poco abundante y sanguinolento* hácia el fin, con dolores violentos en la vejiga. —Necesidad de orinar por la noche, con sed ardiente y emision poco abundante.—Emision involuntaria de orina.—*Orina roja, inflamada*, que forma al posarse filamentos de sangre, color rojo subido.—*Orina de un pardo oscuro*, ácre, turbia.—Presion y tension en la vejiga.—Punzadas en la uretra y en la parte interior de la vejiga.—Menstruacion de una sangre acuosa.—Erupcion granulosa en las partes genitales.

Laringe.—Catarro con irritacion que provoca la tos, y *acumulacion abundante de mucosidades* y *estertor mucoso en el pecho*.—Ronquera.—Sensibilidad dolorosa de la laringe al tacto.—Tos provocada por un fuerte cosquilleo en la tráquearteria.—El niño tose cuando se enfada.—*Accesos de tos con disnea* (tos sofocante).—Tos con calor y humedad de las manos, y sudor en la cabeza, principalmente en la frente.—*Tos con vómito de los alimentos* despues de la comida.—*Tos hueca con estertor mucoso en el pecho.—Tos con expectoracion de mucosidades blanquecinas* ó de *color amarillo limon*, algunas veces *solo por la noche*, principalmente despues de media noche.

Pecho.—*Ortopnea*, sobre todo al anochecer ó por la mañana en la cama.—Respiracion corta.—Respiracion difícil.—°*Parálisis de los pulmones.*—°*Opresion en el pecho*, angustiosa con sensacion de calor que sube al corazon.—°*Estertor mucoso en el pecho, al respirar.*—Dolor de excoriacion en el pecho, sobre todo en el costado izquierdo.—Sensacion ardiente en el pecho que sube á la garganta.—*Inflamacion de los pulmones con síntomas biliosos y gástricos, y signos de hepatizacion y expectoracion amarillenta.—Palpitacion de corazon visible y angustiosa*, algunas veces durante la defecacion.—Como si escarbaran en círculo y golpes en la region del corazon por la noche que no ceden sino cuando el sudor principia á establecerse.—Erupcion miliar en el pecho.

Tronco.—*Dolor en el dorso y en los riñones estando sentado* como por fatiga.—Dolor reumático en el dorso.—Debili-

Digitized by Google

dad de los músculos del cuello que no permite tener derecha la cabeza.—Erupcion miliar en la nuca,

Brazos.—Crujido en las articulaciones del hombro, con *dislaceracion en los brazos* y hasta en las manos.—Pesadez excesiva de los brazos.—Estremecimiento de los músculos en los brazos y en las manos.—Erupcion miliar en los brazos.—Granos pruritosos en los brazos y en las muñecas.—Manchas rojas en las manos como picaduras de pulgas.—*Temblor de las manos*.—Manos frias.—Frio glacial en la punta de los dedos.—La punta de los dedos como muertas, secas y duras.—Manchas de color amarillo oscuro en los dedos.—Distorsion de los dedos.

Piernas.—Pesadez y dolores reumáticos en las caderas y en las piernas.—Debilidad dolorosa en la articulacion de la rodilla por la mañana en la cama.—Tension de los tendones de la corva y del empeine andando.—Calambre en las pantorrillas.—Frio en los piés.—Adormecimiento de los piés cuantas veces se sienta.

194.—TEUCRIUM MARUM VERUM.

TEUCR.—Escordio ó germandina marítima.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 0, 50.—*Duracion de accion*: 2 á 5 semanas en algunos casos de enfermedades crónicas.

ANTÍDOTO: Camphora.

COMPÁRESE CON: Con. ign. magn-arc.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá ser *consultado* este medicamento contra:—*Pólipos en la nariz* y algunas afecciones á consecuencia de las *Ascárides*.

SINTOMAS GENERALES.—Dislaceracion en los miembros, pero sobre todo en las articulaciones.—Estremecimientos de los músculos.—*Irritabilidad excesiva y sobreexcitabilidad nerviosa* con temblor y aturdimiento.—Vacila al andar; un pié pisa sobre el otro.—Adormecimiento y hormigueo en los miembros.—Necesidad de hacer ejercicio al aire libre.—Punzadas pruritosas en varias partes.

Digitized by Google

Sueño.—Sueño tardo por la noche.—Sueño no reparador y dificultad de despertar por la mañana.—*Sueño agitado por la noche por* excesiva *sobreexcitacion*, con ensueños vivos y frecuentes sobresaltos.

Fiebre.—Calofrios y temblor de frio, regularmente con frio glacial, en las manos y bostezo frecuente.—Calor aumentado por la tarde.

Moral.—*Irritabilidad y disposicion á enfadarse*, con impresionabilidad tal que es lo bastante oir hablar para sentirse uno fatigado.—Morosidad.—Pereza y excesiva aversion al trabajo.—*Mucha sobreexcitacion moral* y locuacidad.—*Irresistible deseo de cantar.*

Cabeza.—Cefalalgia con dolor sordo calambroídeo.—*Dolores presivos en la cabeza*, principalmente *en los ojos*, *en la frente y en las sienes.*—Dislaceracion por accesos en el lado derecho de la cabeza.

Ojos.—Dolor en los ojos con presion como si se hubiese introducido algun grano de arena.—*Escozor en los ojos*, sobre todo en los ángulos internos, con rubicundez de la conjuntiva.—Ojos rojos, inflamados.—Ojos lagrimosos con aspecto como si se hubiese llorado.

Oidos.—Otalgia.—Punzadas y dislaceraciones en los oidos. Silbido en los oidos al hablar ó produciendo cualquier sonido.—Erupcion de herpes escamosos en el lóbulo de la oreja.

Nariz.—Sensacion de obturacion en la nariz.—Hormigueo en la nariz.—Estornudo frecuente con hormigueo en la nariz.—*Obturacion de la nariz.*—Coriza fluente al aire libre.

Cara.—Color enfermizo, pálido, con ojos hundidos.—Calor fugaz en la cara sin rubicundez.—Dislaceracion presiva en los huesos de las mejillas hasta los dientes.

Dientes.—*Odontalgia con dolor dislacerante* en las raices de las muelas y en las encías.—Dolor en los dientes y en las encías durante la masticacion.

Boca y garganta.—Boca pastosa.—*Escozor y arañamiento en el fondo de la faringe* y en la raiz de la lengua.—Ligera irritacion en la garganta con dolor lancinante y deglucion difícil.—Presion ó traccion y dislaceracion en la garganta.—Necesidad frecuente de expectorar y *expectoracion abundante de mucosidades* de un sabor mohoso.

Apetito.—Sabor amargo en la garganta despues de co-

Digitized by

mer.—Apetito mas pronunciado.—*Sensacion de hambre* como si los alimentos no satisfaciesen, lo que impide dormir.—Despues de haber bebido agua, retortijones ó náuseas con propension al vómito.

Estómago.—Regurgitacion de los alimentos con sabor amargo.—Hipo penoso al comer, con golpes violentos en la boca del estómago.—*Dolor en el estómago como por vacuidad*, con gorgoteo.—Desfallecimiento en la boca del estómago.—Presion y opresion angustiosa en la boca del estómago.

Vientre.—Cólicos con tracciones dislacerantes por bajo de los hipocondrios.—*Encarcelacion de gases*, con tirones, pellizcos y ruido como de agua en el vientre.—Presion en el vientre.—Presion hácia el anillo inguinal.—*Expulsion abundante de gases* con olor á huevos podridos.

Deposiciones.—Deposicion abundante de la consistencia de papilla fétida.—*Expulsion de ascárides*.—*Prurito y hormigueo frecuente en el ano*, por lo regular despues de las deposiciones.

Orinas.—*Secrecion de orina mas abundante y acuosa*.—Sensacion penosa de excoriacion y de escozor en la parte superior de la uretra.—Sensacion de ardor durante y despues de la emision de las orinas.—Disminucion del apetito venéreo.

Pecho.—Pecho cargado con sensacion de sequedad en la tráquearteria.—Tos seca provocada por un cosquilleo en la tráquearteria, como si se hubiese respirado polvo.—Presion constrictiva en la parte inferior del pecho con un malestar angustioso.

Extremidades.—Traccion reumática y tension en el dorso.—Pesadez dolorosa en los brazos y en los antebrazos.—Estremecimiento de los músculos y de los brazos.—*Dislaceracion* tractiva *en los huesos y en las articulaciones* de los brazos, *de las manos* y de los dedos.—Pulsaciones dolorosas y tirantez en el índice.—Estremecimiento en los músculos de las piernas.—*Dislaceracion en las articulaciones y los huesos* de las piernas, *de los piés* y de los dedos de estos.—Dolor en el dedo pulgar del pié, como si la uña se introdujese en la carnes.

Digitized by Google

195.—THERIDION CURASSAVICUM.

THER.—Teridion ó Araña negra de Curasao.—HERING.—*Hist. nat. y prep.* Farm. homeop.—*Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion* ?

ANTÍDOTO: ?

COMPÁRESE CON: Calc. lyc., medicamentos despues de los cuales el Teridion es principalmente eficaz, si desde luego se halla indicado.

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que podrá consultarse este medicamento contra:—*Mal de mar*; *Afecciones gástricas*, etc.

SINTOMAS GENERALES.—*Mucha debilidad general*, con temblor de los miembros.—Excesivo malestar que no permite ocuparse de trabajo alguno.—*Mucha propension al sueño* y sueño lleno de ensueños.—Sueño profundo por la noche.—Calofrio violento con pesadez en todos los miembros.—Gana de dormir y necesidad de acostarse despues del desayuno.—Desaliento y falta de confianza en sí mismo.—*Mucha propension á asustarse.*—El tiempo parece pasa con rapidez.—*Excesivo temor al trabajo.*—Dificultad de meditar y sobre todo de hacer comparaciones.

Cabeza.—Atontamiento de la cabeza que impide trabajar.—Vértigo frecuente, sobre todo bajándose.—*Vértigo con náuseas hasta el punto de vomitar.*—*Dolor de cabeza en el fondo de las órbitas.*—Sensacion como si hubiese un cuerpo extraño en la cabeza.—Cefalalgia frontal, violenta, con pulsacion hasta el occipucio.—*Dolor de cabeza á cada movimiento que se hace.*—Presion tensiva alrededor de la cabeza como por un círculo de hierro hácia la raiz de la nariz por encima de las orejas.—Dolores de cabeza por la tarde con mucho abatimiento.

Ojos.—Cara.—*Aparecen chispas delante de los ojos*, por accesos frecuentes.—Zumbido sordo en los oidos.—*Ruido confuso en los oidos, como por una corriente de agua.*—Sensibilidad excesiva del oido, *vértigo y náuseas á cada sonido un poco fuerte.*—Prurito violento detrás de las orejas.—Estornudo frecuente y flujo de agua por la nariz sin

Digitized by Google

coriza.—La mandíbula inferior está algunas veces inmóvil, sobre todo por la mañana al despertar.

Boca.—Vientre.—Boca pastosa y como quemada.—*Todos los sonidos y el frio producen una sensacion dolorosa á través de la dentadura.*—Deseo por los ácidos, el vino, el aguardiente y el tabaco.—*Deseo continuo de alimentos ó de bebidas sin saber cuáles.—Náuseas y vómitos*, por la noche, precedidos de vértigos y *renovados por el mas ligero movimiento*, ó con solo cerrar los ojos.—*Náuseas provocadas por cualquier sonido un poco fuerte.*

Deposiciones.—Partes genitales.—Estreñimiento.—Deposicion poco abundante de la consistencia de papilla, con necesidad urgente.—Prolapsus del ano, el que se siente doloroso estando sentado.—*Secrecion de orina mas abundante.—Exaltacion inmoderada del apetito venéreo.*—Retraccion del escroto.

Pecho y tronco.—*Lancinaciones violentas*, en la parte superior del pecho.—Necesidad de respirar profundamente y de suspirar.—Prurito y nudosidades en las caderas.

196.—THUJA OCCIDENTALIS.

THUJ.—Tuya del Canadá.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 0, 30.—*Duracion de accion:* hasta 3 semanas en las afecciones crónicas.

ANTÍDOTOS: Camph. puls.?—*Se emplea como antídoto de*: *Thea* y *merc.*

COMPÁRESE CON: Asa. bry. cann. chin. cic. fer. led. lyc. mang. *merc. nitr-ac.* phos-ac. *puls.* sabin. seleo. *staph.*—Cuando el tuya será eficaz, es sobre todo despues de *nitr-ac.*, siempre que se halle indicado.—Despues del tuya, conviene algunas veces: *Nitr-ac. puls. staph.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que deberá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones reumáticas y artríticas; Herpes sifilíticos y chancros tenaces; *Afecciones sicósicas* (Condilomas); Verrugas; Viruelas; Fiebres intermitentes; Ozena?; Prosopalgia; *Ránula*; Cólicos por estrangulacion de los intestinos; Gonorrea; Cáncer de la matriz?; Verrugas de las manos en los onanistas, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

Digitized by Google

SINTOMAS GENERALES.—*Punzadas en los miembros y en las articulaciones.*—Chasquido en las articulaciones extendiendo la parte.—Hinchazon de las venas de la piel.—*Estremecimiento de algunos miembros y músculos.—*Dolores dislacerantes y pulsativos. como si las partes que padecen estuviesen ulceradas.—*Hinchazones inflamatorias con rubicundez.*—Padecimientos despues de haberse sofocado, haber bebido té, ó comido alimentos grasos ó cebolla.—Temblor de algunos miembros.—*Fácil adormecimiento de los miembros*, sobre todo *por la noche* despertándose.—**Los síntomas se agravan generalmente al despertarse ó despues del medio dia, ó en la noche hácia las tres de la mañana*; impiden volverse á dormir á primera hora de la noche.—**Muchos de los síntomas se agravan con el reposo, y por el calor, sobre todo el de la cama; se mejoran por el movimiento, el frio y la transpiracion.—**Muchos de los síntomas parecen manifestarse, principalmente del lado izquierdo.*—Rigidez y pesadez general en todo el cuerpo, sobre todo en las espaldas y en los muslos.—Debilidad física con integridad de las facultados morales.— Estremecimiento frecuente de la parte superior del cuerpo.—Ebullicion violenta de sangre por la tarde, con pulsacion en todas las arterias, agravada por el movimiento, aliviada estando sentado.—Temor al movimiento.—*Los síntomas tienen frecuentemente un carácter local, y aparecen por ataques; son reemplazados por padecimientos en diferentes partes; aparecen y desaparecen súbitamente.*

Piel.—Sensibilidad dolorosa de la piel.—*Punzadas pruritosas en la piel*, sobre todo al principio de la noche en la cama.—Granos purulentos como en la viruela.—Condilomas.—Forúnculos.—Sabañones.—Manchas rojas ó pardas, jaspeadas, en la piel.—*La mayor parte de los padecimientos cutáneos se alivian por el tacto.*

Sueño.—Mucha propension al sueño por la tarde.—**Desvelo* producido por una agitacion y calor seco.—Insomnio nocturno, con agitacion y frio del cuerpo.—*Sueño no reparador por la noche.*—En cuanto uno se duerme, **ensueños penosos, angustiosos* de peligros y de muerte, ó bien con sobresaltos y gritos, sobre todo *estando echado sobre el costado izquierdo.—Ensueños lascivos sin emision de esperma*, con erecciones dolorosas al despertarse.

Fiebre.—Calofrio con bostezo despues de media noche.—

Digitized by Google

Calofrio todas las mañanas sin sed.—Calofrio intenso con frio interior y exterior (y sed), seguido inmediatamente de sudor.—Calofrio todas las tardes (á las seis), con calor exterior, sequedad de la boca y sed.—*Calor por la tarde*, sobre todo *en la cara*.—Sudor al principio del sueño.

Moral.—**Abatimiento moral*.—Aprensiones angustiosas sobre el porvenir.—*Agitacion* que hace parecer todo penoso y repugnante.—*Está uno muy pensativo* por la menor bagatéla.—Disgusto de la vida.—Humor moroso y desapacible.—*Lentitud de la locucion* y de la reflexion; *se andan buscando las palabras cuando se habla*.—Incapacidad de reflexionar.

Cabeza.—Vacío en la cabeza, como en la embriaguez, sobre todo por la mañana, con náuseas.—Debilidad y embarazo en la cabeza como por *entorpecimiento ó parálisis del cerebro*.—Vértigo como si se estuviese columpiando.—*Vértigo levantándose del asiento y estando acostado*, ó bien mirando al aire.—*Dolores de cabeza por la mañana*, como despues de haberse bajado, ó despues de un sueño muy profundo, con rubicundez de la cara.—Cefalalgia sorda, con aturdimiento.—Cefalalgia que se agrava en bajándose, y se alivia moviendo la cabeza.—*Pesadez de la cabeza*, sobre todo *en el occipucio por la mañana al despertarse*, con mal humor y disgusto por la conversacion.—Cefalalgia como si la frente fuese á estallar, con calofrio interior, que se alivia andando al aire libre.—*Dolores de cabeza presivos*, con sacudidas en la frente y en las sienes.—Dolores de cabeza compresivos, sobre todo en las sienes.—*Dolor en la cabeza, como si hubiera un clavo introducido en el vértice*.—Dislaceracion semilateral en el sincipucio y la cara, hasta los pómulos, principalmente por la mañana y por la tarde.—Estremecimiento con dislaceracion en el occipucio.—Lancinaciones á través del cerebro.—*Congestion de sangre á la cabeza*.—Pulsacion en las sienes.—*Sensibilidad excesivamente dolorosa del lado izquierdo de la cabeza*, y aun de los cabellos por la noche estando acostado y al tacto.—Traccion presiva en los músculos de las sienes, sobre todo durante la masticacion.—Punzadas en las sienes.—*Hinchazon de las venas en las sienes*.—Prurito y corrosion en la piel del cráneo.

Ojos.—*Presion en los ojos*, y escozor como si un grano de

Digitized by

arena se hubiese introducido en ellos.—Dislaceracion en las cejas.—Punzadas en los ojos, á una viva claridad y al viento fuerte.—*Sensacion quemante en los ojos.*—*Esclerótica inflamada y de color rojo de sangre.*—*Hinchazon inflamatoria de los párpados*, con dureza.—Nudosidades rojas y dolorosas en los bordes de los párpados.—Granos purulentos y pruritosos entre las cejas.—°*Condilomas en las cejas.*—Sensacion de calor y de sequedad en los ángulos externos de los ojos.—Lagrimeo, sobre todo del ojo izquierdo, durante el tiempo que se anda al aire libre.—Aglutinacion nocturna de los párpados.—*Oscurecimiento de la vista*, leyendo, con sensacion de sueño.—Vista turbia, como á través de un velo.—*Miopia.*—Puntos negros que revolotean delante de la vista.

Oidos.—*Otalgia*, con fuerte compresion y *punzadas violentas*, sobre todo por la tarde.—*Dolores calambroideos al exterior del oido.*—Martilleo y *dislaceracion en el oido*, por la noche en la cama, con emision frecuente de orina, y frio en las piernas y en los piés.—Dolor presivo detrás de las orejas.

Nariz.—Hinchazon de las alas de la nariz, con dureza y tension.—Tension tractiva en los huesos de la nariz.—°*Costras* dolorosas *en la nariz.*—Mucosidad sanguinolenta.—*Epistaxis* frecuente, sobre todo despues de haberse acalorado.—*Coriza seca*, que se hace fluente al aire libre, con incomodidades de cabeza contínuas.—Coriza fluente, con tos y ronquera.—Flujo verdoso y fétido por la nariz.

Cara.—*Calor en la cara*, algunas veces solamente fugaz, ó bien con rubicundez ardiente.—Sudor del rostro.—Erupcion facial costrosa, pruritosa.—Nudosidades rojas y dolorosas en las sienes.—*Dolor facial terebrante y con sensacion como si escarbaran en los pómulos*, que se alivia por el tacto.—*Estremecimiento de los labios.*—Erupcion granulosa en los labios y en la barba.—Punzadas en la mandíbula inferior, que parecen volver á salir por los oidos.—Hinchazon de las glándulas submaxilares.

Dientes.—Odontalgia despues de haber bebido té, con dolor presivo hasta la mandíbula.—Odontalgia con tirantez aguda, sobre todo durante la masticacion.—*Corrosion en los dientes* (cariados), con sensibilidad dolorosa de todo el lado de la cabeza, agravándose mucho por el

Digitized by

contacto de las cosas frias ó por la masticacion.—Encías hinchadas con dolor de excoriacion.

Boca.—*Aftas en la boca*.—Considerable hinchazon de las glándulas salivales, con saliva muy abundante en la boca.—*Saliva sanguinolenta* ó amarga.—Dolor de excoriacion en la punta de la lengua al tacto.—Hinchazon de la lengua, dolorosa al tacto.—°*Ránula* de los dos lados de la lengua, trasparente, roja, azulada, gris y como gelatinosa.—*Lentitud en la pronunciacion*.

Garganta.—Aspereza y arañamiento en la garganta.—Presion y *dolor de excoriacion en la garganta* y el paladar, *durante la deglucion*.—Necesidad de tragar.—Punzadas en la faringe hasta los oidos.—Hinchazon de las amígdalas y de la garganta.—°Ulceras en la garganta y en la boca, á manera de chancros.—Ruido estrepitoso de mucosidades, y estas de color rojo de sangre.

Apetito.—*Gusto soso* y dulce *en la boca*, por la tarde y despues de la comida.—Sabor amargo del pan.—Los alimentos parece que no están bastante sazonados.—*Sed* solamente *por la noche y por la mañana*.—Deseo de bebidas y de alimentos frescos.—*Pronta saciedad* cuando se come.—Incomodidades despues de haber comido alimentos grasientos ó cebollas.—Despues de la comida, mucha pereza ó abatimiento, con angustia y palpitacion de corazon, ó fuerte timpanitis y padecimientos por el desarrollo de flatuosidades.

Estómago.—*Erutos de los alimentos*, despues de la comida.—*Erutos amargos* ó putridos.—Erutos rancios, sobre todo despues de los alimentos grasientos.—Náuseas y un malestar en la region del estómago.—Vómitos de serosidades acídulas y de alimentos.—Calambres en el estómago con exacerbacion excesiva hácia la tarde.—Presion en la boca del estómago despues de la comida, con dolor al tacto.—Latidos en la boca del estómago.—Angustia en la boca del estómago que sube á la cabeza.

Vientre.—Presion dolorosa en la region hepática.—*Presion en la region de los riñones*.—*Timpanitis*, frecuentemente con dolores contractivos y calambroídeos.—Tension constrictiva en el vientre.—*Dolores* presivos *en el bajo vientre*, sobre todo hácia el íleon (antes de la deposicion).—Sensacion de alguna cosa viva en el hipogastrio.—°*Dolor en el vientre como por estrangulacion de los in-*

Digitized by Google

testinos.—Ruido sordo y borborigmos en el vientre.—*Induracion en el bajo vientre*.—Dolor deprimente en las ingles.—Traccion en las ingles, andando y estando en pié, con punzadas á lo largo de los muslos sentándose.—**Hinchazon dolorosa de las glándulas de la ingle*, algunas veces con traccion hasta la rodilla.

Deposiciones.—**Estreñimiento que dura muchos dias*, algunas veces despues de las poluciones.—*Tenesmo con rigidez del miembro.—**Evacuacion dificil de una deposicion* dura, voluminosa y cubierta de sangre.—Evacuacion sanguinolenta con la deposicion.—*Contraccion dolorosa del ano*, durante la deposicion.—Sensacion de ardor en el ano y en el periné.—°*Condilomas en el ano*.—Dislaceracion á lo largo del recto.—°*Fistula del recto*.

Orinas.—*Necesidad frecuente de orinar con emision abundante* de una orina acuosa, aun por la noche.—Sedimento nebuloso en la orina.—Orina sanguinolenta.—Resudacion de la orina prolongada, despues de haber orinado.—*Sensacion como si una gota fluyese por la uretra* antes y fuera del acto de la emision de orinas.—*Sensacion ardiente de la uretra*, sobre todo por la mañana y durante el dia, así como tambien despues y *durante la emision de las orinas*.—Punzadas en la uretra, durante y fuera del tiempo de la emision de las orinas.—Escozor en las partes sexuales de la mujer durante la emision de orinas.—*Prurito en la uretra*.—*Flujo amarillento por la uretra con el miembro viril encorvado.

Partes genitales.—Sudor abundante de las partes genitales, sobre todo del escroto.—*Gonorrea bastarda*.—**Condilomas en el glande y en el prepucio, húmedas, pruritosas*, y que supuran sobre todo al creciente de la luna.—*Ulceras como chancros en el prepucio.—Hinchazon del prepucio.—Punzadas en el escroto, en el pene y á lo largo del cordon espermático hasta el ombligo.—Traccion en los testículos con retraccion de uno de ellos (el izquierdo).—**Erecciones dolorosas* contínuas, sobre todo *por la noche* y *por la mañana*, con lancinaciones en la uretra.—*Poluciones* con sensacion de estrechez en la uretra.—Flujo de licor prostático.—Flujo abundante y acuoso por el pene.

Reglas.—Prurito y escozor quemantes como por excoriacion, en las partes genitales.—Presion en las partes

genitales.—Dolor contractivo y calambroídeo en las partes genitales hasta el epigastrio.—Hinchazon y excoriacion de los labios de la vulva.—°*Verrugas en el orificio de la matriz*, con punzadas y sensacion quemante al orinar.—Menstruacion muy escasa.—Leucorrea.

Laringe.—*Ronquera* como por contraccion de la laringe.—°*Catarros bronquiales tenaces*.—Punzadas y *hormigueo en la tráquea-arteria*.—Tos por la mañana provocada por un cosquilleo en la tráquea-arteria.—*Tos provocada por un acaloramiento*.—**Expectoracion de pequeños glóbulos grises, amarillos, ó verdes al toser*.—*Tos, con expectoracion de mucosidades amarillas* y dolores en la boca del estómago despues de medio dia.

Pecho.—Dificultad de respirar, con mucha sed y considerable ansiedad.—Disnea con necesidad de respirar profundamente.—Opresion á veces en el costado izquierdo del pecho, otras en el hipocondrio izquierdo con irritacion que provoca la tos.—*Dolor en el pecho como por alguna adherencia interior*.—Presion en el pecho, algunas veces despues de la comida.—Agitacion y sensacion de hinchazon en el pecho.—**Lancinaciones en el pecho*, sobre todo *despues de haber bebido frio*.—Ebullicion de sangre en el pecho, y **palpitaciones de corazon violentas y sensibles al oido*, sobre todo *subiendo una escalera*.—**Palpitaciones de corazon con náuseas*.—**Sensibilidad dolorosa en la region del corazon*.—*Color azul de la piel, alrededor de las claviculas*.

Tronco.—Dolor de quebrantamiento y rigidez de los riñones, del dorso y de la nuca, sobre todo por la mañana despues de levantarse.—Tracciones en el dorso y en los riñones estando sentado.—Terebracion en el dorso.—Pulsacion en la espina dorsal.—*Forúnculos en el dorso*.—Inquietud en la nuca, el cuello y el pecho.—**Tension en la piel de la nuca en moviendo la cabeza*.—Hinchazon de las glándulas del cuello.—*Hinchazon de las venas del cuello*.—*Sudor abundante en los sobacos*.—Manchas oscuras debajo de los brazos como las de nacimiento.

Brazos.—**Latidos en la articulacion del hombro*.—**Dolor* de ulceracion, *dislacerante, pulsativo, desde el hombro* hasta la punta de los dedos.—Dolor de luxacion en la espalda y en los brazos, con chasquido.—*Traccion* como si es-

carbaran en los brazos, en los huesos ó en el periostio. — *Estremecimiento involuntario de los brazos por el dia.*— Sensacion de frio en los brazos por la noche.— *Lancinaciones en los brazos y en las articulaciones.*— Chasquido en la articulacion del codo extendiendo los brazos.— Manchas de un rojo jaspeado en el antebrazo.— Temblor de los brazos y en las manos al escribir.— Sensacion de sequedad en la piel de las manos.— *Sudor en las manos.*— *Las venas de las manos hinchadas.*— °*Verrugas en las manos.*— Frio, *torpeza y palidez de los dedos y de las puntas*, extendiéndose algunas veces hasta el antebrazo.— Hormigueo y punzadas en la punta de los dedos.— *Hinchazon roja y dolorosa de la punta de los dedos.*— *Los dolores de los brazos se agravan teniendo estos colgados ó al calor, y se mejoran por el movimiento, el frio y despues de la traspiracion.

Piernas. — Traccion en las piernas. — *Punzadas en las piernas y en las articulaciones.*— Debilidad excesiva y *laxitud en las piernas*, sobre todo subiendo una escalera — Pesadez y rigidez de las piernas al andar.—Sudor abundante en los muslos y en las partes genitales.— Prurito en los muslos.— Erupcion granulosa en las caderas, en los muslos y en las rodillas.— Ulceras en los muslos.— Chasquido en las articulaciones de las rodillas y de los piés, extendiendo estas partes.— Pústulas con supuracion, en las rodillas.— Nudosidades blancas; con prurito violento en los dedos de los piés.— *Hinchazon inflamatoria y roja de la punta de los dedos de los piés*, ó del empeine con dolor y tension, apoyándose sobre el pié y durante el movimiento.— Manchas de un color rojo jaspeado sobre el empeine.— Sudor en los piés, principalmente en los dedos.— *Sabañones* en los dedos de los piés.

197.— VALERIANA OFFICINALIS.

VALER.— Valeriana oficinal.— *Archivos de* STAPF.— *Hist. nat. y prep.* Farmac. homeopática.— *Dósis usadas*: 12, 30.— *Duracion de accion*: de 3 á 10 dias en algunos casos.

ANTÍDOTOS: Camph. coff.

COMPÁRESE CON: Arn. *bell.* cham. cocc. coff. con. ign. *merc.* n-vom. plat. puls. *stann.*

Digitized by Google

CLINICA.—Se ha empleado este medicamento contra algunos casos de *Fiebres intermitentes*, así como contra *Cefalalgias* y *Cólicos* en las personas *histéricas*.

SINTOMAS GENERALES.—*Dislaceracion reumática en los miembros*, generalmente al exterior de las articulaciones, *principalmente durante el reposo*, despues del movimiento, y lo mas frecuente es *aliviarse por el movimiento*, ó se trasforma por la marcha en otras sensaciones que afectan otras partes.—*Dolores con estremecimiento y conmocion, que aparecen súbitamente y por accesos.*—Dolores que se manifiestan cuando se está mucho tiempo en una posicion cualquiera, y se mejoran cambiando de posicion.—Traccion y estremecimiento en los miembros que parece sentirse en los huesos.—Dolor de parálisis en los miembros al concluir de dar un paseo.—Padecimientos periódicos que reaparecen á los dos ó tres meses.—Ataques de epilepsia.—Entorpecimiento paralítico de los miembros.—La mayor parte de los síntomas se manifiestan por la tarde despues de comer.—*Sobreexcitacion é irritabilidad morbosas*, generales, con laxitud en los miembros, mucha alegría y apariencia de vigor.—Cansancio sumo, sobre todo en los miembros inferiores, por la mañana despues de levantarse.—Erreccion de pequeñas nudosidades, al principio rojas y confluentes, despues blancas y duras.

Sueño.—*Insomnio.*—Sueño agitado, con anhelacion y ensueños angustiosos y confusos.

Fiebre.—*Fiebre con calor continuo*, despues de un corto calofrio, acompañado *de pesadez en la cabeza y de sed.*—Pulso acelerado.—*Sudor frecuente*, sobre todo en la cara y en la frente (que con frecuencia aparece repentinamente y se disipa de pronto).

Moral.—*Sensacion angustiosa, hipocondriaca*, como si todo lo que á uno le rodea estuviese desierto, le disgustase y le fuese desconocido.—*Sobreexcitacion alegre, temblorosa.*—Miedo por la tarde.—Desesperacion.—*Aparicion alternativa de sintomas morales los mas opuestos.*—*Excesiva volubilidad de ideas.*—Alucinaciones y errores del sentimiento en general.

Cabeza.—Cabeza atolondrada como por embriaguez.—

Embriaguez y aturdimiento con falta de ideas.—*Desvanecimiento de la cabeza inclinándose hácia adelante.—Cefalalgia que aparece repentinamente ó por accesos.—Cefalalgia presiva, ó con lancinaciones* presivas, *sobre todo en la frente, hácia las órbitas* que alternan frecuentemente con pesadez y aturdimiento de cabeza.—Dolor tractivo de *un* lado de la cabeza por una corriente de aire.—Contraccion con aturdimiento en la cabeza, como por un fuerte golpe sobre el vértice.—Sensacion de frio glacial en la parte superior de la cabeza por la presion del sombrero.

Ojos.—Ojos abatidos como despues de haber pasado toda la noche en un banquete, sobre todo despues de la comida.—Presion, sensacion de ardor y *escozor en los ojos.* —Rubicundez y *dolor de excoriacion en los bordes de los párpados.*—Hinchazon y sensibilidad dolorosa de los párpados.—*Miopia.*—En la oscuridad se ve claridad y *resplandor*, de modo que casi se divisan los objetos.—Se ven chispas.

Oidos.—Dientes.—Otalgia con traccion calambroídea.—Estremecimiento en los oidos.—Retintin y sonido como de campanas en los oidos.—Dolor facial con traccion calambroídea en los huesos de las mejillas.—Rubicundez y calor de las mejillas al aire libre.—Vesículas blancas en las mejillas y en el labio superior, dolorosas al tacto.—Odontalgia con dolor lancinante.

Apetito.—*Sabor en la boca* (y olor en la nariz) *como á sebo fétido.*—Sabor amargo en la punta de la lengua, pasándola por los labios despues de la comida.—Sabor soso y mucoso de la boca por la mañana despues de despertarse.—Bulimia con náuseas.

Estómago.—*Erutos con sabor á huevos podridos* por la mañana al despertarse.—Erutos frecuentes, en vacío, ó rancios y quemantes.—*Náuseas con propension al vómito* y sensacion como si hubiese un hilo desde la garganta hasta el vientre con acumulacion abundante de saliva. —Náuseas con desvanecimiento, labios blancos y frialdad del cuerpo.—*Vómito* de bílis y de mucosidades, con violento calofrio.—Vómito nocturno.—Debilidad del estómago y de la digestion.—*Presion en la boca del estómago* que aparece repentinamente en el vientre y se disipa luego por un ruido parecido al agua.

Vientre.—Dolores en la region hepática y en el epigas-

trio al tacto.—Sacudidas dolorosas en el hipocondrio derecho.—Lancinaciones en la region de los riñones al sentarse.—*Vientre timpanítico* y duro.—Fuerte sensacion de expansion en el vientre, como si fuera á estallar.—Propension á retraer el vientre.—*Calambres abdominales*, generalmente *por la noche en la cama*, ó despues de comer, los cuales en ninguna posicion se alivian.—Cólicos por hemorróides.—Retortijones y pellizcos dolorosos en el vientre, encogiéndose.—*Dolores de vientre por la tarde*, en el lado izquierdo, como por ulceracion subcutánea.—Traccion, presion y *dolores de contusion en el bajo vientre*, las ingles y los músculos abdominales, como despues de un resfriamiento ó de una luxacion de los riñones.—Dolores como si escarbaran en el vientre.

Deposiciones y orinas.—*Deposiciones diarréicas*.—Deposiciones verdosas, de la consistencia de papilla, mezcladas de sangre.—Terebraciones dolorosas en el recto.—Protorragia.—*Ascárides del recto*.—*Emision de orinas, abundante y frecuente*.

Pecho.—Dificultad de la respiracion y angustia en el pecho.—Opresion de la respiracion, con presion en la parte inferior del pecho.—*Lancinaciones en el pecho*, algunas veces *en el costado izquierdo* (en la region del corazon), al inspirar.—Erupcion de pequeñas nudosidades duras en la piel del pecho.

Tronco.—Dolor tractivo en los riñones y en el dorso.—*Dolores en la region lumbar, como despues de haber cogido un resfriado ó sufrido una derrengadura*.—Dolores reumáticos en los omóplatos.

Brazos.—Tracciones calambroídeas y estremecimiento, ó bien dolor de dislaceracion en los brazos.—Dolor paralítico en las articulaciones escapulares y del codo despues de un paseo moderado.—Erupcion de pequeñas nudosidades duras en los brazos.—Temblor de las manos al escribir.—Sacudidas dolorosas que atraviesan las manos.

Piernas.—Dolor ardiente en las caderas por la noche en la cama.—Traccion calambroídea y estremecimiento en los muslos.—Excesiva pesadez y laxitud en las piernas, pero sobre todo en las pantorrillas.—Dolores de quebrantamiento en los muslos y en la tibia.—Dolor paralítico en las rodillas despues de pasear.—Dolor tensivo en las

pantorrillas.—Dolor de dislaceracion en las pantorrillas, sobre todo cruzando las piernas.—Traccion en las articulaciones de los piés, sentándose.—Dolor de luxacion en las articulaciones de los piés y de los tobillos.—*Dolores* y punzadas *en los talones*, sobre todo estando sentado.—Dislaceracion en la planta y dedos de los piés.

198.—VERATRUM ALBUM.

VERATR.—Heléboro blanco.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas:* 12, 30.—*Duracion de accion*: 2 á 3 semanas en algunas enfermedades crónicas.

ANTÍDOTOS: Acon. *camph.* chin. coff.—*Se emplea como antídoto de*: Ars. chin. fer.

COMPÁRESE CON: *Acon. ars. arn.* bry. camph. caps. caus. *chin.* cic. *coff.* coloc. *cupr. dros. fer.* hell. *hyos.* ign. *ipec.* laur. lyc. magn-m. *merc.* mez. *op.* phos. *phos-ac.* puls. rhus. rut. sabad. sec. *sep.* sil. *spig. stram.* sulf. tart. zinc.—Sobre todo despues de: *Ars. chin. cupr. phos-ac.* es cuando el veratrum será mas eficaz siempre que se halle indicado.—Despues de veratrum conviene algunas veces: *Ars. arn. chin. cupr. ipec.*

CLINICA.—Guiándose por el *conjunto de síntomas*, se verá los casos en que deberá ser consultado este medicamento contra:—Afecciones crónicas por el abuso de la quina; Malas consecuencias de un miedo, de un susto ó de una contrariedad con arrebatos de cólera; Padecimientos reumáticos; Espasmos histéricos; Debilidad física y nerviosa, cuando es resultado de graves enfermedades agudas; Erupciones sarnosas; Fiebres gástricas; Fiebres intermitentes; Manía; Jaqueca; Cefalalgia nerviosa en las niñas y jóvenes histéricas; Ambliopia amaurótica; Odontalgias reumáticas y otras.—Hambre canina, aun á consecuencia de enfermedades agudas (en la convalecencia); *Cólera esporádico, asiático*; Dispepsia con vómito de los alimentos; Hematémesis; Diarreas de diferente naturaleza, aun las producidas por el uso de bebidas frias cuando se está acalorado; Estremecimiento tenaz; Dismenia de las jóvenes; Vómito y otros padecimientos gástricos de las embarazadas; Ninfomanía de las recien paridas; Fiebre puerperal; Hernias que salen en los niños por los esfuerzos del llanto; Coqueluche; Grippe, etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Accesos de dolores que provocan cada vez que se sufren el delirio y la demencia*, durante un corto espacio de tiempo.—Dolor tractivo en los miembros, sobre todo andando mucho.—*Dolor presivo como de rotura en los miembros*, los músculos y los huesos.—**Dolor paralítico en los miembros* como despues de una considerable fatiga ó de mucha extenuacion.—Dislaceraciones en los músculos extensores de las piernas estando sentado.—°*Dolores en los miembros, los cuales son insoportables con el calor del pecho*, los que se alivian levantándose, *y se disipan completamente paseándose*, apareciendo generalmente hácia las cuatro ó cinco de la madrugada.—°Dolores en los miembros que se agravan en la primavera, en otoño, por un mal temporal, por el frio y por la humedad.—Dolores que se agravan con oir hablar.—Relajacion de los músculos.—Adormecimiento de los miembros.—Rigidez de los miembros, principalmente por la mañana y despues de un paseo.—*Temblor de los miembros.*—Punzadas en los miembros como por chispas eléctricas.—Accesos de calambres y *movimientos convulsivos en los miembros.*—°Accesos de espasmos con trismus, pérdida del sentido y del movimiento, y estremecimiento convulsivo de los ojos y de los párpados; antes de los accesos angustia, desaliento y desesperacion.—(Ataques de epilepsia).—Espasmos tónicos, algunas veces con contraccion de la palma de las manos y la planta de los piés.—*Muchos síntomas se renuevan cuando uno se levanta, y se mitigan cuando se acuesta.—**Postracion súbita de las fuerzas*, *general* y paralítica.—**Excesiva debilidad crónica*, que no permite ni estar sentado, ni acostado, ó bien es provocada por el menor movimiento.—Vacila al andar.—**Accesos de desvanecimiento*, algunas veces aun al mas pequeño movimiento.—*Enflaquecimiento general.*—Hormigueo en todo el cuerpo hasta la punta de los dedos de las manos y de los piés.—Es súmamente impresionado por el aire libre.

Piel.—Erupciones miliares que pican con el calor y queman despues de haberse rascado.—Erupciones urticarias.—**Erupciones secas parecidas á la sarna*, con prurito nocturno.—Herpes secos.—Descamacion del epidermis.—**Piel lácia y sin elasticidad.*—°Color blanquecino de la piel.

Sueño.—*Entorpecimiento soñoliento ó coma vigil*, con conocimiento incompleto, sobresaltos con espanto y ojos medio abiertos, cerrados de un solo lado.—*Insomnio nocturno con fuerte angustia.*—Sueño muy profundo.—Al dormir tiene los brazos colocados por encima de la cabeza.—*Sueños angustiosos.*—Gemidos durante el sueño.

Fiebre.—*°Frio general y sudores frios viscosos*, sobre todo en la frente.—Horripilacion y calofrio con deseo de agua fria.—Horripilacion y carne como de gallina despues de haber bebido.—*°Fiebre con frio solamente al exterior.*—°Violento *calofrio* (seguido de calor y de sed moderada). *despues sudor* que pronto se transforma en frio.—*°Calofrio* al principio *con mucha sed*, seguido de calofrio que alterna con calor, despues *calor permanente con sed.*—*Fiebre solamente con calor interior, y orina oscura, ó °con vómito y diarrea, ó con estreñimiento.—Vértigo, náuseas y dolores en los riñones y en el dorso °durante el calofrio.—*Durante el calor somnolencia contínua, ó delirio *con rubicundez de la cara.—*°Fiebre antes de media noche* ó por la mañana, cotidiana, terciana ó cuartana.—*°Pulso lento* y casi extinguido ó pequeño, acelerado é intermitente.—*Sudor fácil de provocar por el dia*, al menor movimiento.

Moral.—Abatimiento melancólico, tristeza y necesidad de llorar.—Afliccion inconsolable con gemidos y gritos por desgracias imaginarias.—**Angustia excesiva é inquietud con aprensiones y perturbacion de la conciencia*, sobre todo *por la noche* ó por la mañana, tambien con frecuencia cada vez que se levanta del asiento ó de la cama.—*Mucha disposicion á asustarse y carácter perezoso.*—*Angustia mortal.—*Desaliento y desesperacion.—*Agitacion expresada por un continuo movimiento*, con mucha disposicion al trabajo.—*Propension á enfadarse* por el mas pequeño motivo, frecuentemente seguido de ansiedad y palpitacion de corazon.—*Mucha disposicion al silencio*, con injurias á la menor provocacion.—Disposicion á ocuparse de los defectos de otro.—Alegria inmoderada y locuacidad.—*Furor* con gana de morderse, de desgarrarlo todo y de fugarse.—Pérdida de la memoria.—*Falta de ideas.*—Pérdida de los sentidos.—**Enajenacion mental y demencia* con cánticos, silbidos, risas, necesidad de correr de un lado á otro, ideas y acciones extravagantes y orgullo-

sas, ó bien disposicion á decir que está atacado de afecciones en realidad inverosímiles y enteramente ficticias. —*Accesos de enajenacion erótica ó religiosa.—*Delirios violentos.

Cabeza.—Embarazo en la cabeza como si todo lo que contiene estuviera movedizo, sobre todo por la mañana. —Embotamiento de todos los sentidos.—*Vértigo rotatorio.* —Embriaguez y aturdimiento.—**Accesos de dolores de cabeza, con palidez del rostro, náuseas y vómitos.—Dolores de cabeza con rigidez dolorosa de la nuca.*—Cefalalgia con emision de orina.—Dolores de cabeza por accesos, como *si el cerebro estuviera contundido ó dislacerado.—*Cefalalgia presiva*, sobre todo en el vértice, *ó bien semilateral*, con dolor de estómago.—Dolor constrictivo en la cabeza (y en la faringe).—Dolor incisivo en el vértice.—Sacudidas en la cabeza con estremecimiento en los brazos y palidez de los dedos.—Fuerte congestion de sangre á la cabeza, bajándose.—*Dolores de cabeza pulsativos.—*Dolor permanente en el cerebro.*—Sensacion de frio y de calor al exterior de la cabeza, con **sensibilidad dolorosa de los cabellos.*—*Frio en el vértice, como si hubiera hielo sobre él. —**Sudor frio en la frente.*

Ojos.—*Dolores en los ojos*, como si el globo estuviera contundido.—*Dislaceracion dolorosa ó compresion en los ojos.*—*Ardor* permanente *en los ojos.*—Rubicundez de los ojos. —*Inflamacion dolorosa de los ojos, sobre todo del derecho*, y á veces con dolores de cabeza violentos é insomnio nocturno.—Ojos empañados, turbios, amarillentos.—Color azul de los ojos.—Ojos lagrimosos y como cubiertos de clara de huevo.—*Sequedad escesiva de los párpados.—Lagrimeo abundante*, frecuentemente con ardor, dolores incisivos y con sensacion de sequedad en los ojos.—Aglutinacion de los párpados durante el sueño.—*Parálisis de los párpados.*—Ojos convulsos, prominentes.—*Pupilas fuertemente contraidas ó dilatadas* de una manera sensible. —Pérdida de la vista.—Diplopia.—**Ceguera nocturna.*—Chispas y manchas negras delante de los ojos, sobre todo levantándose del asiento ó de la cama.

Oidos.—Punzadas en los oidos.—Presion y cerramiento en los oidos.—Sensacion de frio y calor alternativos en los oidos.—*Sordera* como por obturacion de los oidos.—Ruido en los oidos sobre todo al levantarse del asiento.

Nariz.—*Frio glacial en la nariz.—Inflamacion y dolor de ulceracion en lo interior de la nariz.—Dolor contractivo y deprimente en los huesos de la nariz.—Epistaxis nocturna y por una sola nariz.— Olor á estiércol en la nariz.—*Sensacion de sequedad* penosa *en la nariz.*—Estornudo violento y frecuente.—Coriza.

Cara.—**Rostro frio, pálido, hipocrático, macilento, con nariz afilada* y ojeras azules.—Rostro azulado.—°Color amarillento de la cara.—°Rubicundez de una de las mejillas con palidez de la otra.—*Rubicundez y palidez alternativas de la cara.—Rubicundez de la cara cuando se está echado, y palidez incorporándose.—**Calor quemante, rubicundez oscura* y sudor *en el rostro.*—°*Sudor frio en la cara.*—*Dolores faciales* tractivos y tensivos en un solo lado y que se extienden hasta la oreja.—Estremecimiento y pellizcos en los músculos de la cara.—Pústulas en la cara con dolor de excoriacion al tacto.—Acné rosa en la cara.—Erupcion miliar en las mejillas.—Abotagamiento de la cara.—**Labios secos, negruzcos y con grietas.*—Erupcion en las comisuras de los labios.—Acné rosa alrededor de la boca y de la barba.—**Calambre en la mandibula.*—Dolor é hinchazon de las glándulas submaxilares.

Dientes.—Odontalgia con dolores de cabeza y rostro encendido, tumefacto.—**Odontalgia* (algunas veces pulsativa), *con tumefaccion de la cara, sudor frio en la frente, náuseas y vómitos*, cansancio sumo y frio en todo el cuerpo, postracion de fuerzas hasta el desfallecimiento, calor interior y sed inextinguible.—Presion y sensacion de pesadez excesiva en los dientes con tirantez durante la masticacion, aun de los alimentos blandos.—*Rechinamiento de dientes.*—Vacilacion de los dientes.

Boca.—*Boca seca* y pastosa.—*Salivacion* con náuseas ó con sabor ácre ó salado.—*Espuma en la boca.*—Sensacion de frio ó *sensacion de ardor en la boca y en la lengua.*—Inflamacion del interior de la boca.—°*Lengua seca, negruzca, hendida*, ó roja y abultada.—°Lengua cubierta de una costra amarilla.—Balbuceo.—*Mutismo.*—Sensacion de torpeza y excesiva sequedad del paladar.

Garganta.—*Ligera irritacion de garganta con dolor constrictivo* de estrangulacion, sobre todo durante la deglucion.—*Estrechez de la faringe*, como por una hinchazon presiva.—Tumefaccion de la faringe con peligro de sofoca-

Digitized by Google

cion.—Sensacion de frio ó *de ardor en la cara posterior de la boca y de la faringe.*—Sequedad en la garganta que no se apacigua con ninguna clase de bebida.—Aspereza y arañamiento en la garganta.

Apetito.—*Insipidez* de la saliva.—*Gusto amargo*, bilioso, *en la boca.—Gusto pútrido en la boca*, como de estiércol, herbáceo.—Gusto fresco ó picante en la boca y en la garganta.—**Sed* inextinguible, principalmente *con deseo de bebidas frias.*—Apetito y deseo de alimentos, aun en el intervalo de los vómitos y de las evacuaciones alvinas.—Hambre ardiente y voraz.—**Bulimia.*—**Deseo ardiente y continuo de ácidos y de cosas frescas* (frutas).—*Repugnancia á los alimentos calientes.*—°*Por poco que se coma, vómitos y diarrea.*—°*En comiendo, náuseas con hambre y presion en el estómago.*—°*Despues de la comida, hipo, conato al vómito, y regurgitacion de serosidades amargas.*

Estómago.—Eructos con sabor á los alimentos.—*Eructos violentos en vacio*, aun despues de la comida.—*Eructos amargos*, ó ácidos.—Hipo frecuente y violento.—*Náuseas muy fuertes con gana de vomitar, frecuentemente hasta el punto de caer en desvanecimiento*, y generalmente *con excesiva sed.*—**Náuseas frecuentes y continuas*, aun por la mañana.—Vomituricion como de pituitas.—**Vómitos violentos con náuseas continuas, mucho abatimiento y necesidad de acostarse*, precedido de manos frias con horripilacion de todo el cuerpo, acompañada de calor general y seguida de ebullicion de sangre y de calor en las manos.—**Vómito de los alimentos.*—*Vómito amargo ó ágrio.—**Vómito espumoso de mucosidades verdes*, amarillentas ó blancas.—Vómito de mucosidades por la noche.—*Vómito de bilis negra y de sangre.*—**Vómito* continuo, *con diarrea* y presion en la boca del estómago.—**La menor gota de liquido y el mas ligero movimiento provocan vómitos.*—Al vomitar contraccion dolorosa del vientre.—Dolor de estómago con hambre y sed ardiente.—**Excesiva sensibilidad de la region del estómago y de la boca de este.*—Ansiedad excesiva en la boca del estómago.—Sensacion de vacío y de malestar en el estómago.—Calambres de estómago.—*Presion en la boca del estómago,* extendiéndose algunas veces hasta el esternon, los hipocondrios y el bajo vientre, sobre todo despues de la comida.—**Sensacion de ardor en la boca del estómago.*—Inflamacion del estómago.

Digitized by Google

Vientre.—Cólicos en la region umbilical.—°*Mucha sensibilidad, dolorosa, del vientre al tacto.*—Dolores nocturnos en el vientre, con insomnio.—Timpanitis.—°Vientre duro y timpanizado.—Tension en los hipocondrios y en la region umbilical.—**Calambres abdominales y cólicos.*—Dolores en el vientre presivos, tractivos por la tarde andando.—*Retortijones como si cortasen con cuchillos*, acompañados de diarrea y de sed con diuresis.—**Sensacion de ardor en toda la extension del vientre*, como por carbones encendidos.—Dolor de contusion en las vísceras.—Inflamacion de los intestinos.—*Hernia inguinal.*—**Cólico gaseoso*, con gorgoteo ruidoso y borborigmos en el vientre.—Cuanto mas tiempo haya necesidad de expeler los gases, tanto mas difícil es su expulsion.—Expulsion violenta de gases superior é inferiormente.

Deposiciones.—**Constipacion*, algunas veces *tenaz*, por lo regular por inactividad del recto, y frecuentemente acompañada de calor y de dolores de cabeza.—Retraccion del vientre.—Deposiciones duras de una forma muy voluminosa.—**Diarreas violentas y dolorosas*, ó totalmente sin dolor, frecuentemente con tension del vientre precedidas y seguidas de *retortijones*.—Diarreas de materias ácres con sensacion de ardor en el ano.—Diarreas nocturnas.—**Deposiciones diarréicas, negruzcas, verdosas, morenas.*—Deposiciones diarréicas sanguinolentas.—*Deposicion inadvertida, líquida* al expeler gases.—*Durante la deposicion, mucha laxitud, calofrios con horripilacion, palidez del rostro, sudor frio en la frente y ansiedad con temor de ser atacado de una apoplejía.—Sensacion de ardor en el ano durante la evacuacion de vientre.—Dolor de excoriacion en el ano.—Presion hácia el ano con hemorróides ciegas.—Síntomas verminosos.

Orinas.—Retencion de orina.—Conato de orinar mientras la vejiga está vacía, como si la uretra estuviera estrangulada por detrás del glande.—Orina muy rara, amarilla y ya turbia desde que se expele.—*Emision de orina* con hambre y sed excesivas, dolores de cabeza, náuseas con conatos al vómito, cólicos, dureza de las deposiciones y coriza.—*Flujo involuntario de orina.*—Orina ácre.—*Orina oscura y verdosa.*—Dolor presivo en la vejiga y *sensacion de ardor al orinar.*

Partes genitales.—Sensibilidad excesiva de las partes

genitales.—Excoriacion del prepucio.—Tracciones en los testículos.—*Reglas muy adelantadas y abundantes.—Supresion de las reglas.*—Antes de las reglas, *dolores de cabeza*, vértigo, epistaxis y sudor nocturno.—°Al principio de las reglas, diarrea, náuseas y calofrios.—Durante las reglas, dolores de cabeza por la mañana con náuseas y propension al vómito, zumbido de oidos, sed ardiente y dolores en los miembros.—Hácia el fin de las reglas, rechinamiento de dientes y rostro azulado.—°Reglas suprimidas, con delirio.

Laringe.—°*Espasmos en la laringe.*—Estertor mucoso con aspereza y cosquilleo en la faringe.—*Tos provocada por un cosquilleo profundo en los bronquios*, con expectoracion fácil, ó bien seca.—°*Tos violenta con regurgitacion continua como si se fuese á vomitar.*—*Tos por la tarde* con salivacion.—*Tos seca*, ardiente, generalmente *por la tarde* y por la mañana.—*Tos con dolor en el costado*, debilidad y dificultad en la respiracion.—*Tos hueca, profunda*, como procedente del vientre, con dolores incisivos en el abdómen.—°*Al toser lancinaciones hácia el anillo inguinal.*—°*Tos semejante á la coqueluche, con vómitos.*—°*Entrando en una habitacion caliente, tos con expectoracion amarillenta* seguida de dolor contusivo en el pecho.—Tos con expectoracion abundante.

Pecho.—*Dificultad de la respiracion*, con frecuencia hasta el punto de sofocar, producida generalmente por una *constriccion* espasmódica *de la garganta ó del pecho.*—Respiracion corta al menor movimiento.—*Disnea y dificultad de la respiracion*, aun estando sentado.—*Pecho muy oprimido*, con dolor en el costado al respirar.—*Presion en el pecho*, sobre todo *en la region del esternon*, y principalmente despues de haber bebido ó comido.—Sensacion de plenitud en el pecho que obliga á erutar contínuamente.—Compresion en el pecho, sobre todo despues de haber bebido.—*Calambre en el pecho con constriccion dolorosa.*—Contraccion espasmódica de los músculos del pecho.—Dolor incisivo en el pecho.—Punzadas por accesos en el pecho con sofocacion de la respiracion.—*Palpitaciones de corazon violentas, que elevan las costillas*, con sofocacion y *accesos de angustia excesiva.*

Tronco.—°*Dolor de quebrantamiento en el dorso y en los riñones*, °con presion tractiva, sobre todo en bajándose ó

Digitized by Google

estirándose.—Apretamiento entre los omóplatos.—Rigidez reumática de la nuca con vértigo, cuando se hacen movimientos con esta.—*Debilidad paralítica de los músculos del cuello*, los que no pueden sostener el peso de la cabeza.

Brazos.—*Dolor como de quebrantamiento paralítico en los brazos*, desde la articulacion escapular hasta la muñeca.—Estremecimiento en los brazos.—Frialdad con sensacion de plenitud y de hinchazon en los brazos.—Sensacion contínua de adormecimiento en los brazos.—Temblor de los brazos al coger algun objeto.—Conmocion en el codo como por chispas eléctricas.—Herpe seco en las manos.—Hormigueo en las manos y en los dedos.—Adormecimiento y palidez de los dedos.—**Frio glacial de las manos*.—**Tirantez y calambres en los dedos*.

Piernas.—Parálisis de la articulacion coxo-femoral con dificultad para andar.—*Dolor de quebrantamiento paralítico en las piernas*.—Dislaceracion artrítica y tracciones en las piernas y en los piés.—Sensacion contínua de adormecimiento en las piernas.—Tension en los tendones de la corva, como si fuesen demasiado cortos.—Dolor como de rotura en las rodillas, bajando una escalera.—Conmocion en la rodilla como por chispas eléctricas.—Pesadez excesiva y dolorosa de las rodillas, las piernas y los piés, con dificultad para andar.—**Violentos calambres en las pantorrillas y en los piés*.—Hinchazon rápida de los piés.—**Frio glacial en los piés*.—Temblor de los piés con frio como si circulara por los vasos agua fria.—*Punzadas en los dedos (pulgares) de los piés* — Rota dolorosa en los piés.—Lancinaciones y dolor de excoriacion en los callos de los piés.

199.—VERATRUM LUTEUM.

VERATR-LUT. — *Helonias diŏica*, Heléboro amarillo.—Véase HALE, *Remedios americanos*.

Para los homeópatas alopatizantes, que no eligen sus medicamentos sino segun las recomendaciones *conjeturales* de algunos autores, debe servirles de contento tener en esta sustancia una más que añadir á su formulario empi-

rico. Pero para los verdaderos homeópatas, que quieren obrar segun las indicaciones seguras y positivas, esta sustancia es hoy todavía como si no existiese, en atencion á que su *llamada* patogenesia está consignada en términos de tal suerte vagos, que las enseñanzas que nos dan las farmacodinamias de la antigua escuela sobre sus efectos, son las únicas indicaciones que tenemos de ella.—Con todo, y puesto que los lectores que están en la mas completa ignorancia de lo que la homeopatía trasatlántica nos ha suministrado realmente de ella, nos demandan la insercion de este medicamento en nuestro MANUAL, les diremos que aun, segun HALE, no se ha recomendado hasta aquí sino contra las afecciones siguientes: *Diabetes sacarina* (en la que se dice que disminuye el azúcar en el espacio de pocos dias, asociándolo á la quinina y al aceite de hígado de bacalao); *anemia* y *atonía* generales; *albuminuria*; estado lánguido de las partes sexuales de la mujer; *amenorrea*, *dismenorrea*, *metrorragia*, *descenso de la matriz*, y otras debilidades de las partes genitales femeninas.

200.—VERATRUM VIRIDE.

VERATR.-VIR.—Heléboro verde.—Véase HALE, *Remedios americanos*.

Esta sustancia, que no parece diferenciarse mucho del *Veratrum Album*, ha sido usada hasta aquí con bastante éxito contra: *Convulsiones* de diferentes naturalezas; *Opistótonos*; *Epilepsia*; *Eclampsias* puerperales, con delirios furiosos y sudor frio, viscoso; ó con grande sobreexcitacion del sistema vascular, alternando hasta con la manía; *Reumatismos*, sobre todo en la escápula izquierda, cadera y rodilla; *Endocarditis reumatismal*; *Pericarditis*, con desfallecimiento, al levantarse de la posicion acostada y al andar; *Pneumonía* incipiente con pulso duro, lleno y frecuente, ó bien regularmente intermitente, y sensacion de debilidad ó desfallecimiento en la boca del estómago.

---

201. — VERBASCUM.

VERB.—Gordolobo.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 50.—*Duracion de accion*: 4 á 5 dias.
ANTÍDOTO: Camph.?
COMPÁRESE CON: Plat. s. ann.

CLINICA.—Se verá los casos en que este medicamento podrá ser consultado contra *las toses catarrales*, sobre todo *en los niños*, única afeccion en la cual se ha empleado hasta ahora.

SINTOMAS GENERALES.—Pereza general y propension al sueño, por la mañana, despues de levantarse.—*Pandiculacion* y bostezos frecuentes.—*Dislaceraciones*, algunas veces lancinantes, en diferentes partes.—Vacilacion al andar.—*Mucha disposicion al sueño despues de la comida.*—Sueño agitado por la noche, con fatiga.—Sueño corto por la noche, solamente hasta las cuatro de la mañana, con desvelos ansiosos y horribles de guerras y de cadáveres.—*Frio en todo el cuerpo*, sensible aun al exterior, en las manos y en los piés.—Horripilacion, sobre todo en un lado del cuerpo, como si se estuviese inundado de agua fria.—Apatía.—Morosidad, mal humor y carácter irascible.—Alegría con risas.—Sobreexcitacion moral, con imágenes voluptuosas.—Debilidad de la memoria.—Distraccion.—Afluencia de ideas y de visiones.

Cabeza.—Atontamiento y pesadez en la cabeza.—*Accesos de vértigo* como por una presion en la cabeza ú oprimiendo *una* mejilla.—Cefalalgia como si todo el contenido en la cabeza quisiera salir por la frente.—*Dolores de cabeza presivos*, con *aturdimiento*, principalmente *en la frente* ó semilaterales y con particularidad pasando del calor al frio.—Pesadez de la cabeza con dolor sordo.—Pellizcos en las sienes.—Punzadas con aturdimiento en las sienes.—Resonancia en la cabeza al andar.

Ojos.—Oidos.—Dolores en los ojos como por contraccion de los oidos, con ardor en los ojos.—Vista turbia como á través de un velo.—*Dislaceracion en los oidos* con lancinaciones, algunas veces comiendo.—Sensacion como si

Digitized by

el oido se retrajese ó estrechase.—*Sordera* como si alguna cosa obstruyese el oido.—Sensacion de obturacion de los oidos leyendo en alta voz.

Cara.—Dientes.—*Neuralgia facial*, generalmente con dolores *que causan aturdimiento*, *presivos ó tensivos*, principalmente *en los pómulos* y partiendo de la *articulacion de la mandíbula*, se agrava apretando los dientes y por la presion exterior.—Lancinaciones en los pómulos con presion sorda.—Mucha tension en los tegumentos de la barba y de los músculos maseteros.—Odontalgia con dolor dislacerante en las muelas.

Boca.—Apetito.—Acumulacion abundante de saliva en la boca.—Lengua amarilla, pardusca, cubierta de mucosidades viscosas por la mañana y despues de comer.—Sabor soso con exhalacion pulmonar fétida.—Hambre con repugnancia á los alimentos.—Sed inextinguible.

Estómago.—Regurgitacion de serosidades insípidas.—*Erutos á vacío*, ó amargos, con propension al vómito.—Hipo frecuente.—Presion en el estómago.—Sensacion de vacío en la boca del estómago que se disipa por gorgoteos.—Gorgoteos frecuentes debajo de las costillas del lado izquierdo.—Retortijones y punzadas en el hipocondrio izquierdo.

Vientre.—Timpanitis.—*Presion fuerte* y dolorosa *sobre el ombligo como por una piedra*, que se alivia encorvándose.—Constriccion calambroídea en el bajo vientre, hácia la region umbilical.—Dolores de vientre que se extienden profunda é interiormente hácia abajo con gana de defecar y contraccion espasmódica del ano.—Pellizcos y retortijones en el vientre.—*Punzadas en el vientre*, principalmente en la region umbilical, algunas veces dislacerantes, que se dirigen hácia la parte inferior.—Sensacion como si los intestinos estuviesen adheridos á la region umbilical y que se tratara de arrancarlos.

Deposiciones y orinas.—Cámaras suprimidas.—Deposiciones duras, caprinas y con esfuerzos.—*Necesidad frecuente de orinar con emision abundante.—Poluciones.*

Laringe.—°Sensacion de obturacion en la laringe y la nariz, con °*ronquera* leyendo en alta voz.—°*Catarro con ronquera y estertor mucoso.*—°*Tos*, sobre todo *por la tarde* y *por la noche*, en durmiendo, generalmente *áspera y seca*, ó *hueca* y *sorda.*

Pecho.—Tronco.—*Punzadas en el pecho*, algunas veces con opresion y ahogo en la respiracion.—Tension en el pecho con lancinaciones en la region del corazon por la noche despues de acostado.—Lancinaciones en el dorso y en los omóplatos.—Nudosidad roja, cerca del cartílago xifóides, dolorosa comprimiéndola.

Extremidades.—Dislaceracion en el hombro, en el dorso de la mano y en el codo.—Presion calambroídea en el antebrazo, la mano y el pulgar.—*Punzadas* dislacerantes *en la mano* y *en los dedos*.—Dolor tensivo en la muñeca.—Dolor de luxacion en la articulacion de la mano.—Dolor paralítico en las articulaciones de los dedos.—Pesadez excesiva y laxitud en las piernas y en los piés, sobre todo en subiendo escaleras.—Presion calambroídea en los muslos, las piernas y la planta de los piés.—Temblor en las rodillas.—Lancinaciones sordas en la rótula, en los huesos y en los dedos de los piés.—Dislaceracion á lo largo de las piernas.

202.—VIOLA ODORATA.

VIOL.-OD.—Violeta de marzo.—*Archivos de* STAPF.—*Hist. nat. y prep.*—Farmac. homeop.—*Dósis usadas*: 9, 30.—*Duracion de accion*: 2 á 4 dias.
ANTÍDOTO: Camph.

CLINICA.—Hasta ahora no se ha empleado este medicamento sino contra padecimientos *histéricos*.

SINTOMAS GENERALES.—Relajacion de todos los músculos.—Dolores tractivos en los miembros.—Dolor de quebrantamiento en todas las articulaciones por la mañana al despertarse.—Temblor en los miembros.—Sensacion de ardor y calor fugaz en diversas partes.—Los padecimientos son suaves, mas sin embargo muy distintos y subsisten en todas posiciones sin cambiarse.—Bostezos todas las mañanas sin lagrimeo.—Está acostado sobre el dorso por la noche, durante el sueño con la mano izquierda pasada por encima de la cabeza y las rodillas dobladas.—Horripilacion febril.—Sudor nocturno.—Melancolía sombría, y tristeza.—*Humor triste, con llan-*

Digitized by Google

tos continuos, sin que se sepa por qué.—Repugnancia á la conversacion.—*Excesiva debilidad de la memoria*, y olvido.—*Mucha afluencia de ideas*, *estas volubles é incompletas*.—Perspicacia notable y considerable actividad del cerebro.—*Predominio de la inteligencia sobre los sentimientos del corazon.*

Cabeza.—Aturdimiento sordo y doloroso en la cabeza.—*Vértigo rotatorio*, aun estando sentado.—Cefalalgia á veces con calambres en los ojos y círculos luminosos delante de la vista.—Pesadez de cabeza con sensacion de debilidad en los músculos de la nuca.—Congestion de sangre á la cabeza, con picotazos en el sincipucio.—*Tension en los tegumentos de la cabeza* que se extiende hasta la cara, la nariz y las orejas, precisando algunas veces á fruncir las cejas.—Ardor en la frente.

Ojos.—Calambre en los párpados.—*Los ojos se cierran* como por somnolencia.—Pesadez de los párpados.—Sensacion como si el globo del ojo estuviese comprimido.—Ardor y sensacion de ardor en los ojos.—Miopia.—Se ven chispas.

Oidos.—*Punzadas en los oidos.*—Aversion á toda especie de música, principalmente á la de violon.—Ruido confuso y retintin en los oidos.

Nariz.—Deposiciones.—Torpeza en la punta de la nariz como si en ella se hubiera recibido un golpe.—Dolor fácial con presion tractiva en los pómulos.—*Tension en los tegumentos de la cara*, sobre todo por debajo de los ojos.—Dislaceracion en la mandíbula inferior que se dirige hácia el oido.—Otalgia con dolor dislacerante en los dientes inferiores.—Estreñimiento con deseos inútiles de deponer.—Poluciones seguidas de dolores de cabeza.

Laringe.—Extremidades.—Respiracion difícil y apenas sensible con expiracion dolorosa, angustia excesiva y palpitaciones de corazon violentas.—Respiracion corta.—*Mucha opresion de pecho y disnea*, con presion sobre el pecho como por una piedra.—Tension en los músculos del cuello.—Dolor tractivo en la articulacion del codo y en el dorso de la mano.—Dolor presivo en la muñeca.

203.—VIOLA TRICOLOR.

VIOL.-TR.—Pensamiento.—*Archivos de* STAPF.— *Hist. nat. y prep.* Farmacopea homeop.— *Dósis usadas*: 9, 30.—*Duracion de accion*: 8 á 15 dias.
ANTÍDOTOS: Camph.

CLINICA.—Hasta ahora no se ha usado este medicamento mas que en algunos casos de *Costras de leche*.

SINTOMAS GENERALES.—Acabamiento, algunas veces como si no se hubiese dormido bastante.—Dolores lancinantes en los miembros.—Erupcion miliar sobre todo el cuerpo, con sensacion lancinante, como que corroe.—*Gana de dormir despues de medio dia.*—Sueño agitado, con despertar frecuente.—Sueño tardío por afluencia de ideas, con dificultad de despertarse por la mañana.—*Ensueños vivos y eróticos.*—Estremecimiento de las manos y retraccion de los pulgares, al dormir, con rubicundez de la cara y calor seco general.—Disposicion al frio y frio al aire libre.—Sudores nocturnos.—Tristeza sobre sus quehaceres domésticos.—Precipitacion, como por una angustia interna, con sensacion de gran debilidad.—Gana de llorar, *mal humor*, *morosidad*, con alejamiento por la conversacion.—Fuerte susceptibilidad y humor querelloso.—Desobediencia.—Alejamiento para el trabajo.

Cabeza.—Cabeza atormentada y embarazada.—Vértigo y aturdimiento al marchar.—Cefalalgia, desde la raiz de la nariz hasta el cerebro, que se disipa al aire libre.—Pesadez de la cabeza, que la inclina hácia atrás, principalmente al enderezarse y con alivio al bajarse.—*Cefalalgia presiva*, sobre todo en la frente y las sienes.—Punzadas en el occipucio, dia y noche.—Conmocion del cerebro al andar.

Ojos.—Dolor en los ojos, como si un cuerpo duro se encontrase entre el párpado superior y el globo del ojo.—Picazon y punzadas incisivas en el ojo.—*Contraccion y oclusion de los párpados*, con ganas de dormir.—Miopia).

Digitized by Google

Cara.—Calor de la cara, por la noche; en la cama, algunas veces semilateral, en la mejilla sobre la que se ha estado acostado.—Piel densa y dura en la cara.—*Costras en la cara, con prurito quemante, sobre todo por la noche y exudacion de un pus amarillo y viscoso.—*Tirantez en los tegumentos de la cara y la frente.*—Dolor de garganta, por la tarde.—Lengua cargada de mucosidades blanquecinas, con gusto amargo.—Acumulacion de saliva en la boca, con sensacion de sequedad.

Estómago.—Pérdida del apetito é insipidez de los alimentos.—Despues de comer, calor general, sobre todo en la cara (con sudor), opresion de pecho y grande angustia, que no permite permanecer en un sitio.—Náuseas y vomituriciones.

Vientre.—*Dolor de vientre, incisivo,* hasta el extremo de dar gritos, con necesidad de deponer y expulsion abundante de flatuosidades y de gruesas masas de mucosidades.—Punzadas en el vientre.—Punzadas presivas en el diafragma.

Defecacion.—Cámaras con evacuacion de mucosidades y abundantes ventosidades.—*Deposiciones blandas,* como picadas.—Deposicion dura.—Necesidad urgente de deponer.

Orinas y partes genitales.—*Deseo de orinar, con evacuacion abundante.*—Tenesmo de la vejiga.—Orina ardiente.—*Orina fétida*; como la de los gatos.—Orina muy turbia.—Lancinacion en la uretra.—Punzadas y presion en el pene, que se dirigen hácia el glande.—Prurito é hinchazon del prepucio.—Erecciones.—Poluciones.—Leucorrea.

Pecho y extremidades.—Punzadas en el pecho.—Opresion y lancinacion en la region del corazon, que obliga á encorvarse cuando se está sentado.—Angustia en el corazon, estando acostado, con palpitaciones del corazon.—Dolor calambroídeo y contraccion, con pellizcos en los omóplatos.—Hinchazon de las glándulas del cuello.—Lancinaciones en las articulaciones de la escápula, los codos, el antebrazo y los dedos.—Dolor de quebrantamiento en los muslos, por la mañana al despertar.—Genuflexion al andar, con tirantez en las pantorrillas y los muslos.—Distensiones de los músculos en las pantorrillas.—Punzadas en las rótulas, la tibia y los piés.

Digitized by Google

204.—ZINCUM.

ZINC.—Zinc.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Véase Farmac. homeop. — *Dósis usadas*: 30.—*Duracion de accion*: 30 á 40 dias en las afecciones crónicas.
ANTÍDOTOS: Camph. hep. ign.—El zinc es el antídoto de *b-r-c.*—El *vino*, así como la *cham.* y la *n-vom.* agravan los padecimientos.
COMPÁRESE CON: Ant. arn. bell. canth. *carb-veg. hep. ign.* plumb. puls. sep stram sulf.

CLINICA.—Hallándose indicado este medicamento por el *conjunto de síntomas*, podrá ser útil en algunos casos de las afecciones siguientes:—Luxaciones espontáneas; Parálisis; Empeines; Ambliopia amaurótica; Hinchazon inflamatoria de la nariz; Cólicos gaseosos; Arenillas y cálculos renales???; Orquitis?; Disposicion á abortar, con várices en las partes genitales?; Ninfomanía de las recien paridas??; etc., etc.

Véase la nota, pág. 17.

SINTOMAS GENERALES.—*Dolores de dislaceracion en los miembros agravados siempre que se acalora, ó se entrega á un ejercicio.*—Dislaceracion tractiva en la cavidad de los huesos, con dolor tan excesivamente fuerte, que los miembros no pueden sufrirlo.—*Dolor de excoriacion.*—Dolor calambroídeo y calambre en los miembros.—Temblor visible y estremecimiento en diversas partes de los músculos.—Hormigueo en los miembros.—Várices.—Dolores que parecen algunas veces subcutáneos.—*Los síntomas se agravan* extraordinariamente por la chamomila, la nuez vómica y el vino, sustancias que tambien los provocan, y particularmente la agitacion nocturna y el estreñimiento.—*La mayor parte de los síntomas se manifiestan despues de medio dia y hácia el anochecer.*—°*Insensibilidad general del cuerpo.*—°*Sensacion de frio en los huesos.*—Pulsacion violenta en todo el cuerpo.—*Temblor violento de todo el cuerpo*, particularmente despues de toda emocion moral.—*Pesadez, laxitud y debilidad excesiva*, principalmente *andando, ó por la mañana al despertar.*—°*Repugnancia al movimiento.*

Piel.—Prurito en las articulaciones.—Prurito con lancinaciones violentas, sobre todo al principio de la noche en la cama, y que se disipan inmediatamente al tacto.—Hormigueo entre cuero y carne.—Erupciones.—*Herpes y úlceras herpéticas*.—**Gangliones*, sabañones y disposicion de las partes externas á helarse.—**Ragades*.—Pequeños forúnculos.—*°Erupciones tenaces*.—*°Afecciones hidrópicas con dolores nefríticos*.—*°Escarlatina con afecciones cerebrales*.

Sueño.—**Sueño por el dia y predisposicion continua á dormir*, sobre todo **por la mañana* ó despues de la comida, **con necesidad de bostezar*.—Sueño tardo.—Sueño agitado con desvelo frecuente.—**Sueño no reparador*.—**Ensueños fantásticos*, espantosos, agitados ó penosos con gritos y palabras durante el sueño.—Frio excesivo en los piés por la noche.—Sacudidas en el cuerpo, durante el sueño, y sobresaltos frecuentes.

Fiebre.—Horripilacion febril á lo largo del dorso.—Despeluzamiento contínuo con aumento de calor interior.—*Horripilacion febril*, con calor fugaz, *temblor violento en los miembros*, respiracion corta y caliente, y pulsacion en todo el cuerpo.—*°Predisposicion á traspirar por el dia*.—Sudores nocturnos.

Moral.—Humor hipocondriaco.—**Reflexiona sobre la muerte como si se hallara próxima*.—Miedo de ladrones y de espectros espantosos.—*Humor apesadumbrado, áspero, con repugnancia á la conversacion, sobre todo por la noche*.—La conversacion ó un ruido cualquiera afecta excesivamente.—Irascibilidad é impaciencia.—*Propension á los arrebatos coléricos* y desazon considerable cuando uno se abandona á ellos.—**Aversion al trabajo*.—*Humor variable* con tristeza hácia el medio dia y alegría por la tarde ó *vice-versa*.—**Debilidad de la memoria*.—**Olvido*.—Falta de ideas.—Concepcion difícil.—Ideas incoherentes.

Cabeza.—Peso y obnubilacion contínua en la cabeza.—*Vértigo* en lo profundo del cerebro, principalmente *en el occipucio*, hasta el punto de hacer caer de lado.—Vértigo como si se moviese el asiento, ó se fuese á trastornar por la mañana al levantarse de la cama.—Vértigo con aturdimiento, oscurecimiento de la vista y debilidad general.—Cefalalgia por la noche, ó al principio de esta despues de acostado.—Dolores de cabeza despues de haber

Digitized by Google

bebido vino.—Accesos de cefalalgia, con náuseas y vómitos.—*Cefalalgia presiva*, principalmente *por la mañana y en la frente*, con pesadez, ó bien en las sienes y en el occipucio.—Terebracion compresiva, ó presion expansiva en la cabeza.—*Traccion en el occipucio* y en la frente.—Punzadas y *dislaceraciones en la cabeza*, sobre todo en sus lados, las sienes, la frente y el occipucio, *que se agravan despues de comer*.—°Dolor de excoriacion en la cabeza.—Dolores pulsativos en la cabeza.—°Zumbido sordo en la cabeza.—Los dolores de cabeza se alivian al aire libre y se agravan en la habitacion.—Prurito y *sensacion de excoriacion en la piel del cráneo*, ó bien *dolor de ulceracion.—Sensacion como si se erizasen los cabellos.—*Calvicie.

Ojos.—Dolor en los ojos, por la noche temprano, despues de haberse acostado ó de haber bebido vino.—*Presion en los ojos*, ó sensacion, como si estuviesen hundidos en la cabeza.—Dislaceracion presiva y lancinante en los ojos.—Prurito, escozor y *sensacion de excoriacion en los ojos*, los párpados y *los ángulos* internos.—Inflamacion y sensacion de ardor en los ojos y en los párpados.—Rubicundez é inflamacion del ángulo interno de los ojos con supuracion.—°Sequedad de los ojos.—°*Caida y parálisis de los párpados superiores*.—Pupilas contraidas.—Copos luminosos que se presentan á la vista, mirando al aire.

Oidos.—**Otalgia con lancinaciones dislacerantes*, é hinchazon exterior, sobre todo en los niños.—Secrecion de un pus fétido por los oidos.—*Zumbido en los oidos.

Nariz.—*Dolor de excoriacion* en lo interior *de la nariz*.—Presion penosa en la raiz de la nariz, como por estrechez.—**Hinchazon de la nariz* interior y exteriormente, *algunas veces tambien de un solo lado*, con pérdida del olfato.—Obturacion de la nariz.—Coriza fluente, con ronquera y sensacion de ardor en el pecho.

Cara.—Cara pálida, térrea.—Aire sombrío extraviado.—Dislaceracion y *dolor* de quebrantamiento *en los huesos de la cara*.—Grietas en los labios y las comisuras, con ulceracion interior.—Mucosidades espesas, viscosas en los labios.—Erupcion pruritosa y rubicundez en la barba.

Dientes.—Odontalgia durante la masticacion.—*Odontalgia dislacerante*, lancinante ó tractiva sobre todo en los

dientes molares.—**Dolor de excoriacion en la dentadura.* —°Vacilacion de los dientes.—Hemorragia fácil y abundante de los dientes y *las encías.— Encías blancas hinchadas, con dolor de excoriacion.—Ulceras en las encías.

Boca.— Ulceras en la boca, pequeñas, amarillas, en la cara interna de las mejillas.— Hormigueo en la cara interna de las mejillas y *secrecion abundante de saliva*, con sabor metálico.— Vesículas en la lengua.

Garganta.— Dislaceraciones tractivas en el fondo de la garganta, con mas frecuencia fuera del tiempo que en el acto de deglutir, en seco.— Sensacion de estrechez y *calambre en el esófago* y en la region del hoyuelo del cuello.— Sequedad y aspereza en el paladar y en la faringe con escozor y cosquilleo.—*Dolor de excoriacion en la cámara posterior de la boca.—Acumulacion abundante de mucosidades en la faringe.—°Herpes blanquecinos en la garganta, despues de las gonorreas.*

Apetito.— Gusto de sangre en la boca.—**Sabor salado en la boca.*— Mucha sed.— Disminucion del apetito.— Hambre viva y *voracidad insaciables.*—Repugnancia á la carne (de ternera), á las cosas dulces, al pescado y á los alimentos cocidos y calientes.— Despues de haber comido pan, presion en el estómago con náuseas.— Despues de comer, humor hipocondríaco con presion debajo de las costillas falsas, sofocacion, traccion como con garfios en el vientre, plenitud, presion ó sensacion de ardor en el estómago.

Estómago.—Erutos con dolor presivo en el pecho.—*Erutos ágrios*, despues de la comida, sobre todo *despues de haber tomado leche.—Pirosis, despues de haber comido cosas azucaradas.*— Hipo sobre todo despues del desayuno. — Náuseas con vomituricion y vómitos de mucosidades amargas, renovados por el mas ligero movimiento.— Vómito de sangre.— Presion en el estómago.— Sensacion penosa en el cardias y á lo largo del esófago.—Sensacion como de apretamiento y presion en la boca del estómago.—Dislaceracion y punzadas en el mismo punto.— *Sensacion de ardor en el estómago.*

Vientre.— *Dolores calambroideos en los hipocondrios* que alternan con opresion de pecho.—*Fuerte opresion en los hipocondrios* y en los costados del vientre agravada por el movimiento y por la marcha.— Compresion, presion y

Digitized by Google

punzadas en la region hepática.—*Punzadas en la region del bazo.*— Presion, *punzadas y dolor de excoriacion en la region de los riñones.*—Dolores de vientre al principio de la noche despues de acostado.—*Presion muy considerable y tension en el vientre* (en los costados con timpanitis) —Sensacion de malestar producido por una presion sobre las paredes internas del tronco, como procedente de los nervios sin flatuosidades.—Dolor calambroideo en la region umbilical.—Compresion en el vientre.—Retortijones y pellizcos en el vientre con diarrea.—Dolor de dislaceracion y punzadas en el vientre.—Acumulacion abundante de gases con ruido sordo y borborigmos en el vientre, sobre todo despues de la comida.—*Cólicos gaseosos* por la tarde.—Expulsion frecuente de gases calientes y pútridos.—*Hernia inguinal.*

Deposiciones.—**Constipacion.*— Deposiciones duras, secas, insuficientes, evacuadas por lo regular con esfuerzos violentos.—**Deposiciones diarréicas*, blandas, de consistencia de papilla, ó líquidas, y frecuentemente con sangre de un rojo vivo.—°Evacuacion involuntaria.—Durante y despues de la deposicion, dolores de vientre.—Dislaceraciones, punzadas, *sensacion* de ardor *de excoriacion y prurito violento en el ano.*—*Hormigueo en el ano*, como por lombrices.

Orinas.—°Retencion de orina, al empezar á orinar.—Presion muy fuerte de la orina sobre la vejiga.—Emision de orina dolorosa.—°*Emision de orina involuntaria*, °*sobre todo andando*, tosiendo ó estornudando.—Emision frecuente de una orina color amarillo claro, que deposita en seguida un sedimento blanco, en forma de bedijas.—En cuanto se posa la orina se vuelve turbia y con burbujas.—Orina sanguinolenta.—Sensacion de ardor durante y despues de la emision de la orina.—*Dolores incisivos en el orificio de la uretra.*—*Hemorragia por la uretra.*

Partes genitales.—*Testículos retraidos, hinchados y dolorosos.—Traccion en los testículos y á lo largo del cordon espermático.—*Dolor de excoriacion en el escroto.*—Horripilacion y endurecimiento del escroto.—Fuerte excitacion al cóito con **eyaculacion dificil* y *muy pronta.*—**Erecciones permanentes por la noche.*—Flujo de licor prostático.

Reglas.—*Sensibilidad excesiva de las partes genitales.*—Sen-

Digitized by

sacion como si todo se dirigiese hácia las partes genitales.—Supresion de los loquios.—°*Reglas* muy adelantadas ó *suprimidas*.— Retraso de las reglas.—°A la aparicion de las reglas, cólicos espasmódicos.—°Timpanitis durante las reglas, retortijones y presion en el vientre y los riñones, con mucha pesadez y laxitud en las piernas.— *Leucorrea de un moco espeso* algunas veces precedida de dolores en el vientre.— Dolor de excoriacion en los pezones.— Supresion de la leche.

Laringe.—*Aspereza y sequedad en la laringe* y en el pecho, sobre todo por la mañana y despues de comer.— Expulsion de una sangre negra expectorando.— *Tos seca*, aun por la noche, con lancinaciones y dolor en el pecho como si fuera á abrirse.—Tos con expectoracion de mucosidades viscosas seguida de una sensacion de frio y de excoriacion en el pecho como si estuviese en carne viva.— *Tos con expectoracion de sangre*, sensacion de ardor y dolor de excoriacion en el pecho.

Pecho.—Dificultad de la respiracion y *opresion*, *con dolor presivo en el pecho*, sobre todo por la tarde.—*Disnea espasmódica*.—Respiracion corta á consecuencia del desarrollo de gases despues de la comida.— *Mucha cantidad de mucosidades*.—*Presion en el pecho*.—°Dolor tensivo en el esternon.—Dislaceraciones en el pecho.—*Punzadas* en el pecho, sobre todo *en la region del corazon*.—Sensacion quemante en el pecho.—**Palpitaciones de corazon* con y sin angustia.— °Movimientos irregulares del corazon.— °Sacudidas en el corazon é intermitencia de los latidos, *con sofocacion*.

Tronco.—**Dolores en los riñones*, sobre todo andando y sentándose. —Sensacion de debilidad paralítica en el dorso y en los riñones.—**Dolores* reumáticos *en el dorso*. —Empeine pruritoso en el dorso.—Tension y punzadas en y entre los omóplatos —Herpe pruritoso en el dorso. —*Dislaceraciones* lancinantes, rigidez y tension en la nuca y en el cuello.

Brazos.—**Traccion* reumática y *dislaceracion* lancinante, *en los hombros*, *los brazos*, los codos, las articulaciones de la mano, las manos y los dedos.—°Sensacion dolorosa de parálisis en los brazos.—Forúnculos en los brazos.— *Palidez y parálisis de las manos*.— Debilidad y *temblor de las manos*, escribiendo.— °Manchas herpéticas,

escabrosas y pruritosas en las manos.—*Piel seca, con ragades en las manos.—Grietas entre los dedos.—°Adormecimiento de los dedos, por la mañana al levantarse.

Piernas.—Tracciones reumáticas y *dislaceraciones en las piernas*, las rodillas, las articulaciones del pié y de los piés.—Várices en los muslos y en las piernas.—Dolor tensivo en las rodillas.—Dolores nocturnos en las rodillas.—Sensacion como si la sangre no circulase en las piernas.—Traccion y rigidez tensiva en las pantorrillas andando.—Hormigueo en las pantorrillas.—Inflamacion erisipelatosa é hinchazon del tendon de Aquiles.—°Rigidez de la articulacion del pié despues de haber estado sentado.—Dolor de luxacion en las articulaciones del pié y dedos.—Sensacion de ardor en los piés.—Hinchazon inflamatoria en los piés.—Debilidad y temblor de los piés.—Parálisis de los piés.—*Sabañones dolorosos en los piés.—Prurito, calor, rubicundez é hinchazon de los dedos de los piés, como si estuvieran helados.—Lancinaciones pulsativas en los dedos de los piés.

205.—MAGNES ARTIFICIALIS.

MGS.—Iman artificial.—HAHNEMANN.—*Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop. *Su uso es el siguiente:* El enfermo toca con la punta del dedo el polo Norte ó el polo Sud *por un minuto.—Duracion de accion*: 10 á 14 dias en algunos casos de enfermedades crónicas.

¿ANTÍDOTOS: Ign. zinc. y *el polo opuesto*.

206.—A.—MAGNETIS POLI AMBO.

MGS.—Los dos polos del iman sin distincion.

SINTOMAS GENERALES.—Sensacion de ardor en los miembros y en las articulaciones.—Lancinaciones quemantes de las partes carnosas.—Dolor de luxacion en los miembros.—*Dolores como de rotura en las articulaciones*, sobre todo por la tarde y por la mañana en la cama, y principalmente durante el movimiento.—*Lancinaciones quemantes á través* de todas las partes del cuerpo en diferentes direcciones.—Horripilacion que atraviesa todo

Digitized by Google

el cuerpo.—*Estremecimientos en el cuerpo*, con espanto ó sacudidas que le hacen doblarse y enderezarse violentamente, algunas veces con pérdida del conocimiento.—Tendencia de todas las úlceras antiguas á sangrar de nuevo con facilidad.—Ulceras dolorosas, como llagas recientes.—Forúnculos pequeños.—Pequeñas pústulas con dolor lancinante tractivo.

Sueño.—Sueño agitado con palabras, ronquido y anhelacion contínua.—Vigilia desde las tres de la mañana; despues se cae *en una somnolencia comatosa hácia la hora de salir el sol.*—Se está acostado sobre el dorso con la mano debajo del occipucio, las piernas separadas, y la boca medio abierta, con ronquido al respirar.—Ensueños de amores lascivos.—Estremecimiento del cuerpo antes de dormirse.—Despues de despertarse, por la mañana, dolores de cabeza con dolor de quebrantamiento en todas las articulaciones que obliga á cambiar constantemente la posicion de los miembros.—Por la noche y por la mañana en la cama, calor seco que precisa á descubrirse.

Moral.—Se halla muy solícito y preocupado en los asuntos.—Distraccion.—Irresolucion.—Inadvertencia.—Disposicion á encolerizarse y á enfurecerse.

Cabeza.—Vértigo sobre todo al principio de la noche, estando ya acostado, como si uno fuera á caerse, ó como una sacudida en la cabeza.—Vértigo con vacilacion al andar; parece que los objetos se bambolean delante de uno.—Dolores de cabeza por un trabajo intelectual sostenido.—Dolor de contusion en la cabeza por la mañana al despertarse.—Dolores de cabeza como si escarbaran, con aturdimiento, que se disipan inmediatamente por movimiento de gases.—*Cefalalgia como si se introdujese un clavo* ó como por una úlcera, sobre todo despues de haberse enfadado.—Dislaceracion con estremecimiento en la cabeza que aparece por intervalos.—Zumbido sordo en la cabeza.

Ojos.—Nariz.—*Prurito en los ojos*, sobre todo en los párpados.—Pupilas dilatadas.—Centelleo de resplandores blanquecinos fuera del rádio visual, al crepúsculo.—Se ven chispas.—Zumbido en los oidos.—Disminucion del oido.—Aberracion del olfato; se percibe un olor de humo ó de moho.

Digitized by Google

Cara.—Sudor en el rostro con calor por la mañana.—Dislaceracion con estremecimiento en la mandíbula superior.—Lancinacion quemante muy considerable en los músculos de la cara por la tarde.—Hinchazon de los labios por la tarde con salivacion.—Granos pequeños con dolor de ulceracion en los labios.

Dientes.—Odontalgia despues de beber frio ó por el contacto al aire frio.—Odontalgia presiva, con estremecimiento por sacudidas aisladas.—Odontalgia en las muelas cariadas con hinchazon de las encías.

Apetito.—Aliento fétido.—Sabor metálico en la boca.—Insipidez del tabaco y de la cerveza.—Gusto á moho y á diferentes cosas.—Pronta saciedad.—Hambre pronunciada por la tarde.

Estómago.—Erutos abortados.—Erutos con olor y sabor á raspaduras de cuerno.—Regurgitacion de ácidos bajándose.—*Presion en el estómago*, con calambres que se dirigen hácia las partes superiores, agitacion que no deja permanecer en parte alguna, pesadez de la lengua, palidez del rostro y frio en el cuerpo.

Vientre.—Presion y plenitud angustiosa en el vientre, sobre todo durante un trabajo penoso intelectual.—Ruido sordo, sonoro y borborigmos en el vientre.—Produccion abundante de gases.—Cólico flatulento.—Expulsion de flatuosidades con presion dolorosa.

Deposiciones.—Constipacion de vientre como por estrechez del recto.—Diarrea sin dolor, con flatuosidades.—Dolor hemorroidal, con escozor en el ano despues de la deposicion y constriccion en el recto.—Hemorróides ciegas.—Prolapsus del recto.

Partes genitales.—Sensacion de ardor en la region de las vesículas espermáticas que excita al cóito.—Defecto de intensidad del apetito venéreo y repugnancia al cóito.—Ereccion sin pensamientos eróticos.—Retraccion del prepucio detrás del glande.—Hinchazon del epididimo con dolor durante el movimiento y al tacto.—Reglas muy anticipadas, muy abundantes y de muy larga duracion.

Pecho.—Accesos prolongados y violentos de *tos seca* por la noche.—Tos calambroídea, sobre todo despues de media noche, estando en vela ó reflexionando.—Disnea nocturna provocada por mucosidades en la tráquea-ar-

teria que por la mañana se desprenden fácilmente.—Lancinaciones quemantes, insoportables, en los músculos del pecho.

Tronco y extremidades.—Estremecimiento de la espina dorsal, ocasionado como por un insecto.—Sensibilidad dolorosa de la articulacion del sacro por la mañana en la cama, estando acostado sobre el lado, ó por el dia encorvándose.—Dolor de luxacion en la articulacion del hombro ó como el sobresalto de un tendon en la muñeca.—Dolores tractivos en las articulaciones y en los músculos del brazo, regularmente desde la cabeza hasta los dedos.—Estremecimiento con dislaceracion en los músculos del brazo, despues de haber permanecido al frio.—Manchas rojas en la palma de las manos como vesículas.—Accesos de calambres en las pantorrillas y los dedos de los piés por la mañana despues de despertar.—Lancinaciones quemantes en los talones y en los clavos de los piés.

207.—B.—MAGNETIS POLUS ARTICUS.

MGS-ARC.—Polo norte del iman.—*Hist. nat. y prep.*—Farmacop. homeop.
Antídotos: Mgs-aus. igo. zinc.

CLINICA.—Se ha empleado hasta el dia este remedio contra:—*Sobreexcitacion nerviosa*; *Odontalgia nerviosa* y Prodromos de una hernia inguinal.

SINTOMAS GENERALES.—Excesiva laxitud y cansancio sumo en todo el cuerpo con abatimiento, sobre todo por la mañana y al aire libre, como cuando hace un tiempo caluroso.—Sensacion tractiva en el periostio de todos los huesos como al principio de una fiebre intermitente.—Lancinaciones como si escarbaran en diversas partes del cuerpo, las que son tanto mas dolorosas cuanto mas profundas.—Sacudidas lancinantes, latidos, temblor frio y sensacion como si la sangre se dirigiese hácia las partes tocadas por el iman.—*Sobreexcitacion con temblor, agitacion, inquietud en los miembros y mucha debi-*

Digitized by

lidad nerviosa.—Hormigueo y prurito lancinante en la piel.—Sensacion de ardor ó dislaceracion quemante en los herpes.—*Panadizos.*

Sueño.—Bostezos violentos, espasmódicos, con dolor en la articulacion maxilar como si fuera á luxarse.—**Considerable propension al sueño por el dia.—Somnolencia.*—Sueño profundo por la noche durante el cual se está generaralmente acostado sobre el dorso.—Afluencia de ensueños vivos (algunas veces lascivos) y cánticos durante el sueño.—Desvelo al principio de la noche en cuanto se ha dormido, producido por una sacudida violenta en la cabeza y en los músculos del cuello.—Agitacion durante el sueño con calor penoso y necesidad de descubrirse sin sed.—Por la mañana desvelo incompleto, con plena conciencia de sí mismo, memoria viva, excesiva afluencia de ideas y reflexiones sobre un objeto importante.

Fiebre.—Sensacion de frio ó de frescor en todo el cuerpo.—*Disposicion al frio.*—Frescura en las manos con sudor fresco en ellas y en todo el cuerpo.—Horripilacion seguida de calor de corta duracion y de hinchazon de las venas de las manos.—Sensacion de calor en todo el cuerpo con manos frias y frio en las extremidades inferiores.

Moral.—Chabacanería y gana de llorar *con calofrios.*—*Carácter dulce y sumiso.*—Pereza como si hubiera perdido la facultad de moverse estando sentado.—Irresolucion seguida de una pronta ejecucion de lo que al fin se ha resuelto.—El sujeto habla alto á solas durante sus ocupaciones.—Humor variable.—*Perplejidad angustiosa y carácter inquieto.*—Pérdida de los sentidos.—Pérdida de las ideas.—Debilidad de la memoria.—Se equivoca uno fácilmente cuando escribe.

Cabeza.—Vértigo como por embriaguez con vacilacion cuando se pasea al aire libre, y falta de firmeza para estar en pié.—Tiron semilateral con vértigo desde la mitad de la cabeza hácia las orejas, como el volante de una péndola.—Cefalalgia al levantar y al mover los ojos.—Cefalalgia deprimente, como por un peso.—Cefalalgia como si el cerebro fuera á estallar.—Tension de los tegumentos de la cabeza, como si estuviesen muy adherentes al cráneo.

Ojos.—Ojos prominentes y fijos.—*Frio glacial en los ojos* (débiles).—Movimientos inquietos de los ojos.—Lancinaciones, prurito y traccion con estremecimiento en los párpados y lagrimeo.—Sensacion de sequedad dolorosa de los párpados por la mañana al despertarse.

Oidos y nariz.—Ruido confuso en los oidos y calor interior como por agua hirviendo.—Sordera como si estuviera tapado el oido con una venda.—Aberracion del olfato, como si se oliesen huevos podridos, yeso recien amasado, ó polvo.—Epistaxis precedida de cefalalgia presiva en la frente.—Rubicundez y calor en la punta de la nariz, seguida de manchas rojas, calientes y sumamente circunscritas, en las mejillas.

Cara.—Palidez del rostro.—Tension en la cara.—Apretamiento doloroso en la articulacion de las mandíbulas, con sensacion durante el movimiento como si estuviesen luxadas.—**Hinchazon de una sola mejilla.*—Trismo.

Dientes.—**Odontalgia de las muelas cariadas*, por intervalos, como si las arrancasen.—**Dolores en las muelas cariadas, con las encias hinchadas y dolorosas al tacto.*—**Dolores en las muelas* (cariadas), *aumentadas despues de la comida y al calor, aliviados al aire libre y andando.*—*Odontalgia con las mejillas encendidas, hinchadas, calientes.—**Odontalgia con sacudidas que atraviesan el periostio de la mandibula*; ó con dolores tractivos, presivos ó dislacerantes, como si escarbaran, ó quemantes, lancinantes.—Dentera de los dientes incisivos inspirando.—Entorpecimiento é insensibilidad de las encías, despues de cesar los dolores de muelas.

Estómago.—Pérdida del gusto.—Sabor acídulo de la boca.—Sabor amargo del tabaco.—Eructos á vacío frecuentes.—*Pirosis* contínua, sobre todo despues de cenar.—Voracidad por la tarde.

Vientre.—Produccion abundante y retencion de gases.—Cólico flatulento, presivo.—Sacudidas en el abdómen como si alguna cosa cayese en él, ó golpes que partiendo del vientre suben al pecho y hasta la garganta.—*Meteorismo del vientre.*—*Presion y terebracion hácia el anillo inguinal como por una hernia, con relajacion del anillo inguinal.

Deposiciones.—Reglas.—**Especie de compresion tenaz nerviosa de vientre* y constipacion.—Deposicion dura, de

forma voluminosa, difícil de evacuar, frecuentemente precedida de dolores tractivos, disentéricos en el bajo vientre.—Secrecion mas abundante de orina que de ordinario.—Orina oscura.— *Erecciones inmoderadas* con *poluciones frecuentes.*— Excitacion al cóito.—*Reglas muy débiles.*—Supresion de las reglas.

Laringe.— Tos con sofocacion, seca, asmática, agravada por la marcha al aire libre.—*Tos espasmódica, que produce conmocion, al principio de la noche al dormirse*, que impide coger el sueño.— Tos espasmódica, con sofocacion, hácia media noche producida por una irritacion en los bronquios que conmueve la cabeza y todo el cuerpo, y provoca calor que dura hasta que es reemplazado de un sudor general con cesacion de la tos.—Necesidad contínua de toser por la tarde, que no se puede disipar sino reteniendo la tos.

Tronco y extremidades.— Dolores de quebrantamiento en el dorso, volviéndose.—Chasquido en las vértebras cervicales durante el movimiento. — Inflamacion del dorso de la mano con dolor pulsativo.—Pesadez de los brazos, las manos y los dedos.— Dolor como de rotura en la articulacion coxo-femoral y en los miembros inferiores.— Mucha laxitud en los miembros inferiores, los que parece van á romperse cuando se anda.—Dolor de excoriacion en los clavos y dedos de los piés.

208.—C.—MAGNETIS POLUS AUSTRALIS.

MGS-AUS.—Polo Sud del iman.— *Hist. nat. y prep.* Farmac. homeop.
Antídotos: Mgs-arc. ign. zinc.

CLINICA.— Hasta el dia solo se ha empleado este medicamento contra :—Estado paralítico del cuello de la vejiga; Impotencia: Várices de las embarazadas y panadizos.

SINTOMAS GENERALES.— Traccion en los dedos, las articulaciones de estos y de los piés y de los maléolos.— Dolores lancinantes y pulsativos de las raices de las

Digitized by

uñas, como si estas fueran á entrar en supuracion.— Dolores con pellizcos ó lancinaciones quemantes, en diversas partes del cuerpo.— Dolor de quebrantamiento en los miembros y sus articulaciones, como si se estuviese acostado sobre piedras.— Disposicion á resfriarse. —Disposicion de la nariz, de las orejas, de las manos y de los piés á helarse por un frio poco intenso.— Pronta laxitud paseándose, con ansiedad y calor, ó necesidad súbita de dormir.

Sueño.— Mucha propension al sueño por la tarde y por la mañana; se cierran los ojos sin poderse dormir.—Insomnio con sobreexcitacion antes de media noche.—Ensueños confusos, espantosos. — Ensueños prolongados sobre un mismo objeto, con fatiga por la meditacion.— Espiracion lenta, sonora, con ronquido, antes de media noche; despues de media noche sucede lo mismo con la inspiracion.—Se está acostado sobre el dorso toda la noche.—Congestion sanguínea én la cabeza por la mañana que obliga á estar echado con la cabeza alta.

Fiebre.— Horror excesivo al aire libre, el que parece penetrar hasta la médula de los huesos, aun cuando sea caliente, con mal humor y propension á llorar.—Horripilacion con oscurecimiento de la vista, temblor y agitacion de los miembros, sin calofrio seguido de calor á la cabeza y la cara.

Moral.— Morosidad y mal humor con repugnancia á la conversacion.— Se separa de la sociedad y tiene antipatía á las personas alegres.— *Arrebato y cólera.*— Instabilidad de las ideas.

Cabeza y garganta. — Vértigo como por embriaguez con vacilacion al andar.—Pesadez, hormigueo y como si escarbaran en la cabeza.—Sacudidas en la cabeza, algunas veces con dolor de dislaceracion.— Sequedad y escozor en los párpados, sobre todo moviéndolos y principalmente al principio de la noche y por la mañana.— Lagrimeo.— Ambliopia.— Odontalgia dislacerante, con estremecimiento, agravada por las cosas calientes.— Acumulacion de saliva acuosa en la boca.— Pronunciacion difícil como por hinchazon de la lengua.—Sensacion quemante en la faringe.

Estómago.— Sabor metálico, ya dulce, ya acídulo encima y debajo de la lengua.— Sabor muy poco pronun-

Digitized by

ciado de todos los alimentos.—Indiferencia excesiva á los alimentos, las bebidas y el tabaco de hoja.—Bulimia á medio dia y por la tarde, algunas veces durante los calofrios febriles.—Presion en la boca del estómago durante una fatiga moral.

Vientre.—Pellizcos en el vientre por una corriente de aire.—Borborigmos sonoros y ruido sordo en el vientre.—Cólico gaseoso, presivo, con pellizcos y meteorismo en el vientre.—Sensacion de dilatacion del anillo inguinal como para la salida de una hernia, con sensacion dolorosa de esta parte siempre que se tose.

Deposiciones.—*Deposiciones blandas*, diarréicas, precedidas de retortijones.—Evacuacion de una deposicion líquida, con sensacion como si se fuese á expeler gases. Estrechez y constriccion dolorosa del recto y del ano, que no permite expeler los gases.

Orinas.—**Emision involuntaria de orinas por parálisis del esfinter de la vejiga*, sobre todo por la noche.—Emision de orina gota á gota, con entorpecimiento de la uretra.—Chorro de la orina muy delgado.—*Emision frecuente de orina, por la noche.

Partes genitales.—Excesiva disposicion á la eyaculacion.—**Impotencia con desaparicion repentina de todo placer en el momento de la mas fuerte exaltacion.*—Dolor en el miembro viril, como si algunas de sus fibras se desgarrasen ó se arrancaran.—Retraccion dolorosa de los testículos por la noche.—Hinchazon de los testículos con sacudidas dislacerantes y sensacion de estrangulacion de estas partes.—*Reglas muy anticipadas y muy abundantes.*—Metrorragia.

Pecho.—Tos y coriza, con expectoracion de mucosidades verdosas y respiracion corta.—Accesos de tos fétida por la noche al dormirse.—Necesidad de respirar profundamente, y como con suspiros, con deglucion involuntaria.—Opresion en el pecho como si la respiracion fuese trémula y produjese una impresion de frio.—Presion tractiva en los lados del esternon, con muy poca tranquilidad de conciencia que no permite estar en ninguna parte.—*Palpitaciones de corazon violentas.*—Latidos de corazon; parece que no es este el que late.

Tronco.—Dolor presivo, quemante en los riñones, durante el reposo y el movimiento.—Dolor de quebranta-

miento y de luxacion en las articulaciones del sacro y de las vértebras lumbares.

Brazos.—Hormigueo á lo largo de los brazos parecido á ligeras sacudidas.—Estremecimiento doloroso y rápido á lo largo de los brazos.—Pesadez y laxitud de los brazos.—Ruido como el del agua á lo largo de los brazos y de las venas de estos.—Hormigueo y latidos en la punta de los dedos.—**Panadizos*.

Piernas.— Latidos con estremecimiento en los tendones de la corva, contraccion de las piernas, sobre todo durante el movimiento.— Dislaceracion presiva en las rótulas.—Latidos en los músculos de los piés despues de haber andado.—Flexibilidad de las rodillas durante el movimiento.— Luxacion fácil de la articulacion del pié dando un paso en falso.—Sensibilidad y dolor de ulceracion en la uña del dedo pulgar del pié.—*Las uñas de los dedos se introducen en las carnes.—°Várices.

FIN DE LA PRIMERA PARTE.

Digitized by

TABLA ALFABETICA

DE LAS INDICACIONES CLÍNICAS MAS IMPORTANTES.

A

Aborto. Sabin. plat. sec. bell. cham. ipec.
Abscesos. Hep. lach. merc. phos. sulf. sil.
— calientes ó inflamatorios. Merc. bell. cham. puls. phosph.
— frios ó cronicos. Hep. sil. sulf. calc.
Abstinencia sexual (padecimiento por la). Con.
Acaloramiento (padecimientos por un) Acon. carb-vg. ant. bry. bell.
Acceso nervioso. N-vom. sep carb-vg. natr-m. sil. plat. sulf.
Acedias. Puls. n-vom. calc. chin. sulf. phosph. phos-ac.
Acido hidrociánico (padecimientos por el). Coff. ipec. n-vom.
— fosforico. Coff. lach.
— nitrico. Hep.
— sebácico. Bry. phos-ac. ars. kreos.
— sulfúrico. Puls.
Acidos (padecimientos por el uso de los). Acon. lach. n-vom. sep. staph.
— diarrea. Staph. bry n-vom. ant.
— exantemas. Bell. rhus.
— fiebre. Lach. bell.
Acne Bell. carb-vg. hep. sulf. led.
— embriagados (en los). Carb-veg. led. sulf.
— endurecido. Bell. carb-vg.
— jóvenes (en los). Bell. carb-veg. sulf.
— libertinos (en los). Carb.-vg. calc. phos-ac. sulf.
— lombrices (en forma de). Natr. selen. nitr-ac. sulf.
— punteado Sulf. dros. selen.
— rosa. Carb-an. calc. rhus. ruta. verat.
Acostado (deseo de permanecer). N-vom. ars. ferr. chin. cham.
— (padecimientos en estando). Puls. rhus. sep. ars. caps. dros. natr-m.
— con la cabeza baja (estando). Ars. puls. chin. hep. spig. nitr.
— sobre el lado (estando). Acon. bry. phos. sil.
— sobre el lado derecho. Merc. caus. kal. puls. n-vom.
— — izquierdo. Lyc. phos. sep.
Acostado sobre el lado enfermo. Acon. bry. phos. sil.
— — sano. Arn. bry. calc. cham. puls. rhus.
— sobre el dorso. Ign. n-vom. acon. caus. phos.
Adipsia. *Vease* Sed nula.
Aerofobia. Camph. caus. cocc. coff. n-vom. sulf.
Aficcion (resultados de una). Ign. phos-ac.
Afonia. *Véase* Voz (pérdida de la).
Agilidad del cuerpo, aumentada. Coff. stram.
Agitacion en el cuerpo. Carb-vg. phosph. sil. puls. sep.
— dolorosa, dolor pulsativo. Acon. bell. ferr. ign. cham. sep.
— **nerviosa.** Acon. coff. n. vom. cham. ars.
Agua, como bebida (padecimientos por el). Natr-m. chin. merc. puls.
Aguardiente por el uso del). N-vom. op. ign. ars. lach. sulf.
Aire caliente (mal por el). Carb-veg. ant. bry. puls. sulf. lyc.
— corriente (por el). Acon. bell. chin. sulf.
— de la tarde (por el). Merc. sulf. carb-veg. nitr-ac.
— frio (por el). Ars. veratr. merc, dulc. rhus.
— libre (por el). Camph. n-vom. cocc. sulf. caus. coff.
Alcalis (padecimientos por el uso de los). Nitr-ac. sulf-ac.
Alcanfor (padecimientos por el uso de el). Coff. op.
Alcohólicas (padecimientos por el uso de las bebidas). Acon. op. ars. n-vom. calc. sulf. lach.
Alegria loca. Coff. croc. op. stram. veratr. bell. natr-m. lach. plat.
Alimentos (sufrimientos por los). Ars. calc. carb-veg. chin. hep. n-vom. sulf.
— calientes (por los). Bry. phosph. puls. bell. carb-veg. cham.
— crudos (por los). Rut. puls. veratr. lyc.
— flatulentos. Bry. cycl. petr. calc. lyc. puls. sep.

Digitized by Google

Alimentos frios. Ars. lyc. n-vom. rhus. con. sulf. veratr.
— grasos. Puls. carb-veg. cycl. ferr. tarax. ars. sulf.
— indigestos. Puls. caus. bry. lyc. ant. iod.
Almendras amargas (padecimiento por el uso de las). Coff. op. ipec. n-vom.
Alopecia. *V.* Cabellos (caida de los).
Alumbre (padecimientos por el uso del). Puls. veratr.
Amaurosis. Bell. calc. phosph. sulf. sep. sil. cin. hyos.
— congestiva. Bell. merc. phosph. sil. sulf.
— incipiente. Bell. chin. hyos. phosph. sil. sulf.
— paralítica. Caus. chin. phos-ac. plumb. sec.
Ambliopia ó debilidad de la vista. Bell. calc. hyos. rut.
— abdominales (con sufrimientos). Calc. chin. lyc. n-vom.
— afectos del corazon (por). Aur. con. lach. puls. spig.
— artrítica. Bell. merc. puls. sulf.
— borrachos (en los). Chin. calc. n-vom. op. sulf.
— cefalalgias (por frecuentes). Bell. bry. hep. n-vom. sep.
— congestiva Bell. hyosc. op. n-vom. phosph.
— debilidad (por). Chin. caus. op. phos-ac. sec.
— desórden en las reglas (por). Lyc. puls. sep. bell.
— enfermos del pecho (en los). Calc. sulf. n-vom.
— enfriamiento (por un). Dulc. bell. merc. puls.
— erupcion repercutida (despues de una). Sulf. caus. merc. hep. sil.
— escrofulosa Bell. calc. merc. sulf.
— frecuentes neurosis (despues de). Bell. hyosc. caus. op.
— golpes en la cabeza (á consecuencia de). Arn con. rhus.
— gástrica. Ant. caps. n-vom.
— hemorragias suprimidas (despues de las). Bell. lyc. n-vom.
— mercurio (por abuso del). Sulf. hep. nitr-ac. sil.
— paralítica. Aur. bell. chin. phosph. puls. sil.
— pérdidas debilitantes (por). Chin. cin. calc. n-vom.
— reumatismo (por). Merc. puls. sulf. chim.
— sufrimientos en las orejas y en el oido (con). Cic. nitr-ac. phosph. puls.
— supuracion suprimida (despues de una). Chin. lyc. puls. sil.
Ambliopia á consecuencia de trabajos delicados. Bell. rut.
— úlcera repercutida (á consecuencia de una). Chin. lyc. puls. sil. ars. caus.
Amenorrea. *Véase* Reglas desordenadas.
Amigdalas (afeccion de las). Bell. aur. merc. hep. lach. kal. ign.
— hinchazon. Bell. merc. hep. lach. dulc. ign.
— hipertrofia (de las). Staph. nitr-ac. bell. aur.
— inflamacion. Ign. dulc. cham.
— inflamacion. Bell. acon. merc. hep. lach. kal. ign.
— supuracion. Bell. hep. lach. merc. sulf.
— ulceracion. Merc. bell. lach. lyc. thui.
Amoniaco (padecimientos por el uso del). Bell. hep. nit-sp.
Amor desgraciado (sufrimiento por un). Ign. phos-ac. hyosc. aur. staph.
Anasarca. Ars. bell. kal. chin. lyc. sulf.
Anemia. Chin. fer. sulf. n-vom. arsen. con. calc.
Aneurismas. Carb-veg. lach. lyc. puls. guai. sulf.
Anginas. Acon. bell. merc. lach. sulf dulc. coff.
— agudas. Acon. merc. bell. dulc. coff puls. ign. cham.
— catarrales. Cham. merc. puls. dulc. hep. bell. sulf.
— crónicas. Sulf. hep. lach. lyc. carb-veg. baryt. alum. anim.
— enfriamiento (á consecuencia de un). Acon. merc. dulc. bell.
— escarlatinosas. Bell. sulf. ars. merc.
— faringeas. Merc. bell. canth. lach. hep.
— flegmonosas. Bell. merc. lach. hep. dulc.
— gangrenosas. Ars. lach. amm. sulf-ac. carb-veg.
— lardácea. Bell. ars. baryt. sulf-ac. lyc. chin.
— membranosas. Brom. merc. bell. sulf-ac. lyc. chin.
— mercuriales. Bell. lach. hep. lyc. sulf. nitr-ac.
— mucosas. Bell. puls sulf. merc. chin.
— palatinas. Acon. coff. merc. bell. lach.
— sarampion (á consecuencia del). Carb-veg. puls. merc. ars.
— sifilíticas. Merc. lyc. aur. nitr-ac. thui.
— tonsilar. Bell. merc. hep. lach. kal. ign.
— traumáticas. Arn. acon. merc. calc. bell.
— ulceracion (con). Merc. lach. bell. lyc. nitr-ac.
— uvulares. Coff. acon. merc. bell. lach.
— variolicas. Merc. bell. sulf.

Ano afectado. N-vom. sulf. calc. ign. acon. merc.
— dartros (de). Natr-m. petr.
— dolor (en el). Ign. n-vom.
— erupcion (en el). Calc. kal. lyc.
— excoriacion. Sulf. hep. merc. carb-an. sep. carb-veg.
— fistula. Calc. s l. sulf. caus.
— hinchazon. Hep. n-vom. sulf. graph.
— parálisis. Hyosc. bell. acon. laur.
— prurito. Acon. sulf. merc. calc. nitr-ac. thuj. zinc. baryt.
— ragades. Ang. graph. ign. sulf. cham.
— resudacion. Carb-an. nitr-ac. carb-veg. baryt.
— secrecion mucosa (por el). Phosph. merc. sep. graph.
— tenesmo. Merc. sulf. n-vom. caps. ars. rhab.
Anorexia. *Véase* Apetito (pérdida del).
Ansiedad, angustia. Ars. bell. n-vom. acon. cham. merc.
Antrax. Ars. lach. sil. bell. chin.
Antropofobia. Ambr. hyos. pulsat. baryt.
Apetito alterado. Sulf. n-vom. ant. chin. sil. rhus. sep. cycl.
— (pérdida del), n lo. Sulf. n-vom. chin. sep. cycl. sil. puls. rhus.
— (pérdida del), con hambre.—Op. natr m. rhus. bry. hell
— (pérdida del), con sed. Natr-m. n-vom. nitr. phosph. sil.
— variable, caprichoso. Natr-m. bry. ch n. ign.
— voraz. Chin. veratr. cin. merc. sep. mur-ac.
Apoplejia. Bell. acon. arn. op. n-vom. lach. puls.
— borrachos (en los). N-vom. op. lach. puls. coff.
— congestiva. Bell. lach. arn. op. n-vom. acon.
— en las personas de edad avanzada. Op. con. arn. merc.
— gástrica. Ip c. n-vom. puls.
— nerviosa. Bell. hyos. camph. laur. coff. stram.
— semi-lateral (hemiplegia). Cocc. lach. bell. n-vom.
— serosa. Arn. ipec. chin dig. merc. sulf.
Apoyándose (mal e.). Sulf. nitr-ac. coloc. arn. cycl. hep.
— miembro (en un). Con. arn. sil. kal. bell. rhus cin.
Aprensiones. Calc. acon. coff. bry. rhus. hyos.
Ardor (sensacion de), dolores quemantes. Ars. carb-veg. canth. caus. merc. phos.
Arenillas, mal de piedra. Puls. sass. lyc. zinc. calc. cann. n-vom. sil.
Arrancada (dolor como si alguna cosa fues). Rhus. plumb. n-vom. coloc. h p.
Arrugas en la cara. Lyc. calc. sep. stram. rhab bell.
— en la frente. Calc. lyc. bell. strem. sep. rhus. sulf.
Arsénico (padecimientos por el uso del). Ipec. n vom. chin. veratr. hep.
Articulaciones afectadas (cuando están las). Acon. sulf. arn. rhus. bry. merc. caus. cham chin.
— (crujido en las). Cocc. sulf. ant. petr. caps. nitr-ac.
— (descomposicion fácil de las). Rhus. agn. sulf. carb-veg. ruta. lyc. n-vom. nitr-ac.
— dolores (en las). Acon. arn. sulf. rhus. bry. merc. caus. chin.
— excoriacion (en las). Sulf. cham. ignma. n. calc. puls. merc. lyc.
— hinchazon (en las) Acon. bry. sulf. lyc. sass. rhus. n-vom. bell.
— inflamacion. Acon. sulf. arn. rhus. bry. merc. chin. caus. cham.
— ragades. Mang.
— rigidez. Rhus. lach. sep. cham. graph. sul. rhod.
— sequedad. Puls. n-vom. canth. lyc. phos-ac. croc.
Artritis. Acon. sulf. lyc. arn. bell. sass. n-vom. bry.
— aguda. Acon. puls. ant. n-vom. bell. ferr. bry.
— alegres (en las personas). Ant. calc. iod puls. sulf. lyc.
— agua (en los trabajadores en el). Calc. puls. sass. sulf.
— cabeza (en la). Sep. puls. coloc. n-vom. b ll.
— crónica. Lyc sulf. sass. caus. ant. puls.
— estómago (en el). N-vom. ant. lyc. puls
— espirituosas (por abu o de las bebidas). N-vom. calc. sulf. acon.
— intestinal. Bell. n-vom. ant. sulf. puls. lyc.
— nudosa. Calc. lyc. graph. ant.
— ojos (en los). Acon. bell. merc. coloc. spig.
— vaga, er ática. Puls. n-vom. arn. mang. sulf-ac.
Artrocace. Coloc. phos-ac. calc. sil. sulf. merc. bry. rhus.
Ascarides. *Véase* Gusanos intestinales.
Ascitis. Aps. ars. sulf. chin. kal. bell. merc.
Asfixia. Chin. op. arn. bell. lach.
— ahogados (en los) Lach.
— ahorcados (en los). Op. arn.
— congelacion (á consecuencia de una). Bry. acon. carb-veg. ars.
— gases (por inspiracion de). Op. acon. b ll.

Asfixia de resultas de golpes en la cabeza. Arn. chin. lach.
— heridos por un rayo (en los). N-vom.
— recien nacidos (en los). Tart. op. chin.
Asma. Acon. sulf. ars. cupr. puls. ipec.
— acceso (durante el). Camph. ipec. op. mosch.
— arsénico (por el vapor del). Ipec. n-vom. cupr. merc.
— azufre (por el vapor del). Puls.
— catarral. Tart. camph. ars. ipec. n-vom. puls.
— congestiva. Acon. bell. n-vom. sulf. merc. aur. phosph.
— convulsiva. Cupr. kal. n-vom. sulf. lach. stram.
— cobre (por el vapor del). Hep. ipec. ars. merc.
— crónica. Sulf. calc. nitr-ac. kal. ars. n-vom.
— edad avanzada (en las personas de). Op. lach. camph. aur. con.
— emocion á consecuencia de una). Ign. n-vom. cham. acon. staph.
— enfriamiento (á consecuencia de un). Dulc. ipec. acon. bell. bry. puls.
— escullores (en los). Calc. sil. sulf. hep. ars. ipec.
— espasmódico. *Véase* Asma convulsivo.
— flatulento. Carb-veget. n-vom. sulf. chin. cham. op.
— histérico. Ign. n-vom. mosch. coff. bell.
— mujeres (en las). Puls. cocc. cupr. bell. merc. n-vom.
— Millar (de). Samb. acon. ipec.
— mucoso. Chin. puls. ars. dulc. sep. stram. sulf.
— nervioso. Cupr. kal. n-vom. sulf. lach. stram.
— niños (en los). Acon. bell. ipec. mosch. n-vom. samb.
— tímico. Acon. ipec. spong. bell. merc. tart.
— Wigand (de). Acon. samb. bell. ipec. ars.
Aspirar (padecimiento al). Acon. squill. bry. sabin. rhus. kal. merc.
Atrofia. Ars. calc. sulf. chin. iod. n-vom. phosph.
— niños (en los). N-vom. sulf. calc. ars. chin. cin.
— partes enfermas (en las). Bry. phosph. plumb.
Audacia. Op. ign. acon. merc. sulf. anim.
Avidez. Puls. ars. bry. lyc. calc.
Azafran (padecimientos por el uso del). Puls. bell. op. acon.
Azúcar (padecimientos por el abuso del). Ign. merc. cham. selen. acon. zinc. natr. calc.
— (deseo de). Kal. amm. lyc. ipec.
Azúcar (repugnancia al). Caus. sulf. graph. phosph.
Azufre (padecimiento por el uso del). Puls. merc. sil. n-vom. sep. chin. ars.

B

Baile (malas consecuencias del). Bell. stram. cic. hyosc. acon. plat.
Bajarse (padecimiento al). N-vom. bell. acon. bry. hep. puls.
Balanitis, ó inflamacion del glande. Merc. nitr-ac. thui. sulf. sep.
Balbuceo y tartamudez. Belladona. euphr. caus. stram. aur. sulf. acon. op.
Banos, como causa (de los). Rhus. ant. carb-veg. sass. sulf.
— frios. Ars. dulc. puls. sass. sulf. ant. calc.
— mar (de). Ars. rhus. sep.
— piés (de). Rhus. puls. sil. cupr. nitr-ac. merc.
Bebedores (enfermedades de los). *Véase* Borrachos.
Beber (padecimientos por). Aur. bell. lach. merc. sil. cupr.
— de prisa (por). Sil. ars. n-vom. nitr-ac. sulf.
Bebidas, como causa (las). Ars. chin. ferr. natr. sil. veratr.
Bebido (padecimientos despues de haber). Ars. ferr. chin. natr. sil. veratr.
Berza cocida (padecimiento por la). Bry. petr. ca. lyc. puls. chin. phosph.
Bilis, afecciones biliosas. Acon. cham. n-vom. merc. bry.
Blefaritis (con orzuelo). Puls. staph. calc. ferr. anim.
— **Blefaritis**. Bell. acon. ars. cham. hep. n-vom. puls. sulf. ign. sep.
— aguda. Acon. bell. merc. champ. hep. puls. n-vom.
— borde de los párpados (en el). Bell. puls. hep. merc. cham.
— conjuntiva (en la). Acon. ars. bell. merc. puls.
— crónica. Ant. ars. calc. chin. sulf.
— esterna. Acon. bell. hep. sulf.
Blenorragia. *Véase* Gonorrea.
Boca (afecciones en la). Merc. n-vom. carb-veg. ars. bor. sulf-ac. sulf.
— aftas (en las). Bor. sulf-ac. merc. n-vom. sulf.
— convulsa, contraida, estirada. Bell. hyosc. caus. cham. op.
— — azulada. Veratr. cin. cupr.
— cerrada por calambre. Bell. camph. lach. merc. op. veratr.
— entreabierta, espasmódicamente. Bell. op. puls. ars. hyosc. acon.

Digitized by Google

Boca escoriada por dentro. Merc. n-vom. lach. phosph. carb-veg. sil.
— espumosa. Bell. hyos. ign. camph. stram. veratr.
— fétida. Merc. arn. ars. bell. rhus. sil. sulf.
— hinchada por dentro. Merc. n-vom bell. lach amm. sep.
— inflamada por dentro. Acon. merc. lach. bell. n-vom. canth.
— rodeada de un círculo amarillo. N-vom. sep.
— seca por dentro. Acon. bell. ars. hyos. merc. n-vom.
— ulcerada por dentro. Merc. nitr-ac. op. bell. hep. iod. n-vom.
Boca del estómago (afecciones del estómago y). Bry. ars. cupr. phos. veratr. n-vom.
— con acúmulo de gases. N-vom. ars. bell. calc. lyc.
— dartros (en la). Ars.
— dolor (en la). Ars. n-vom. veratr. bry. calc
— hinchazon (en la). Sulf. calc. hep. lyc. natr-m. petr.
— sensibilidad al contacto. Bry. n-vom. calc. lyc. sulf. hep.
Bocio. Iod. spong. calc. lyc. amm. natr.
Borborigmos. Veratr. chin. carb-veg. ign. natr. puls. sep. sulf.
Borrascoso (padecimiento por un tiempo). Sil. sep. natr-m. bry.
Bostezos. Hep. rhus. n-vom. lyc. ign. bry.
— abortados. Lyc. lach.
— calambroideos. Hep. ign. rhus. plat.
— pandiculaciones (con). N-vom. plat. bry. puls.
— violentos. Hep. rhus. ign. n-vom. plat.
Brazos (afecciones de los). Lach. lyc. ign. phos. puls.
Bronquitis. Acon. merc. bell. bry. spong. phos. n-vom puls. cham.
— catarral, ó catarro bronquial. Merc. n-vom. puls. cham. rhus. sulf.
— coriza (con). Merc. puls. sulf. dulc. ars. lach. bell. hep.
— edad avanzada (en las personas de). Carb-veg. con. baryt. hyosc. sulf.
— escrofulosos (en los sujetos). Bell. calc. hep sulf.
— epidémica ó grippe. Merc. bell. n-vom. bry. acon. caus. rhus. hep. ars. phos.
— espasmódica, con tos convulsiva. Ipec. carb-veg. bell. n-vom. con. dros.
— gruesa (en las personas). Calc. ipec.
— inflamatoria. Acon. bell. bry. phos. spong.
— niños (en los). Acon. cham. tart. ipec. sulf.
Bronquitis mucosa con espectoracion. Puls. merc. sulf. tart. dulc. carb-veg.
— ronquera (con). Dulc. carb-veg. merc. cham. sulf.
— sarampion (á consecuencia del). Dros. carb-veg. bry. cham.
— seca, con tos seca. N-vom. bry. cham. bell. ign. sulf. acon.
— sofocante, con acceso de sofocacion. Ars. ipec. op. carb-v. chin. lach.
Bubones escrofulosos. Sil. hep. aur. merc. sulf. nitr-ac.
— sifilíticos. Mercur. nitr-ac. carb-an. aur. carb-veg.
Bulimia. Chin. cin. hyos. iod. sabad. spig. sulf.

C

Cabellos (afecciones de los). Bell. borax. graph. hep. kal. lyc. natr-m. sulf.
— cefalalgias (despues de frecuentes). Hep. nitr-ac. calc. sil. sulf.
— (caida de los). Hep. kal. sulf. calc. graph. natr-m.
— — por los lados. Graph. phos. kal. zinc.
— — por delante. Ars. natr-m. phos
— — en el occipucio. Carb-veg. phosph. sil. petr.
— — por detrás de las orejas. Phos.
— — por chapas. Canth. iod. phos.
— — en las sienes. Calc. kal. lyc. natr-m.
— — en el vértice. Baryt. lyc. graph. sep. zinc.
— debilidad (por). Ars. chin. ferr. carb-veg. veratr.
— disgusto (por efecto de un). Ign. phos-ac. staph.
— encanecidos. Phos-ac. staph. lyc. ars.
— con dolor. Ars. chin. carb-v. n-vom. fer.
— enfermedades graves (por). Lyc. hep. sil.
— enredados. Lyc. phos-ac. bor. natr-m.
— enrizamiento (de los). Arn. canth. zinc.
— flacidez (de los). Phos-ac.
— grasos. Bry. plumb.
— mercurio (por abuso del). Hep. nitr-ac. carb-veg. kal. iod.
— sequedad (de los). Kal. calc. phos-ac.
— sudores (despues de frecuentes). Merc. chin. ferr.
— viscosos. Chin.
Cabeza afectada. Bell. verb. sil. n-vom. ign. phosph. acon. sabin. natr-m. sabad
— calor (de). Arn. acon. sulf. bell. sep. bry. sil.
— congestion (de). Bell. acon. n-vom. arn. sulf. bry. op. lach.

Digitized by Google

Cabeza (costras de). *Véase* Tiña.
— dolores (de). *Véase* Cefalalgia.
— fatiga (de). *Véase* Meditacion difícil.
— voluminosa (muy) en los niños. Calc. sulf. sil.
Café (padecimientos por el uso del). N-vom. cham. ign. merc. canth.
— agitacion nerviosa. N-vom. cham. acon.
— cefalalgia. N-vom. cham.
— cólicos. Cham. n-vom. ign. bell. coloc.
— gastralgia. Cham. n-vom. cocc.
— hernia (dolor de). N-vom. cham.
— insomnio. N-vom. acon.
— odontalgia. Cham. n-vom. ign. bell. cocc. merc.
Caida (padecimientos de resultas de una). Arn. cic. bry. con. puls. rhus.
— de los cabellos. *Véase* Cabellos (caida).
— de la matriz. *Véase* Matriz (caida).
— de los párpados. *Véase* Párpados (caida).
— de las uñas. *Véase* Uñas (caida).
Calambres. Cham. camph. bell. cup. op. ign. n-vom. veratr.
— de la matriz, del pecho, de los párpados, etc. *Véase* Pecho, Matriz, etc.
Cálculos. Sil. sass. lyc. sulf. calc.
— biliares. Calc. hep. lach. sil. sult.
— renales. Lyc. sass. calc. phos. sil. zinc. cann.
— vesicales. Sass. cann. lyc. calc. ant. phos. rut.
Calofrios. Merc. puls. caps. chin. veratr. ars. n-vom. ipec. bry. lyc. nitr-ac.
— acompañados de calor. Acon. n-vom. bell. puls. ars. rhus. merc. cham. ign.
— alternando con calor. Chin. n-vom. merc. ars. bry. calc. sulf. bell.
— precedidos de calor. Bell. caps. bry. puls. n-vom. sep. lyc. staph.
— seguidos de calor. Acon. n-vom. bell. puls. arn. sulf. spig. rhus.
— parciales. Bell. puls. cham. n-vom. acon. lach.
— sed (con). Bry. natr-m. cin. calc. veratr. acon. chin. arn.
— — (sin). Puls. ars. n-vom. chin. daph. rhus. spig. sabad.
— con sudor. Puls. lyc. sulf. sabad. n-vom. ars. calc.
— seguidos de sudor. Bry. rhus. caus. lyc. carb-an. caps. sabad. veratr. natr-m.
Calor (padecimientos por el). Acon. carb-veg. ars. aur. rhus.
— del aire. Carb-veg. ant. bry. lyc. puls. sulf.
— de la habitacion. Acon. arn. natr-m. phos. puls. sulf.
— del fuego. Merc. ant. bry.
Calor de la cama. Ars. merc. sulf. bell carb-veg. cham.
Callos en los piés. Arn. ant. calc. lyc. nitr-ac. sep. sil. sulf.
Callosidades de la piel. Ant. sep. dulc. sulf. graph.
Camomila (padecimientos por abuso de la). Puls. ign. n-vom. coc. acon. coff.
— agitacion nerviosa (por la). Acon. n-vom. coff.
— cólicos. N-vom. coloc. borax.
— convulsiones. Ign. cocc.
— diarrea. Puls.
— dolores. Acon. coff.
— escoriaciones. Puls. ign.
— fiebre. Acon. coff.
— gastralgia. N-vom. ign.
— metralgia. Cocc.
— náuseas. Puls. n-vom.
— sobreexcitacion nerviosa. Acon. coff. n-vom.
Campanilla afectada. Coff. bell. merc. n-vom. puls. carb-veg.
— prolongada. Coff. calc. croc. dulc. lyc. iod.
— inflamada. Coff. acon. bell. merc. n-vom.
Cancer. Ars. kreos. graph. bell. cann. sil. sulf.
— del estómago, del útero. *Véase* Estómago. Utero.
Cantáridas (consecuencias por abuso de las). Camph.
Canto (padecimiento por el). Carb-veg. phosph. amm. dros. hep. stann. sulf.
Caparrosa. Carb-an. ars. calc. kreos. rhus. ruta. veratr.
Cara (afecciones de la). Bell. acon. cham. phos. plat. puls. rhus.
— agrisada. Ars. ferr. chin. lyc. merc. n-vom.
— amarilla. Acon. china. ferr. spig. sep. ars. n-vom. bell. bry.
— — alrededor de la nariz. Sep.
— — alrededor de la boca. N-vom. sep.
— — alrededor de los ojos. Nitr-ac. spig. n-vom.
— ardiente. Cham. acon. ars. bell. bry. plat. veratr.
— arrugada. Calc. op. sulf. lyc. sep.
— azulada. Acon. bell. op. veratr. ars. cham.
— acné rosa (con). Carb-an. calc. rhus. ruta. ars. veratr.
— caliente. Acon. merc. sulf. chin. cocc. arn.
— convulsa. Ars. bell. cham. sec. stram. n-vom.
— costrosa. Rhus. dulc. ars. graph. calc. merc.
— dartros (en la). Dulc. natr-m. rhus. carb-veg. sep. merc. bry.

Digitized by Google

Cara descompuesta. Ars. camph. chin. op. phos-ac. rhus. spig. stram. veratr.
— demacrada. Calc. ferr. selen. mez.
— dolorosa. *Véase* Prosopalgia.
— efélides (con). Ant. lyc. sulf. calc. dul. graph.
— entumecida. Hyos. n-vom. acon. ars. chin. op. phosph.
— erisipela (con). Bell. crotal. lach. rhus. puls. sep.
— fria. Camph. hyos. veratr.
— granulosa. Bell. carb-veg. ars. calc. veratr.
— hinchada. Bell. arn. merc. lach. lyc. sulf. phosph.
— hipocrática. Ars. phosph. chin. phos-ac. veratr. sec. carb-veg. n-vom.
— lustrosa, grasienta. Magn. natr-m. selen.
— macilenta, hundida. Ars. chin. veratr. n-vom. stann. sec.
— manchada. Ars. ferr. rhus. sulf. calc. merc. sil. natr.
— — de azul. Ferr. ars. veratr.
— — de amarillo. Sep. ferr. natr. colch. n-vom.
— — de rojo. Sulf. samb. ferr. bell. bry. lyc. sabad.
— — sucias (de chapas). Plumb. lach. sec.
— morenuzca. Bell. op. daph. hyos. nitr-ac. sep. sulf.
— negros (con poros). Sulf. natr. nitr-ac. dros. dig.
— negruzca. Chin. ars.
— pálida. Puls. merc. ars. carb-veg. chin. sep. sulf.
— pálida alternando con rubicundez. Acon. ign. croc. cham. bell. n-vom.
— paralítica. Caus. graph. op.
— prurito (con). Calc. con. lyc. natr-m. alum. chel.
— roja. Acon. bell. n-vom. hyos. merc. bry. op.
— rugosa. Graph. sulf. ars. rhus. sep.
— sucio (de un tinte). Lach. sec. ars. chin. ferr.
— sudosa. Carb-veg. ign. merc. n-vom. puls. rhus. veratr.
— térreo (de color). Ars. chin. ferr. n-vom. merc. lyc.
— vasos venosos á manera de red (con). Plat.
— verrugosa. Caus. dulc. calc. sep.
Carbon (padecimientos por el vapor del). Bell. op. amm. arn.
Carcinoma. *Véase* Cáncer.
Cardialgia. *Véase* Gastralgia.
Carditis. *Véase* Corazon (inflamacion del).
Carfologia. Rhus. hyosc. bell. op. phos. phos-ac.
Cáries de los huesos. Sil. calc. lyc. merc. phos-ac. sulf. asa.
Catalepsia. Plat. cham. ipec. stram. acon. bell. hyosc. mosch. veratr. cic.
Catarata. Puls. sil. amm. con. sulf. phos. magn.
Catarro bronquial. *Véase* Bronquitis catarral.
— febril. *Véase* Fiebre catarral.
— nasal. *V.* Coriza.
— pulmonar. *V.* Bronquitis catarral.
— sofocante. *V.* Ortopnea paralítica.
— vesical. *V.* Cistitis catarral.
Cebollas (Padecimientos por el uso de las). Thui.
Cefalalgia. N-vom. bell. acon. bry. coff. puls. merc. sulf.
— artrítica. Colc. bell. n-vom. bry. ipec. sep.
— baño (á consecuencia de un). Ant. calc. puls.
— bebidas frias (por las). Acon. bell. ars. natr. puls.
— catarral. Sulf. n-vom. acon. chin. cin. merc.
— calor (por efecto del). Acon. carb-veg. bell. bry. sil.
— café (por abuso del). N-vom. cham. ign. bell.
— cólera (por un arrebato de). Cham. n-vom. bry.
— congestiva. Acon. bell. bry. lach. op. sulf. n-vom. arn.
— contrariedad (por una). Cham. bry. n-vom. ign.
— corriente de aire (por una). Acon. chin. bell. n-vom. coloc.
— por una conmocion del cerebro. Cic. con. bry. bell. hyosc.
— derrengadura (por una). Rhus. arn. calc. sil. natr. bry.
— disgusto (por un). Ign. staph. phos-ac.
— esceso (por un). Carb-veg. n-vom. puls. cocc. bry.
— esceso de estudio (por un). N-vom. sulf. calc. lach.
— esfuerzos corporales (por). Rhus. arn. calc.
— emocion moral (por una). Ign. n-vom. cham. coff. bry. op.
— entriamiento (por un). Dulc. bell. acon. merc. puls. coff. n-vom.
— espirituosas (por abuso de las bebidas). Carb-veg. n-vom. calc. puls. sulf.
— gástrica. Puls. n-vom. ipec. ant. arn. bry.
— golpes en la cabeza (por efecto de). Arn. cic. con. bry.
— histérica. Ign. acon. sep. plat. mosch.
— indigestion (por una). Puls. rhus. n-vom. ipec. sulf.
— jaqueca. Seneg. spig. sep. n-vom. puls. coloc.

Cefalalgia mercurial. Hep. nitr-ac. aur. carb-veg. chin. sulf.
— metálica (por la accion de un veneno). Sulf. hep. carb-veg. chin. puls.
— mujeres (en las). Puls. cham. acon. bell. plat. chin.
— nerviosa. Coff. n-vom. ign. cham. acon.
— niños (en los). Bell. cham. acon. coff. ign.
— reumática. Puls. merc. acon. sulf. chin.
— sensibles (en las personas). Coff. acon. ign. n-vom. cham.
— tabaco de humo (por el). Puls. n-vom. acon. ant. ign.
— tiempo (por el mal). Dulc. carb-veg. bry. rhus. rhod.
— veladas sucesivas (por). N-vom. cocc. puls. bry. calc. chin. sulf.
Celialgia. Ars. n-vom.
Celos (padecimiento por los). Ign. hyos. lach. n-vom. puls.
Centeno con cornezuelo (afeccion por el). Stram. bell. hyos. colch. solan-nigr.
Cerdo (padecimientos por el uso de la carne de). Puls. colch. carb-veg. dros. sep. natr-m.
Cerebro (afecciones del). Bell. hyosc. acon. bry. zinc. camph.
— congestion (al). *V.* Apoplejía.
— hidropesía (del). *V.* Hidrocéfalo.
— inflamacion (del). *V.* Meningitis.
Cerveza (padecimiento por el uso de la). N-vom. sulf. bell. puls.
Chancro *Véase* Sífilis.
Cianosis. Hydr-ac. dig. laur. veratr. camph. lach. cupr. acon.
Cistitis. Con. canth. puls. n-vom. acon. dig.
— catarral ó catarro vesical. Dulc. puls. sulf. n-vom. ant.
— del cuello de la vejiga. Cann. canth. n-vom. puls.
— hemorroidal. Puls. n-vom. sulf. borax.
Claudicacion espontanea. Coloc. rhus. bry. sulf. calc. sil. lyc.
Cloro (padecimiento por el uso del). Puls.
Clorosis. Sulf. calc. ferr. puls. con. crotal. sep.
Cobre (padecimientos por el uso del). Hep. n-vom. bell. ipec.
Coito (padecimientos relativos al). Natr-m. kal. lyc. sep. con.
— eyaculacion sin energía. Calc. phos. con. natr-m.
— — insuficiente. Agar.
— — demasiado lenta. Calc. lach. lyc.
— — completamente nula. Kal. lach. lyc. calad.
— — demasiado pronto. Phos. zinc.
Cóito (debilidad á consecuencia del). Kal. petr. agar. calc. lyc. sep.
— imposible. *V.* Impotencia.
— (repugnancia al). Kal. lyc. phos.
— sin goce. Anac. calad. plat.
— con sufrimientos (despues del). Agar. calc. kal. sep. natr. n-vom.
Cólchico (padecimiento por abuso del). Cocc. n-vom. puls.
Cólera asiático. Veratr. ars. ipec. camph. sec. phos-ac.
— asfítico. Ars. veratr. camph. carb-veg.
— calambres (en que predominan los). Camph. cupr. sec. veratr.
— calambres en las pantorrillas. Camph. cupr. sec. veratr.
— cefalalgia (con). Camph. bell. veratr.
— debilidad (con). Chin. veratr. ars. carb-veg. ferr.
— cianosis. Camph. veratr. kal. iod. carb-veg.
— diarrea predominante. Veratr. ars. sec. ipec.
— esporádico. Dulc. cham. ipec.
— tifoideos (con síntomas). Hyosc. bry. rhus. cocc. phos-ac.
— vértigos (con). Camph. bell. n-vom. op.
— vómitos (en que predominan los). Ipec. veratr. ars.
Cólera (á consecuencia de un arrebato de). Cham. n-vom. bry. coloc. staph.
Coléricos (temperamentos). N-vom. phos. cham. bry. caus. sulf.
Colerina. Veratr. ars. sec. phos-ac. ipec. cupr. phos.
Coles (padecimiento por las). Bry. lyc. petr. chin. puls. cupr. sep.
Cólicos. Cham. coloc. bell. puls. acon. chin. sulf. rhus. rhab. cocc. veratr.
— baño (á consecuencia de un). N-vom. puls.
— cólera (por un arrebato de). Cham. coloc. sulf.
— derrengadura (á consecuencia de una). Rhus. bry. arn. carb-veg. lach.
— enfriamiento (por un). Cham. n-vom. merc. puls. coloc. chin.
— espasmódicos. Cham. coloc. bell. cocc. puls. n-vom.
— flatulentos. Carb-veg. cham. chin. bell. n-vom. sulf.
— golpe en el vientre (á consecuencia de un). Arn. bry. rhus.
— hemorroidales. N-vom. sulf. puls. carb. veg. petr.
— hipocondríacos (en sujetos). N-vom. sulf. calc. natr. chin.
— histéricos (en las mujeres). Cocc. ign. n-vom. magn-m.
— indigestion (por una). Puls. bell. n-vom. carb-veg. bry. sulf.

Cólicos á consecuencia de una indignacion. Cham. coloc. sulf.
— inflamatorios. Acon. bell. hyosc. merc. ars. puls.
— mujeres embarazadas (en las). Cham. puls. bell. sep. sulf.
— mujeres que están criando (en las). Arn. cham. puls. hyos. sep. veratr.
— mensuales ó durante las reglas. Cham. bell. cocc. puls. sec. n-vom.
— miserere (de). Op. n-vom. plumb. thui.
— niños (en los). Cham. rhab. bell. acon. calc.
— nefríticos. Puls. lyc. sass. bell. zinc.
— saburrales. Puls. n-vom. bell. bry. sulf.
— saturninos (por el plomo). Op. bell. cham. plat. alum
— uterinos. Cham. cocc. ign. n-vom.
— verminosos. Merc. con. sulf. cic.
Colorosis ó accidentes coléricos aislados. Ve. atr. ipec. cham. carb-vg. acon. ign. ars. camph.
— angustia y miedo. Ars. veratr. calc. acon. ign.
— colicos. Cham. veratr. coloc. camph. cupr.
— diarrea. Veratr. ipec. phos-ac. ars. sec. phos.
— dispepsia. Veratr. [n-vom. puls. ipec. i n.
— fiebre. Acon. bell.
— con gastricismo. Veratr. ipec. n-vom. carb-veg.
— náuseas. Ca b-veg. n-vom. ipec. puls. veratr.
— respiracion penosa. Carb-veg. chin. acon.
— vómitos. Ipec. veratr. carb-veg. n-vom.
Comezon. *V.* Prurito.
Comida (sufrimientos durante la). Carb-veg. phosph. sep. graph. puls. hep. natr-m. lyc.
— (á consecuencia de la). Sulf. ars. n-vom. calc. natr-m. carb-veg. hep. chin.
Condilomas. Nitr-ac. thui. lyc. phos-ac. sass.
— resquebrajados, coliflores. Thui. nitr-ac. lyc.
— planos. Thui. nitr-ac. sass.
— de cola. Lyc.
Congelacion (consecuencia de una). Arc. bry. carb-veg. acon. hyos. lach. puls.
Congestion. Acon. arn. n-vom. bell. bry. op. merc. sulf.
— á la cabeza. Acon. arn. bell. bry. op. n-vom. merc.
— al pecho. Acon. bell. n-vom. phos. sulf.
Congestion al vientre. N-vom. sulf. puls. carb-veg. ars. caps.
Conmocion de cerebro. Cic. arn. bry. merc. sulf.
Constipacion de vientre. N-vom. veratr. bry. op. sep. lyc. lach. alum.
— accidental. N-vom. veratr. op. bry. plumb.
— crónica ó habitual. N-vom. sulf. bry. calc. lyc. sep.
— niños de pecho (en los). N-vom. op. bry. lyc.
— mujeres embarazadas (en las). N-vom. sep. bry. op. lyc.
— mujeres recien paridas (en las). N-vom. op. bry. plat. ant.
— borrachos (en los). N-vom. lach. op. calc. sulf.
— plomo (por abuso del). Op. plat. alum.
— purgantes frecuentes (por el uso de). Op. n-vom. lach. ant. rut.
— sedentaria (en las personas de vida). N-vom. sulf. bry. plat. lyc.
— viejos (en los). Op. ant. phos. bry. sulf. lach.
— viaje (en). Plat. alum. op.
— hemorróides (por). N-vom. sulf.
Constricciones espasmódicas. Belladona, ign. alum. plumb. n-vom. rhus.
Contacto (sufrimientos por el). *V.* Tocamiento.
Contracciones calambroideas. Calc. lyc. sulf. caus. coloc. rhus.
Contractivos (dolores). *Véase* Dolores contractivos.
Contrariedad (consecuencias de una). Ign. acon. cham. bry. coloc. staph. n-vom.
Contusiones. Arn. euphr. con. puls. sulf-ac.
Conversacion (mal por una). Arn. ars. cocc. ign. n-vom. sulf.
— de otros (sufrimiento oyendo la). Ars. veratr.
Convulsiones. Bell. op. hyosc. cic. cupr. ign. ipec. stram. veratr.
Coqueluche. Cin. dros. ipec. carb-vg. n-vom. puls. veratr. acon.
— periodo catarral. Acon. dulc. ipec. puls. n-vom.
— — espasmodico. Cin. dros. carb-veg. kal. veratr.
— — de descenso. puls. arn. carb-veg. dulc. hep.
Corazon (afecciones del). Acon. puls. spig. calc. kal. natr-m. sep. sul.
— aneurisma (del). Carb-veg. lach. zinc. calc. caus. guai.
— latidos, palpitaciones. Acon. pulsat. spig. iod. lyc. natr-m. sulf.
— — acelerados. Tart. sulf. zinc. ars.

Corázon, latidos en desarmonia con el pulso. Spig. kal. dig. natr-m.
— — demasiado fuertes. Chin. dig. tart. sabin.
— — intermitentes. Natr-m. kal. sep. chin. ars.
— — irregulares. Spig. natr-m. ars. arn.
— — trémulos. Spig. ars. calc.
— hipertrofia (del). Brom. ars. kal. iod. spong.
— inflamacion. Acon. puls. bry. cann. caus. lach.
— polipo. Calc. staph. lach.
— espasmo. Dig. camph. ars. cham. puls. caus.
— reumatismo. Acon. lach. arn. bry. kal. caus. puls. spig.

Cordon espermatico (afecciones del). puls. n-vom. spong.

Corea. Lyc. cupr. bell. caus. n-vom. ign. zinc.

Coriza. Bell. cham. merc. puls. sulf. hep. n-vom. ars. amm. dulc. lach. euphr.
— agudo. Merc. bell. hep. puls.
— cronico. Hep. sil. sulf. calc. puls. graph. natr.
— epidémico. Merc. bell. hep. dulc.
— febril. Merc. spig. acon. puls. n-vom.
— fluente. Merc. puls. euphr. ars. bell. hep. ipec.
— frecuente, habitual. Sil. sulf. calc. graph. natr. puls.
— incipiente. N-vom. hep. amm. calc.
— ordinario, simple. Merc. bell. hep.
— recien nacidos (en los). N-vom. sil. amm.
— seco, con obstruccion de la nariz. N-vom. amm. lach. sulf. calc.
— suprimido. Ars. chin. puls. bell. n-vom. bry. sulf.
— — con bronquitis. Acon. n-vom. bry.
— — en la cabeza afectada. N-vom. chin. acon. bell. cham. sil. sulf.
— — con los ojos afectados. Euphr. bell. puls. lach. ign. n-vom.
— — con el pecho afectado. Ipec. ars. bry. n-vom.

Córnea (afecciones de la). Nitr-ac. cann. euphr. hep. merc.
— nubes. Cann. euphr. hep. nitr-ac.
— oscurecimiento (de la). Euphr. cann. magn. puls. sulf.
— película (sobre la). Lach. euphr. magn. calc.
— pústulas. Merc. kal. bry.
— úlceras. Ars. calc. bell. arg-n.

Corrida (con cuencias de una). Sil. sulf. aur. natr-m.

Corriente de aire (padecimiento por una). Bell. acon. chin. sulf. cham.

Corrosivos (padecimientos por el abuso de agentes). Puls. kal. sulf.

Corvas (dartros en las). Petr. carb-veg. natr-m. dulc. graph. ars. kreos.

Costra de leche. Rhus. ars. carb-an. sulf. calc.

Costras (erupcion de). Sulf. calc. ars. rhus. graph. dulc.

Coxalgia. Rhus. coloc. calc. bry. puls. bell. caus. sulf.

Coxartrocace. Phos-ac. sulf. coloc. calc. sil. hep. rhus.

Cráneo (padecimientos de los huesos del). Acon. merc. phos. nitr-ac. phos-ac.

Crecimiento (mal por el). Phos-ac. sulf. guai. n-aus.

Crepúsculo (padecimiento en el). Calc. puls. ars.

Crup. Acon. spong. hep. phos. lach. ars. cupr. mosch. tart.
— periodo inflamatorio. Acon. dros. spon.
— periodo de exudacion. Spong. phos. ars.
— prodromos. Acon. hep. dros. spong. cham. cin.
— periodo de descenso. Hep. phos. carb-veg. dros.

Cruz (dolores que se manifiestan en). Magn. puls. calc. nitr-ac. sil.

Cubriendo la cabeza (padecimiento en). Carb-veg. sulf.

Cystoplegia. Ars. bell. laur. dulc. hyosc.

D

Dartros. Sulf. calc. clem. con. dulc. graph. lyc. merc. rhus. sep. oleand.
— amarillentos. Cic. sulf. dulc. lyc. cupr. merc. sep.
— anulares. Sep. natr. natr-m.
— blancos. Ars. graph. lyc. zinc.
— escamosos. Dulc. calc. ars. phos. sulf.
— furfuráceos. Ars. bry. calc. sulf. kreos.
— grietados. Sep. sulf. calc. puls. rhus. cycl. graph. hep. lach. lyc.
— grises. Ambr. sulf.
— oscuros. Lyc. natr.
— pruritosos Clem. calc. ars. merc. sulf. rhus. sep.
— resudan (que). Merc. sulf. calc. clem. dulc. graph. sep.
— rojizos. Ars. lyc. sep. calc. graph. sulf.
— rojos. Graph. rhus. puls. sulf. clem.
— secos. Bry. calc. ars. veratr. staph. rhus. sep. sil.
— supuran (que). Sulf. merc. cic. clem. rhus. sep.

Debilidad. Ars. chin. phos-ac. carb-v. ipec. veratr. staph. sulf.
— carruaje (yendo en). Coce. petr. sep

Digitized by Google

Debilidad por la mas corta conversacion. Sulf. calc. natr-m. stann.
— crecimiento (por el). Phos-ac. sulf.
— enfermedades graves á consecuencia de). Chin. veratr. hep. sil. sulf.
— esfuerzos (á consecuencia de grandes). Calc. sulf. cocc. petr. sep.
— — (á los menores). Cocc. sep. sulf.
— excesos sexuales (despues de). Phos-ac. daph. calc. chin. sulf. sil. n-vom.
— histérica. Ign. cham. mosch. sep. natr-m. phosph.
— masturbacion (efecto de la). Sull. n-vom. cin. phos-ac. staph.
— movimiento (al menor). Veratr. cocc. staph. stann.
— nerviosa. N-vom. phos-ac. m-arc. calc. sulf. acon. ign. cham.
— niños (en los). Calc. sulf. sil. n-vom. lyc. baryt.
— pérdidas debilitantes (á consecuencia de). Chin. ipec. n-vom. sulf. phos-ac.
— pertinax. Chin. veratr. hep. phos-ac. natr.
— senil. Baryt. con. ambr. op. sec. aur.
— tempestad (durante una). Sil. petr. phosph. natr. nitr-ac.
— — rápida. Ars. ipec. veratr. phosph. carb-vg. cham. ign.
— vigilias prolongadas (despues de). N-vom. puls. carb-vg. cocc. natr.
Dedos afectados. Arn. caus. graph. sulf. sabin. asa.
— doloridos. Acon. sulf. arn. calc. lyc. bry. ars sabin.
— excoriados. Graph. natr. carb-an. nitr-ac. mang.
— sudosos. Cycl. tarax. arn. clem.
Deglucion dolorosa. Bell. merc. lach. hep. puls. sulf.
— de los alimentos. Merc. bell. cham. hep. sulf.
— de las bebidas. Bell. merc. lach. canth. phos.
— de la saliva. Merc. bell. bry. cocc. hep. merc.
— penosa, difícil. Bell. hyosc. merc. lach. canth. stram.
— de los alimentos. Alum. baryt. cham. hep. n-vom. sulf. sil.
— de las bebidas. Bell. lach. merc. aur. sil.
— involuntaria, necesidad de tragar. Bell. cham. ign. lach. merc. n-vom.
Delirios. Bell. acon. bry. hyosc. op. stram. n-vom. lach. sull.
— alegres. Acon. bell. op. sulf. veratr.
— ansiosos. Op. stram. bell. hyosc. sil. puls.
— fantásticos. Bell. stram. sulf. hyosc. op.
— furibundos. Bell. bry. op. acon. coloc.
Delirios locuaces. Bell. stram. rhus. veratr. lach. op.
— musitacion (con). Bell. hyos. stram. n-vom. op.
— nocturnos. Acon. bell. bry. rhab. puls. arn. sulf.
— tristes. Puls. acon. bell.
Denticion laboriosa. Cham. merc. sulf. acon. calc.
— agitacion nerviosa (con). Acon. coff. cham. bell.
— constipacion de vientre. N-vom. bry. magn-m.
— diarrea. Merc. sulf. cham. ipec. calc. ars.
— espasmos y convulsiones. Bell. cin. ign. cham. calc.
— fiebre. Acon. cham. n-vom. coff.
— insomnio. Coff. acon. cham. borax.
— tos. Cham. cin. n-vom.
Derecho (sufrimientos estando). Bry. aur. cocc. caps. phos-ac. plat. puls.
Derrengadura (consecuencias de una). Rhus. bry. puls. n-vom. calc.
Desayuno (sufrimientos despues del). Cham. n-vom. phosph. bry. calc. caus. natr. natr-m.
Descendiendo (padecimiento en). Acon. ars. aur. bry. petr. sull.
Descubrirse (padecimiento al). Acon. merc. ars. cocc. hep. n-vom.
Descubrirse la cabeza (mal al). Iod. lyc. acon. calc. ferr. puls. spig. veratr.
Descubriendo un miembro (en). Hep. sil. rhus. squill. stram.
Deseo de ácidos. Acon. sulf. arn. ars. chin. puls. veratr.
— aguardiente (de). Lach. sulf. hep. ars. chin.
— aire libre (de). Stram. rhus. cocc. n-vom. magn. plat.
— alimentos grasos (de). N-vom. nitr-ac.
— amargos (de alimentos). Dig. natr-m. sulf.
— café (de). Ang. ars. bry. carb-veg. con. aur.
— cal, yeso (de). Nitr-ac. n-vom. calc. hep. ign.
— carbon (de). Cic. con.
— carne (de). Sulf. hell. magn.
— carne ahumada (de). Caus.
— cerveza (de). Sulf. acon. cocc. merc. n-vom. puls.
— farináceos (de). Sabad.
— frios (de alimentos). Sulf-ac. veratr. puls. ign. tart.
— frituras (de). Plumb.
— golosina (de). Chin. ipec. calc. natr. petr. rhus.
— grasas (de cosas). N-vom. nitr-ac.
— legumbres (de). Alum. magn.
— leche (de). Sabad. merc. sil. staph ars. rhus.

Digitized by Google

Deseo de alimentos líquidos. Bry. merc. staph. sulf. ferr.
— pan (de). Puls. ars. bell. natr. natr-m. plumb.
— queso (de). Arg.
— refrigerantes (de cosas). Puls. rhab. cocc. caus.
— suculentos (de alimentos). Phos-ac.
— vino (de). Calc. staph. acon. bry. hep. lach. sulf.

Deseos de las mujeres embarazadas. Sep. ign. ip. c. con. puls.
— á las uñas. Rhus. calc. sulf. lyc.

Desesperacion. Acon. calc. veratr. ign. lach. puls. sulf. valer.

Desfallecimiento, desmayo. Acon. ign. n-vom. op. camph. carb-veg. cham.
— alegría (despues de un acceso de). Coff. op.
— caida (á consecuencia de una). Arn.
— dolor (por el mas pequeño). Hep. n-mosch.
— dolor (por la intensidad del). Acon. cham.
— borrachos (en los). Carb-veg. op. acon.
— emociones morales (despues de). Ign. acon. coff. op. cham. veratr.
— esfuerzos intelectuales (despues de). N-vom. lach.
— mercurio (por abuso del). Hep. lach. op.
— movimiento (al menor). Arn. acon. veratr.
— pérdidas debilitantes (á consecuencia de). Carb-veg. chin. veratr. n-vom.
— sobresalto (despues de un). Ign. op. veratr. coff.
— vértigos (con). Acon. bell. n-vom. bry. ars.

Desnudándose (padecimientos en). Ars. dros. n-vom. rhus. oleand. puls. cocc. spong.

Desolladuras. Arn. sulf-ac. puls.
— de los enfermos que están mucho tiempo en cama. Arn. sulf-ac.

Destete (padecimiento por el). Puls. bell. calc. bry.

Diabetes sacarina. Phos-ac. merc. nitr-ac. phosph. sulf. natr-m. aur. harvt.

Diarrea. Veratr. cham. puls. merc. chin. ars. dulc. ferr. ipec. rhab. sec.
— ácidos (por el uso de los). Staph. bry. n-vom. ant.
— alegría excesiva (por una). Coff. acon. op. veratr. puls.
— alternando con constipacion. Ant. phos. bry. lach. n-vom.
— bebido frio (por haber). Ars. carb-veg. puls. n-mosch.
— biliosa. Ars. cham. merc. puls. chin.
— calofrios (con). Puls. merc. sulf.
— á consecuencia de un arrebato de cólera. Cham. n-vom. coloc.
— cólicos (con). Cham. coloc. merc. ars. rhus. bry. sulf. chin. rhab.
— comida (despues de cada). Chin. ferr. coloc. a. s. lach.
— debilitadas (en las personas). Chin. ferr. phos-ac. phos.
— debilitante. Chin. ipec. veratr. phos. phos-ac.
— dentician (durante la). Merc. sulf. cham. ars. calc. cocc. ferr.
— disgusto (á consecuencia de un). Staph. phos-ac. ign.
— dolor (sin). Ars. chin. puls. veratr. phos-ac. fer.
— edad avanzada (en las personas de). Ars. bry. phos. sec. ant.
— emocion (á consecuencia de una). Cham. coloc. acon. coff.
— debida á un exantema. Ipec. ars. merc. puls. sulf.
— enfriamiento (debida á un). Dulc. merc. bry. cham.
— escrofulosa. Sulf. calc. sil. lyc. ars. sep.
— estercorácea. Ars. puls. cham. rhab. sulf.
— estío (en). Ars. dulc. bry. merc. carb-veg.
— frutas (por el uso de las). Puls. ars. chin. lach.
— indigestion (á consecuencia de una). Coloc. staph.
— leche (por el uso de la). Sulf. lyc. bry. natr.
— lienteria. Chin. ferr. bry. ars. phos. phos-ac.
— mujeres embarazadas (de las). Sep. sulf. ant. phos.
— mujeres criando (en las). Rhab. ant. dulc. hyose
— matutina. Bry. ars. n-vom.
— mercurial. Hep. nitr-ac. carb-veg. chin. sulf.
— mucosa. Puls. merc. sulf. chin. caps.
— náuseas (con). Ipec. veratr. ars. cham. puls. merc.
— ninos (en los). Cham. merc. ipec. sulf. rhab.
— nocturna. Cham. ars. merc. chin. puls. ferr. sulf.
— orgia (despues de una). Carb-veg. n-vom.
— pertinaz. Sulf. graph. phos. calc. kreos. nitr-ac.
— por el otoño. Merc. ars. sulf. carb-veg. chin.
— primavera (en la). Dulc. merc. carb-veg. sulf. ars. bry.
— sed (con). Ars. cham. chin. ferr. dulc.
— serosa, acuosa. Merc. ferr. phos-ac. phos. ars. chin. ipec. puls. sec.

Digitized by

Diarrea despues del uso del tabaco. Puls. cham.
— tardes (por las). Puls. merc. sulf. dulc. veratr.
— terror (á consecuencia de un). Veratr. op. ant. acon. coff.
— tiempo húmedo (por un). Lach. rhod.
— tísicos (en los). Phos. calc. chin. ferr.
— vómitos (con). Ipec. veratr. ars. cupr. puls. camph. bell. rhab.
Dientes (afecciones de los). Cham. merc. n-vom. staph. bell. acon.
— alargamiento. Cham. bry. arn. bell. sulf. hyosc.
— cáries. Staph. croc. sep. phos. plumb. mez.
— (dentera). Merc. dulc. phos-ac. sulf. sulf-ac. mez. nitr-ac. staph.
— dolorosos. *Véase* Odontalgia.
— amarillos. Phos-ac. nitr-ac. lyc. iod.
— ennegrecimiento. Staph. merc. sep. plumb. squill.
— exfoliacion. Staph. arg-n. lach.
— fetidez. Calc. graph. kal. plumb. rhus
— flujo de sangre. Carb-vg. merc. sulf. ant. phos phos-ac.
— manchas. Staph. lach. euphorb. bell. plumb. borax.
— rechinamiento. Ars. bell. hyosc. lyc. stram. veratr.
— supuracion, fistulas. Calc. sil. sulf. caus. staph. natr-m.
— vacilacion. Cham. merc. staph. puls. amm. bry. caus.
— caminos (padecimientos en los). Calc. n-vom. sep. sulf-ac. rhus.
— cariados (en los). Cham. ant. staph. merc. n-vom.
— incisivos (en los). Sulf. sep. rhus. natr-m. m-arc.
— inferiores afeccion en los). Cham. bell. staph. m-arc.
— molares (en los). Staph. cham. chin. bry. natr.
— superiores (en los). Acon. bell. chin. sep. aur. carb-vg.
Digestion debil, laboriosa. *Véase* Dispepsia.
Diplopia. Bell. cic. hyosc. natr-m. puls. sulf.
Disecea. Puls. bell. caus. phos. calc. sulf.
— catarral. Cham. puls. merc. bell. hep. ars.
— congestiva. Aur. bell. merc. phos. puls. sil.
— enfriamiento (á consecuencia de un). Puls. merc. bell. ars. led. caus. sulf.
— erupciones repercutidas (á consecuencia de). Sulf. ant. caus. graph. lach.
— erupcion repercutida (despues de una). Sulf. bry. caus. lach.
— escarlatina (despues de la). Hep. bell.
Disecea á consecuencia de un exantema. Bell. puls. sulf. merc.
— evacuacion suprimida (á consecuencia de una). Hep. lach. led. bell. merc. puls.
— fiebres intermitentes (despues de las). Puls. calc. sulf. n-vom. carb-vg.
— hipertrofia de las amigdalas (con). Staph. aur. nitr-ac.
— mercurio (por abuso del). Staph. nitr-ac. asa. hep. aur. sulf. petr.
— mujeres embarazadas (en las). Sep. ipec. n-vom. sulf. natr. calc. chin. staph.
— nerviosa. Phos. arn. phos-ac. veratr. caus. petr.
— por el uso de la quina. Puls. calc. sulf. n-vom. carb-vg. hep.
— reumática. Puls. merc. caus. bell. sulf. lach. ars. hep. cham. calc.
— sarampion (á consecuencia del). Carb. veg. puls. merc.
— viruelas (á consecuencia de las). Sulf. merc.
Disenteria. Merc. sulf. ars. rhus. acon. puls. chin.
— bebido frio (despues de haber) Bry.
— noches frias de verano (por las). Acon. bry. cham. merc. n-vom.
— pantanosos (en lugares). Chin.
— pútrida. Ars. carb-vg. n-vom. chin.
— reumática. Cham.
Disfagia. *Véase* Deglucion dificil.
Disgusto (consecuencias de un). Ign. staph. phos-ac. caus. lach.
Dispepsia. Sulf. hep. puls. n-vom. lach. bry. calc. merc. carb-veg. arn. chin.
— alegres (en los sujetos). Puls. n-vom. ipec. acet. ars. sulf.
— café (por abuso del). N-vom. ign. cocc. merc. sulf. cham. puls. rhus.
— edad avanzada (en las personas de). Baryt. cic. n-vom. chin-ant.
— emociones morales (despues de). Phos-ac. staph. coloc. n-vom. chin. cham.
— espirituosas (por abuso de las bebidas). N-vom. carb-vg. sulf. lach puls.
— estudios forzados (á consecuencia de). N-vom. arn. sulf. calc. puls. lach. cocc.
— golpe en el epigastrio (por un). Arn. bry. rhus. puls. con.
— histéricas (en las personas). Ign. sep. puls. con. bell. n-mosch.
— niños (en los). N-vom. sulf. calc. lyc. puls. baryt. ipec. merc.
— pérdidas debilitantes (por). Chin. carb-vg. sulf. n-vom.
— sedentarias (en las personas). N-vom. sulf. calc. sep.
— tabaco (por el abuso del). Puls. sulf. n-vom.

Digitized by Google

Dispepsia por abuso del té de la China. Ferr. thui.
— vigilias prolongadas (despues de). Cocc. n-vom. carb-vg. puls.
Distension (sensacion de). Ign. bell. n-vom. spig. bry. merc.
Disuria. N-vom. puls. cann. canth. dulc. sasa. lyc. zinc.
Diviesos. Arn. bell. hep. sil. lyc. phosph. sulf. lach.
— de mucha magnitud. N-vom. sil. lyc. hep. nitr-ac. hyos. bell.
— pequeños. Arn. bell. sulf. lyc. magn. natr-m.
Doblar la parte enferma (sufrimiento al). Calc. ign. arn. chin. bry. bell. n-vom.
— la cabeza (al). Calc. spong. cic. rhus. arn.
Dolores artríticos. Acon. sulf. colch. puls. n-vom. ant. arn. hep. chin.
— batientes. *Véase* Pulsac on.
— cambiado de sitio. Puls. magn. sulf. chin. arn. rhod.
— contusivos. Arn. con. ruta. cic. cin. puls.
— como si descuartizaran. Bell. merc. bry. ign. n-vom. sulf. sil.
— cambroideos. Calc. coloc. plat. ign. carb-vg. oleand.
— contractivos. Alum. bell. ign. plumb. chin. graph.
— como si rasparan. Asa. phos-ac. puls. rhus.
— como si royeran. Dros. mez. ruta. alum. canth.
— cortantes, incisivos. Bell. canth. hyosc. coloc.
— como si aserraran. Calc. carb-vg. coloc. ign. oleand.
— desgarradores. Chin. merc. puls. bry. carb-vg. calc. sulf.
— distensivos. *Véase* Distension.
— excoriacion (de). Hep. ign. canth. arg.
— estremecimiento (de). Chin. colch. n-vom. puls.
— fractura (de). Hep. bry. arn. chin. n-vom. rhus. veratr.
— garra (como con una). Calc. lyc. graph. caus. carb-vg. ign. n-vom. phos. puls. sil.
— hormigueo (con). Cocc. puls. colch.
— lancinantes. Acon. bry. nitr-ac. merc. sil.
— luxacion (de). Rhus. arn. bry. amm. colch. puls.
— martillaran (como si). Aur.
— magulladura (de). Con. arn. bry. n-vom. rhus. nitr-ac. sulf.
— paralíticos. Chin. n-vom. carb-vg. cocc. staph.
— presivos. Chin. n-vom. oleand. ign. arn.
Dolores quemantes. Ars. carb-vg. caus. merc. n-vom.
— que producen aturdimiento. Cham. n-vom. oleand. cocc. plat.
— sordos. N-vom. plat. oleand. rhus. sulf.
— tensivos. Bry. caust. asa. bell. n-vom. puls.
— taladraran (como si). Bell. hep. merc. puls. sep. spig.
— tirantes. Arn. bry. cham. chin. merc.
— ulceracion (de). Amm. bry. ign. puls. sil. cham.
Dorso afectado. Calc. puls. sulf. sep. lach. petr. sil.
— encorvado. Puls. sulf. n-vom. calc. sil. rhus. staph.

E

Ebullicion de sangre. Acon. bell. merc. fer. hep. phos. sep. sulf.
Eclampsia. Bell. cham. ign. caus. n-vom. plat.
— mujeres embarazadas (de las). Plat. bell. hyosc. cham. cic.
— mujeres criando (de las). Plat. cham. bell. n-vom. sulf.
— niños (en los). Cham. bell. n-vom. cic. cin.
Ectima. Sil. sep. sulf. merc. ars. kreos. rhus. tart.
Eczema. Bell. dulc. merc. acon. phos. ars. sulf. graph. mez.
— edad avanzada (en las personas de). Aur. phos. staph. sulf.
— agudo. Acon. bell. dulc. petr. phos.
— crónico. Clem. dulc. merc. phos. sulf. graph. mez.
— febril. Acon. bell. dulc.
— niños (en los). Acon. bell. dulc. phos. sulf.
— impetiginoso. Bell. merc. rhus. carb-veg. dulc. sulf.
— rojo. Ars. aur. dulc. merc. sulf.
— simple Dulc. ars. petr. sulf. phos.
Edad avanzada (padecimientos en las personas de). Ambr. aur. baryt. con. op. s p.
Edema. Chin. bell. ars. sulf. kal. lyc. dig. bry.
Efélides. Con. sep. sulf. hyosc. lyc. nitr-ac. ant.
— hepáticos. Ant. lyc. sulf. laur. merc. sep.
— solares. Lyc. sulf. puls. ant. natr. calc.
Embarazo gástrico. *Véase* Gastricismo.
Emociones morales (tristes consecuencias de). Ign. acon. cham. staph. coff. coloc. n-vom.
— angustia. Bell. acon. cham. merc. plat.

Emociones morales (congestion á la cabeza por). Bell. acon. coff. n-vom. op.
— convulsiones. Bell. ign. cham. hyosc. op. samb.
— desfallecimiento. Veratr. coff. op. cham. ign.
— diarrea. Veratr. cham. puls.
— enajenacion. Plat. bell. hyos. op. stram. lach.
— gastricismo. Cham. coloc. puls. bry. n-vom. ign.
— (insomnio por). Coff. acon. staph. merc.
— parte moral afectada (estando la). Bell. aur. ign. phos-ac. plat. staph.
— vértigos. Bell. merc. n-vom. op.
— vómitos. N-vom. op. puls. ign.
Empeines. Carb-veg. bell. sulf. hep. n-vom. calc. carb-an. ars.
Enajenacion mental. Bell. hyosc. op. stram. veratr. ars. cupr. n-vom.
— disgusto (á consecuencia de un). Ign. phos-ac. staph. plat. ars.
— contrariedad (por una). N-vom. staph. lach.
— emocion moral (por una). Bell. hyosc. n-vom. plat.
— esceso en el estudio (por un). Lach. plat. stram. n-vom. op. sulf.
— mujeres (en las). Acon. bell. plat. puls. stram. veratr.
— — embarazadas (en las). Puls. bell. acon. stram. veratr.
— — paridas (en las). Plat. bell. puls. veratr.
— miedo (por un exceesivo). Op. Ign.
— borrachos (en los). N-vom. op. ars. bell. calc. hyos. lach. stram.
— orgullo (por). Plat. lyc.
— desórden en las reglas (por). Acon. bell. puls. plat.
— religiosas (con ideas). Lach. sulf. veratr. aur. puls.
Encefalitis. *Véase* Meningitis.
Encias (afecciones de las). Merc. sulf. staph. n-vom. bell. cham. carb-veg. caps.
— azuladas. Cin. lach. oleand. sabad.
— arrojan sangre con facilidad (que). Carb-veg. sulf. merc. calc. nitr-ac. sil.
— blancas. Merc. staph. carb-an. nitr-ac.
— desprendidas. Carb-veg. merc. natr. phos. rhus. sep.
— escoriadas. Carb-veg. sep. sil. chin. nitr-ac.
— escorbúticas. Merc. n-vom. carb-veg. sulf. staph. caps.
— fétidas. Graph. calc. rhus.
— fungosas. Staph. sulf. carb-veg. merc. nitr-ac.
Encias hinchadas. Acon. n-vom. merc. staph. sulph. phos-ac.
— inflamadas. N-vom. sulf. hep. natr-m. sep. anm.
— (nudosidades en las). Staph. calc. caus. phos-ac. thui. natr.
— pálidas. Merc. staph. carb-an. nitr-ac. aur. plumb. zinc.
— rojas. Hep. n-vom. sulf. amm. natr-m. sep.
— que supuran. Merc. sulf. carb-veg. staph. caus. natr-m.
— ulceradas. Merc. staph. calc. carb-vg. sulf-ac. natr-m. lyc.
— vesículas (cubiertas de). Bell. mez.
Encogimiento. Merc. cic. rhus. n-vom. puls. bell. phosph. bry. petr.
Encorvándose (padecimiento en). Bell. n-vom. puls. bry. acon. hep. sep. spig.
Enderezándose (padecimiento en). Acon. sulf. bell. rhus. bry. op. n-vom.
Enflaquecimiento. Ars. chin. graph. calc. phos. sulf.
— niños (en los). N-vom. sulf. calc. baryt ars.
— cara (de la). Calc. chin. sulf.
— parcial. Plumb. sulf. bry. graph.
— partes enfermas (de las). Bry. puls. carb-veg.
Enfriamiento (padecimiento por un). Dulc. acon. n-vom. cham. puls. merc.
— cefalalgia. Acon. n-vom bell. dulc.
— cólicos. Cham. merc. bell.
— diarrea. Merc. veratr. dulc. puls. sulf.
— disuria. Puls. calc. dulc.
— fiebre. Acon. coff bell. merc. dulc.
— gastricismo. Ipec. acon. n-vom. puls. bry.
— odontalgia. Cham. dulc. acon. coff. merc.
— oftalmia Acon. bell merc.
— otalgia. Puls. merc. bell.
— oido (afeccion al). Dulc. puls. acon. bell.
— prosopalgia. Acon. merc. dulc. bell. n-vom.
— reuma. Puls. acon. merc. dulc.
— constipacion al cerebro. Merc. n-vom. dulc. acon. puls. bell. hep.
— — de pecho. Acon. bry. n-vom. puls. bell.
— sudores abundantes. Merc. cham.
— vista (afeccion á la). Bell. dulc. merc.
— de los piés (padecimiento por un). Sil. puls. cham.
— en la cabeza (padecimiento por un). Sep. bell. puls. led.
Enfriamientos (facilidad á los). Dulc. baryt. sulf. calc. sep. carb-veg. sil. graph.
Engrosamiento de la piel. Ant. dulc. graph. rhus. sep. sil.

Digitized by Google

Ensueños. Chin. sil. n-vom. puls. sulf. phosph. lyc.
— agua (de). Sil. ars. merc. ferr. magn. ign.
— agradables. N-vom. op. puls. acon. magn-m. staph.
— animales (de). Puls. sulf. arn. phosph. bell. veratr. hyos.
— ansiosos. Chin sil. bell. n-vom. sulf. ca c. acon.
— aparecidos, espectros (de). Sil. carb-veg. puls. ign. alum. kal.
— bailes (de). Ant. natr. alum. magn.
— caidas (de). Chin. thui.
— confusos. Chin puls. croc. stann. natr.
— continúan despues de despertar. Ign. chin. calc. natr-m.
— contrariantes. Cham. nitr-ac. chin. natr-m. staph. caus. bry. n-vom.
— desdichas (de). Puls, arn. phosph. ars. n-vom. chin.
— enfermedades (de). N-vom. kal. calc. con. amm. sep.
— eróticos. Op. chin. staph. ign. n-vom. sil.
— fantásticos. Sil. carb-veg. sulf. con. petr. n-vom.
— frecuentes. Chin. sil. lyc. carb-veg. puls n-vom.
— fuego (de). Sulf. ars. hep. calc. spong. natr. spig.
— guerra y soldados (de). Hep. bry. amm-m. ferr. spong. merc.
— ladrones (de). Merc. aur. sil. natr. veratr. bell.
— muertos, cadáveres (de). Phosph. anac. phos-ac. thui. kal.
— plata (de). Zinc. alum. mang. cycl.
— pulgas, etc. (de). N-vom. alum. sil. amm. phosph. kal.
— querellas (de). N-vom. bry. staph. arn. phosph. cham.
— sucesos del dia (de los). N-vom. bry. sil. rhus. puls.
— tempestades (de). Spig. ars. arn.
— viajes (de). Op. lach. sil. sang. magn-m. natr.

Enteralgia. *Véase* Cólicos.

Enteritis. Acon merc. hyosc. ars. bell. lach. bry.
— artrítica. Bell. n-vom sulf. merc.

Entorpecimiento de los miembros. Puls. croc. rhus. chin.

Epigastrio (afecciones del). N-vom. bry. cham. cocc. sulf

Epilepsia. Bell. calc. sulf. cupr. n-vom. ign. op. caus. sil.

Epistaxis. Acon. chin. bry. arn. croc. bell.

Equimosis. Sulf-ac. bry. n-vom. arn. con. puls. sulf.

Erecciones. Canth graph. n-vom. phos. natr-m puls. sil.

Erecciones (falta de). Con. lyc. kal. graph. caus. hep.
— cortas (demasiado). Con. calc.
— dolorosas. Con. n-vom. canth. thui. merc. puls.
— débiles (muy). Baryt. hep. lyc. selen. sulf.
— fuertes (muy). Zinc. puls. canth phos. sabin.
— frecuentes (muy). Natr-m. n-vom. phos. puls. con.

Eretismo nervioso. Acon. cham. n-vom. merc. coff.

Erisipela. Bell acon. lach. rhus. merc.
— edematosa. Sulf. ars. rhus. chin. bell. merc.
— flemonosa. Bell. rhus. merc. lach. puls. acon.
— gangrenosa. Ars. carb-veg. lach. bell. sil. chin.
— simple. Acon. bell. hep. lach.

Eritema. Acon. cham. ign. graph. hep. puls. merc.
— niños (en los). Cham. puls. ign. acon. sulf.
— mujeres (en las). Graph. sep. carb-veg. caus. sulf.
— nalgas (entre las). Carb-veg. cham. sulf. caus. hep. graph. lyc. calc. natr-m.

Erutos. Bry. sulf. ant. n-vom. arn. natr-m. veratr. cocc. sep. rhus. con.
— ácres. Merc. alum. asa. sulf. hep. phos-ac. bell.
— ágrios. Puls. n-vom. sulf-ac. carb-vg. sulf. phosph. calc. lyc. natr-m. graph.
— ajo (de olor á). Asa.
— aire (de). N-vom. bry. sulf. carb-veg. lach. caus. hep. con. arn. veratr.
— alimentos (con gusto á los). Puls. ant. sil. carb-veg. phosph.
— amargos. Bry. arn. puls. ars. con. graph. n-vom.
— abortados. Con. caus. phosph. carb-veg. sulf. ambr.
— dulce (de un gusto). Acon. sulf-ac. merc. alum. dulc.
— dolorosos. N-vom. cocc. phosph. petr. sep. carb-an.
— fétidos. Sulf. cocc. bism.
— pútrido (de un gusto). Puls. arn. coff. ant. merc. n-vom.
— ruidosos. Petr. con. sil. ant. puls. caus. phosph. ambr. lach. kal.
— rancio (de un gusto á). Thui. merc. asa. sulf. hep. bell. puls.
— repugnantes, nauseabundos. Sep. natr-m. cin.
— salado (de un gusto). Staph. arn. tart. sulf-ac.

Erupciones. Acon. bell. calc. clem. graph sulf. merc. puls. rhus. sep.
— ardientes. Ars. carb-veg. sulf. merc. hep. caus. caps. kreos.

Digitized by Google

Erupciones amarillentas. Merc. cic. nitr-ac. sep.
— blanquecinas. Ars. bry. puls. sulf. valer.
— burbujas (de). Cant. dulc. graph. rhus. sep. caus.
— costras (en forma de). Bell. lach. phos-ac. sep.
— dolorosas. Bell. ars. hep. lach. lyc. phos. merc.
— duras. Ant. aur. rhus. spig. valer.
— escoriacion (con dolor de). Hep. graph. puls. sulf.
— escamosas. Ars. calc. dulc. phos. sep. sil. sulf.
— finas. Carb-veg. graph. hep. phos-ac. natr-m. ars.
— furfuráceas. Bry. ars. sulf. calc. sil. kreos.
— granos (de). Ars. carb-veg. hep. graph.
— grietas (con). Graph. lyc. sep. rhus.
— grupos (en). Calc. rhus. phos. veratr. phos-ac.
— hinchazon (con). Bell. rhus. hep. sulf.
— húmedas. Merc. sulf. rhus. calc. cic. sep.
— indolentes. Hell. hyos. stram. cocc.
— negruzcas. Ars. rhus. bell. lach. sil. sec. mur-ac.
— pruritosas. Sulf. acon. ars. merc. sep. calc.
— pustulosas. Ant. cic. ars. dulc. puls. sulf. rhus.
— racimos (en forma de). Calc. rhus. veratr. staph.
— rojizas. Caust. sulf. ars. sil. petr. graph. cham.
— secas. Calc. baryt. bry. merc. staph. sep. sil. veratr.
— sudan (que). Calc. cic. clem. merc. rhus. sep. sulf.
— supuran (que). Rhus. sulf. hep. merc. cic. clem.
— ulceracion (con dolor de). Cham. puls. rhus. sil. merc.

Escarlatina. Bell. sulf. amm. phos. acon. merc.
— gangrenosa. Ars. carb-veg. amm. sulf lach.
— lisa. Bell. sulf. phosph. merc. amm. acon.
— miliar (en forma de). Sulf. acon. dulc. bell. bry. coff.
— repercutida. Phosph. bry. sulf. bell. phos-ac.

Escesos sexuales (malas consecuencias de los). Phos-ac. staph. con. calc. n-vom. cin.

Escirro. Con. sil. sulf. clem. sep. bell. petr.

Escorbuto. Amm. staph. n-vom. sulf. merc. carb-veg. lach. natr-m.

Escoriaciones. Cham. graph. ign puls. ep. sulf.
— ninos (en los). Acon. cham. ign. sulf. puls

Escrecencias. Thui. staph. nitr-ac. ant. calc. lyc.

Escribiendo (padecimiento en). Sil. aur. calc. sep. ign. kal. natr-m.

Escrófulas. Sulf. calc. merc. hep. baryt. iod. bell. sil. amm. ars.

Escroto (afecciones de). Sulf. petr. thui. rhus. cinn. calc. natr-m. carb-veg. sil.
— dartros (en el). Petr. calc. natr-m.
— prurito (en el). Petr. carb-veg. sil. graph. selen.
— sudor (en el). Sil. amm. sep. baryt. thui. ign. rhod. magn-m.

Esfacelo. Sec. chin. squill. lach. ars.

Esfuerzo (malas consecuencias de un). Rhus. arn. cocc. sulf. calc. ruta. sil. acon. lyc.

Esofagitis. Cocc. carb-veg. lach. ars. canth. a a.

Espasmos. Bell. stram. camph. n-vom. cupr. op. hyosc. cic. ign.
— clónicos. Bell. stram. ipec. cocc. veratr. hyos.
— internos. Ign. cham. ipec. coloc. cupr. bell. n-vom. hyos. stram.
— tónicos. Op. camph. veratr. bell. sec. cupr. stram. aug.

Espectoraciones por efecto de la tos. Puls. hep. lyc. tart. sil. kal.
— amarga. Puls. cham. n-vom. merc. ars. bry.
— acuosa. Merc. lach. carb-vg. ars. ferr. sulf.
— amarillenta. Puls. sulf. dros. lyc. bry. carb-veg.
— blanquecina. Puls. sulf. carb-veg. lyc. sep.
— copos (en forma de). Sulf. stann. agar. phos.
— constipado (como de un antiguo). Puls. bell. sulf. ign. n-vom.
— difícil. Chin. sulf ars. lach. seneg. sep.
— dulce. Calc. phos. stann. kal. puls. s. lf.
— espumosa. Ars. ferr. puls. lach. sil. phos.
— espesa. Puls. sulf. acon. ruta. calc. bell.
— fácil. Arg. kreos. sang. veratr.
— fétida. Puls. calc. sil. natr. sulf. caps. graph.
— frecuente. Puls. sulf. dulc. sep. squill. stann.
— gelatinosa. Laur. dig. arg. baryt. fer. chin.
— gris. Ambr. ars. lyc. sep. ars. dros.
— herbácea (de un sabor). Phos-ac.
— imposible. Caus. arn. sep. ambr. kal.
— moho (con gusto á). Borax.

Digitized by Google

Espectoracion mucosa. Puls. sulf. chin. dulc. ars. seneg.
— — con sangre. Bry. chin. ferr. acon. ars. bell.
— negruzca. Chin. lyc. n-vom. rhus.
— pútrida. Puls. stann. graph. carb-veg. arn. cham.
— purulenta. Calc. sulf. kal. sil. lyc. nitr-ac.
— rojiza. Bry. squill.
— salado (de gusto). Lyc. puls. ars. phos. natr.
— sanguinolenta. Acon. ipec. ferr. sulf-ac. arn. bry. lyc. phos. puls.
— trasparente. Sil. ars. ferr. seneg.
— verde (de un color). Magn. puls. ars. carb-veg. lyc. sulf.
— viscosa. Sil. kal. chin.

Esperma (alteracion en el). Sulf. caus. sep. mur-ac. merc. selen.

Espermatorrea. Ferr. phos-ac. sulf. calc.

Espinas (dolores como por). Nitr-ac. hep. carb-veg. cic.

Esplenalgia. Arn. sulf. acon. chin. ars. ign.

Esplenitis. Bry. sulf. chin. acon. ars. caps. n-vom.

Esputos de sangre. *Véase* Hemoptisis.

Estaño (padecimiento por el uso del). Cham. puls. hep. carb-veg. ign.

Estasis Agar. stram. acon.

Esteatoma. Baryt. calc. iod. sabin. ant. sulf. hep.

Estension de un miembro (padecimiento por la). Bell. n-vom. spig.

Esterilidad. Merc. borax. phos. cann. sulf. caus. natr-m.

Estomacace. N-vom. sulf-ac. carb-veg. merc. borax. ars.
— mercurial. Carb-veg. nitr-ac. hep. sulf. aur. staph.
— enfriamiento (despues de un). Dulc. n-vom. merc. carb-veg.

Estómago (afecciones del). N-vom. puls. hep. lach. sulf. ars. phos.
— cáncer (en el). Phos. lyc. ipec. n-vom. ars. baryt.
— desarreglo (de). *Véase* Indigestion.
— dolores. *Vease* Gastralgia.
— debilidad. *Véase* Dispepsia.
— gangrena en el. Sec. ars.
— inflamacion en el. *Véase* Gastritis.

Estornudar (mal por). Acon. hep. rhus. bell. ars. sil. kal.

Estornudo frecuente. Kal. con. sil. arn. calc. rhus.

Estrabismo. Alum. hyos. bell. puls. men. sec.

Estramonio (padecimiento por el uso del). N-vom. coff. hyos. bell.

Estrangulacion de los intestinos. *Vease* Hernia estrangulada.

Estrangurria. N-vom. puls. dulc. cann. sulf. merc. canth.

Estrofulus. Sulf. acon. bell. calc.

Estudios forzados (padecimiento por). N-vom. lach. calc. sulf. aur.

Evacuaciones alteradas. Merc. sulf puls. n-vom.
— ácidas. Rhab. calc. sulf. graph. natr merc.
— áceres. Merc. ars. puls. sulf. cham. veratr.
— acuosas. Sec. ars. puls. ferr. chin. phos-ac. cham. calc. dulc.
— amarillentas. Ipec. ars. merc. dulc. chin. puls. cham.
— ardientes. Ars. merc. lach. sulf.
— biliosas. Puls. ars. merc. cham. veratr. chin. bry. sulf.
— blanquecinas. Merc. acon. sulf. chin. puls. hep. phosph. ars. veratr. ipec.
— papilla (en forma de). Sulf. bell. puls. phosph. chin. rhab. ipec. cham.
— cambiando de color. Puls.
— difíciles. N-vom. alum. sil. chin. natr-m. sep. sulf plumb. op.
— duras. N-vom. calc. sep. ant. op. baryt. lach. alum. sil. sulf.
— escrementos de carnero (en forma de). Magn-m. sep. sulf. lach.
— espumosas. Sulf. calc. merc. chin. rhus. coloc.
— fétidas (muy). Ars. sulf. carb-veg. sil. puls. calc. merc. chin. n-vom.
— frecuentes. *Véase* Diarrea.
— gris (de color). Merc. phos-ac. aur. rhab. div. chin.
— inadvertidas. Sulf. colch. veratr. ars. puls. phos-ac.
— insuficientes. N-vom. calc. sulf. natr. alum chin.
— involuntarias. Rhus. arn. sec. bell. hyos. chin. phosph. ars.
— líquidas. *Véase* Diarrea.
— morenuzcas. Veratr. ars. sulf. chin sec. arn.
— mucosas. Puls. chin. sulf. bell. phos. merc.
— mucosas y sanguinolentas. Merc. sulf. ars. hep. rhus. puls. n-vom.
— negras. Veratr. ars. merc. chin. squill. cupr.
— picadas (como). Cham. rhus. puls. merc. lach.
— de materias no digeridas. Chin. arn. sulf. bry. ferr. phosph.
— pálidas (muy). Carb-veg. lyc. hep.
— purulentas. Merc. arn. lach. calth. nitr-ac. sil. sulf.
— pútridas. Sulf. ars. chin. carb-veg. n-vom. rhus. nitr-ac.
— raras. *Véase* Constipacion.

Digitized by Google

Evacuaciones sanguinolentas. Merc. sulf. puls. ars. rhus. ipec.
— verdosas. Merc. a s. puls. cham. veratr. i, ec.
— voluminosas. (muy).
— **con sufrimientos.** Merc. sulf. caps. ars. n-vom. rhab.
— antes de la eva nacion. Veratr. m rc. tart. cham. puls. caps. rhus. dulc.
— durante la evacuacion. Veratr. ars. sulf. cham. merc. puls. caps. rhab.
— á consecuencia de la evacuacion. Caus. phosph. n-vom. veratr. a s. sulf. calc.

Exantemas. *Vease* Erupciones.

Exóstosis. Merc. aur. phos. sil. phos-ac. calc.

F

Faringe (afecciones de la). Bell. acon. hyos. lach. m rc. coff. cocc. sulf. dulc.
— afectada de calambres. Bell. stram. ign. n-vom. sulf. cocc.
— inflamada Acon. bell. merc. coff. sulf. d lc.
— paralizada Caus. cupr. sil. lach laur.

Fatiga corporal (pa'ecimien'os por una). Arn. rhus caun. chin.
— intelectual (padecimiento por una). N-vom. calc lach. natr-m. sulf. arn.

Fiebre. Acon. bell. bry. ipec. cham. merc. n-vom. puls. sulf.
— amari la. Acon. bry. merc. crotal. lach.
— biliosa. Acon. cham. bry. n-vom. puls. chin. cocc.
— catarral. Bell. n-vom. puls. cham. merc. acon. dulc.
— cerebral. Acon. bell. bry. cupr. hyos. arn. rhus.
— denticion (de). Acon. cham. n vom sil. sulf. calc.
— gástrica. Ipec. puls. n-vom. ant. sulf. tart. bry.
— héctica. Ars. phosph. sulf. calc. ipec. chin cocc.
— inflamatoria. Acon. bell. bry. merc. hyos. n-vom.
— intermitente. Chin. ipec. n-vo n. puls. sulf. ars.
— lec'ie (de). Acon. coff. b ll. rhus.
— lenta. Ars. coc'e. phos-ac ipec. camph. chin.
— matutina. Bell. n-vom. b y calc. lach.
— modorra (con). Puls. tart. op. con. bell. hyos. an'.
— mucosa. Bell. puls. chin. rhus. merc. sulf.
— nervio-a. Bry. hyos. rhus. ars. mur-ac. na r-m.
— niños (n os). Acon. be'l. n-vom. bry. c'am.

Fiebre nocturna. Cham. ars. bell. rhus. m rc. sulf.
— pútrida. Ars. chin. rhus. bry. merc. carb-veg. phos-ac. nitr-ac.
— reumá ica. Acon. puls. bell. cham. bry. merc. n-vom.
— tifoidea. Bell. hyos. bry. rhus. ars. op. sulf. nitr-ac. phos-ac. merc.
— traumática. Arn. acon bry. puls. rhus.
— ve mimo'a Acon. me:c. cin. sulf. sil. cic. hyos.
— vespertina. Puls. bell. ars. bry. arn. l ch.

Fimosis. Merc. sulf. cann. thui. nitr-ac. s p.

Fistulas. Calc. sil. phosph. sulf. puls. caus. an'. carb-veg.
— ano (del). Calc. ign. sulf. sil. caus.
— dentaria. Calc. sulf. caus. sil. staph. na:r-m.
— lagrimal. Calc. bell. chel. arg-n. puls. su'f. sil. phosph.
— urinaria. Calc. sulf.

Flictenas, ampollas (erupcion de). Dulc. caus. canth. graph. rhus. ars.

Flores blancas. Puls. su'f. merc. sep. calc. alum. con cocc.
— ácres. Cham. puls. sulf. sep. phosph. kreos. ars. merc. mez.
— acuo-as. Puls. graph. carb-veg. sulf. alum. amm.
— amaril.as. Sep. n-vom. stann. su'f. ars. kreos.
— ardientes. Carb-an. calc. puls. sulf-ac. alum. kreos. amm. con. fluor-ac.
— a uladas. Ambr.
— blancas. Calc. puls. sil. merc. kreos. ferr. sep.
— clara de huevo (como). Borax. plat. amm-m. petr. bovis. mez.
— corrosivas. Sulf. sep. ars. phosph. con. cham. puls. sulf. merc. mez.
— espesas. Puls. sep. carb-veg. con. ars. borax. natr-m. magn-m. natr.
— fétidas. N-vom. kreos. natr. sep. nitr ac.
— lechosas. Puls. calc. sil. con. sep. lyc.
— mucosas. Puls. lach. con. stann. natr. sass. carb-veg. merc. cocc.
— morenuzcas. Cocc. nitr-ac. amm-m.
— nocturnas. Ambr. caus. natr-m.
— pruritosas. Calc. sulf. sep. merc. chin. cham.
— puriformes. Ca'c. merc. ign. sep. cocc. con.
— pútridas. Natr. sep. nitr-ac. kreos.
— que ponen tieso el lienzo. Sabin. alum. nitr. sep.
— reglas (antes de las). Calc. lach. carb-veg. chin. phosph. puls. graph. sulf.
— — (despues de las). Alum. puls. sabin. ruta. cocc. si . g aph. sulf. merc.

Flores durante las reglas. Alum. puls. chin. cocc. lach. graph.
— rojizas. Kreos. ars. sulf. cham. sep. puls. phosph. ruta.
— sanguinolentas. Chin. cocc. sep. calc. carb-veg. con.
— saliendo al orinar. Carb-veg. sil. amm-m. calc.
— serosas. Puls. graph. alum. carb-veg. amm. sulf.
— trasparentes. Stann. sulf-ac. alum natr-m.
— verdosas. Sep. carb-veg. merc. lach. natr-m.
— viscosas. Acon. phosph. tart.
Fósforo (padecimiento por el uso del). Coff. n-vom. sulf. bell. alum.
Fotofobia. Bell. acon. con. hep. phos. merc. sulf. cin.
Fracturas de los huesos. Calc. sulf. sil. lyc. ruta. nitr-ac.
Frio (padecimientos por el). Ars. dulc. camph. rhus. n-vom. rhod. hep. sil. cham.
Frotamiento (sufrimientos por el). Puls. con. sil. sep. caps. caus. merc. ars.
— (alivio por el). Calc. phosph. natr. sulf arn. ant. merc. puls.
Frutas (padecimiento por el uso de las). Puls. ars. bry. chin. veratr. sep. magn-m.
Fungosidades. Ant. sulf. sil. staph. ars. kreos.
— articulares. Ant. bry. sil. sulf. iod. staph. con.
— hematodes. Ars. carb-veg. carb-an. phosph. sep. sil.
— medular. Carb-an. phosph. thui. bell. sil. sulf.
Furor. Bell. stram. hyos. veratr. canth. op. ars.

G

Gangliones. Arn. sil. phosph. plumb. phos-ac. zinc.
Gangrena. Ars. sil. sec. squill. sulf. chin. acon. bell.
— esfacelo. Ars. sec. plumb. lach. sil. asa. euphorb. squill sulf-ac. sulf.
— húmeda. Chin. bell.
— inflamatoria. Sabin. sec. ars. bell. acon. mur-ac.
Garganta (afeccion de la). Bell. merc. acon. dulc. hep. lach. baryt brom.
— convulsa, espasmos de la garganta. Bell. stram. lach. n-vom. ign. veratr.
— dolorosa. Acon. bell. ign. merc. dulc. n-vom. hep. lach.
— escoriada. Alum. merc. lach. nitr-ac. arg. graph. caps. brom. carb-veg.
Garganta estrechada por los espasmos Bell. stram. n-vom. caps. veratr. ign.
— hinchada. Bell. lach. merc. hep. sulf. cham. coff. n-vom. ign.
— inflamada. Acon. bell. merc. dulc. brom. hep. lach. bar t.
— paralizada. Caus. cupr. sil. laur. lach. ars. bell.
— seca. Merc. bell. acon. sulf. n-vom. ign. cham.
Gases deletéreos. (padecimiento por los). Bell. op. sulf-ac. amm.
Gastralgia. N-vom. cocc. carb-veg. ign. puls. bell. sulf.
— borrachos (en los). N-vom. carb-veg. sulf. calc. lach.
— café (por el uso del). Cham. n-vom. ign. cocc.
— camomila (por el uso de la). Puls. n-vom. ign. bell.
— emocion (á consecuencia de una). Cham. coloc n-vom. staph. cocc.
— hipocondriacos (en los). N-vom. sulf. grat. cocc.
— histéricas (en las mujeres). Ign. n-vom cocc. calc. magn.
— indigestion (por una). Puls. n-vom. bry. ant.
— pérdidas debilitantes (á consecuencia de). Chin. carb-veg. n-vom. cocc. sulf.
— reglas desordenadas á consecuencia de). Puls. cocc. lyc. calc. cham. n-vom.
— — demasiado débiles (á consecuencia de las). Puls. cocc.
— — demasiado fuertes (á consecuencia de las). Calc. lyc.
— sal comun (por abuso de la). Carb-vg. nitr-sp.
Gastricismo. Puls. n-vom. ipec. ant. bry. cham.
— acaloramiento (á consecuencia de un). Bry. sil.
— ácidos (por el uso de los). Acon. hep. ars. carb-veg. lach. sulf.
— café (por el uso del). N-vom. cham. ign. cocc. merc.
— camomila (por el uso de la). Puls. n-vom. ign. bell.
— cólera (á consecuencia de un arrebato de). Cham. n-vom. bry. coloc.
— disgusto (á consecuencia de un). Ign. staph. phos-ac. lach.
— derrengadura (á consecuencia de una). Rhus. bry. arn. puls.
— esfuerzo corporal (por un). Arn. rhus. bry. puls.
— emocion (á consecuencia de). Cham. ign. coloc. acon. bry.
— estudio forzado (por un). N-vom. sulf. arn. puls.
— enfriamiento (á consecuencia de un). Cocc. ipec. puls. cham. ars.
— espirituosas (por abuso de las bebi-

Digitized by Google

das). N-vom. ars. carb-veg. lach. op.
Gastricismo por el uso de las frutas. Ars. puls. carb-veg.
— golpe sobre el estomago (á consecuencia de un). Arn. bry. rhus.
— helados (por el uso de los). Ars. puls.
— indigestion (á consecuencia de una). Puls. ipec. ant. n-vom. arn.
— mercurio (por abuso del). Carb-veg. aur. chin. sulf. hep.
— niños (en los). Cham. bry. ipec. merc. puls. n-vom.
— pérdidas debilitantes (á consecuencia de). Chin. carb-veg. ruta, calc.
— tabaco (por el uso del). Puls. n-vom. ipec. ign. staph.
— vigilias prolongadas (á consecuencia de). Cocc. puls. arn. n-vom. sulf.
Gastritis Acon. ars. bry. puls. n-vom. ipec. bell. hyos.
— aguda. Acon. bry. arn. puls. ipec. n-vom. bell.
— crónica. N-vom. sulf. hep. lach. calc. lyc.
— reumática. Acon. bell. n-vom. bry.
Gastro-enteritis. *Véase* Gastritis.
Glándulas (afecciones de las). Bell. merc. sulf. iod. con. lyc. hep. sil. amm. calc.
— doloridas. Cham. merc. phosph. bell. chin. sulf. calc.
— duras. Cham. con. iod. spong sil. sulf.
— escirrosas. Cham. bell. iod. lyc. clem. con. sil. phosph.
— inflamadas. Merc. bell. phosph. sil. cham. hep.
— infartadas. Merc. bell. sulf. hep. iod. con. dulc.
— supuran (que). Sil. hep. merc. bell. sulf. dulc. lyc. nitr-ac.
— ulceradas. Sil. phosph. ars. bell. lach. hep. con. sulf. canth.
Glaucoma. Phosph.
Glositis. Merc. acon. bell. lach. arn.
Glosoplegia. Caus. bell. hyos. dulc. graph. lach.
Golpe (padecimiento á consecuencia de un). Arn. puls. sulf-ac. cic. con.
Gonorrea. Cann. merc. sulf. canth. caps. nitr-ac.
— aguda. Cann. canth.
— bastarda. Sep. merc. nitr-ac. thui. sulf. n-vom.
— crónica. Merc. sulf. cann. caps. nitr-ac. thui.
Gota *Véase* Artritis.
Gozo inmoderado (padecimientos por un). Coff. op. croc. acon. caus.
Granos (erupcion de). Bell. merc. acon. ant. nitr-ac. sep.
Grietas. Rhus. cham. sulf. merc. calc. lyc. hep.
Grippe. Merc. n-vom. bell. bry. ars. camph.
Gritos. Bell. cham. caus. acon. coff. lyc. sil.
Gusanos venenosos (padecimiento por los). Rhus. acon. bell.
Gusto alterado. Puls. rhus. chin. sulf. acon. veratr. bell. n-vom. bry. cham.
— ácido. Puls. bell. sulf. n-vom. chin. calc. tarax. phosph. merc. cham.
— amargo. Puls. bry. n-vom. cham. sep. merc. sulf. acon. lyc. arn.
— dulce. Puls. phosph. sabad. plum. squill. acon. stann. alum.
— embotado. Puls. ant. n vom. canth. bell. phosph lyc. sil. calc. caus.
— empireumático. Puls. sulf. squill. chin.
— grasiento. Puls. caus. valer. asa. lyc. alum. magn. rhus. sil. sang.
— herbáceo. N-vom. phos-ac. sass. puls. veratr. stann.
— metálico. Rhus. cupr. n-vom. calc. cocc. lach. merc.
— nauseabundo. Puls. merc. sabad. sep. bry. n-vom. ars. calc. iod.
— pútrido. Arn. puls. merc. n-vom. sulf. bell. acon. arn. coff. cham.
— salado. Puls. merc. sep. ars. phosph. carb-veg. sulf. con. rhus. n-vom.
— soso, acuoso. Chin. ign. bry. staph. ant. puls. bell. caps. natr-m.
— terroso. Puls. phosph. cann. n-mosch. chin. ign. hep. ipec.

H

Hablado (padecimiento despues de haber). Sulf. arg. ign. bell. cocc.
Hablando (padecimiento en). Ars. arn. sulf. n-vom. cocc. ign.
Hambre morbosa. Chin. lyc. n-vom. puls. sulf.
— canina. Cin. chin. hyos. sulf. sabad. spig.
— comida (despues de la). Calc. cin. lyc. chin. merc. lach.
Helmintiasis, ó enfermedades producidas por los entozoarios en el canal intestinal. Acon. sulf. cin. merc. spig. cic. sabad. ferr. hyos. sil. n-vom.
— ascárides (por). Acon. sulf. merc. ferr. ign. n-vom. calc. phosph. graph.
— bulimia (con). Spig. cin. sulf. sabad. chin. lyc. graph.
— cólico (con). Spig. cic. merc. cin. acon. sulf.
— convulsiones (con). Cic. hyos.
— diarrea (con). Merc. cin. spig. acon.
— enflaquecimiento con). Cin. sulf. spig. graph. lyc. calc.
— escalofrios (en los sujetos). Sil.

Digitized by Google

Helmintiasis con fiebre. Acon. merc. cin. bell. sil. lach. spig. ferr. ign.
— lombrices (por las). Cin. merc. acon. cic. sabad. spig. sulf.
— llena (á la luna). Sil.
— lombriz solitaria (por la). Sulf. merc. sabad. graph. sil. calc. puls. carb-veg.
Hematémesis. Ipec. arn. phosph. ferr. sulf. acon. sep. chin. puls.
Hematuria. Cann. canth. puls. arn. ipec. merc. sulf.
Hemeralopia. Bellad. merc. veratr. stram. hyos. puls.
Hemiopia. Lyc. sep. aur. calc. caus. mur-ac.
Hemiplegia. Cocc. caus. bell. lach. graph. plumb. rhus. n-vom.
Hemoptisis. Phosph cham. acon. arn. ferr. ipec. sulf-ac.
— mujeres paridas (en las). Acon. puls. ipec. arn. chin. hyos. sulf.
— hemorróides suprimidas (á consecuencia de). Cham. acon. phosph. sulf.
— masturbacion (á consecuencia de la). Sulf. carb-veg. phos. chin. n-vom.
— tísicos (en los). Acon. sulf-ac. sulf. arn. phosph. cham.
— reglas (por desórden de las). Puls. bry. acon. sulf. sep. con. ferr.
Hemorragias. Chin. croc. acon. ipec. phosph. bell. arn. sulf-ac. lach.
— activas. Bell. acon. ferr. hyos. croc. puls. cham.
— pasivas. Chin. carb-veg. phos-ac. sec. ferr. puls. ipec. arn.
Hemorroides. N-vom. sulf. puls. carb-veg. calc. ars. mur-ac. phosph. sep.
— azuladas. Carb-veg. mur-ac.
— con cólicos. Sulf. n-vom. puls. carb-veg.
— dolorosas. Ars. carb-veg. n-vom. cham. natr-m.
— inflamadas. Puls. n-vom. ars. sulf. mur-ac. acon.
— grietas (con). Cham. caus.
— hinchadas. N-vom. puls. carb-veg. calc. carb-an. sulf.
— mucosas. Borax. sulf. puls. carb-veg. caps. merc.
— tenaces. N-vom. sulf. carb-veg. calc. caus. lach.
— pruritosas. Acon. sulf. n-vom.
— recto (en el). N-vom. calc. caus. coloc. lach. lyc.
— sangre (arrojando). Acon. bell. phos. ipec. sulf. puls.
— salientes. Calc. sep. caus. puls. sulf. hep. phosph.
— sudosas. Sulf. sulf-ac. sep. caus. natr-m.
— suprimidas. N-vom. sulf. puls. carb-veg. calc.
— ulceradas. Puls. cham. n-vom.

Hepatitis. N-vom. acon. cham. bry. bell. merc. puls.
— aguda. Acon. merc. bell. n-vom. sulf. lach.
— crónica. N-vom. sulf. lyc. aur. magn-m. lach.
Hernias. N-vom. sulf. sulf-ac. veratr. cocc. sil.
— niños (en los). N-vom. aur. veratr. cocc. nitr-ac.
— encarceladas. Acon. sulf. n-vom. sulf ac. op. lach.
— escrotales. N-vom. magn-m.
— inguinales. N-vom. cocc. aur. sil. cham. anm-m.
— umbilicales. N-vom.
Herpes. Merc. bell. rhus. acon. dulc. hep. sulf.
— anular. Sep. clem. natr. natr-m.
— cara (en la), en los labios. Bell. rhus. merc. hep.
— furfurácco. Bry. ars. sulf. calc. kreos.
— flictena (en forma de). Acon. bell. merc. ars. clem.
— prepucio (en el). Sep. merc. nitr-ac. hep. dulc. caus.
Hidrargirosis. Nitr-ac. hep. chin. carb-veg. sulf. aur. sil. lach. lyc. kal-hdr.
Hidrocéfalo. Acon. bell. bry. hell. arn. ars.
— agudo. Bell. bry. hell. sulf. arn. lach. merc. zinc. phosph.
— crónico. Sulf. hell. ars. merc. dig. lach. stram.
Hidrocele. lod. puls. sulf. sil. graph.
Hidrofobia. Bell. canth. hyos. lach. veratr. stram.
Hidropesia. Aps. chin. hell. ars. kal. sulf. dig. dulc. lyc.
Hidrotorax. Carb-veg. kal. bry. lach. ars. merc.
Hierro (padecimiento por el uso del). Puls. chin. ars. ipec. veratr. hep.
Hinchazon. Cham. bell. merc. bry. sulf. hep. puls.
— azulada. Cham. bell. lach. ars. arn. sil. puls. con.
— blanca, tumor blanco. Bry. lyc. puls. ars. rhus. ant. sulf. sal in. sil.
— dura. Bry. rhus. phosph. puls. sulf. carb-an. cham. calc.
— edematosa. Ars. sulf. puls. bry. squill. ant. chin. hell. lyc. kal.
— esponjosa. Lach. sil. ars. sulf. carb-an. phosph. ant.
— escirrosa. Con. bell. iod. lyc. clem. cham. sil. phosph.
— fria, tumor frio. Con. merc. ars. sulf. cocc. squill, rhod.
— inflamatoria. Acon. merc. bell. bry. hep. puls. ars. sulf. sil.

Digitized by Google

Hinchazon lucien'e. Bry. su'f. rhus. a n. merc ars. sabin.
— melanó'ica, h ma'o les. Carb-an. ars. si . phosph. ca'b-veg. sulf. nitr-ac.
— pálida. Bry. lyc. rhus. arn. iod. pu's. lach. ars. merc. ca'c.
— purulenta. Bell. hep. merc. sil. phos. lach. sulf. ca'c. lyc.
— roja. Acon. merc. bell. bry. hep. puls. ars. sulf. sil.
— varicosa. Carb-an. ars. sil. phosph. carb-veg. sulf. nitr-ac. lach.
Hipo. Ign. puls. n-vom. acon. hyos. s ram. bell.
Hipocondria. N-vom. sulf. natr. dulc. lach. calc. con. ign. caus. cham.
Hipocondrios sensibles. N-vo m. kal. lyc. calc. sulf. bry. hep. caus. carb-veg.
Histérico. Ign. n-vom. puls. cin. aur. ca c. plat.
Hongos (padecimientos por los). Carb-veg. coff. puls. acon. n-vom.
Horror al aire. Bell. n-vom. camph. coff. sulf. cocc.
— á lavarse. Sulf. calc. sass. nitr-ac.
— al m vimiento. N-vom. caps. natr-m. su'f. lach.
Huesos afectados. Merc. calc. sulf. sil. asa. lyc. phosph. aur.
— cariados. Sulf. calc. merc. sil. phos-ac. lyc.
— desviados. Cal . sulf. sil. puls. rhus. lyc.
— dolorosos. Chin. merc. sulf. nitr-ac. aur. phosph.
— inflamados. Merc. chin. aur. sil. nitr-ac.
— forman'o lentamen'e callosidad. Calc. sulf. sil. lyc.
— hinchados (exóstosis). Merc. phosph. aur. calc. asa. phos-ac. sil. sulf. staph
— necrosis. Sil. sulf. calc. sec. phosph. asa.
— reblandecidos. Sulf. calc. sil. merc.
— ulcerados. Sulf. calc. merc. si. a-a. lyc. phosph. aur.
Humor (mal). Merc. n-vom. phosph. sulf. staph.
— variable. Croc. ign. acon. plat. bell. stram.

I

Ictericia. Merc. chin. acon. sulf. cham. lach. n-vom. aur.
Ictiosis. Coloc. hep. plumb.
Impétigo. *Véase* Dar'os costro'os.
Impotencia. Ign. lyc calad. con. cann. sep. sulf.
Incontinencia de orina. Puls. sulf. bell. hyos. cin. sep. sil.
Incontinencia de orina en los niños. Puls. cin. bell. s ulf. sep. sil.
Indigestion (consecuencias de una). Puls. ipec. ant. bry. sulf. tartr. n-vom.
Indignacion (consecuencias de una). Staph. coloc.
Induraciones. Cham. lach. carb-veg. carb-an. sil. sulf. con. clem.
Inflamaciones. Acon. bry. bell. merc. puls. sulf.
Insectos (picaduras de). Arn. bell. acon. ant. sep calad.
Insensibilidad. Op. anac. carb-veg. carb-an. phos-ac. sep. ars.
— física. Carb-veg. op. chin. con. sulf. phos-ac.
— moral. Phos-ac. anac. op. ign. sep. staph. a s.
Insomnio. Coff. bell. acon. hyos. n-vom. puls. cham.
— antes de media noche. N-vom. puls. bry. lach. alum.
— despues de media noche. Coff. hep. ars. n-vom. nitr-ac. sil.
— con somnolencia. Bell. hep. chin. lach. merc cham. phosph. puls. sulf.
Intermitentes (padecimientos). Chin. ars. ipec. spig. n-vom. arn. caps.
Intertrigo. Cham. puls. graph. arn. sulf. sep. ign.
— escroto (en el). Sulf. petr. graph. arn. natr.
— nalgas (entre las). Sulf. carb-an. graph. hep. merc.
— en los niños. Cham. ign. sulf. acon. puls. bell.
— sobacos (en los). Carb-veg. mez. ars. zinc.
— vulva (en la). Sep. graph. caus. sulf. lyc. rhod. carb-veg.
Invierno (afecciones del). Rhus. dulc. n-vom. camph. ars. carb-veg. petr. ve-ratr.
Iodo (padecimiento por el uso del). Phos. bell. ars. sulf. chin.
Ira (consecuencia de un arrebato de). Champ. n-vom. bry. coloc. staph.
Iris afectado. Merc. nitr-ac. sulf.
Iscuria. Acon. con. op. canth. n-vom. puls. bell. lyc.
— niños (en los). N-vom. puls.

L

Labios (afecciones de los). Bell. sulf. sep. rhus. natr-m. bry. staph. n-vom. ign.
— azules. Ars. lyc. dig. cupr. arg-n. phosph.
— cancero'os. Ars. sulf. con. bell. sil. clem.

Digitized by Google

Labios dolorosos. Phos-ac. ign. ipec. splat. abad. bell.
— escoriados. Ars. bell. canth. cham. lyc. natr-m.
— esfoliados. Cham. n-vom. pu's. sep. tart.
— grietas (con). Carb-veg. ign. merc. natr-m. veratr.
— hinchados. Bell. merc. ars. sulf. hep. sil.
— — inferior (el). Lach. sep. puls. lyc. mur-ac.
— — superior (el). Sulf. natr-m. merc. natr. arg.
— morenuzcos. Ars. bry. op. staph. phos. chin.
— negros. Ars. chin. rhus. veratr. acon. squil.
— pálidos. Caus. lyc. ferr. spig. calc. sulf. con.
— vueltos hácia arriba. Bell. merc.
— sangre (arrojando). Ign. merc. ars. carb-an. bry.
— secos. Bell. merc. bry. rhus. chin. veratr. sulf. phosph. acon.
— ulcerados. Bell. sil. sulf. merc. ars. sep. natr-m.
— vesículas (cubiertos de). Sulf. ars. bell. rhus. bry. sep.

Lactancia laboriosa. Bell. bry. puls. calc. cham. n-vom.
— cabellos (caida de los). Calc. natr-m. sulf. lyc.
— cólicos. Cham. bry. puls. sep. arn. bell.
— (constipacion de vientre por la). N-vom. bry. ant. plat. sep.
— convulsiones. Plat. bell. hyosc. ign. cham. cic.
— diarrea. Rhab. ant. hyosc. dulc.
— fiebre láctea. Acon. coff. bell. bry.
— — puerperal. Bry. n-vom. rhus. merc. acon. bell. cham. hyosc.
— leche desordenada. *Véase* Leche.
— insomnio. Coff. acon. bell. hyosc. n-vom. ign. op.
— loquios desarreglados. *Véase* Loquios.
— pechos afectados. *Véase* Mamas y Pezones.
— moral afectado. Plat. bell. puls. veratr. zinc.
— ninfomanía. Plat. phosph. hyosc. stram. veratr.
— sudores frecuentes. Acon. bry. chin. sulf.
— humor blanco. Rhus. bell. arn. calc. sil. sulf.
— vientre grueso. Sep. coloc.

Lagrimeo. Acon. euph. bell. puls. sil. phosph. ars.

Laringe afectada. Acon. spong. hep. dros. carb-veg. caus. phosph. iod.

Laringe inflamada. Acon. dros. phosph. spong. carb-veg. caus. hep.
— ulcerada. Carb-veg. phosph. arg. iod. sulf. caus. lach. hep.

Lascivia. Carb-vg. phosph. chin. calc. canth. puls. sep. stram.

Laxitud. Puls. veratr. chin. ars. rhus. bry. arn.

Leche (padecimiento por el uso de la). Bry. sulf. n-vom. calc. lyc.
— acedia. N-vom. sulf. lyc. carb-veg. calc. chin.
— diarrea. Sulf. lyc. bry. sep. natr.
— flatulencia. Carb-veg. sulf-ac. con.

Leche de las nodrizas (alteracion de la). Bell. merc. cham. calc. puls. sil. sep.
— (cambio en la). Puls. bry. bell. dulc. rhus. acon.
— (flujo de). Calc. puls. bell. bry. rhod. rhus.
— (falta de). Calc. dulc. agn. zinc. caus. puls.
— (mala calidad). Cin. sil. merc. cham. n-vom.

Leer (mal por). Sil. calc. sulf. bell. natr-m. cin. lyc. chin. ruta. n-vom.
— en alta voz. Phosph. carb-veg. magn. par. nitr-ac. verb. cocc.

Legañas (fluxion de). Acon. euph. nux. puls. stram.

Legumbres (padecimiento por las). Bry. natr. bell. veratr. ars. cupr.

Lengua (afecciones de la). Merc. ars. canth. puls. caus. graph. lach. phos-ac. natr-m.
— azul. Dig. ars. mur-ac. sabad.
— blanca. Puls. sep. n-vom. ars. sulf. lach.
— cargada. Ant. chin. merc. puls. n-vom. sulf.
— — de blanco. Chin. puls. merc. bell. arn.
— — de color gris. Amb. puls. tart. cupr. arg.
— — de amarillo. Chin. bry. ipec. n-vom. cham.
— — de mucosidades. Chin. merc. puls. sulf. bell.
— — de negro. Chin. merc. phosph.
— — de verde. Magn. magn-m. rhod. plumb.
— convulsas. Cham. ign. lyc.
— escoriada. Merc. sil. n-vom. lach. carb-veg.
— fria. Veratr. bell. laur.
— grietas (en la). Bell. sulf. puls. cham. n-vom. chin.
— hinchada. Ars. bell. lach. bel. kal. hell.
— inflamada. Acon. merc. lach. n-vom. veratr.

Digitized by Google

Lengua negra. Ars. chin. lach. n-vom. veratr.
— pesada. Bell. mur-ac. colch. plumb. carb-veg.
— paralizada. Caus. lach. bell. hyos. dulc. graph. op. n-mosch. euphr.
— quemada por accidente. Ars. caus. puls. merc. acon.
— rígida. Lach. bell. lyc. calc. merc. con.
— roja. Hyos. cham. rhus. bell. sulf.
— seca. Bell. rhus. sulf. hyos. cham. ars.
— ulcerada. Merc. natr-m. lyc. n-vom. borax. sulf-ac. op.
— vesículas (cubierta de). Hell. sulf. carb-an. merc. natr.
Lepra. Sulf. sil. ars. hep. alum. graph. natr. phosph.
Lesiones mecánicas. Arn. rhus. puls. lach. sulf-ac. ruta. con. bry. sil. cic.
Letargia. Op. bell. camph. lach. puls. tart. hyos.
Letargo. *Véase* Sueño letárgico.
Leucorrea. *Véase* Flores blancas.
Levantarse de la cama (padecimiento al). Carb-veg. cocc. con. ign. ars. acon. bry. bell. puls.
Levantarse de su asiento (padecimiento al). Puls. caps. rhus. con. spig. phosph.
Liquen. Acon. lyc. sulf. cic. bry. natr-m.
Lientería. Chin. ferr. phosph. bry. ars. phosph-ac. calc.
Lipitudo. Acon. euph. merc. puls. rhus. stram.
Lociones (padecimiento por las). Calc. puls. sulf. sass. nitr-ac. rhus.
Lombrices. Acon. cin. merc. sabad. sulf. cic. spig.
Lomos (padecimiento en los). Puls. bry. n-vom. sulf. calc. acon.
Loquios (desarreglo de los). Sec. puls. plat. rhus. bell. carb-an.
— detenidos. Puls. n-vom. bell. coloc. sec. plat.
— de muy larga duracion. Sec. plat. calc. rhus. puls.
— fétidos. Carb-an. sec. bell.
Lumbago. Puls. n-vom. sulf. dulc. lyc. bry. rhus.
Luna nueva (padecimiento por la). Sil. anim. alum.
— llena (por la). Alum. sil. calc. sulf. graph.
Lupias. Calc. nitr-ac. sulf. hep. graph. sabin.
Lupus voraz. Ars. graph. staph. sulf. sil. sep.
Luxaciones. Arn. rhus. ruta. amm. ang. bry. calc.
Luz (padecimiento por efecto de la). Bell. merc. phosph. n-vom. acon. euhpr.
Luz artificial (padecimiento por efecto de la). Puls. euph. sep. dros. merc.
— sol (del). Merc. bell. n-vom. phos-ac. sep. bry. ign.
— (deseo de la). Acon. bell. stram.

LL

Llagas. Arn. sulf-ac. daph. puls. cham. sil. sulf.
— abiertas de nuevo. Lach. phosph. carb-veg. sil.
— arrojan sangre con facilidad (que). Kreos. arn. phosph. chin. sulf-ac.
— contusion (por). Arn. con. sulf-ac. puls euphr.
— difíciles de curarse. Hep. cham. sil. petr. sulf. lach.
— espinas (por). Hep. nitr-ac.
— gangrenadas. Chin. ars. sil. bell. lach. carb-veg.
— inflamadas. Cham. hep. sil. puls. sulf. petr.
— incision (por). Staph. arn. sulf. nat.
— mordedura (por). Sulf-ac. arn.
— picadura (por). Arn. lach. sil. carb-veg. nitr-ac.
— supurando mucho. Merc. bell. sulf. hep. puls.
Llorar con facilidad. Puls. cham. sulf. acon. plat. caus. nitr-m. sep.
Llorar mucho (padecimientos por). Arn. hep. bell. staph.

M

Mal de mar ó mareo. Sulf. ars. cocc. petr. sep. sil. ther.
Malos padecimientos por el uso de los huevos. Colch. ferr.
Maldad ó terquedad. Merc. arn. anac. n-vom. bry. ars. canth.
Mamas afectadas. Bell. dulc. con. iod. sil. phosph. puls.
— atrofiadas. Iod. con. nitr-ac.
— cancerosas. Con. sil. ars. clem. carb-an. graph.
— inflamadas. Bell. bry. sulf. phosph. sil. merc.
— hinchadas. Bry. bell. merc. phosph. sulf. sil.
— nudosidades (llenas de). Dulc. con. carb-an. cham. sil.
— escirrosas. Con. cham. carb-an. phos clem. rhus. sil.
— supurantes. Sil. phosph. bell. lach hep. sulf.
Manchas sobre la piel. Sep. con. sulf. bry. phosph. hyos. nitr-ac. aur. hep.

Digitized by Google

Manchas amarillas. Sep. con. sulf. arn. phosph. ferr. p tr.
— azules. Ferr. sulf-ac. arn. phosph. bell. plat.
— blancas. Sulf. sil. sep. ars. merc. alum. natr.
— cobrizas. Nitr-ac. merc. phosph. con.
— de color de escarlata. Bell. merc. amm. phosph. ipec. euphorb.
— furfuráceas. Bry. sulf. ars. sil. calc. kreos. lyc.
— hepáticas. Sulf. ant. lyc. laur. sep. merc. nitr-ac.
— leprosas. Natr. sil. ars. sep.
— lívidas. Ars. plumb. sec.
— marmóreas. Thui. carb-veg. natr-m. caus. lyc. plat.
— morenas. Sep. con. sulf. carb-veg. nitr-ac. hyos.
— nacimiento (de). Carb-veg. sulf. calc. thui. sulf-ac.
— negras. Ars. chin. euphorb. bell.
— pecas (de). Lyc sulf. ant. puls. calc. natr.
— purpúreas. Bry. ars. con. rhus. sulf-ac. arn.
— rojas. Sulf. arn. sulf-ac. bell. sabad. ars. sep.
— sangre (de). Bry. sulf-ac. arn. rhus. ars. n-vom.
— sonrosadas. Natr.
— verdosas. Con. ars. sep. arn.
— vino (de color de). Sep.
— violáceas. Con. phosph.

Mandíbulas afectadas. Bell. zinc. staph. sil. plumb. canth. caus.
— articulacion (la). Rhus. bell. merc. ign. spong. cic. spig. colch.
— inferior. Bell. zinc. canth. staph. caus. plumb. sil. cham. puls. laur.
— hueso y periostio. Sil. merc. aur.
— superior. Zinc. amm. kreos. chin. carb-veg. bell. aur. phos. sulf-ac.

Manía ó furor. Bell. canth. stram. hyos. veratr.

Manos afectadas. Calc. sulf. lyc. sep. n-vom. spig. bell. sil. bry. rhus. chin.
— ardientes. Phosph. canth. lach. stront. hep. sec. petr. n-vom. laur.
— dartros (con). Dulc. zinc. ipec. sass. veratr. sep.
— grietas (con). Sulf. petr. alum. zinc. lach. nitr-ac. calc. hep.
— hinchadas fácilmente. Lach. lyc. carb-veg. croc.
— fría. Veratr. iod. sulf. lach. caus. chin.
— muertas de tiempo en tiempo (como). Calc. con. lach. n-vom. cann.
— paralizadas. Ambr. cupr. arg. natr-m. ruta.
— ulcosas. Sulf. calc. hep. sep. sil. carb-veg. puls.

Manteca (padecimientos por el uso de la). Carb-veg. puls. ars. chin. hep.

Marasmo. Ars. chin. phos-ac. n-vom. sulf.
— dorsal. N-vom. croc. staph. sulf. phosph. carb-veg. caus.
— senil. Chin. baryt. op. ambr. aur. sulf. phos. ars.

Marcha (padecimiento por la). Arn. chin. sep. veratr. bell. carb-veg.
— acelerada. Sil. sulf. aur. natr-m. ars. calc.
— agua (junto al). Ferr. sulf. ang.
— calle (por la). Con. hep. ant.
— viento (contra el). N-vom. bell. phos. asar. chin. ars. puls. lyc.

Mascar (mal al). Calc. merc. bry. staph. n-vom. carb-veg. ars. sulf.

Masturbacion (padecimiento por la). N-vom con. sulf. staph. phos-ac. cocc. chin. cin.
— (inclinacion á la). Merc. con. staph. sulf. phosph. carb-veg. con.

Matriz afectada. Bell. puls. plat. sec. con. sulf. sep. n-vom. merc.
— cancerosa. Graph. kreos. carb an. con. sep. sil. bell.
— dolorosa, histeralgia. Ign. cocc. n-vom. con. puls. cic. sep. magn-m.
— inflamada. Merc. bell. n-vom. cham. acon. plat. sep. thui.
— polipos (afectada de). Calc. staph. sep. thui. nitr-ac.
— podrida, putrefaccion, gangrena. Sec.
— escirrosa. Con. carb-an. sil. bell. sep. graph. kreos.

Meditacion difícil. N-vom. calc. natr-m. staph. alum. hyos. op. bell. lach.
— (mal por la). N-vom. sulf. calc. lach. ign. aur. natr-m. puls. sep.

Médula espinal afectada. Dulc. n-vom. cocc. rhus. sulf.
— atrofiada. N-vom. sulf. cocc. caus. staph. phosph.
— inflamada. Dulc. caus. n-vom. lach. bry. cocc.

Mejillas hinchadas. Arn. merc. bell. n-vom. puls. sulf. lach. cham.
— rojas. Acon. cham. merc. lyc. caps. n-vom. phosph.
— — una sola Cham. ign.

Melancolía. Bell. aur. bell. natr-m. lyc. puls. ars.

Memoria debilitada. Lach. hyos. aur. staph. op. sulf.

Meningitis Bell. bry. acon. bell. sulf. camph. hyos.
— sol (por la accion del). Camph. acon. bell. hyos.

Mentagra. Cic. sil. sulf. ars. hep. graph. ant.

Mercurio (padecimientos por abuso del).

Hep. nitr-ac. bell. sulf. chin. aur. lyc. lach.

Mercurio (angina por el abuso del). Lyc. carb-veg. staph. bell hep. lach. sulf.

— boca afectada. N[illegible]ac. sulf. dulc. op. carb veg. staph. hep. aur.

— debilidad. Chin. carb-veg. hep. nitr-ac. lach. aur.

— glándulas afectadas. Aur. nitr-ac. carb-veg. sil. dulc.

— hidropesía. Chin. hell. sulf dulc.

— impresionabilidad al cambio de tiempo (con). Carb-veg chin.

— nervios fatigados. Hep. nitr-ac. aur. puls. carb-veg. cham.

— huesos afectados. Phos-ac. aur. nitr-ac. sil. sulf. lyc.

— reuma. Chin. hep. carb-veg. sulf. puls. lach. bell. aur.

— salivacion. Nitr-ac. op. dulc. sulf. iod hep. chin. carb-veg.

— úlceras. Nitr-ac. hep. thui. lyc. sulf. aur carb-veg. sil.

Metralgia. *Véase* Matriz dolorosa.

Metritis. *Véase* Matriz inflamada.

Metroperitonitis. Merc. bell. cham. n-vom. plat. bry. acon. rhus.

Metrorragia. Bell. chin. sabin. plat. croc. ferr. hyos.

Miedo (consecuencias de un). Veratr. op. ign.

Miel venenosa (padecimientos por la). Coff. camph

Mielitis. Dulc. lach. n-vom. caus. bell. ars. bry.

Miembro viril (inflamado). Cann. merc. canth. sulf. sep. n-vom. zinc.

Migrana. Sang. bell. coloc. sep. puls. n-vom. spig. bry.

Miliar. Acon. ipec. bry. merc. rhus. cham. ars. sulf.

— niños (en los). Acon. bry. ipec. bell. cham.

— purpúrea. Acon. coff. bell. sulf.

— escarlatinosa. Sulf. dulc. acon. bry. coff.

Miopia. Carb-veg. con. phosph. phos-ac. lyc. nitr-ac. sulf-ac ruta. sulf. puls.

Modorra. *Véase* Sueño letárgico.

Mojado (mal despues de haberse). Puls. calc. rhus. sep. sass. bell. n-mosch. bry.

Molas. Canth. merc.

Moral afectada. N-vom. bell. stram. veratr. aur. sulf. hyos. hell. staph. ign. puls. acon.

Mordeduras Sulf-ac. arn.

— venenosas. Seneg. lach. bell. amm. ars. arn.

Morenas (afecciones de las personas). Bry. acon. nitr-ac. n-vom. ars.

Movimiento (mal por el). Bry. chin. n-vom. arn. bell. lach.

— (horror al). Caps. n-vom. natr-m. sulf. lach.

Mucosas (afecciones). Puls. merc. sulf. chin. fluor-ac. dulc. bell. hep. calc.

Muermo de los caballos. Ars. merc. sulf. sil. bell. bry. hep.

Mujeres (enfermedades de las). Bell. acon. puls. sep. plat. con. valer. n-vom.

Música (mal por la). Phos-ac. calc. sep. natr. coff. n-vom. kal.

N

Nabos (mal por el uso de los). Puls. bry.

Narcotismo. Coff. amm. carb-vg. puls. lach. bell. ars. calc. hell.

Nariz afectada. Aur. carb-veg. merc. bell. hep phosph. bry. sil. alum.

— amarilla. Sep. n-vom.

— arrojando sangre. Chin. acon. arn. croc. bell. puls.

— cancerosa. Sil. ars. sulf. calc aur. sep. carb-an.

— cariada Aur. merc. sil.

— costras por fuera (con). Sulf. carb-veg. graph. baryt. sil. aur.

— dartros (afectada de). Nitr-ac. spig.

— dolorosa al tacto. Hep. merc. bry. phosph. bell. cham. n-vom.

— divisos (afectada de). Carb-veg. arn. lyc.

— efélides (cubierta de). Sulf. phosph.

— erupciones (cubierta de). Sulf. barit. aur. graph. fluor-ac.

— fria. Veratr. n-vom. arn. bell. plumb.

— inflamada. Bell. aur. merc. sulf. ars.

— tapada. Sil. calc. bry. n-vom. sulf. caus. con. amm. alum.

— pesada. Amm. merc. sil. stann.

— poros negros (afectada de). Sulf. nitr-ac. graph. sabin. dros.

— roja. Aur. calc. sulf. puls. ars. merc. hep.

Náuseas. Ipec. n-vom. carb-veg. ant. tart. hep. natr-m. puls. bry.

— bebido (despues de haber). N-vom. puls. bry. natr-m. rhus.

— comer (al). Puls. cocc. veratr. kal. carb-veg.

— comido (despues de haber). N-vom. sulf puls. sil. natr-m.

— manana (por la). N-vom. sil. graph. carb-veg. amm veratr.

— carruaje (yendo en). Petr. cocc. sulf.

Nefralgia. Puls. lyc. sass. canth. sulf. bell. n-vom. cann.

Nefritis. Puls. bell. n-vom. canth. cann. lyc. sass.

Nervios fatigados. N-vom. acon. cham ign. coff. asar. merc. arn. cocc.

Neuralgias. Coff. acon. cham. n-vom. spig. coloc. veratr. merc.
Neurosis. Bell. stram. ign. n-vom. calc. sulf. caus. op. sil. hyos.
Ninfomania. Plat. phosph. hyos. veratr stram.
Ninos (afecciones de los). Acon. bell. cham. merc. sulf. calc. hep. ip c.
— *Vége* tambien Niños de pecho.
Ninos de pecho afecciones de los). Acon. bell bry. cham coff.
— acedia. Rhab. cham. bell suf. calc.
— altas. Sulf. merc. borax. sulf-ac. n-vom.
— asfixia. Tart. op. chin. acon.
— asma. Cham. ipec. samb. mosch. acon.
— atrofia. N-vom. sulf. calc. ars. baryt.
— balbuceo. Sulf. bell. euphr. merc.
— claudicacion espontánea. Merc. bell. calc. coloc. rhus.
— colicos. Cham. rhab. ipec. cin. n-vom. mosch.
— constipacion. N-vom. op. bry. sulf. veratr.
— convulsiones. Bell. ign. cham. ipec. op. cin.
— coriza. N-vom. samb. carb veg. dulc. cham.
— (gritos en los). Cham. bell. rhab. coff. borax acon.
— costra de leche. Rhus. ars. sulf. dulc.
— denticion dificil. Acon. merc. sulf. calc. bell. cham. cin.
— diarrea. Cham. rhab. bell. sulf. ipec. n-vom.
— eclampsia (en los). Bell. ign. cham. merc. cin. coff.
— excoriaciones. Cham. ign. puls. merc. borax. carb-veg.
— debilidad muscular Calc. sulf. sil. bell. caus. n-vom.
— fiebre. Acon. coff. cham. merc. bell.
— gastricismo. Ipec. puls. n-vom. cham. bell.
— hernias. Nux vom. sulf. aur. cham veratr.
— insomnio. Coff. op. acon. cham. rhab. bell.
— iscuria. Camph. puls. acon.
— ictericia. Merc. chin. acon.
— miliar. Acon. cham. sulf. bry. ipec. coff.
— oftalmia. Acon. merc. cham. dulc. bell.
— lombrices. Cin. merc. sulf. acon. sil. cic.
— vómitos. Ipec. cin. sil.
Noche (padecimientos por la). Ars. merc. cham. sulf. puls. chin. bell. hep. sil. ferr.
Nostalgia. Caps. ign. bell. phos-ac. hel.
Nubes de la córnea. Cann. cin. nitr-ac. hep. bell. sil. euphr.
Nuca afectada. Calc. n-vom. baryt. rhus. staph. bell. puls. merc. bry.
— dartros. Sep. lyc. petr. caus. sulf.
— dolores. Bell. n-vom. lyc. caus. con. natr-m.
— glándulas infartadas. Calc. baryt. staph. sil. petr.
— hinchazon. Bell. puls. baryt. sep. calc.
— rigidez. Bell. sil. calc. sep. nitr-ac. carb-veg.
— sudor. Sulf. nitr-ac.

O

Obesidad. Calc. ant. [sulf. ars. puls. caps. ferr.
Odontalgia. Cham. merc. puls. sulf. acon. staph.
— artritica. Acon. puls. n-vom. sulf. cin.
— agua que se bebe por el). Cham. rhus. amm. sil. spig.
— café (por abuso del). Cham. n-vom. ign. bell. merc.
— cariados (en los dientes). Cham. merc. staph. puls. sep. n-vom.
— congestiva. Acon. calc bell. aur. hyos. chin. cham.
— comer (al). Bell. merc. bry. staph. sulf.
— — caliente (al). Bell. puls. bry. sulf. cham.
— — frio (al). Calc. merc. carb-veg. cham.
— cabeza (hasta la). Merc. puls. bell. sulf n-vom.
— encias hinchadas (con las). Merc. bell. n-vom. sulf. staph.
— embarazo (durante el). Sep. bell. puls. staph. n-vom.
— enfriamiento (causada por un). Dulc. bell. acon. merc. puls. n-vom. ign.
— frio húmedo (por un). N-mosch. borax, puls. rhus. rad. sulf.
— glándulassubmaxilares infartadas (con las). Cham staph. merc. sep. n-vom.
— histérica. Ign. sep. n-vom. aur.
— hilera de dientes (en toda una. Merc. staph. cham. rhus.
— jóvenes (en las). Acon. bell. puls.
— mujeres (en las). Puls. bell. sep. hyos. acon. cham.
— mejilla hinchada (con la). Bell. merc. cham. n-vom. staph. puls. arn. sulf.
— mañana (por la). Ign. n-vom. merc. staph. phos. h.
— mercurio (por abuso de). Carb-veg. nitr-ac. staph.
— ninos (en los). Cham. merc. acon. bell. sulf. calc.

Digitized

Odontalgia nerviosa. Coff. acon. hyos. bel . spig. n-vom.
— nocturna. Cham. bell. merc. coff. sulf. puls.
— nodrizas (en las). Carb-veg. chin.
— orejas (hasta las). Pu s. merc. bell. staph. cham. sulf
— ojos (hasta los). Spig. puls. calc. cham.
— reglas (en la época de las). Carb-veg. cham. amm. sep. graph. calc.
— reumática. Chin. puls. merc. acon. sulf. n-vom.
— rostro (hasta el). Merc. n-vom. hyos. rhus. spig.
— sensibles (en las personas). Coff. acon. cham. n-vom ign.
— semilateral. Puls. cham. n-vom. merc. rhus.
— tabaco (por el humo del). Ign. bry. spig. chin.
— tarde (por la). Puls. merc. sulf. bell. rhus. ign. bry.

Oftalmia. Bell. acon. merc. puls. euphr. ars. cham. calc. phosph. sulf.
— aguda. Acon bell. merc. puls. cham. du.c.
— artrítica. Acon. puls sulf. bell. spig. ca c
— catarral. Merc. pu's. n-vom. acon. bell. ars. euphr.
— crónica. Ars. sulf. hep. ca'c. phosph. euphr. nitr-ac.
— conjuntiva afectada (con la). Bell. ars. merc. sulf. puls.
— cornea afectada (con la). Cann. nitr-ac. merc. hep. ars. lach.
— esterior. Hep. acon. sulf. bell. puls. merc.
— fatigado los ojos (por haber). Bell. r ta.
— glándulas d · Meibomio afectadas (con las). Puls. bell. merc sulf. ars.
— gonorréica. Acon. puls. nitr-ac. merc. sulf.
— iris afectado (con el). Merc. sulf. clem. seneg.
— mercurial. Nitr-ac. hep. sulf. lach aur.
— recien nacidos (en los). Sulf. euphr. merc. acon. puls. bell
— palpebral. Acon. bell. sulf. puls. n-vom. hep.
— enfriamiento (á consecuencia de un). Dulc. cham. acon. ars.
—reumática. Acon. merc. sulf. puls. bry. ars.
— escrofu'osa. Bell. merc. sulf. calc. n-vom
— sifilítica. Merc. nitr-ac. aur. thui. phosph.
— traumática. Arn. con. acon. sulf. sil. calc. sulf-ac. hep. lach.

Oftalmia causada por trabajos delicados. Ruta. bell. carb-veg.
Oido afectado. Puls. bell. merc. phos. caus. sulf.
— agudo (mas). Phos-ac. bell. lyc. natr. bry.
— embotado, débil. Bell. caus. sil. puls. phosph. sulf
— sensible (demasiado). Acon. coff. cham. bell. n-vom.
Ojos afectados. Bell. euphr. acon. puls. merc. sulf. pho ph. ars. hep nitr-ac.
— amarillos. Merc. chin. bell. ars. dig. cham. sulf. con.
— brillantes. Bell. stram. hyos. acon. op. bry.
— cerrados, oclusion. Bell. stram. cham. sep. croc. hep. ars. hyos. phosph.
— convulsos. Cham. bell. op. hyos. stram. acon. cic.
— costras alrededor (con). Merc. spong. sep.
— empañados. Op. bell. veratr. chin. merc. hyos. stram.
— fijos, mirada fija. Hyos. ars. stram. bell. phos-ac. cic. op. sulf.
— frio (sensacion de). Plat. amm. lyc. con. kal. calc.
— aglutinacion (de los). Sulf. ars. puls. caus. phosph. n-vom. cham. merc.
— hinchados. Bell. sulf. acon. puls. bry. rhus. calc. merc. euphr.
—hundidos. Chin. veratr. ars. sec. staph. phosph. ferr. phos-ac.
— inflama os. *Véase* Oftalmia y Blefaritis.
— invectados. Merc. acon. ign. bell. ars. ambr. sulf. lach. spig. phos-ac.
— lagrimosos. Puls. euphr. sulf. acon. phosph. ars. hep. ant. bry. staph. calc.
— legañosos. Ant. sulf. graph. aur. euphr. sil.
— ojeras. Chin. ars. veratr. staph. phos. phos-ac. sec.
— — azul s. Veratr. ars. chin. lach. cham. n-vom. phos-ac. sulf.
— — amarillas. Nitr-ac. spig. n-vom.
— — verdes. Veratr.
— prominentes. Hyos. acon. spong. bell. hep. arn. veratr. ars.
— rojos. Acon. bell. merc. cham. ant. sep. phosph. euphr. bry. puls. hep.
— supuracion (con). Euphr. caus. nitr-ac. bell. merc. kreos. puls. hep. sulf.
Olfato afectado. Bell. sulf. n-vom. lyc. puls. natr-m. sil. sep. hep.
— embotado. Bell. puls. n-vom. sil. sulf. sep.
— sensible (demasiado). Bell. sulf. n-vom. acon. lyc. hep.
Olores (mal por los). Sulf. acon. lyc. ign. bell. phosph. n-vom. coff. aur.

Digitized by Google

Olor de ajo. Sabad.
— café (de). Sulf-ac.
— carne (de). Colch. ars.
— madera (de). Graph. carb-veg.
Olores diversos delante de la nariz. Bell. calc. sulf. puls. n-vom. aur. veratr. nitr-ac.
— ácidos. Bell. alum.
— aromáticos. Ign. puls.
— coriza (de una antigua). Puls. sulf g aph. merc.
— dulces. Nitr-ac. aur. sil. n-vom.
— empireumáticos. N-vom. anac. sulf. aur. graph. calc.
— pez (de). Ars. con.
— pus (de). Sulf. seneg.
— pútridos. Bell. phos. aur. nitr-ac. sep. calc. n-vom. graph. veratr.
— sangre (de). N-vom. amm. sil.
— azufre (de). N-vom. ars. graph. calc. plumb. anac.
— terrosos. Veratr. calc. sulf. anac.
Ooforitis. Thui. plat. nitr-ac. merc. bell. sep.
Opio (padecimiento por el uso del). Coff. camph. ant. ipec. merc. bell.
Opistótonos. Op. n-vom. bell. ipec. ang.
Orbita de los ojos dolorida. Spig. bell. chin. hyosc. plat. calc.
Orejas afectadas. Puls. merc. bell. cham. sulf. n-vom. calc. con.
— cariadas por dentro. Nitr-ac. sil. aur. staph. asa.
— con zumbido. Puls. acon. caus. aur. b ll. lyc. sulf.
— dartrosas. Graph. sep. oleand. calc. lyc. sulf.
— dolorosas. *Véase* Otalgia.
— escoriadas. Graph. merc. petr. sulf. calc. kal.
— fétidas. Graph. carb-veg. hep. aur. oleand.
— hinchadas. Puls. merc. sep. lyc. rhus. sil.
— inflamadas. *Véase* Otitis.
— rojas. Puls. alum. ant. chin.
— secas por dentro. Graph. phos. petr. lach. nitr-ac.
— sudosas por detrás. Oleand. calc. lyc. graph.
— se purgan (que). Puls. sulf. merc. caus. calc. carb-veg.
— tapadas. Calc. puls. merc. sil. nitr-ac. sulf.
— retintin en las. Chin. bell. puls. n-vom. calc.
— ulceradas. Merc. puls. ruta. spong. kal. calc.
Orgullo. Plat. lyc. stram. cupr. veratr.
Orinar (padecimiento al). Cann. merc. puls. n-vom. sulf. calc. coloc.
Orinar (padecimiento antes de). Puls. n-vom. borax. coloc. tart. arn. sulf. bry.
— durante la emision. Puls. cann. phos-ac. cant. merc. lyc. thui. hep.
— despues de la emision. Thui. canth. natr-m. coloc. hep. sulf. bell. staph.
— fin de la emision (al). Canth. sulf. phos. bry. petr.
— necesidad de. N-vom. acon. puls. bry. sulf. caus. staph. n-vom. squill.
— necesidad sin resultado. Dig. canth. sass. n-vom. puls. sulf. sep. caus. petr.
— principio de la emision (al). Merc. canth. clem. caus.
Orinarse en la cama. Cin. bell. puls. sulf. sep. sil.
Orinas alteradas. Puls. sulf. acon. n-vom. phos-ac. carb-veg. sass. lyc. merc.
— abundantes (demasiado). Puls. carb-veg. phos-ac. merc. sulf. aur. spig. natr-m.
— de olor ácido. Merc. ambr. petr. calc. graph. nitr-ac.
— acres. Borax. merc. hep. caus. phos. calc. veratr.
— ardientes. Merc. acon. phos. ars. lyc. cann. dulc.
— calientes. N-vom. acon. merc. ars. hep. bry.
— poso (con). Sep. arn. puls. chin. phos-ac. dulc. merc. lyc.
— — arcilloso. Zinc. sulf. anac. sep. sass. kal. ign. amm-m. canth.
— — arenoso. Sass. lyc. zinc. ant. sil. calc. ruta phosph.
— — blanquecino. Rhus. phosph. sulf. sep. con. spig. hep. petr.
— — farináceo. Calc. natr-m. graph. phos-ac. chin. tart. merc.
— — filamentoso. Mez. zinc. canth. seneg. sass. merc.
— — agrisado. Con. spong. hyos. mang. tart. led.
— — amarillento. Zinc. cham. sulf-ac. phosph. spong. sil. chin. cupr.
— — mucoso. Puls. cu c. valer. natr-m. sulf. ant. sulf-ac. aur.
— — nebuloso. Phos-ac. bry. thui. nitr. seneg. merc. ambr. petr. caus.
— — purulento. Clem. canth. puls. lyc. sep. con. kal. cann. sulf.
— — rojizo. Puls. canth. sep. natr-m. valer. nitr-ac. chin. lyc. acon.
— — sanguinolento. Canth. sep. puls. phos-ac. zinc. lyc. dulc. sulf.
— espumosas. Spong. chin. lach. seneg. laur.
— emitidas con demasiada frecuencia. Merc. arg. staph. caus. rhus. nitr. squill.
— — por gotas. Sulf. calc. m-aus. canth. petr. dulc. camph. arn.

Orinas emitidas por intervalos. Con. clem. zinc. sulf. m-aus. dulc. op. caus.
— — involuntariamente. Puls. caus. rhus. sulf. bell. sil dulc. sep. lyc.
— — por la noche en la cama. Bell. sulf. rhus. cin. sil. puls. sep. caus.
— — de tarde en tarde. Canth. puls. arn. stram. acon. n-vom. arn.
— fétidas. Dulc. puls. ars. phos-ac. carb-veg. nitr-ac. natr. viol-tr.
— filamentosas. Mez. zinc. canth. seneg. sass. merc. cham. cann. nitr.
— oscuras. Acon. veratr. bell. tart. bry. sep. colch. merc. carb-veg. sulf.
— frias. Nitr-ac. agar.
— lechosas. Phos-ac. aur. merc. cin. mur-ac. dulc. iod. carb-veg. he .
— mucosas. Puls. dulc. valer. natr-m. sulf. ant. sulf-ac. aur.
— pálidas. Phos-ac. con. nitr. rhus. arn. puls. bell. stram. ign. coloc.
— con película irisada. Puls. phosph. calc. hep. iod. par. sulf.
— nubes (cubiertas de). Phos-ac. bry. carb-veg. thui. nitr. seneg. merc. amb. petr.
— purulentas. Clem. canth. puls. lyc. con. sep. kal. cann. sulf.
— raras, poco copiosas. Op. canth. staph. colch. bell. ruta. graph. dig.
— retenidas, retencion de orina. Stram. arn. lyc. canth. ruta. acon. puls.
— sanguinolentas. Puls. canth. sulf. ars. sep. calc. sec. caps. phos. ipec.
— turbias al salir. Cin. sabad. con. merc. sep. cann. rhus. chin. puls.
— turbias (que se ponen). Bry. phos-ac. cham. rhus. caus. valer. merc.
— verde (de un color). Camph. veratr. rhab. ruta. kal. iod. sulf. aur. chin. ars.
— viscosas. Phos-ac. arg. cupr. canth. kreos. dulc.

Orquitis. Merc. arn. aur. puls. spong. acon.
— gonorréica. Merc. aur. puls. cham. nitr-ac. ign.
— bubon (á consecuencia de un). Merc. carb-veg. pu s.
— traumática. Arn. con.

Ortopnea paralítica. Tart. ars. carb-veg. op. lach.

Orugas venenosas (mal por las). Rhus. acon. bell.

Oscuridad (mal en la). Calc. stram. ars. puls.

Otalgia. Puls. bell. merc. cham. sulf. n-vom.
— inflamatoria. Bell. merc. puls. sulf.
— enfriamiento á consecuencia de un). Cham. puls. dulc. chin.
— reumática. Puls. bell. merc. chin. n-vom.

Otalgia nerviosa. Bell. cham. n-vom. sulf. puls.

Otitis. Puls. merc. bell. sulf. n-vom.
— externa. Puls. merc. bell. sulf.
— interna. Puls. bell. sulf merc. n-vom.

Otoño (padecimientos de). Rhus. dulc. veratr. merc. chin.

Otorrea. Puls. sulf. merc. calc. men. carb-veg.
— catarral. Puls. sulf. merc. calc. hep. bell.
— despues de un exantema. Men. merc. puls. bell.
— escrofulosa. Merc. sulf. lyc. puls. hep.
— mucosa. Puls. merc. sulf. calc. nitr-ac.
— purulenta. Merc. sulf. hep. puls. asa. calc sil.
— sanguinolenta. Puls. merc. graph. rhus. bry.
— suprimida. Puls. merc. bell. hep. bry. lach. n-vom.
— — seguida de cefalalgia. Bell. bry.
— — de glándulas infartadas. Merc. puls. bell.
— — de orquitis. Merc. puls. aur. zinc. n-vom.

Ovarios afectados. Merc. lach. plat. thui. nitr-ac. canth. bell sep. chin.

Ozena. Aur. merc. asa. calc. sulf. puls. lyc.

P

Palabra (afecciones de la). Bell. stram. euphr. caus. merc. lach.
— difícil. Euphr. stram. n-vom. dulc. lach.
— embrollada, indistinta. Caus. lyc. bry. lach. calc. sec.
— artamuda. Bell. stram. caus. euphr. merc.
— lenta. Ars. thui. sec.
— nasal, gangosa. Bell. lyc. phos-ac. lach. sil.
— perdida. Bell. hyosc. caus. laur. lyc. stram.
— precipitada. Bell. lach. hep. merc. ars.
— mal al hablar. Ars. arn. sulf. n-vom. cocc. ign.
— — despues de haber hablado. Sulf. arg. ign. bell. cocc.

Paladar enfermo en general. Mer. aur. n-vom. bell. calc. lach.
— cáries (en el). Aur. merc. lach. sil. calc.
— inflamado. N-vom. calc. merc. lach. aur. chin.
— escoriado. Carb-veg. merc. nitr-ac. lach. sulf.
— hinchado. N-vom. calc. chin. baryt.

Palpitaciones del corazon. Acon. spig. puls. sep. lyc. chin. natr-m. iod. phosph.

Palpitaciones por congestion. Acon. kal. phosph. chin. sulf.
— despues de una contrariedad. Ign. acon. bry. spig.
— despues de una alegria repentina. Coff. acon. veratr.
— de carácter nervioso. Coff. cocc. cham. n-vom. puls. veratr.
— á consecuencia de pérdidas debilitantes. Chin. n-vom. sulf. phos-ac.
— por efecto del miedo. Coff. veratr. op.
— á consecuencia de úlceras repercutidas. Ars. sulf. caus. lach. lyc.

Pan (padecimiento por el uso del). Chin. sulf. sep. merc. bry.
— de centeno (padecimiento por el). Sep. bell. sulf. puls. chin. rhus.

Panadizo. Hep. sil. lach. sulf.

Pantorrillas (calambres en las). Cham. camph. veratr. sep. nitr-ac. sil. sec. calc.

Parálisis. Cocc. caus. rhus. n-vom. bell. hyos.
— apopléticas. Bell. arn. n-vom. zinc. stram.
— por efecto de debilidad. Chin. sulf. ferr. cocc. rhus. n-vom.
— parciales. Caus. sulf. cupr. sec. bell. cocc.
— reumáticas. Ruta. ferr. baryt. arn.
— semilaterales, hemiplegias. Cocc. caps. lach. plumb. graph. bell.
— á consecuencia de espasmos. Cupr. sec. caus. bell. n-vom.
— por la repercusion de úlceras. Sulf. caus. lach. rhus. bell. sil.

Parotitis. Rhus. merc. carb-veg. kal. aur. calc.
— escarlatinosa. Calc. kal. nitr-ac. lyc.

Párpados afectados ó enfermos. Acon. hep. bell. euphr. ars. cham.
— aglutinados. Merc. puls. n-vom. sulf. ars. carb-veg.
— caidos. Spig. sep. veratr. nitr-ac. bell. stram.
— con calambres. Hyos. cham. sil. bell. hep. croc.
— dartrosos. Bry. sep. rhus. ars.
— inflamados. *Véase* Blefaritis.
— cerrados, oclusion. Cham. bell. hyos. croc. hep. stram.
— hinchados. Acon. merc. sulf. bell. puls. hep. nitr-ac. ars. cham.
— con nudosidades. Staph. calc. rhus. bry. aur.
— paralizados. Veratr. sep. spig. nitr-ac. bell. stram. hyos.
— pesados. Cham. sep. n-vom. spong. bell.
— encogidos en sus comisuras. Ant. canth. arn. croc.
— rigidos. Rhus. veratr. spig.

Párpados rojos, con rubicundez Acon. lyc. cham. bell. n-vom. hep. merc. sulf.
— secos. Veratr. acon. rhus. n-aus.

Parto laborioso. Puls. sec. cham. coff. n-vom. op.
— con adherencia de la placenta. Puls. sec. plat.
— sin dolores. Puls. sec. op.
— — insuficientes. Coff. n-vom.
— dolores consecutivos muy fuertes. Cham. coff. arn.
— metrorragia. Croc. plat. chin. sabin.
— espasmos, convulsiones. Hyos. ign. bell. cham.

Pasteleria (padecimiento por el uso de alimentos de). Puls. ipec. ant. kal.

Patatas (padecimiento por el uso de las). Alum. veratr. sep. coloc. amm-m.

Pecho afectado. Acon. bry. sulf. phosph. hep. kal. sil. spong. nitr-ac. puls.
— congestion (afectado de). Acon. bry. bell. phosph. sulf. n-vom.
— calambres (de). Camph. stram. cupr. n-vom. ipec. hyos sulf. cocc. kal.
— dolorido. *Véase* Pleurodinia y Pleuresia.
— inflamado. *Véase* Pleuresía y Neumonia.
— frio interior (afectado de). Ars. sulf. carb-an. graph. rhus.
— hidrópico. *Véase* Hidrotorax.
— opresion (con). Carb-veg. kal. acon. bell. ipec. ars. sulf. chin. kal. nitr.
— catarro (de). *Véase* Catarro bronquial.
— tuberculoso. *Véase* Tisis.

Pelos (caida de los). Sulf. kal. graph. phosph. natr-m. caus. calc. sil. rhus.
— de la barba. Graph. natr-m. calc. ambr. sil. nitr-ac. plumb.
— del bigote. Kal. plumb. baryt.
— de la nariz (de las ventanas). Graph. caus. sil. calc.
— del púbis. Rhus. natr-m. natr. selen. bell. nitr-ac. bell.
— de las cejas. Kal. bell. selen. caus. par. plumb. bell.
— de todo el cuerpo. Calc. natr-m. graph. sec. carb-veg. sabin.

Pénfigo. Dulc. rhus. canth. ars. ran. hep. caus.

Penetracion magnética espontánea. Phos. acon. bry. sil.

Peras (padecimiento por el uso de las). Veratr. borax. bry.

Peritonitis. Merc. acon. n-vom. bry. bell. hyos.
— puerperal. N-vom. acon. merc. bell. cham. bry.

Pesadilla. Acon. n-vom. op. sulf. puls. sil.

Pescados (padecimiento por el uso de los). Plumb. kal. carb-an.
— a tera los. Puls. carb-an. chin. ars.
Petequias. Bry. ars. rhus. phosph. n-vom.
Pezones (enfermedades de los). Cham. puls. ign. sulf. arn.
— es oriados. Arn. sulf. puls. cham. ign.
— grieteados. Sulf. caus. graph.
Piano (sufrimiento tocando el). Kal. natr. calc. sep. zinc.
Picaduras de insectos. Arn. bell. acon. ant. merc. sep.
Piedra de la vejiga. Sass. lyc. cann. calc. phosph. ant.
— arenillas (en la orina). Puls. sass. lyc. zinc. calc. cann. n-vom. sil.
Piel del cráneo (afecciones de la). Carb-an. hep. ars. chin. rhus. calc.
— costras (en la). Sulf. rhus. hep. ars. calc. lyc.
— escamas. Alum. phosph. staph. mez. oleand.
— dolor (en la). Chin. hep. merc. n-vom. staph. sulf.
— frio (sensacion de). Sulf. calc. veratr. sep.
— hinchazon. Rhus. ars. bell. merc. graph.
— prurito. Alum. sulf. sep. staph. calc. graph. merc.
— sensibilidad dolorosa. Chin. n-vom. spig. ars. merc. sulf.
— sudor. Cham. chin. bry. merc. puls. bell. calc. kal. sil.
— tension. Merc. nitr-ac. ars. caus. lach. spig.
Piel ardiente, quemante. Ars. acon. bry. bell. sil. phosph. lach. lyc.
— amarilla. Acon. merc. chin. sep. con. n-vom. sulf. aur. spig. bry. op. bell.
— arrugada. Veratr. cupr. sec. ant. sep. lyc. stram. ambr. rhus phos-ac. spig.
— áspera. Sep. calc. sulf. bell. rhus. iod. sass. graph. oleand. laur.
— atonia (de la). Con. phos-ac. kal. anac. lyc. bry. sil. dulc. ipec.
— azulada. Dig. veratr. lach. op. cupr. bell. ars. carb-veg. phos-ac. sec.
— caliente. Acon. bry. ars. bell. sil. lyc. phosph. lach.
— callosa. Sep. graph. ant. sil. ran. borax. rhus. lach. sulf. amm.
— dolorosa. Puls. rhus. graph. amm-m. phosph. kal. mang. hep.
— dura. Sep. rhus. graph. ant. sil. dulc. lyc. chin. ars. thui. lach. kal.
— — como el pergamino. Ars. sil. lyc. chin. squill. kal. phosph.
— edematosa. Bell. ars. chin. ferr. ant. cupr. calc. caps. graph. bry. asa.
— escamosa con descamacion. Mez. bell. amm. veratr. acon. staph. coloc.
Piel falta de elasticidad. Veratr. cupr. rhus. bovis. ars. lach. dulc.
— floja. Calc. veratr. iod. cocc. lyc. chin. caps. sec. sulf. con)
— fria. Veratr. ipec. sulf. rhus. sep. camph. phos. carb-veg. samb. chin.
— grasienta. Natr-m. chin. merc. bry. selen. calc. magn-m. asar.
— insensible. Sec. anac. oleand. ambr. phos-ac. lyc. sulf. plat. con. phosph.
— marchita. Sec. chin. veratr. phos-ac. ars. sil. ferr. sass. iod.
— negruzca. Sec. nitr-ac. spig. acon. rut. asa.
— pálida. Sulf. calc. nitr-ac. ferr. puls. bell. cocc. plat. lyc. sep. kal. phosph.
— resuda (que). Rhus. carb-veg. lyc. graph. sep. kal. staph. petr. selen. lach.
— rígida. Phosph. nitr-ac. plat. acon. caus. natr-m. stront. sep. n-vom.
— roja, encarnada. Rhus. bell. merc. graph. puls. acon. n-vom. arn. phos-ac. lyc.
— seca. Acon. sulf. bell. phosph. lyc. bry. kal. calc. dulc. ch n. cham.
— sucia. Iod. ferr. phosph. merc. sec. bry.
— viscosa. Phosph. lyc. veratr. ac n. phos-ac. bry. merc. cham. iod. ars.
— vulnerable. Sil. cham. petr. nitr-ac. sulf. baryt. puls. borax. hep. asa.
Piernas (afecciones de las). Merc. staph. sep. calc. caus. chin.
— adormecimiento fácil. Sep. calc. ant alum.
— dartros. Clem. ars. graph. lach. carb-veg. petr. dulc. natr-m.
— debilidad en las. Sulf. alum. ruta. caus. n-vom. stann. cyel. kal.
— erisipela en las. Sulf. calc. borax. hep.
— frio en las. Sep. nitr-ac. n-jugl. sulf. carb-an. n-vom. lyc.
— hinchazon. Puls. bry. n-vom. lach. sep. kal. dulc. lyc.
— inquietud. Sulf. carb-veg. nitr-ac. graph. caus. amm. phos. ars.
— manchas. Natr. sulf. hyos. ant. calc. phosph. lyc. zinc. stann.
— parálisis. N-vom. cocc. bell. rhus. bry.
— sudor. Ars. hep. bry. euphorb.
— várices. Puls. caus. coloc. ferr. graph.
— úlceras. Sulf. ars. sil. calc. sabin. carb-veg. ruta. phos-ac. lyc. lach.
Piés (enfermedades de los). Puls. bry. sulf. caus. sep. lyc. sil. hep. graph.
— calambres (de los). Carb-veg. amm. calc. sep. coff. sil. n-vom. phosph.
— erisipela en los). Puls. dulc.
— frios. Sulf. caus. sil. con. veratr. graph. plat. kal. phosph. lyc.

Digitized by Google

Piés hinchados. Kal. ferr. sulf. ars. phos. bry. sil. chin. phos-ac. led. sep.
— paralizados. Oleand. chin. ars. plumb. phosph.
— sudan (que). Sil. carb-veg. sulf. calc. sep. lyc. hep. graph.
Pirosis. Puls. n-vom. sulf. calc. sulf-ac. caps.
Pituitas del estómago. Bry. carb-veg. sep. n-vom. sulf. sil. lyc. staph. mez.
Placenta adherida. Plat. sec. puls. bell.
Plétora. Acon. sulf. bell. phosph. puls. n-vom. hyos. sabin. calc. hep.
Pleuresía. Acon. bry. kal. squill. sulf. nitr. lach. merc.
— con dereame. Kal. merc. sulf. squill.
Pleurodinia. Arn. n-vom. bry. acon. sulf. puls. chin.
Plica polaca. Lyc. fluor-ac. natr-m. borax.
Plomo (padecimiento por el uso del). Alum. plat. op. cham.
Podagra. Arn. acon. sulf. lyc. sass. puls. sab.
Pólipos. Staph. calc. lyc. puls. nitr-ac. phosph. thui.
Poluciones. Con. phos-ac. puls. carb-veg. sulf. n-vom. sep. chin. phos.
Posiciones durmiendo:
— sentado. Sulf. ars. rhus. lyc. puls. chin. pho ph. hep.
— sobre las costillas. Phosph. baryt. colch. sulf. caus. spig. merc. n-vom.
— sobre el dorso. Rhus. bry. puls. n-vom. cycl. lyc. ign.
— con las pierna cruzadas. Rhod.
— — apartadas, separadas. Puls. bell. rhus. plat. dulc. chin. cham.
— — dobladas. Ambr. stann. viol-od.
— — — (una sola). Stann.
— — retiradas. Puls. carb-veg. plat. stann. chin. cham. men. rhod.
— — rígidas, envaradas. Cham. puls. plat. viol-od.
— con las manos á la cabeza. Puls. n-vom. plat. calc. coloc. veratr.
— — bajo la cabeza. N-vom. ars. plat. coloc. bell. men. rhus. acon.
— — sobre el vientre. Colc.
— con la cabeza hácia atrás. Bell. spong. cin. sep. cic. hyos. ign. hep.
— — hácia adelante. Staph. acon. cupr. cic. viol-od.
— — hundida, encogida. Bell. spong. hep. arn. n-vom.
— — de costado. Cin. spong. tarax.
— sobre el vientre. Stram. coloc. bell. cham. puls. ign.
Prenez laboriosa. Sep. n-vom. puls. veratr. acon. bry.
Prenez con bulimia. Sep. n-vom. petr. natr-m. magn-m. cin.
— con cefalalgia. Bell. n-vom. puls. cocc. veratr. plat. bry.
— con cólicos. Cham. n-vom. puls. bell. sep. bry. arn.
— con constipacion. Bry. n-vom. sep. lyc. n-vom. alum.
— con convulsiones. Cham. ign. bell. cic. hyos. cocc. ipec.
— con diarrea. Sulf. ant. sep. phosph. dulc. petr. hyos.
— con dispepsia. N-vom. puls. ipec. con. sulf. ferr. natr-m.
— con disuria. Puls. cocc. phos-ac. n-vom. sulf. con.
— con gastricismo. Ipec. n-vom. sulf. con. puls. petr. sep.
— con la moral afectada. Puls. bell. plat. acon. stram. veratr.
— con náuseass. Ipec. n-vom. sulf. con. puls. petr. sep.
— con odontalgia. Sep. cham. bell. puls. magn. staph.
— con manchas súcias á la cara. Sep. con. ferr. nitr-ac.
— con tos. Sep. puls. bell. n-vom.
— con várices. Puls. carb-veg. lyc.
— con vómitos. Ipec. n-vom. sulf. con. sep. ferr. puls.
Presbiopía. Calc. sulf. con. sil. dros. sep. hyos.
Priapismo. Canth. natr-m. n-vom. sil. phosph. majoran.
Proctalgia. Ign. n-vom.
Proctorrea mucosa. Phosph. chin. merc. graph. sep. ant.
Prosopalgia. Spig. n-vom. coloc. con. staph. dros. puls. kal. plat. stram.
— artrítica. Caus. acon. bell. spig. n-vom.
— del lado derecho. Con. bell.
— del izquierdo. Coloc. spig. graph. n-vom. staph. lach.
— inflamatoria. Acon. merc. aur. staph. baryt.
— mercurial. Staph. bell. aur. puls. lach. spig.
— nerviosa. N-vom. spig. staph. coloc. stram. plat. chin.
— reumática. Chin. puls. merc. n-vom. bry. spig. bell. acon.
Próstata afectada. Puls. con. thui. merc. phos-ac. iod. nitr-ac.
Prurigo. Acon. sep. merc. calc. nitr-ac. con.
Prurito á la piel Acon. con. op. sulf. ambr. sil. ant. rhus. sep. merc.
— quemante. Ars. rhus. n-vom. sulf. cic.
— con el calor de la cama. N-vom. carb-veg. staph. cocc. sulf. thui. merc.
— al desnudarse. Cocc. pulc. con. sil. n-vom.

Prurito por la noche. Ars. veratr. cham. puls. cocc.
— por la tarde. Rhus. amm-m. staph. n-vom. puls.
— durante el sudor. Op. rhus. cham. ipec. con.
Psoitis. Puls. rhus. sulf. bry. merc. arn. acon. bell. hep.
Psoriasis. Sep. dulc. sulf. ars. phos. calc.
Puerperios laboriosos (en general). Bell. bry. puls. calc. cham. n-vom.
— con caida de los cabellos. Calc. natr-m. sulf. lyc.
— con cólicos. Cham. bry. puls. sep. arn. bell.
— con constipacion. N-vom. bry. ant. plat. sep.
— con convulsiones. Plat. bell. hyosc. ign. cham. cic.
— con diarrea. Rhab. ant. hyosc. dulc.
— con fiebre de leche. Acon. coff. bell. bry.
— — puerperal. Bry. n-vom. rhus. merc. acon. bell. cham. hyosc.
— insomnio. Coff. acon. bell. hyosc. n-vom. ign. op.
— moral afectada. Plat. bell. puls. veratr. zinc.
— ninfomanía. Plat. phos. hyos. stram. veratr.
— sudores frecuentes. Acon. bry. chin. sulf.
— tumor blanco. Rhus. bell. arn. calc. sil. sulf.
— vientre abultado. Sep. coloc.
Pulmonía. Acon. bry. sulf. phosph. merc. chin. tartr. squill. ars.
— adinámica. Acon. merc. cham. n-vom. veratr. ars.
— con síntomas biliosos. Tartr. cann.
— al principio. Acon. bry. sulf. phos. lyc.
— en el período de hepatizacion. Sulf. phos. lach. lyc.
— en el de esplenizacion. Acon. bry. phosph. sulf. chin. lach. sil.
— con supuracion. Sulf. phosph. lyc. lach.
Pulmonía tifoidea, pútrida. Rhus. bry. veratr. ars. op. arn. bell.
— en los viejos. Tart. chin. cann. op. veratr. ars.
Pulsaciones en el cuerpo. Carb-veg. phos. sil. puls. sep.
— dolorosas, dolor pulsativo. Acon. bell. ferr. ign. cham. sep.
Pulso (aceleraciones del). Acon. veratr. ars. bell. rhus. cupr. stram. sil. phos.
— acelerado (muy). Acon. phosph. bry. merc. bell. sulf.
— — mas que las pulsaciones del corazon. Spig. acon. arn. rhus.
Pulso desigual. Natr-m. ars. nitr-ac. merc. con. stram. phos-ac. chin. dig.
— duro. Acon. bry. phosph. arn. sulf. bell. n-vom. ipec.
— insensible. Carb-veg. veratr. sil. acon. cupr. op. ars. tart.
— intermitente. Natr-m. ars. phos-ac. chin. acon. sec. dig. sulf. bry. sep. kal.
— lento. Stram. dig. veratr. bell. op. con. sec. cupr. puls. laur.
— — mas que las pulsaciones del corazon. Dig. veratr. bell. laur.
— lleno. Acon. phosph. sulf. bell. puls. hyos.
— pequeño. Acon. veratr. carb-veg. sil. cupr. stram. laur. chin. op. bell. merc.
— temblon. Spig. calc. rhus. ars. sep. bell. staph. cic. sabin. kreos.
Pupila afectada. Bell. merc. calc. hyos. nitr-ac. spig. hyos. stram. hep.
— adherida. Nitr-ac. calc. sulf. graph. sil.
— contraida. Veratr. cocc. sulf. arn. sil. cham. sep. chel.
— dilatada. Stram. bell. spig. calc. op. hyos. nitr-ac. cin.
— inmóvil. Op. bell. nitr-ac. cupr. stram. hyos. laur. baryt.
— desigual. Merc. sulf. baryt.
Púrpura hemorrágica. Bry. rhus. arn. sulf-ac. ars.
Pus de las úlceras alterado. Sil. asa. ars. merc. rhus. sulf. chin. bell.
— abundante. Hep. sulf. merc. puls. asa. sep. chin. sil.
— de olor ácido. Hep. sulf. merc. sep. calc. graph.
— albuminoso. Puls. lyc. calc. sulf. ars. sil. amm. sep.
— acuoso. Sil merc. rhus. caus. sulf. ars. staph. asa.
— blanquecino, lechoso. Puls. lyc. calc. sulf. ars. sil. amm.
— morenuzco. Sil. bry. carb-veg. ars. puls. rhus.
— corrosivo, ácre. Sil. ars. rhus. caus. merc. sep. nitr-ac.
— fétido. Sulf. hep. phos-ac. ars. sil. asa. sep. calc. merc. chin.
— — parecido al requeson. Hep. sulf.
— gelatinoso. Sil. merc. ambr. sep. arg. cham. arn.
— gris. Caus. sil. merc. ambr. lyc. sep. ars. chin. thui. carb-an.
— de olor á arenque. Grap.
— amarillento. Puls. merc. sil. sep. ars. carb veg. staph. calc. phosph. caus.
— líquido claro. Merc. caus. sil. asa. sulf. nitr-ac. rhus.
— que tiñe de negro. Sulf. chin. bry. lyc.
— que falta alguna vez. Sil. calc merc. lach. hep. bell. veratr. cupr.

Digitized by Google

Pus sanguinolento. Merc. ars. hep. asa. sil. carb-veg. puls. caus. nitr-ac. lyc.
— sanioso. Sil. ars. rhus. carb-veg nitr-ac. merc. chin. asa. staph.
— verminoso con insectos. Sil. sabad. sulf ars. merc. calc.
— que tine de verde. Sil. asa. puls. caus. sep. merc. rhus. aur. n-vom.
— vi coso. Sil. asa. con. ars. sep. merc.
Pústulas. Tart. ars. thui. merc. sulf. ant. bell. hep.
— negras. Chin. ars.

Q

Queso (padecimiento por el uso del). Coloc.
— echado á perder. Bry. ars. rhus. phos-ac.
Quemaduras. Canth. ars. caus. kreos. carb-veg. phos.
Quina (padecimientos por el abuso de la). Ipec. veratr. sulf. n-vom. puls. ars. merc.

R

Rabia. Canth. bell. hyos. lach.
Ragades, grietas. Puls. calc. sulf. cham. merc. lyc. hep. petr.
Ranula. Thui. staph. merc. ambr. calc.
Raquitismo. Calc. bell. sulf. lyc. sil. merc. puls. nitr-ac.
Rasurarse ó afeitarse (mal por). Carb-an. puls. calad.
Recto dolorido. Ign. caus. acon. n-vom. con. merc. ars. sulf.
— descenso del prolapsus. Ign. sep. n-vom. sulf. merc. ars.
Reglas desordenadas. Puls. sep. sulf. cocc. graph. calc. bry. acon. phos. n-vom.
— ácres. Sulf. carb-veg. sil. amm. puls. kal.
— de color moreno. Chin. bry.
— de muy corta duracion. Puls. dulc. lach. baryt. amm.
— demasiado oscuras. Cham. puls. cocc. sulf. bell. n-vom.
— demasiado fuertes. Calc. plat. ign. sec. lyc. sil. phos. bell.
— de muy larga duracion. N-vom. lyc. sulf-ac. plat. phos-ph.
— en forma de coágulos. Cham. ipec. chin. bell. sabin.
— en las jóvenes. (retrasadas). Puls. sulf. caus. sep. kal.
— fétidas. Bell. syl. carb-veg. bry. sabin. cham.
— muy débiles. Puls. con. natr-m. graph. baryt. lach.
— muy pálidas. Carb-veg. sulf. puls. graph. nitr-ac. ferr. calc. con.
Reglas que se adelantan. N-vom. ipec. sep. calc. phosph. carb-veg.
— que se atrasan. Sulf. puls. sep. caus. natr-m. dulc.
— suprimidas. Puls. bry. lyc. sulf. sep. con. acon. kal.
— con sufrimientos en general. Puls. bry. sulf. calc. sep. cocc. n-vom. graph.
— — antes de la época. Puls. calc. sulf. cupr. sep. lyc. veratr. sec.
— — al principio de la época. Hyos. sep. acon. puls. cham. plat. caus. phosph. lyc.
— — durante las. Puls. graph. kal. hyos. cham. sulf. sep. n-vom. cocc
— — á consecuencia de. N-vom. borax. graph. kreos. stram. lyc. phosph.
Regurgitaciones. Sulf. carb-veg. phosph. lach. n-vom. bry. cham. puls. con.
— de los alimentos. Phosph. bry. sulf. cham. puls. con.
— sanguinolentas. N-vom. sep.
Reir (gana de). Croc. phosph. acon. hyosc. bell. stram. con. plat. veratr.
— convulsiva (risa). Con. aur. ign. calc. phosph. alum. cupr. bell. croc. caus.
— padecimiento por. Bell. ars. stram. carb-veg. phosph.
Relajacion, lisiadura. Arn. rhus. ruta. bry. calc. lyc. amm. puls.
Reposo (mal durante el). Carb-veg. rhus. caps. dulc. aur. puls. con. valer. sabad.
Repugnancia á los alimentos. Puls. arn. n-vom. bry. ipec. chin.
— á los ácidos. Sulf. bell. ferr. cocc. ign.
— á la cerveza. Chin. bell. n-vom. cham. cocc.
— al caldo. Rhus. cham. arn. graph. ars. bell.
— al café. N-vom. bry. phosph. calc. coff. cham. sulf-ac. lyc. natr-m.
— á los alimentos dulces. Sulf. caus. phos. ars. merc. graph. nitr-ac.
— al agua. Bell. stram. n-vom. bry. natr-m. lyc. chin. caus.
— al aguardiente. Ign. merc.
— á las cosas farináceas. Sabad. phos. ars.
— al queso. Chin. oleand.
— á la grasa. Petr. bry. puls. carb-veg. natr-m. ang. sulf. ars. hep.
— á la leche. Sep. calc. puls. guai. bry. sil. cin. sulf. bell. ign. carb-veg.
— á los licores. Bell. magn.
— al pan. Natr-m. con. sep. lyc. puls. n-vom. sulf. nitr-ac. phosph.
— al pan de centeno. Lyc. sulf. kal. puls. n-vom.
— á los pescados. Zinc. graph.
— á los alimentos salados. Selen. carb-veg.

Repugnancia á los alimentos sólidos. Staph. ang. merc. ferr.
— á la carne. Sulf. mur-ac. sil. petr. sep. calc. rhus. carb-veg.
— al vino. Merc. sabad. rhus. ign. sulf. lach.
Respiracion afectada. Acon. sulf. puls. ars. phosph. bry. ipec. bell
— acelerada. Acon. sulf. bell. sep. carb-veg. phosph. cupr. lyc. ipec.
— quemante. Cham. spong. chin. samb. ars. sulf. cin. stram. hep. phosph.
— corta. Acon. ipec. sep. bell. carb-veg. arn. bry. phosph.
— difícil. Sulf. ars. phosph. bell. lach. iod. kreos.
— desigual. Bell. op. ang. cupr. puls. cham. ign. cin. laur. iod.
— jadeante. Ipec. bry. stram. bell. cham. carb-an. phosph. arn. sil.
— lenta. Bell. op. cupr. ign. ipec. hep. laur bry. n-vom.
— profunda. Op. bry. ipec. lach. sil. cupr. caps.
— ruidosa. Hep. tart. lyc. cupr. hyosc. cham. ipec. chin. bell. stram.
— sibilante. Samb. hep. spong. cupr. lach.
— suspirosa. Sil. acon. stram. cocc. op. bry. sec. ipec.
Respirar (padecimiento al). Bry. acon. chin. kal. ars. merc. nitr. bell. arn.
Reumatismo. Acon. puls merc. rhus. bry. colch. arn. n-vom. sulf.
Rigidez de los músculos. Sulf. cupr. sep. caus. coloc.
— acortamiento de los músculos. Caus. arn. sep. amm-m. sulf. coloc. lach. natr-m.
Riñones afectados. Puls. lyc. sass. canth. n-vom. cann. zinc.
Rinones (dolores de). N-vom. calc. sulf. rhus. puls. sep. caus.
— derrengadura (á consecuencia de una). Rhus. bry. puls. n-vom. calc. sulf. puls.
Rodilla afectada. Bry. sulf. rhus. sil. sep. puls. n-vom.
— hinchada. Iod. calc. lyc. sulf. sil. n-vom.
— hidrópica. Sulf. calc. iod. sil. merc. con. dig.
— inflamada. Sulf. bry. n-vom. arn. calc. lyc.
Rodillas (padecimientos estando de). Sulf. bry. phos-ac.
Romadizo del cerebro. *Véase* Coriza.
— de pecho. *Véase* Catarro bronquial.
Ronquera. Carb-veg. dulc. dros. mag. phos. spong.
Rotura (dolor de). Arn. bry. chin. hep. n-vom. rhus, veratr.
Rubias (afecciones de las personas). Bell. caps. cocc. hyosc. lyc. merc. sil. sulf.
Ruibarbo (padecimientos por el uso del). Cham. merc. bell. n-vom.
Ruido (padecimiento por el). Arn. n-vom. bry. bell. cham. ign. coff. spig. veratr.
Ruido como de agua en el vientre. Chin. veratr. carb-veg. puls. sulf.
Rupia. Merc. ars. sulf. petr. sep. graph.

S

Sabañones. Bell. puls. sulf. ars. n-vom. carb-an. nitr-ac. phos. lyc. petr.
— azulados. Arn. bell. kal. puls.
— dolorosos. Bell. sulf. puls. n-vom. nitr-ac. petr.
— inflamados. Cham. puls. sulf. ars. nitr-ac.
Sal de cocina (padecimiento por el abuso de la). Carb-veg. nitr-sp. calc. lyc. ars. dros.
Salchichas alteradas (padecimientos por las). Bry. phos-ac. ars. kreos.
Saliva (alteraciones de la). Merc. sulf. hyos. puls. dig. bism. magn-m. sabin.
— acuosa. Puls. kreos. magn-m.
— aumentada. Merc. bell. rhus. puls. phosph. sulf. n-vom. ant. sep. arg.
— á hilos. Arg. veratr. bell. camph. nitr-ac.
— blanca. Spig. sabin. ran.
— de color morenuzco. Bism.
— disminuida. Bell. veratr. stram. n-mosch. sulf. phosph. sep. ars.
— espumosa. Sulf. bry. spig. canth. sabin.
— espesa. N-mosch. bell. bism.
— fétida. Merc. dig.
— rojiza. Sabin.
— sanguinolenta. Sulf. hyosc. merc. n-vom. arn. nitr-ac.
— viscosa. Camph. arg. bry. bell. cann.
Salivacion. Merc. op. chin. nitr-ac. sulf. hep.
Sangre alterada de las hemorróides. Puls. carb-veg. graph. croc. cham. bry.
— caliente. Dulc.
— coagulada. Rhus. cham. bell. plat. fer. arn.
— clara de un rojo vivo. Bell. sabin. hyos. dulc. sec. arn. rhus. bry. phos.
— corrosiva, ácre. Nitr. ars. sil. kal. sulf. arn. hep. amm. carb-veg.
— espesa. Sulf. croc. plat. cupr. puls. arn.
— fétida. Sabin. bell. plat. carb-an. phosph. bry.

Sangre morenuzca. Carb-veg. bry. rhus. calc. puls. con.
— oscura, negra. Cham. n-vom. croc. sep. amm. puls. sulf.
— pálida. Puls. carb-veg. graph. sulf. plat.
— viscosa. Croc. cupr. magn. sec.
Sapos (padecimientos por el veneno de los). Carb-veg. ars. nitr. sep.
Sarampion. Puls. acon. sulf. bell. phosph. ars. rhus.
— antes de la erupcion. Puls. acon. bry. sulf. rhus. phosph.
— durante la erupcion. Puls. coff. acon. sulf. bry. phosph.
— despues de la erupcion. Puls. ars. coff. rhus. bry. phosph. dros.
— suprimido, repercusion. Puls. bry. rhus. phosph. sulf.
Sarcocele. *Véase* Testículos hinchados.
Sarna. Sulf. merc. caus. carb-veg. sep. selen. hep. lyc.
— con sangre al rascarse. Merc. sulf. calc. dulc. arg-n.
— gruesa, pustulosa. Sulf. lyc. caus. clem. rhus. kreos. merc. sep.
— húmeda. Sulf. merc. caus. kreos. carb-veg. sep.
— miliar. Sulf. carb-veg. caus. sep. lach. natr.
— repercutida. Sulf. merc. caus. ambr. sep.
— seca. Sulf. merc. carb-veg. hep. caus-lach. sep. veratr.
Satiriasis. Chin. plat. merc. sulf. natr-m majoran.
Ciática. Rhus. puls. bry. calc. sulf. coloc.
Sentado (padecimientos estando). Puls. assa. rhus. sep. plat. dulc. lyc. con.
Sentarse (mal al). Coff. valer. spong. agn. bell. samb. ipec.
Sicosis. Thui. nitr-ac. lyc. phos-ac. sabin. sass.
Sífilis. Merc. nitr-ac. aur. carb-veg. carb-an. iod. lyc.
Sobacos afectados. Calc. hep. sil. sulf. carb-an. lyc. sep.
— dartros (en los). Sep. lyc. carb-an.
— escoriacion. Mez. ars. carb-veg. zinc.
— glándulas infartadas. Sulf. calc. sil. hep. staph. carb-an.
— prurito. Phos. spig. anac. carb-an. sep. nitr-ac.
— sudor. Sep. hep. sulf. lach. petr. kal. nitr-ac. thui.
Sobresalto (consecuencias de un). Ign. op. acon. coff. bell. veratr. lach.
Sobresaltos de todo el cuerpo. Sulf. ars. kal. bell. sil. hep. sep. carb-veg. puls. cupr. op.
Sobresaltos de los miembros. Bell. sil. ars. sep. kal. sulf. calc.
— de los tendones. Rhus. bell. puls. con. sulf-ac. hyos.
Sociedad (padecimiento en). Sep. barit. puls. natr. hyos. ambr.
Sofocacion al aire libre (padecimiento por una). Puls. bry. lyc. iod. spig. sabad.
— en la cama. Cham. merc. dros. sulf. sabin. veratr. thui. lyc.
Sol (padecimiento al). Selen. camph. natr. ant. acon. bry.
Soledad (mal en la). Stram. phos. lyc. sil. ars. dros.
Somnambulismo. Phos. acon. sil. bry. sulf. op.
Somnolencia. Sulf. chin. bell. puls. hep. phos-ac. natr-m.
— por la mañana. N-vom. colc. sulf. hep. phos-ac. natr-m.
— durante el dia. Sulf. bell. op. chin. puls. hep. merc. croc.
— despues de la comida. N-vom. sulf. chin. sil. phos. lach.
— al entrar la noche. Sulf. bell. sil. ars. puls. n-vom.
Subir (padecimiento al). Calc. spong. bry. ars. cupr. spig. sep. merc. amm. nitr.
— escalera (una). Merc. n-vom. rhus. petr. aur. acon.
— alto (á lo). Calc. spig. oleand. sulf. acon.
Sudor. Merc. hep. chin. cham. op. samb. acon. sulf. natr. kal. nitr.
— ácre. Cham. ipec. con.
— amarillento. Merc. ars. rhab. bell. magn.
— con ansiedad. Ars. natr. n-vom. cham. caus. sulf. phosph. staph.
— caliente. Op. cham. stram. phosph. bell. lach.
— comiendo. Carb-veg. nitr-ac. carb-an. natr-m.
— de olor ácido. Sulf. lyc. sep. nitr-ac. ars. sil.
— debilitante. Chin. merc. samb. bry. carb-an. nitr. phosph.
— de olor amargo. Dig.
— de olor á moho. Stan. n-vom.
— de olor pútrido. Stram. n-vom. staph. carb-veg.
— de olor á sangre. Lyc.
— durante el sueño. Puls. cham. ferr. chin. ars.
— durante los trabajos mentales. Sulf. graph. sep. borax.
— de olor á orina. Coloc. nitr-ac. canth.
— en las partes afectas. Merc. ambr. tart. stront.
— en las que están cubiertas. Bell.

Sudor fétido. Staph. baryt. puls. dulc. phos. graph.
— frio. Veratr. ars. sec. camph. ipec. chin. puls. bry. n-vom. hep. carb-veg.
— graso. Merc. bry. stram. chin. magn. glutinoso. Phos. cham. veratr. acon. lyc. ars. phos-ac.
— matutinal. Chin. sep. n-vom. phos. rhus. bry. puls. calc. stram.
— nocturna. Sulf. calc. sil. kal. stann. hep. phos. puls. ars. sep. chin.
— que colora la ropa. Merc. ars. magn. bell. rhab. carb-an. graph. selen.
— que aparece fácilmente. Sulf. hep. calc. sep. chin. natr.-kal. lyc. sil.
— que pone tiesa la ropa. Merc. selen.
— sanguinolento. Lach. n-mosch. crot.
— semilateral. Puls. cocc. n-vom. bry. rhus. sulf.
— viscoso. Phos. cham. veratr. acon. lyc. ars. phos-ac.

Sueño alterado. Sil. chin. sulf. ars. rhus. bell. puls. baryt. n-vom. cham.
— agitado. Sulf. ars. sil. chin. rhus. bell. cham. rhab. puls. hep. phosph.
— al dormirse. Ars. sep. rhus. bry. puls. calc. phos. carb-veg. merc.
— con ansiedad. Acon veratr. cocc. phos. op. lyc. dulc.
— con sufrimientos. Sulf. ars. stram. bell. sil. bry. puls. cham. op. hep.
— durante el sueño. Bell. ars. sulf stram. bry. sil. puls. op. hep. cham.
— despues del sueño. Lach. carb-veg. sulf. calc. staph.
— muy ligero. Merc. ars. sulf. cham. n-vom. ign.
— no reparador. Chin. sulf. bry. sep. con. sil. phosph.
— profundo. Op. bell. sulf. ign. tart. stram.
— soporoso, comatoso. Puls. op. ant. bell. n-vom. croc. tart.
— tardo, al principio de la noche. N-vom. ars. sulf. chin. phos. carb-veg.

Supuraciones. Hep. lach. puls. merc. sil. sulf. asa. cham. phos. ars.
— benignas. Hep. sil. sulf. puls. merc. bell. phos. calc. lach.
— muy copiosas. Sulf. asa. puls. merc. sep. sil. hep. chin. phos. calc. ars.
— malignas. Sil. asa. merc. phos. hep. sulf. kreos. nitr-ac. carb-veg.
— suprimidas, detenidas. Hep. lach. sil. merc. calc.

T

Tabaco (padecimientos por el uso del). Puls. n-vom. cocc. veratr.
Tacto (mal al). Hep. chin. bell. bry. n-vom.
Talones ulcerados. Sep. natr. ars. caus. sil.
Tarde (padecimiento por la). Puls. acon. sulf-ac. ars. sep. calc. merc. phosph.
— cama (en la). Ars. hep. calc. sulf. bry. sep. carb-veg. rhus. graph. phos.
Te de China (padecimiento por el uso del). Chin. thui. ferr. veratr. coff. selen. lach.
Telangiectasis. Puls. carb-veg. sep. ars. nitr-ac.
Temblor nervioso. Ars. stram. bell. rhus. calc. sulf. cic. puls. op. iod.
— en las manos. Sulf. ars. phos. kal. n-vom. hyosc. anac.
Tempestad (padecimiento por una). Sep. con. sulf. sil. rhus.
Tenesmo del ano. Merc. sulf. n-vom. ars. rhab. caps. rhus. puls.
— de la vejiga. Puls. cann. n-vom. merc. canth. dig.
Testículos afectados. Puls. arn. nitr-ac. merc. clem. arn. zinc. rhod.
— atrofiados. Spong. iod.
— dolorosos. Sep. rhod. sponj. phos-ac. arn. phosph.
— duros, induracion. Clem. merc. rhod. agn. spong.
— hinchados. Puls. aur. iod. clem. rhod. arn.
— inflamados. Merc. puls. aur. nitr-ac. clem.
Tetanos. Op. camph. ipec. bell. sec. cic. ign. veratr.
Tiempo (padecimientos por el cambio de). Calc. sulf. carb-veg. sil. rhus.
— húmedo (padecimiento por un). Puls. veratr. dulc. rhus. carb-veg.
— nebuloso (por un). Rhus. magn. cham. n-mosch. chin. sep. rhod. merc. bry.
— seco (por un). Caus. n-vom. hep. asar. spong. acon. ipec. bry. sabad.
Tifo. Bry. rhus. bell. chin. phos-ac. nitr-ac. op. merc. natr-m.
— con pérdida del conocimiento. Op. arn. natr-m. hyos. bell. bry. rhus.
— con constipacion de vientre. Bry. n-vom. op. natr-m. merc. puls.
— con delirio. Acon. bell. bry. op. puls. rhus. lach.
— — diarrea. Ars. rhus. merc. arn. nitr-ac. puls. n-mosch. phosph.
— — disentería. Rhus. ars. carb-veg. n-vom. rhus.
— — evacuacion involuntaria. Arn. rhus. bell. bry. hyos.
— — pecho afectado. Rhus. bry. phos.
— — ulceraciones intestinales. Nitr-ac. op. merc. rhus. ars.
Timpanitis. Chin. colc. carb-veg. sulf. n-vom. lyc. phosph.
Tintineo ó Retintin en los oidos.

Digitized by Google

Chin. n-vom. bell. puls. calc. caus. sulf. con. petr.

Tina. Sulf. calc. baryt. lyc. ars. hep. rhus. merc.

— amantácea. Ars. staph. rhus. carb-an. merc.

— escamosa. Calc. sulf. graph. sep. lyc. con. phos-ac. rhus. dulc.

— favosa. Ars. sulf. phos. hep. merc. baryt. calc. brom.

— furfurácea. Ars. bry. alum. oleand. mez. calc. sulf. kal. graph. rhus.

— húmeda. Sulf. rhus. calc. ars. lyc. hep. sep. staph. graph. merc.

— impetiginosa. Sulf. calc. rhus. ars. hep. phosph. merc.

— porriginosa. Sulf. calc. rhus. ars. lyc. hep. staph. sep. graph. merc.

— seca. Sulf. baryt. calc. aur. ars. graph. thui. lach. merc.

— serpiginosa. Sulf. ars. calc. sep. clem. sass. graph. dulc.

Tiriasis. Bry. ars. sulf. calc. sil. kreos. phosph. dulc.

Tisis. Sulf. calc. sil. lyc. phosph. kal. nitr-ac. hep.

— abdominal. Calc. phosph. sulf. sec. nitr-ac.

— laringea. Carb-vg. lach. arg. spong. hep. mang. ars. iod.

— pulmonar. Calc. sulf. sil. kal. nitr-ac. lyc. hep. lach. puls.

Torceduras. Rhus. arn. amm. bry. calc. ruta. lyc.

Tos. Bell. acon. puls. bry. n-vom. ipec. carb-vg. veratr. sulf. sep. dros.

— chillona. Spong. chin. samb. cin. dros. acon.

— como si ladraran. Bell. acon. spong. hep. nitr-ac. dros. phosph.

— conmovente. Carb-vg. puls. merc. ign. stann. anac.

— con vomito. Ipec. n-vom. carb-vg. dros. bry. puls. tart. sulf.

— corta. Acon. merc. cin. lach. coff. caus. phosph. bry.

— crascitante. Acon. ruta. lach.

— espasmódica. Calc. n-vom. carb-vg. ipec. puls. bry.

— espectoracion (con). Puls. bell. stann. bry. lyc. calc. kal. squill. sep. chin.

— — por la mañana. N-vom. bry. sep. carb-veg. phosph. calc.

— — por la noche. Bell. tart. calc. sep. canst. lyc.

— — por la tarde. Graph. arn. cin. stann. calc. staph.

— hueca. Bell. spong. hep. dros. staph. nitr-ac.

— ronca Acon. stann. cin. spong. dros. n-vom. ign. hep.

— seca. Acon. n-vom. merc. bry. sep. phosph. coff. calc.

Tos sibilante. Acon. spong. cin. kal. dros. phosph. kreos.

— sofocante. Op. tart. cupr. ipec. chin. dros. cin. sil.

— violenta. Merc. n-vom. lach puls. carb-vg. sulf.

Tosiendo (padecimiento en). N-vom. bry. phosph. acon. dros. sulf. puls. caus.

— cabeza dolorida. N-vom. bry. sulf. natr-m. puls. bell.

— hipocondrios doloridos. N-vom. bry. dros. phosph. lach. lyc. sulf. op. hep.

— orinas involuntarias Phosph. caus. natr-m. kreos. puls.

— pecho dolorido. Acon. phosph. bry. puls. bell. sulf. carb-vg. kal. nitr.

Trabajadores en piedra (enfermedades de los). Sil. calc. lyc. puls. natr. ipec. sulf. nitr-ac.

Trabajo corporal (padecimiento por un). Rhus. arn. sulf. bry. sil. cocc. lyc. acon.

— intelectual (por un). N-vom. natr-m. calc. lach. bell. aur. sep. puls. sulf.

— manual (por un). Natr-m. sil. lach. amm-m. veratr bovis. nitr-ac. kal.

Traspiracion (padecimiento por efecto de la). Merc. phosph. chin. ars. sep. hep.

— suprimida. Cham. chin. dulc. acon. sulf. lach. sil. bry. bell. puls.

Trasudacion de la piel. Sulf. calc. petr. merc. graph. lyc.

Trismo. Op. camph. veratr. bell. merc. lach. ign. hyos. plat. arn. sil.

Tristeza. Ign. cocc. puls. aur. nitr-ac. calc. natr-m. bell. hell.

Tumores. *Véase* Hinchazon.

U

Ulceras en general. Sulf. ars. puls. asa. sil. lach. merc. lyc. hep. nitr-ac. thui.

— artríticas. Bry. sulf. lyc. chin. bell. staph. calc. rhus. graph.

— atónicas. Ars. sulf. sil. lach. calc. phos-ac. carb-vg. puls. lyc. graph.

— azuladas. Ars. sil. asa. veratr. merc. aur. lach. hep. bell.

— agrisadas. Sil. ars. merc. caus.

— amarillas. Cic. merc. sil. bell. puls.

— blancas. Merc. sil. lach. sulf. ars. thui. nitr-ac. sabin.

— con bordes elevados. Merc. ars. sulf. hep sil. puls. sep. petr.

— — dentellados. Phos-ac. hep. sulf. lach. thui. merc. sil.

— — negros. Mur-ac. ars. sil. lach. asa. sulf. sep.

Ulceras con granos alrededor. Carb-veg. ars. lach. sulf. caus. sep.
— con dolor quemante. Ars. sulf. carb-veg. sil. merc. rhus. puls.
— callosas. Lach. caus. sulf. petr. ars. asa. carb-veg. merc. bell. clem.
— carcinomatosas. Bell. sulf. ars. sil. con. kreos. graph.
— con cáries. Sil. asa. merc. lyc. ca'c. aur. sulf. ruta. phos-ac.
— costrosas. Sulf. calc. sil. merc. ars. rhus. bell. sep.
— con hinchazon. Sil. merc. sep. rhus. sulf. ars. puls. bell.
— corrosivas, fagedénicas. Merc. carb-veg. sil. ars. caus. sulf. nitr-ac.
— dolorosas. Sil. hep ars. graph. carb-veg. puls. kreos.
— duras. Lach. caus. sulf. merc. sil. puls. lyc. carb-veg.
— escorbúticas. Sulf-ac. ars. sil. mur-ac. amm. staph. sulf. merc. hep.
— escrofulosas. Sil. ars. sulf. calc. merc. lyc. carb-veg. asa. hep.
— fétidas. Ars. sil. merc. carb-veg. sec. chin. sep. asa.
— fistulosas. Ca'c. sil. phosph. ant. sulf. puls. carb-veg. caus.
— fungosas. Merc. sil. clem. petr. lach. ars. staph.
— frio (con sensacion de). Sil. ars. rhus. bry. merc.
— gangrenosas. Ars. sil. bell. sulf. chin. lach. sec.
— grieteadas, cortadas. Phos-ac. hep. thui. merc. sil. sulf. lach. staph.
— herpéticas. Sulf. calc. clem. lach. graph. sil. merc. lyc. sep. rhus.
— inflamadas. Acon. sil. phos. cham. ars. hep. lyc.
— indolentes. Phos-ac. ars. sep. carb-veg. lach. cupr. puls. phosph.
— insensibles. Op. carb-veg. sulf. phos-ac. lyc. ars.
— lardáceas. Merc. hep. sabin. sulf. thui. nitr-ac.
— lujuriantes. Petr. cham. sulf. merc. sil. ars. graph.
— mercuriales. Sulf. hep. nitr-ac. sil. asa. lyc. thui. bell. aur. lach. carb-veg.
— manchadas. Sulf-ac. arn. ipec. ars. lach. con.
— planas, superficiales. Nitr-ac. lach. merc. thui. ars.
— profundas. Merc. bell. asa. lach.
— pruritosas. Lyc. sil. ars. hep. puls. rhus. phos-ac.
— pútridas. Sulf-ac. ars. sil. cycl. bell. hep mur-ac merc.
— que se vuelven negras. Sil. lach. ars. mur-ac. sulf.
— que sangran con facilidad. Phosph. ars. graph. hep. phos-ac. carb-veg. puls.
Ulceras que supuran mucho. Sil. hep. merc. chin. puls. cham. bell. asa. sulf.
— — poco. Ars. hep. lach. sil. merc. calc.
— rojas (alrededor). Acon. sil. phosph. cham. ars. hep. lyc. asa. merc. bell.
— sucias (en el fondo). Merc. lach. nitr-ac. th. i. sabin.
— sifilíticas. Merc. nitr-ac. thui. aur. lyc. carb-veg. sil. carb-an.
— varicosas. Carb-veg. sulf. puls. ars. lyc. caus. graph lach.
— verminosas. Sil. merc. sabad. ars. calc.
— verrugosas. Ars. sil. petr.
Uñas enfermas. Sil. graph. hep. ant. merc. sulf. rhus.
— azules. Chin. n-vom. natr-m. dig. aur. sil.
— amarillas. Sep. sil. con. nitr-ac. merc. sulf.
— con paños ó manchas. Sulf. natr-m. rhus. stann. merc. calc.
— costillas (en forma de). Sabad.
— crecen lentamente (que). Ant.
— descoloridas. Graph. nitr-ac. sil. ant. ars. sulf.
— deformes. Graph. sulf. sil. sep. ant. alum.
— dolorosas. Graph. caus. m-aus. merc. ant.
— desprendidas. Graph. merc. ars. sep. sec. bell.
— esfoliadas. Graph. sulf. sil. alum. merc.
— frágiles, quebradizas. Sil. alum. sulf. graph. sep. merc.
— gruesas. Graph. sil. sulf. calc. sep. alum. sabad. merc.
— que se introducen en las carnes. Sulf. m-aus. graph. sil. teuer. colch.
— sensibles. Ant. graph. caus. sulf. merc.
— ulceradas. Hep. sil. merc. sulf. lach.
Uretra afectada. Cann. canth. puls. sulf. merc. caps. n-vom.
— con estrechez. Clem. petr. dulc. sulf. rhus. n-vom.
— dolorosa. Cann. sulf. calc. merc. arg-n. puls.
— inflamada. Cann. merc. n-vom. canth. puls. acon.
Urticaria. Ipec. dulc. calc. rhus. hep. ars. ant. puls.
Utero. *Véase* Matriz.

V

Vaca (padecimiento por la carne de). Nitr. calc. sep. caus. ipec.

itized by Google

Vagina afectada. Sep. merc. con. sulf. bell. ferr. lyc.
— caida de la). Sep. merc. n-vom.
— inflamada. Merc. puls. s p. sulf. lyc. n-vom.
— con sequedad excesiva. Lyc. bell. m rc.

Valeriana (padecimiento por el uso de la). Cham. n vom. coff. sulf.

Varices. Carb-veg. puls. arn. sulf. calc. n-vom. ars. lyc.
— inflamadas. Puls. arn. sulf. ars. spig. calc. sil. kreos. zinc. n-vom.
— ulceradas. Lyc. sil. puls. ars. lach. sulf. tart kreos.

Varioloide. Rhus. sulf. bell. merc. ars.

Vasos sanguíneos afectados. Phosph. arn. sulf. ars. sep. carb-veg. puls. caus.
— inflamados. Acon. cham. bell. puls. sulf. sep.
— frio interior (con). Lyc.

Vejiga de la orina afectada. Dulc. puls. can h. sulf. graph. n-vom. phos-ac. merc. calc.
— de catarro. Dulc. puls. sulf. n-vom. ant. phosph.
— de dolores. Cann. puls. n-vom. dulc. sulf.
— de espesor. Dulc.
— de inflamacien. Cann. puls. canth. n-vom. acon.
— inflamado el cuello de la. Cann. canth. dig. puls. n-vom. acon.
— de parálisis. Ars, bell. laur. dulc. hyos.
— — del cuello. Ars. hyos. dulc. lach. bell. acon. m-aus. cic.
— de pólipo. Calc. staph. puls. con. thui. merc. sil.

Velo del paladar afectado. Acon. merc. coff. lach. bell. sulf. phosph.

Ventanillas de la nariz afectadas. Calc. cham. lach. lyc. sulf. n-vom. bell. puls. sil. caus.
— costrosas. Merc. lyc. sulf. aur. cham. lach. graph. calc. staph.
— dolorosas. Hep. merc. cham. bell. n-vom. bry. phosph.
— escoriadas. Phosph. n-vom. fluor-ac. spig. ign. alum. graph. ant.
— tapadas. Sil. calc. bry. n-vom. sulf. caus. con. amm. alum.
— ulceradas. Merc. sulf. aur. staph. calc. alum. puls. lyc. sil.

Ventosidades. Chin. carb-veg. phos. graph. c.am. bell. ign. cocc. n-vom.
— acumuladas. Chin. lyc. carb-veg. n-vom. cocc. puls. merc. arn. graph.
— calientes (al espelerlas). Cham. acon. staph. phosph. zinc.
Ventosidades de olor ácido. Natr-m natr. sulf. calc. arn.
— encarceladas. Carb-veg. chin. graph. lach. n-vom. sulf.
— frecuentes. Carb-veg. chin. phosph. graph.
— frias (al espelerlas). Con.
— muy fétidas. Chin. carb-veg. sulf. puls arn.
— ruidosas (á su espulsion). Merc. caus. lach. squill. zinc.
— sin olor. Bell. carb-veg. lyc. ambr. coff. plat.

Verdete, cardenillo (padecimiento por el uso del). Hep. n-vom. bell. ipec. chin.

Verrugas. Calc. natr. caus. rhus. sulf. dulc. thui. ep.
— antiguas. Caus. rhus. sulf. nitr-ac. kal.
— á manera de crestas. Thui. nitr-ac. phos-ac. natr. rhus.
— callosas. Ant. thui. dulc. sulf. graph.
— debajo de los ojos. Caus. sulf.
— dolorosas. Caus. thui. natr. sulf. nitr-ac. natr-m.
— en los brazos. Calc. nitr-ac. caus. sulf. sep.
— e i los dedos. Thui. sep. sulf. lach.
— en la cara. Caus. sep. kal. dulc.
— en las manos. Thui. calc. sep. rhus. phosph. dulc. lyc. lach.
— en la nariz. C us.
— en los párpados. Caus. thui. nitr-ac.
— en las cejas. Caus.
— gruesas. Caus. sep. natr. nitr-ac. dulc.
— inflamadas. Natr. caus. sulf. sil. thui. nitr-ac.
— pediculadas. Sabin. thui. lyc. dulc.
— pequeñas. Rhus. calc. thui. sep. sulf. sass. nitr-ac. du c.
— planas. Lach. dulc. calc.
— pruritosas. Thui. phosph. nitr-ac. calc. euphorb.
— que sangran fácilmente. Natr. thui nitr-ac.
— ulceradas. Natr. caus. sil. calc. thui ars. phosph.

Vertigos. Acon. sulf. bell. n-vom. arn. puls. con. sil. phosph. caus. lach.
— congestivos. Acon. n-vom. bell. op. arn. sulf. puls.
— por efecto de hallarse el estómago sobrecargado. Puls. n-vom. ant. bell.
— por estar fatigado los nervios. N-vom. puls. arn. rhus. chin.
— á consecuencia de úlceras repercutidas. Sulf. calc. phosph. bell. lach. caus.
— yendo en carruaje. Ferr. cocc. sulf. hep.

Vestidos (incomodidad causada por los). N-vom. bry. sulf. calc. lyc. hep. caus. spig.

Vianda (padecimiento por el uso de la). Colch. calc. puls. sil. sep ferr.
— repugnancia á la. Suif. puls. sil. lyc. sep. ign. rhus. merc. nitr-ac.
Viento (padecimiento por el). Con. sulf. bry. sil. carb-veg. lyc. lach. sep.
— del Este. Sil. acon. hep. caus. bry. n-v m. carb-veg.
— del Norte. Sep. caus. sil. hep n-vom. acon.
Vientre afectado. Sulf. chin. sep. coloc. puls. n-vom. plumb. cham. rhus. bell.
— con sensacion de frio i terior. Sep. veratr. ars. petr. calc. phosph. sec.
— con calor interior. Sil. bell. n-vom. ars. phosph. acon.
— con congestion. Sulf. n-vom. carb-veg. ars. caps. puls.
— doloroso. *Vease* Cólicos.
— inflamado. *Vease* Enteritis y Peritonitis.
— hinchado. *Véase* Flatuosidades y Ascitis.
— timpanítico. Chin. carb-veg. sulf. coloc. phosph. lyc. veratr. arn. puls. grap .
— abultado, grueso (en las mujeres). Sep. bell. n-vom. calc. coloc. chin.
— sensible al tacto. N-vom. merc. acon. puls. hyos. sulf. cham. bell.
— con manchas en la piel. Phosph. sep. sabad. bell. lach. canth.
Vientre con afeccion del hígado. N-vom. lach. lyc. aur. natr. sulf. magn-m. ca'c. caps. chin. merc.
— doloroso (el hígado). N-vom. merc. chin. bry. bell. lach. acon. aur. lyc.
— duro, induracion. Calc. n-vom. sulf. chin. lyc. merc. ars.
— inflamado. Acon. n-vom. bell. sulf. merc. lach. lyc. au . magn-m.
— ingurgitado. Calc. n-vom. chin. sulf. merc. ars. magn-m. caps. n-mosch.
— (con afeccion del bazo). Caps. arn. sulf. ars. sec. chin. rhus. ign. a a. natr.
— doloroso. Natr-m. arn. natr. con. amm-m. chin. sulf.
— duro, induracion. Sulf. caps. chin. a s. n-mo ch.
— inflamado. Chin. bry. sulf. acon. n-vom.
— ingurgitado. Caps. ars. sulf. chin. n-mosch. ign. n-vom.
Vigilias prolongadas (padecimiento por). Cocc. n-vom. selen. colch. puls. ambr.
Vinagre (padecimiento por el uso del). Ant. ar . sulf. ferr. sep.
— por el que contiene prepa aciones de plomo. Op. sulf. bell. plat. n-vom. ars. alum. sulf-ac.
Vinagre (padecimiento por el què contiene azufre). Puls. merc. sep. ar . chin.
Vino (deseo de beber). Calc. acon. staph. bry. s lf. sep. sil.
— (padecimiento por el uso del). N-vom. coff. op. ach. zinc. calc. sil. lyc. puls ant.
— (repugnancia por el). Lach. ign. rhus n.e c. fluor-ac.
Violon (malos efectos por oir tocar el). Kal. calc. viol-od.
Viruelas en general. Merc. sulf. ars. rhus. thui. bell.
— antes de la erupcion. Acon. coff. bell. rhus. bry. sulf.
— con pústulas confluentes. Sulf. merc.
— con pústulas negras. Ars. chin. sulf. carb-veg. lach. rhus.
— durante la erupcion. Sulf. merc. bell. stram. thui.
— durante la supuracion. Sulf. merc. thui. p ls. rhus.
— en el tiempo de la desecacion. Bell. cham. puls. acon. sulf.
Viruelas locas Puls. tart. ant. merc. su f. bell. acon.
Visiones fantásticas. Bell. stram. veratr. hyos. op. merc. anac. sulf. sil. ars.
Visiones fisiológicas. Bell. phosph. aur. sulf. calc. sil. sep.
— aureo a alrededor de la l'ama. Puls. bell. sulf. ruta. phosph. cocc. sep.
— colores blancos. Kal. amm. sulf. alum. phos-ac. b ll. dig. cann. caus.
— — azules. Lyc. bell. stron.t. stram. zinc. sulf.
— — claros. Bell. stront. puls. camph. n-vom. aur. valer. hyos. kal. borax.
— — diversos. Phosph. bell. phos-ac. cic. stram. dig. nitr. kal.
— — oscuros. Stram. bell. sil. calc. sep. chin. phosph. con. nitr-ac. merc. cocc.
— — grises. Phos. sil. stram. sep.
— — iris (parecidos al arco). Phos-ac. bell. phosph. con. stram. cic. nitr. kal. dig. sulf.
— — amarillos. Sep. bell. dig. canth. stront. sil. kal. alum. sulf. ars.
— — negros. Phosph. sil. bell. stram. sep. magn.
— — rojos. Sulf. bell. hyos. con. hep. stront. c oc. sabad. cann. spig. dig.
— — estriados. Sep. amm. natr-m. con. puls. bell. phosph. amm-m.
— de colores verdes. Phosph. dig. ruta. zinc. sep. stront. sulf. merc.
— como relámpagos. Spig. n-vom. natr. sec. kalc. croc. staph. bell. zinc.
— fuego, llamas. Spig. bell. kal. zinc. aur. puls. n-vom. caus. natr-m. hyos.
— mo cas que vuelan. Stram. agar. sil. bell. sep. calc. rhus. chin. phos.

Visiones de manchas. Phosph. sil. k-l. amm-m. calc. sep. caus. merc. bell. aur.
— objetos dobles. Hyos. veratr. sulf. bell. sec. cic. puls. dig. natr-m. lyc.
— — muy iluminados. Hyos. valer. con. n-vom. camph.
— — muy lejanos. Stann. anac. phosph. carb-an. sulf. n-mosch. natr-m.
— — muy grandes. Phosph. hyos. natr-m. euphorb. laur.
— — muy pequeños. Plat. stram. hyos.
— — muy aproximados. Bovis. stram. cic.
— — cubiertos con un velo. Phosph. calc. croc. caus. sulf. bell. ruta. lyc. phos-ac. natr-m.

Vista afectada. Bell. ruta. sulf. phos. sil con. amm. sep. calc. hyos.
— abolida. *Véase* Amaurosis.
— confusa al leer. Natr-m. sil, graph. dros. chin. bell. lyc. hyos.
— — con respecto á los demás objetos. Plat. con. stram. graph. sil. lyc. iod. led.
— debil. Chin. cin. bell. ruta. sulf. phos. sil. calc.
— o curecimiento frecuente.
— pálidos (los objetos están). Sil. dros.
— turbia. Caus. phosph. sil. calc. sep. cann. ruta. bell. puls. merc. stram.

Vista fija (mirada fija). Op. stram. bell. phos-ac. hyos. ars.

Vómitos en general. Ipec. n-vom. ars. veratr. puls. tart. ant. sulf. bry. sil. cham.
— ácidos, ágrios. Sulf. calc. phosph. chin. n-vom. puls. cham. ferr. bell.
— amargos, bilinosos. Ars. veratr. puls. ipec. n-vom. cham. merc.
— de los alimentos ingeridos. N-vom. ars. sil. phosph. bry. ferr. lyc. ipec. puls.
— de las bebidas ingeridas. Ars. sil. veratr. ipec. hyos. spong. cin. arn.
— de materias fecales. Op. sulf. bell. bry. plumb.
— de sangre. Arn. phosph. ipec. ferr. sulf. acon. sep. chin. puls.

Vómitos de lombrices. Cin. acon-sabad. ferr. sec. hyos. veratr. spig. sil.
— fétidos. Sep. ars. sulf. cupr. stann. n-vom. op. phosph. veratr.
— mucosos. Puls. dros. veratr. acon. n-vom. ars. ipec. bell. ign. cham. hyos.
— negros. N-vom. ars. veratr. phosph. lyc. ipec. plumb. petr. sulf-ac.

Vomituricion. Ipec. bell. veratr. arn. n-vom. chin. tart. me c. asar.

Voz alterada. Dros. phosph. baryt. sulf. chin. caus. iod. carb-veg.
— abolida, afonia. Phosph. carb-veg. veratr. ant. spong. bell. puls. caus.
— aguda. Stram. cupr. stann.
— chillona. Stram. cupr.
— como á través de un velo. Merc. camph. stann. caus. spong. chin. salen. dros. magn. graph.
— débil. Veratr. hep. canth. ang. staph. ant. spong. cham. sec. chin.
— de bajo (cantante). Dros. chin. iod. par. baryt. cham. arn, laur.
— enronquecida. Spong. carb-veg. phos. magn. veratr. dros. puls. calc. caus.
— hueca. Veratr. spong. ipec. stann. samb. led. dros. caus. tart. stram. sec.
— irregular. Graph. spong. merc. caus. dros. hyos. chin. nitr-ac. croc.
— nasal. Staph. lach. merc. bell. phos-ac. aur. bry. alum.
— ronca. Phosph. sulf. caus, stann. sen-neg. men. puls. n-vom.
— sibilante. Phosph. bell.
— sin timbre. Dros. spong. hep. calad. ambr. chin. carb-an. samb. cin.
— temblorosa. merc. acon. ign. ars. canth.

Vulnerabilidad de la piel. Cham. petr. sil. hep. sulf. staph. nitr-ac. alum. calc.

Z

Zanahorias (indigestion por las). Calc, lyc.

Zarzaparrilla (padecimiento por el uso de la). Merc. bell. sulf.

Zona. Rhus. graph. sull. ars. puls, caus, merc, bry,

FIN DEL TOMO II Y DE LA MATERIA MÉDICA,

LIBRERIA DE D. C. BAILLY-BAILLIERE.

— Plaza de Sta. Ana, 10, Madrid. —

MEDICINA HOMEOPÁTICA DOMÉSTICA.

POR BRUCKNER.

Traducido por el doctor Paz Alvarez. 1874. Un tomo, 6 pesetas en Madrid.

GUÍA POPULAR DE HOMEOPATÍA.

POR MOORE.

Barcelona, 1870. 1 peseta en Madrid.

LA PRACTICA DE LA HOMEOPATIA SIMPLIFICADA.

POR ESPANET.

Barcelona, 1875. Un tomo, 5 pesetas en Madrid.

LOS LADOS DEL CUERPO.

COMO TAMBIEN LAS AFINIDADES DE LOS MEDICAMENTOS. — ESTUDIOS HOMEOPÁTICOS.

Por BOENNINGHAUSEN.

Vertidos del francés al castellano por el doctor Jph. Ant. Alvarez Peralta. Precio: 1 peseta en Madrid y 1 peseta 25 céntimos en provincias, franco de porte.

TRATADO METODICO Y PRACTICO

DE MATERIA MÉDICA

Y DE TERAPEUTICA.

Fundado en la ley de los semejantes, por A. ESPANET; traducido del francés al español por el profesor y médico homeópata D. Pio Hernandez y Espeso. Madrid, 1862. 2 tomos en 8.°, de unas 500 páginas cada uno, 10 pesetas en Madrid y 11 pesetas y 50 céntimos en provincias, franco de porte.

Digitized by Google

TERAPEUTICA HOMEOPATICA

DE LAS ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS

POR EL DOCTOR HARTMANN.

Traducido del aleman al francés con notas, por el Dr. Leon Simon hijo, y del francés al castellano bajo la direccion de don Ramon Fernandez del Rio, doctor en medicina y cirugía, etc. Madrid, 1853. Un tomo en 4.°, 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.

TRATADO PRACTICO

DE TERAPEUTICA HOMEOPATICA

DE LAS ENFERMEDADES AGUDAS Y CRONICAS

POR EL DOCTOR HARTMANN

Traducido al francés de la edicion alemana por A. J. L. Jourdan, socio de la Academia nacional de Paris, y del francés al castellano por D. Pio Hernandez y Espeso, médico homeópata, catedrático de homeopatía en el Instituto español, socio fundador del Instituto homeopático, etc.—*Segunda edicion.* Madrid, 1863. Tres tomos en 8.° marquilla, 15 pesetas en Madrid y 17 pesetas y 50 cént. en provincias, franco de porte.

MEDICINA

HOMEOPÁTICA DOMÉSTICA

ó

GUIA DE LAS FAMILIAS

Para que sus individuos puedan tratarse por sí mismos homeopáticamente en la mayoría de casos, y en los urgentes y graves prestar auxilios eficaces á los enfermos hasta la llegada de un médico homeopata: por el doctor C. HERING de Filadelfia. *Novena edicion* española, arreglada á la última edicion publicada por el mismo autor (y que difiere en mucho de las anteriores), y á la

cuarta edicion francesa; traducida al español, revisada, corregida, anotada y considerablemente aumentada, por D. Angel Alvarez de Araujo y Cuellar. La parte aumentada contiene: una breve exposicion de las doctrinas médicas; nociones generales de higiene; noticias sobre el clima de las Antillas y Filipinas; reglas higiénicas y de aclimatacion, que deben observarse en las mismas por los europeos, alimentos que les son permitidos y prohibidos estando enfermos; tratamiento que conviene seguir en las enfermedades mas temibles de aquellos paises, de la América en general, Asia y costa de Africa, y en algunos otros casos de enfermedades comunes en ciertas provincias de España, como son la *suette*, etc.; antropologia, temperamentos y medicamentos que les son apropiados, asi como á las diferentes edades y sexos; profiláxis de las enfermedades hereditarias. *Obra única en su clase.* Madrid, 1875. Un volúmen en 8.°, de mas de 700 páginas, buena impresion y excelente papel, 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.

GUÍA DEL MÉDICO HOMEOPATA

A LA CABECERA DEL ENFERMO

Y REPERTORIO DE TERAPÉUTICA HOMEOPATICA.

Por el doctor B. HIRSCHEL. Traducido del aleman al francés por el doctor Leon Simon (hijo), y de este al español, por D. Silverio Rodriguez Lopez. Madrid, 1859. Un tomo en 12.°, 4 pesetas en Madrid y 4 pesetas y 50 cent. en provincias, franco de porte.

NOCIONES ELEMENTALES

ACERCA DE LA HOMEOPATÍA

Y DEL MODO DE PRACTICARLA

Con algunos de los mas importantes efectos de diez de los principales remedios homeopáticos; dedicadas á las personas de buena fé que quieran convencerse experimentalmente de la verdad de esta doctrina; por G. H. G. JAHR. Vertidas al castellano de la última edicion francesa, por los señores D. Tomás Pellicer, médico homeópata, y D. J. Alvarez Peralta (de Puerto Rico), escritor médico, individuo de la Sociedad Hahnemanniana matritense. — *Segunda edicion* española. Madrid, 1851. Un tomo en 8.°, 2 pesetas en Madrid y 2 pesetas y 25 céntimos en provincias, franco de porte.

NUEVA FARMACOPEA HOMEOPÁTICA

Ó HISTORIA NATURAL Y PREPARACION
DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS, Y POSOLOGIA, Ó DE LA ADMINISTRACION DE LAS DÓSIS.

Segunda edicion, revisada y considerablemente aumentada con 135 figuras intercaladas en el texto: por G. H. G. JAHR y CATELLAN. Traducida al español por D. Silverio Rodriguez Lopez, médico homeópata. Madrid, 1860. Un tomo en 8.°, buena impresion, con 135 grabados. Precio: 7 pesetas y 50 cént. en Madrid y 8 pesetas 50 cént. en provincias, franco de porte.

DEL TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

DE LAS

ENFERMEDADES DE LAS MUJERES

POR G. H. G. JAHR.

Traducido del francés por D. Silverio Rodriguez Lopez, médico homeópata. Madrid, 1862. Un tomo en 8.°, 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.

DEL TRATAMIENTO HOMEOPATICO

DE LAS AFECCIONES NERVIOSAS

Y DE LAS ENFERMEDADES MENTALES

POR EL DR. G. H. G. JAHR.

Traducido por D. Silverio Rodriguez Lopez. Madrid, 1865. Un tomo en 8.°, de mas de 600 páginas, 6 pesetas y 25 cént. en Madrid y 7 pesetas en provincias, franco de porte.

Esta importante obra comprende: 1.° la descripcion sintomatológica de la enfermedad y sus diversas variedades, el diagnóstico y el pronóstico; 2.° todas las indicaciones sintomatológicas y farmacológicas que la materia médica y los experimentos clínicos suministran para el tratamiento de estas afecciones.

MATERIA MEDICA HOMEOPATICA.

Patogenesia de los medicamentos llamados Brasileños; publicacion del Instituto homeopático de Rio-Janeiro, version castellana por ***. Madrid, 1859. Un tomo en 8.° Precio: 5 pesetas en Madrid y 6 en provincias, franco de porte.

ELEMENTOS
DE MEDICINA PRACTICA

Con el tratamiento Homeopático de cada enfermedad, por el doctor P. JOUSSET, presidente de la Sociedad médica homeopática de Francia, etc., etc.; traduccion hecha al castellano, anotada y cuidadosamente corregida por el decano de los Homeópatas españoles D. Pedro Rino y Hurtado, doctor en medicina y cirugia, etc., etc. Madrid, 1869. Tomo único, 15 pesetas en Madrid y 16 en provincias, franco de porte.

TRATADO
DE LAS ENFERMEDADES VENÉREAS

Y SU TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO

Por el doctor Simon hijo; traducido del francés al castellano, con autorizacion del autor, por un doctor en medicina y cirugia. Madrid, 1861. Un tomo en 8.°, 6 pesetas y 50 cént. en Madrid y 7 pesetas en provincias, franco de porte.

SISTEMATIZACION PRACTICA
DE LA MATERIA MÉDICA HOMEOPÁTICA

Por A. TESTE.

Vertida al castellano por D. Tomás Pellicer, médico homeópata, y D. J. Alvarez Peralta (de Puerto-Rico), escritor médico, individuos de la Sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid, 1855. Un tomo en 4.°, 8 pesetas en Madrid y 9 en provincias, franco de porte.

FORMULARIO PATOGENÉTICO USUAL

Ó Guia homeopática para tratar por sí mismo las enfermedades: por J. PROST-LACUZON, miembro corresponsal de la Sociedad médica homeopática de Francia, miembro titular de la Sociedad de emulacion del Jura, de la Sociedad de arqueologia, de zoologia. *Cuarta edicion*, corregida y aumentada; traducida al castellano por el doctor D. Pedro Rino y Hurtado, decano de los homeópatas españoles. Madrid, 1874. Un tomo en 12.°: en rústica, 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.

OBSERVACIONES PRACTICAS

DE SAMUEL HAHNEMANN

Y CLASIFICACION DE SUS INVESTIGACIONES

Sobre las propiedades caracteristicas de los medicamentos, por Lud. de PARSEVAL, doctor en medicina de la facultad de Paris. Traducidas al castellano por D. José Perez Valls, licenciado en medicina, etc. Un tomo en 8.°, 5 pesetas y 50 cént. en Madrid y 6 pesetas en provincias, franco de porte.

Esta obra, eminentemente práctica como lo indica su título, es indispensable á todo médico práctico, y tambien puede ser de mucho interés y hasta necesaria para toda persona que, lejos del facultativo, necesite cuidarse por sí mismo hasta la llegada de este.

La Intoxicacion puludiana ó el Paludismo.—Tratado completo de las Fiebres intermitentes, remitentes y continuas, de las neuropatías, caquexias y demás enfermedades que se producen por los miasmas palúdicos, con la Geografía médica de España en sus relaciones con estas enfermedades: por D. Anastasio GARCIA LOPEZ, antiguo interno de la facultad central, médico-director de baños minerales, etc. Madrid, 1861. Un tomo en 4.°, 6 pesetas en Madrid y 7 en provincias, franco de porte.

Exposicion de la doctrina médica homeopática, ú Organon del arte de curar. Por HAHNEMANN. *Tercera edicion*, arreglada á la sexta francesa, y aumentada con la vida y retrato del autor, publicada por el doctor D. Juan-Sanllehy. Barcelona. Un tomo en 4.°, 5 pesetas y 50 cént. en Madrid y 6 pesetas y 50 cént. en provincias, franco de porte.

Exámen crítico de la Homeopatía. Por el doctor D. Pedro MATA. Madrid, 1853. Dos tomos en 4.°, 15 pesetas en Madrid y 17 pesetas y 50 cént. en provincias, franco de porte.

Exámen crítico de la Medicina alopática desde su orígen hasta nuestros dias. Discursos expositivos de los principios dogmáticos de la Medicina homeopática; Hahnemann como reformador, y Profilaxis de las enfermedades epidémicas y hereditarias por el principio de los semejantes. Por MATA Y ALVAREZ. Madrid, 1864. Dos tomos en 4.°, 7 pesetas y 50 cént. en Madrid y 8 pesetas y 50 cent. en provincias, franco de porte.

Memoria sobre el Cólera morbo asiático, publicada por la sociedad Hahnemanniana matritense. Madrid, 1848. En 8.°, 1 peseta en Madrid.

Estudio médico del veneno de la Tarántula segun el método de Hahnemann. Por J. NUÑEZ. Madrid, 1864. Un tomo, 4 pesetas en Madrid y 5 en provincias, franco de porte.

CATALOGO MENSUAL

DE LA LIBRERÍA EXTRANJERA Y NACIONAL

DE D. CARLOS BAILLY-BAILLIERE

Plaza de Santa Ana, núm. 10, Madrid.

Esta *publicacion*, en la que se anuncia todo lo mas selecto en obras de ciencias, artes y literatura que salen á luz en España, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, Inglaterra, Portugal, etc., se remite *gratis* á todo el que lo solicita.

Tambien hay una seccion destinada á obras de **lance** procedentes de varias Bibliotecas, en las que se hace, por lo menos, una rebaja de un 50 por 100 sobre su primitivo valor.

SUSCRICIONES:

A todos los periódicos Españoles, Franceses, Ingleses, Alemanes, Belgas, Italianos, Portugueses, etc.

GRAN SURTIDO

De libros ilustrados magnificamente encuadernados y de todos los Almanaques y Calendarios ilustrados Españoles, Franceses, Ingleses, Italianos y Alemnes para 1876.

MR. AUBRY, *Fabricante de instrumentos de Cirugia, Física y Matemáticas, Proveedor de la Beneficencia municipal de Madrid.* — Boulevard Saint-Michel, núm. 6, Paris.—Esta Casa, la primera en su género, establecida hace mas de cincuenta años, surte los principales despachos de Paris, asi como tambien los del extranjero. En general, la fabricacion de casi todos los nuevos instrumentos le están confiados, pues su habilidad, perfeccion, precision y exactitud en todo ello la ha hecho acreedora á tener la preferencia sobre todas.

LA PROPAGANDA LITERARIA

— FUNDADA EN 1864. —

Casa editorial Cubana encargada por el Gobierno de la impresion de los Billetes de Loteria, de proveer de libros á los Institutos literarios y de la venta de láminas de la Calcografia Nacional.—Calle O'Reilly, núm. 54. **HABANA.**—*Corresponsal de D. C.* **Bailly-Bailliere.**

Tetuan de Chamartin —Imp. de C Bailly-Bailliere.

Digitized by Google

BIBLIOTECA DE CATALUNYA
1001986383

Digitized by Google

BIBLIOTECA CENTRAL
A 61-8°
1038

12 2

INSTITUT
D'ESTUDIS CATALÀ

BIBLIOTECA DE CATALÀ

Núm. 52152